

B. Prov.
XVI
171

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIÈRES:

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédé d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l'Ouvrage,
ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers Éditeurs
de l'Encyclopédie.*



AUTEURS.

On n'a pu citer dans le Frontispice que les principaux Auteurs de ce Dictionnaire; mais voici une liste de tous ceux qui y ont travaillé, avec les lettres par lesquelles ils sont désignés à la fin de chacun des articles qui leur appartiennent. Quelquefois on a écrit les noms en entier. M. de la Lande est seul Auteur de toute la partie astronomique.

M. d'Alembert.....	(O)
M. l'Abbé Boffut.....	(L. B.)
M. de la Lande.....	(D. L.)
M. le Marquis de Condorcet.....	(M. D. C.)
M. Castillon, père.....	(J. D. C.)
M. Castillon, fils.....	(F. D. C.)
M. Jean Bernoulli.....	(J. B.)
M. l'Abbé de la Chapelle.....	(F.)
M. Dargenville.....	(K.)
M. Diderot.....	
M. Rallier des Ournes.....	


646392

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

MATHÉMATIQUES,

Par MM. D'ALEMBERT, l'Abbé BOSSUT, DE LA LANDE,
le Marquis de CONDORCET, &c.

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins;

A LIÈGE,

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats.

M. DCC. LXXXIV.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILÈGE DU R^{oi}.

DISCOURS



DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

PAR M. L'ABBÉ BOSSUT.

LE NOM SEUL des Mathématiques, qui, dans son étymologie, veut dire *Instruction*, *Science*, peint d'une manière juste & précise l'idée noble qu'on doit s'en former. En effet, elles ne font qu'un enchaînement de principes, de raisonnemens & de conclusions, que la certitude & l'évidence accompagnent toujours : caractère propre des connoissances scientifiques.

On fait que les Mathématiques ont pour objet de mesurer, ou plutôt de comparer les grandeurs ; par exemple, les distances, les surfaces, les vitesses, &c. Elles se divisent en *Mathématiques pures* & *Mathématiques mixtes*, autrement appelées *Sciences Physico-Mathématiques*.

Les Mathématiques pures considèrent la grandeur d'une manière simple, générale & abstraite ; & par-là elles ont le précieux avantage d'être fondées sur les notions primordiales de la quantité. Cette classe comprend, 1.^o l'Arithmétique ou l'Art de compter. 2.^o La Géométrie, qui apprend à mesurer l'étendue. 3.^o L'analyse, science des grandeurs en général. 4.^o La Géométrie mixte, combinaison de la Géométrie ordinaire & de l'Analyse.

Les Mathématiques mixtes empruntent de la Physique une ou plusieurs expériences incontestables, ou bien supposent dans les corps une qualité principale & nécessaire : ensuite, par des raisonnemens méthodiques & démonstratifs, elles tirent du principe établi, des conclusions évidentes & certaines, comme celles que les Mathé-

Tome I. Mathématiques.

matiques pures tirent immédiatement des axiomes & des définitions. A cette seconde classe appartiennent, 1.^o la Méchanique, science de l'équilibre & du mouvement des corps solides. 2.^o L'Hydrodynamique, qui considère l'équilibre & le mouvement des corps fluides. 3.^o L'Acoustique ou la Théorie du son. 4.^o L'Optique ou la Théorie du mouvement de la lumière. 5.^o L'Astronomie, science du mouvement des corps célestes.

J'ai rangé ici les différentes parties des Mathématiques dans l'ordre qui me paroît le plus propre à montrer d'un coup - d'œil leur enchainement réciproque dans l'état où elles se trouvent aujourd'hui. Mais cet ordre n'est pas tout-à-fait conforme à leur développement historique, parce que le hasard & des circonstances particulières ayant souvent donné lieu à des découvertes, la filiation naturelle n'a pu être constamment observée.

Il est vraisemblable que la première origine des Mathématiques est presque aussi ancienne que celle des sociétés & des loix. Les hommes s'étant rassemblés, & chacun étant obligé de pourvoir à sa subsistance & à sa conservation, sans pouvoir attenter à la possession d'autrui, le besoin industrieux trouva sans doute bientôt les pratiques, au moins informes, de quelques arts de première nécessité, tels que ceux de bâtir des cabanes, de régler l'ordre des saisons, de mesurer les champs, &c. Or toutes ces connoissances appartiennent, dans le fonds, à la Méchanique, à l'Astronomie, à la Géométrie, &c. Mais elles ne furent d'abord que le fruit de l'expérience ou d'une routine aveugle. L'assiduité que demandoient les travaux de la campagne ne permettoit pas aux hommes de s'élever à des idées générales & réfléchies. Le cercle de leurs besoins bornoit celui de leurs pensées. Insensiblement l'inégalité des biens s'établit parmi eux. Quelques-uns ayant acquis une espèce de superflu, se livrèrent à l'oisiveté, plus conforme à la faiblesse de notre nature, qu'un travail pénible & souvent destructeur. Alors le tourment de l'ennui, attaché à l'inaction, vint porter le mouvement & l'inquiétude dans l'esprit humain, exciter sa curiosité, aggrandir la sphère de ses idées, & donner l'impulsion aux arts & aux sciences. A ce point mobile, se joignit l'aiguillon des honneurs & des récompenses accordés dans tous les pays aux hommes qui se distinguoient par leurs talens. Le chant, aussi ancien que le monde, & une poésie grossière, presque de même date, prirent une forme plus variée & moins barbare. Il y eut des Orateurs, des Poètes, des Peintres, des Architectes & des Sculpteurs. On observa les phénomènes de la nature, & on voulut en connoître les causes. La Géométrie, bornée d'abord à la mesure des champs, recula ses limites, & s'étendit

à des usages fondés sur des théories moins élémentaires. L'Astronomie, dont les Bergers de Chaldée, au milieu de leurs paisibles fonctions, avoient jeté les fondemens, s'enrichit de nouvelles observations & d'instrumens propres à les rendre plus exactes. Toutes les parties des Mathématiques firent successivement des progrès. Ils auroient été plus rapides, si l'ambition des hommes & tous les fléaux de la guerre, qu'elle entraîne après elle, n'avoient souvent obscurci le flambeau du génie, pendant une longue suite de siècles : mais, comme un feu caché sous la cendre, il reprit son éclat dans les tems plus heureux ; & l'édifice des Sciences s'est élevé par degrés.

Tous les peuples un peu considérables de l'ancien monde ont aimé & cultivé les Mathématiques. Les plus distingués en ce genre sont les Chaldéens, les Egyptiens, les Chinois, les Indiens, les Grecs, les Romains, les Arabes, &c, dans les tems modernes, les Nations occidentales de l'Europe. Quant aux Américains, ils n'avoient que les Arts mécaniques les plus nécessaires à la vie, & nulle théorie des Sciences, avant leur communication avec les Européens. Leur penchant naturel ne les porte point aux connoissances spéculatives, & la servitude où ils ont été réduits les empêcheroit de s'y livrer.

On ne peut former que des conjectures sur l'état des Sciences avant le déluge. Immédiatement après ce grand événement, le genre-humain ayant commencé à s'accroître, & à se diviser sur la surface de la terre, l'observation du cours des astres occupa les Chaldéens dans l'Asie, & les Egyptiens dans l'Afrique. Les premières connoissances de tous ces peuples ne se répandoient, & ne passaient d'âge en âge, que par la simple voie de la tradition. Aussi la plupart se perdirent, & il n'en est resté que la renommée.

Les Chinois commencèrent à s'adonner aux Sciences presque aussitôt qu'ils eurent formé un corps de peuple ; & cette époque remonte à la plus haute antiquité. Leurs premiers Souverains établirent, & les autres ont conservé un tribunal destiné expressément à l'enseignement des Mathématiques : cependant ils n'y ont jamais fait que des progrès assez bornés. Je citerai en exemple leur Astronomie, qui, sous le ciel le plus favorable aux observations, n'est pas plus avancée aujourd'hui, que l'étoit celle des Européens au tems de Tycho-Brahé. Attachée superstitieusement à ses anciennes institutions, la nation chinoise paroît dépourvue de cette activité inquiète qui cherche la nouveauté, & qui produit les découvertes.

Il en est à-peu-près de même des Indiens : les sciences sont fort anciennes chez eux ; ils ont connu, plusieurs siècles avant l'ère chré-

tienne, les tems des révolutions du soleil & de la lune; ils savoient prédire les éclipses; quelques auteurs leur attribuent le système de notre numération arithmétique; on croit que Pythagore alla puiser dans l'Inde le dogme de la Métempsychose: aujourd'hui ils sont beaucoup moins instruits que les Chinois.

Dans ces tems reculés, où les connoissances humaines commençoient à s'augmenter, les prêtres ou-mages de l'Égypte en étoient, pour ainsi dire, les dépositaires universels. Le Commerce ayant ouvert des communications entre les peuples de l'Orient, on venoit de toutes parts s'instruire en Égypte. Ce motif y attira plusieurs Philosophes Grecs, entre autres, Thalès de Milet & Pythagore de Samos. De retour en Grèce, Thalès y répandit les principes de la Géométrie, de la Physique & de l'Astronomie. Pythagore eut l'ambition des Conquêteurs: jaloux d'étendre l'empire des Sciences, il alla fonder en Italie une Ecole qui acquit en peu de temps une telle célébrité qu'il comptoit des princes & des législateurs parmi ses disciples.

L'Ecole d'Alexandrie, presque toute composée de Mathématiciens Grecs, entretint, pendant plus de dix siècles, le goût & l'étude des Sciences dans leur pays. Cet établissement fut l'ouvrage de Ptolomée-Lagus, qui, dans le démembrement des États conquis par Alexandre, avoit eu le Royaume d'Égypte en partage. Ses Successeurs fondèrent, à cet exemple, une immense bibliothèque, où l'on rassembloit, à grands frais, tous les livres que l'on pouvoit se procurer.

La haute idée qu'on se fait ordinairement des Romains, préoccupe l'imagination à tel point, qu'on ne peut songer, sans étonnement, à leur médiocrité dans les Mathématiques. Rivaux & quelquefois vainqueurs des Grecs dans l'éloquence, la poésie & l'histoire, ils n'en font ici que les disciples ou les commentateurs. Le talent de parler & de remuer l'imagination, menoit, chez eux, à la gloire & aux dignités: ils estimoient peu les connoissances abstraites & spéculatives, que le génie cultive en silence, & qui ne sont pas destinées à exciter les applaudissemens de la multitude.

Une surprise d'un genre opposé, est de voir les Arabes & les Persans, cent cinquante ans après Mahomet, se livrer aux Lettres, aux Sciences, & produire en particulier de très-grands Astronomes. Je joins ensemble ces deux peuples, parce qu'en effet, quand ils commencèrent à se polir, ils étoient soumis à la même religion & aux mêmes Souverains.

Enfin, à la renaissance des lettres & des arts en Europe, au tems des Médecins, les Mathématiques prennent, à leur tour, un mouvement rapide; & les progrès qu'elles ont faits depuis cette époque

Ann. 57. J. C.

510.

Ann. 88. J. C.

540.

Ann. 88. J. C.

540.

jusqu'à nos jours, forment pour elles comme un nouvel âge : nous ne pouvons pas en prédire la durée ; mais quelques révolutions que les Sciences puissent éprouver , il sera toujours regardé comme le plus brillant de tous , par l'importance des découvertes qui s'y sont faites , & sur-tout par celle des calculs *différentiel & intégral*.

M. de Montucla a écrit l'histoire des Mathématiques depuis leur origine, jusqu'au commencement de ce siècle , avec une sagacité & une profondeur, qui lui assurent l'estime & la reconnaissance de tous les Savans. Il ne s'est pas borné à faire connoître les travaux & la vie des grands hommes dont il parle : il remonte à la source des inventions : il en développe l'esprit & les progrès ; il instruit le lecteur , en satisfaisant sa curiosité.

Mon objet est simplement d'indiquer ici les principales découvertes qui se sont faites dans les Mathématiques. Je les rapporte à quatre périodes successives : la première s'étend depuis leur origine jusqu'au tems des Arabes ; la seconde , jusqu'au seizième siècle ; la troisième, jusqu'à la naissance de l'analyse infinitésimale ; la quatrième , jusqu'à nos jours. Je suivrai , le plus qu'il me sera possible , l'ordre historique : évitant de trop morceler les différentes parties du récit , & donnant à chacune d'elles le corps & l'étendue que pourront permettre la nature du sujet , & la succession chronologique des connoissances.

P R E M I E R E P É R I O D E.

DANS CE TABLEAU, l'Arithmétique se présente en première ligne, par son antiquité & ses usages. Rien n'est plus clair & plus élémentaire, que l'idée de *nombre* : aussi-tôt que l'homme ouvrit les yeux, il put compter ses doigts, les arbres qui l'environnoient, les brebis de ses troupeaux, &c. Ces calculs, si on peut leur donner ce nom, se firent d'abord avec le simple secours de la mémoire : ensuite, pour les faciliter & les étendre davantage, on employa des petites boules enfilées par un cordon, comme les grains d'un chapelet : ces boules représentoient par leur nombre, celui des objets qu'on vouloit compter. L'invention de l'écriture fit faire un nouveau pas à l'Arithmétique : on traçoit sur des tables couvertes de poussière, les caractères qu'on avoit destinés à représenter les nombres ; & par-là, on pouvoit exécuter des calculs d'une certaine étendue.

Toutes les nations, si on excepte les anciens Chinois, & une peuplade obscure dont Aristote fait mention, ont distribué les nombres en périodes, composées chacune de dix unités. Cet usage ne peut guère s'attribuer qu'à celui où l'on est naturellement dans l'enfance,

 ARITHMÉ-
TIQUE.

de compter par ses doigts, qui sont au nombre de dix. Les anciens se sont également accordés à représenter les nombres par les lettres de leur alphabet. On distinguoit les différentes périodes de dixaines, par des accens dont on affectoit les lettres numériques, comme chez les Grecs, ou par différentes combinaisons des lettres numériques, comme chez les Romains. Toutes ces notations, & principalement celle des Romains, étoient fort composées & fort incommodes quand il s'agissoit d'exprimer des nombres un peu considérables.

Strabon raconte dans sa *Géographie*, qu'on attribuoit de son tems l'invention de l'arithmétique, comme celle de l'écriture, aux Phéniciens. Cette opinion a pu en effet trouver d'autant plus de facilité à s'établir, que les Phéniciens ayant été les plus anciens commerçans de la terre, ont dû naturellement perfectionner une science dont le commerce fait un usage continuel; mais les premiers principes de l'Arithmétique étoient connus depuis long-tems des Egyptiens.

On lit, dans plusieurs auteurs, que Pythagore avoit poussé fort loin les combinaisons des nombres : ils ajoutent, que son imagination vive & portée à l'esprit de système, attachoit des vertus mystérieuses à certaines propriétés de ces combinaisons; mais on n'en parle que par conjecture : tout ce qu'il peut avoir écrit sur ce sujet est perdu; le tems n'a respecté que sa table de multiplication.

Comme l'Arithmétique étoit, dans son premier objet, une science bornée, les anciens ne l'ont cultivée en général qu'à cause de ses applications aux autres parties des Mathématiques. Ajoutons que leur manière de représenter les nombres n'étoit pas avantageuse pour faire des découvertes qui auroient demandé des calculs abstraits & compliqués.

L'Arithmétique ne prit une forme simple & commode qu'entre les mains des Arabes, comme nous le remarquerons plus expressément sous la seconde période.

GEOMETRIE. ON DONNE différentes origines, plus ou moins vraisemblables; à la Géométrie. La plupart des auteurs la font naître en Egypte. Tel est, par exemple, Hérodote, le premier qui, parmi les anciens, ait écrit l'Histoire en prose : car auparavant on n'écrivoit qu'en vers; tout étoit embelli & dénaturé par les fictions de la poésie. Écoutons ce qu'il en dit, d'après ce qu'il avoit appris lui-même dans ses voyages à Thèbes & à Memphis (1). *On m'assura que Sésostris avoit partagé l'Egypte entre tous ses sujets, & qu'il*

(1) Hérodote, liv. II.

avoit donné à chacun une égale portion de terre en quarré , à la charge d'en payer , par an , un tribut proportionné : si la portion de quelqu'un étoit diminuée par la rivière , il alloit trouver le Roi , & lui exposoit ce qui étoit arrivé dans sa terre ; en même tems le Roi envoyoit sur les lieux & faisoit mesurer l'héritage , afin de savoir de combien il étoit diminué , & de ne faire payer le tribut que selon ce qui étoit resté de terre. Je crois , ajoute Hérodote , que ce fut de-là que la Géométrie prit naissance , & qu'elle passa chez les Grecs. Si , comme le supposent plusieurs chronologistes , Sésostris est le même que le roi Sésac , qui fit la guerre à Roboam , fils de Salomon , la naissance de la Géométrie ne précéderoit , suivant Hérodote , que d'environ mille ans l'ère chrétienne. Cette ancienneté n'est pas suffisante , pour rendre raison des progrès qu'il paroît que l'Astronomie avoit déjà faits avant le tems de Sésostris. Car on n'a pu passer de la stérile contemplation des cieus à un corps de connoissances liées & suivies , que par le moyen de l'Arithmétique & de la Géométrie.

Les plus grands progrès de l'ancienne géométrie sont dûs aux Grecs & aux Mathématiciens de l'école d'Alexandrie. Je confonds toujours ensemble les travaux des uns & des autres. Thalès de Milet montra le premier l'usage de la circonférence du cercle pour la mesure des angles. Il détermina la hauteur des pyramides de l'Egypte , par l'étendue de leur ombre , méthode fondée sur la théorie des lignes proportionnelles ou des triangles semblables. Pythagore est regardé comme l'inventeur de la belle propriété qu'a le quarré de l'hypoténuse , dans le triangle rectangle , d'être égal en surface à la somme des quarrés des deux autres côtés. Quelques auteurs ont écrit que dans l'ivresse de la joie que lui causa cette découverte , il sacrifia cent bœufs aux Muses pour les remercier de l'avoir si bien inspiré ; mais on a de la peine à concilier ce fait avec la fortune bornée du Philosophe , & plus encore avec ses idées religieuses sur la transmigration des ames.

Il seroit difficile de faire une énumération un peu exacte des anciens philosophes grecs qui ont accru le domaine de la Géométrie. Contentons-nous d'observer en général qu'ils ont trouvé presque toutes les propositions qui composent ce qu'on appelle encore aujourd'hui les *Elémens* de cette science. Elle fit , en deux siècles , de si grands progrès dans la Grèce , qu'au tems de Platon on jetta les fondemens de la théorie des sections coniques.

Platon lui-même est regardé comme le premier qui ait remarqué la formation de ces courbes. Quelques Géomètres de son école , tels que Aristée , Eudoxe , Mnechme & son frère Dinostrate , com-

An. av. J.-C.
110.

mencèrent à découvrir leurs propriétés. On eut bientôt l'occasion de les appliquer à deux problèmes célèbres dans l'antiquité.

L'un de ces problèmes avoit pour objet la duplication du cube, ou la manière de faire un cube double d'un autre. C'étoit une ancienne tradition dans la Grèce, que les Athéniens ayant irrité Apollon, il avoit envoyé la peste dans leur pays, & que l'Oracle du temple de Délos, consulté sur les moyens de faire cesser ce fléau, avoit répondu : *doublez l'autel d'Apollon*. L'oracle désignoit ainsi un petit autel d'or, de forme cubique, qu'Apollon avoit dans Athènes, & dont sans doute il n'étoit pas content. Le problème est aussitôt proposé à tous les Géomètres de la Grèce. Au tems de Platon, il fut agité avec la plus grande chaleur. On chercha pendant long-tems à le résoudre, sans employer d'autres instrumens que la règle & le compas : car les opérations exécutées de cette manière étoient les seules que l'on regardât alors comme géométriques ; mais ce moyen ne réussit point & ne pouvoit réussir. En examinant la question sous toutes les faces, les Géomètres reconnurent que si l'on pouvoit trouver deux moyennes proportionnelles entre le côté du cube donné & le double de ce côté, la première de ces deux lignes seroit le côté du cube cherché. Dès-lors ils dirigèrent leurs méditations vers ce but. Platon détermina les deux moyennes proportionnelles, à la faveur d'un instrument particulier de son invention ; mais cette méthode supposoit la description d'une courbe du troisième ordre, & n'avoit pas ce caractère de simplicité, si précieux en géométrie, sur-tout chez les anciens. D'autres Géomètres proposèrent d'autres moyens sujets à de semblables inconvéniens. Enfin ; Mnechme trouva que les deux moyennes proportionnelles pouvoient être considérées comme les ordonnées de deux sections coniques, qui étant construites suivant les conditions du problème, se coupoient en deux points propres à le résoudre. La question ainsi réduite, donna la naissance à la célèbre théorie des *lieux géométriques*, dont les anciens & les modernes ont fait tant d'applications. Il ne s'agissoit plus, pour la mettre en pratique, que d'imaginer des instrumens simples & commodes pour tracer les sections coniques ; ce qui n'a jamais été difficile. La solution de Mnechme fut bientôt simplifiée : on s'aperçut qu'au lieu d'employer deux sections coniques, on pouvoit se contenter de combiner un cercle avec une seule section conique. Les Géomètres proposèrent encore successivement plusieurs autres courbes pour le même objet : telles que la *conchoïde* de Nicomède, la *cissoïde* de Dioclès, &c.

L'autre problème, que nous avons indiqué, consistoit à diviser un angle en trois parties égales. Après avoir appris de la géométrie élémentaire

élémentaire à couper un angle en deux parties égales, on devoit naturellement chercher à le couper en trois parties, ou même dans un rapport quelconque. On trouva que le problème de la trisection de l'angle dépendoit de principes analogues à ceux de la duplication du cube, & qu'il pouvoit se construire ou par l'intersection de deux sections coniques, ou par l'intersection d'un cercle avec une section conique.

Euclide, géomètre de l'école d'Alexandrie, conçut un projet dont l'exécution a été très-utile au progrès de la science dont il s'occupoit. Il rassembla en un corps d'ouvrage les propositions de géométrie élémentaire, auparavant isolées & éparpillées dans les écrits des premiers inventeurs; il y en ajouta un grand nombre d'autres, & il forma, de l'ensemble, ses fameux *Elémens*. De quinze livres dont ils sont composés, il n'y en a que onze où l'auteur traite proprement de la Géométrie : les autres contiennent une théorie générale des proportions, & les principaux caractères des nombres, soit commensurables, soit incommensurables.

En rendant toute la justice qui est due à cet excellent ouvrage; on regrette quelquefois qu'Euclide ait employé trop de définitions & de divisions scholastiques, trop de scrupule à démontrer des choses claires d'elles-mêmes. Il semble que la méthode subtile & pointilleuse des sophistes grecs, avoit cherché à pénétrer dans les sciences exactes. Peut-être faut-il attribuer à cette cause les difficultés que Ptolomée-Philadelphie, Roi d'Egypte, éprouvoit dans l'étude des mathématiques. Rebuté par ces difficultés, il demanda un jour à Euclide s'il ne pouvoit pas les applanir en sa faveur. Le philosophe répondit ingénuement : *non, prince, il n'y a point de chemin particulier pour les rois.*

Les propriétés du cercle forment une partie considérable de la géométrie élémentaire. Quand on fut quarrer les figures rectilignes, on chercha aussi à quarrer le cercle, que l'on peut regarder comme un polygone régulier d'une infinité de côtés : on reconnut-bientôt que la surface de cette courbe est égale à la moitié du produit de la circonférence par le rayon; & qu'ainsi, pour la transformer en un quarré, il falloit commencer par déterminer le rapport de la circonférence au rayon ou au diamètre. Le géomètre Dinostrate avoit imaginé une courbe qui auroit donné la solution de ce problème, si on eût pu la construire d'une manière certaine & sans tâtonnement : on l'a nommée, par cette raison, la *quadratrice*; mais elle est du nombre des courbes *mécaniques*, & ne fournit réellement aucun secours pour l'objet qu'elle regardoit. Il est démontré, dans les élémens d'Euclide, que les circonférences de deux cercles sont comme les

AN. XV. J. C.
250.

diamètres, & que leurs surfaces sont comme les quarts des diamètres; mais l'auteur n'enseigne point à comparer la circonférence avec le diamètre. Archimède, le plus grand Géomètre de l'antiquité, & postérieur d'environ un demi-siècle à Euclide, découvrit le rapport de ces deux lignes, sinon rigoureusement, au moins d'une manière approchée & renfermée entre des limites connues : la méthode qu'il y employa est le premier exemple d'un problème résolu par approximation : exemple si utile & si souvent imité. En inscrivant & circonscrivant au cercle une suite de polygones réguliers, dont le nombre des côtés alloit en progression double, & poussant le nombre des termes de cette progression jusqu'à quatre-vingt-seize, il fit voir que si l'on représente le diamètre par 7, la circonférence est représentée par un nombre de très-peu de chose moindre que 22. La quadrature exacte & rigoureuse du cercle est encore aujourd'hui l'écueil des Géomètres, ou plutôt de ceux qui sont presque étrangers à la géométrie; car lorsque l'on connoît le vrai point de la difficulté, on n'est guères tenté de s'occuper de cette recherche.

Sans citer en détail les nombreuses découvertes géométriques d'Archimède, je dirai seulement que les plus importantes sont la proportion de la sphère avec le cylindre circonscrit, la quadrature de la parabole, la construction de la spirale & la manière d'en mener les tangentes. Il attachoit le plus grand prix à la première : car il ordonna que l'on plaçât, sur son tombeau, une sphère inscrite dans un cylindre, avec les nombres qui expriment les rapports de de ces deux solides.

AN. XV. J. C.
300.

La théorie des sections coniques, quoique déjà avancée au tems d'Euclide, n'entroît pas dans le plan de son ouvrage. Un autre Géomètre de l'école d'Alexandrie, Appollonius, né à Pergée en Pamphlie, fit, de cette théorie, la matière d'un savant traité. Il y développe toutes les propriétés des sections coniques par rapport à leurs axes, à leurs diamètres & à leurs tangentes. Il démontre ces Théorèmes, aujourd'hui si connus & alors si remarquables, que dans l'ellipse ou l'hyperbole, le parallélogramme fait autour de deux diamètres conjugués est égal au rectangle fait autour des deux axes; & que la somme ou la différence des carrés de deux diamètres conjugués est égale à la somme ou à la différence des carrés des deux axes. Il résout plusieurs questions concernant les plus grandes ou les plus petites lignes qu'on peut mener de certains points aux circonférences des sections coniques, &c. Cet ouvrage porte par-tout l'empreinte d'un génie inventeur; aussi fit-il donner à l'auteur, de son vivant même, le surnom de *Grand Géomètre*.

Appollonius étoit en effet supérieur à tous ses contemporains ; il n'enlève pas à Archimède la première place parmi les anciens Géomètres, la seconde lui est du moins assurée.

Dans les fréquentes applications que les anciens faisoient de la géométrie à la pratique, ils sentirent bientôt le besoin, & ils cherchèrent les moyens de connoître un triangle, par la relation de ses côtés & de ses angles ; ce qui est l'objet de la trigonométrie rectiligne : aussi cette branche de la géométrie pratique est-elle fort ancienne. Comme elle est principalement utile à l'astronomie, elle doit ses progrès à des Géomètres qui faisoient une étude particulière de cette science.

Le *Traité des Sphériques* de Théodose est un morceau précieux de l'ancienne Géométrie. L'Auteur exantme en général, dans cet ouvrage, les propriétés qu'ont les uns, par rapport aux autres, les cercles que l'on forme en coupant une sphère par des plans quelconques. La plupart des propositions qu'il donne, paroissent aujourd'hui évidentes au premier coup-d'œil ; mais elles n'en devoient pas moins trouver place dans un Livre Élémentaire ; & d'ailleurs on fait que les anciens Géomètres s'attachoient à tout démontrer dans la plus grande rigueur. Cet ouvrage a été, dans son tems, une excellente introduction à la *Trigonométrie Sphérique*.

Sur la fin du quatrième siècle, depuis l'ère chrétienne, Pappus d'Alexandrie donna ses collections mathématiques : ouvrage recommandable par le savoir qui y règne, & par l'analyse qu'on y trouve d'un grand nombre de traités qui sont perdus aujourd'hui. Il nous représente à-peu-près l'état de l'ancienne Géométrie. On trouve dans la Préface, l'énoncé d'un fameux Théorème que le Père Guldin, Jésuite, a inventé depuis, avant que cet endroit de la Préface de Pappus fut imprimé. Ce Théorème porte, que les figures ou les solides produits par la circonvolution d'une ligne ou d'une surface, sont en raison composée de la ligne ou surface génératrice, & des circonférences décrites par leurs centres de gravité.

L'ancienne Géométrie a aussi quelques obligations à Proclus, Chef de l'Ecole Platonicienne, établie à Athènes. Il encouragea les Savans par son exemple & par ses instructions ; il a laissé sur le premier Livre d'Euclide, un commentaire qui contient plusieurs observations utiles, concernant l'histoire & la métaphysique de la Géométrie. Il eut pour successeur, dans son École, Marinus, Auteur d'une introduction aux données d'Euclide. Viennent ensuite *Isidore de Milet* & *Anthémios*, tous deux habiles Géomètres & Mécaniciens : *Eutocius*, Commentateur d'Archimède ; *Dioclès*,

b ij

An 27. J. C.
60.An. de J. C.
450.An de J. C.
450.

inventeur de la Cissoïde, &c. Je ne m'entends pas sur des fragmens qui ne présentent aucune découverte remarquable.

De tout tems, le spectacle des Cieux & du mouvement des corps semés dans cette immense étendue, ont attiré les regards des hommes; mais, comme nous l'avons déjà observé, l'Astronomie ne commença à devenir une véritable science, qu'é lorsque l'on y appliqua l'Arithmétique & la Géométrie : elle ne peut donc être mise qu'au troisième rang pour l'ancienneté.

ASTRONOMIE.

Les premiers hommes régloient les tems sur les mouvemens du soleil & de la lune. On s'étoit d'abord aperçu que dans le mouvement journalier qui paroît emporter tous les astres d'orient en occident, le soleil & la lune changeoient continuellement de place par rapport aux étoiles, tandis que celles-ci demeuroient toujours aux mêmes distances respectives les unes des autres. On avoit remarqué aussi que le soleil & la lune partant d'un point du Ciel, y revenoient après avoir achevé une révolution entière d'occident en orient; que ces mouvemens étoient d'ailleurs inégaux entr'eux, & que la lune faisoit un peu plus de douze tours, pendant que le soleil n'en faisoit qu'un seul. Dès-lors on divisa l'année, ou le tems de la révolution solaire, en douze mois, qui comprenoient chacun une révolution lunaire, à-peu-près.

Si l'on s'en rapporte à ce que dit Joseph, dans ses *antiquités Judaïques*, les Patriarches devoient être fort versés dans l'Astronomie; car ils avoient reconnu, selon lui, que le soleil & la lune étant supposés répondre au même endroit du Ciel, pour une certaine époque, devoient y répondre de nouveau après un espace de six cens ans. D'un autre côté, on lit dans l'*Almageste* (1) de Ptolomée, que ceux qu'on appelloit les anciens Astronomes dès le tems d'Hyparque, ayant trouvé par une longue suite d'observations d'éclipses lunaires, que le mouvement de la lune étoit inégal tant en longitude qu'en latitude, & que l'apogée & le périée parcouroient successivement tous les signes du zodiaque, avoient cherché à comprendre tous ces mouvemens dans des périodes formées d'un nombre égal de mois inégaux; que Hyparque rectifia ces périodes sur les anciennes observations les plus exactes, & qu'enfin il parvint à faire tomber, sous des époques fixes & déterminées, les mouvemens du soleil & de la lune, le mouvement de l'apogée & du périée, & la succession des éclipses lunaires en nombre égal. On

(1) Mot dérivé de l'arabe, qui veut dire grande composition.

voit que ces témoignages font remonter bien haut l'antiquité de l'Astronomie; mais il faut avouer que la période, citée par Joseph, & même celle que Ptolomée attribue à Hyparque, paroissent appuyées sur des fondemens peu solides. Elles supposent, dans des tems obscurs, un trop grand nombre d'observations, & d'observations très-exactes; aussi la plupart des Astronomes les regardent-ils l'une & l'autre comme controuvées.

Je ne me perdrai pas dans ces savantes ténèbres: la gloire de les percer appartient au célèbre Historien de l'Astronomie; je me borne aux faits les plus avérés & les plus remarquables.

On s'accorde assez généralement à regarder les Chaldéens, & bientôt après les Égyptiens, comme les premiers inventeurs de l'Astronomie. Des Auteurs modernes revendiquent cette gloire aux Chinois, parce que les anciens écrivains de la Chine parlent de deux phénomènes Astronomiques, qu'on prétend en conséquence y avoir été observés: le premier est une conjonction de cinq planètes, qu'on place entre les années 2513 & 2437; le second, une éclipse de soleil, arrivée en 2155. Je compte les années, en remontant depuis l'ère chrétienne. Examinons brièvement la force de ces preuves.

Le calcul Astronomique démontre qu'il n'y a point eu de conjonction de cinq planètes, dans l'intervalle de tems indiqué. M. Kirc, célèbre Astronome, a trouvé, à la vérité (1), que l'an 2449, le 28^e Février, Saturne, Jupiter, Mars & Mercure, s'étoient rencontrés d'un même côté du Ciel, entre le XI.^{me} & le XVIII.^{me} degré des poisons; qu'en même tems, le soleil & la lune étoient en conjonction, vers le XVIII.^{me} degré du verseau, & que Vénus étoit vers le XV.^{me} degré du Capricorne: mais ce phénomène ne peut pas être pris pour une conjonction de cinq planètes, sans donner à ce mot un sens forcé & arbitraire; on aimera mieux sans doute penser que les anciens Auteurs Chinois ont parlé au hasard d'une conjonction de cinq planètes, & non d'après des observations. Quant à l'éclipse de l'an 2155, les Missionnaires Mathématiciens ont trouvé que les Chinois ne l'avoient pas observée, mais qu'ils l'avoient calculée longtemps après.

Selon M. de Mairan & M. de Guignes, la plupart des loix & des usages, le genre d'écriture, les arts & les sciences des Chinois, sont dûs à une Colonie d'Égypte, qui arriva chez eux quinze ou seize cens ans avant l'ère chrétienne (2).

(1) *Miscellanea Berolinensia*, tome III, pag. 165.

(2) Lettres de M. de Mairan & du P. Parennin.

Tandis que les Savans perfectionnoient l'Astronomie, le besoin ou la cupidité la faisoit servir à l'extension du commerce. Les Phéniciens, aussi entreprenans qu'industriels, commencèrent à employer les observations célestes pour se conduire dans leurs voyages, & ils en furent retirer un tel secours, qu'il portèrent le commerce dans des pays très-éloignés, se rendirent les maîtres de la mer, passèrent le détroit de Gibraltar, & fondèrent plusieurs Colonies sur les côtes de la méditerranée & de l'océan (1).

Thalès apporta de l'Egypte & de la Phénicie, dans la Grèce, la science des Astres. Il fit connoître à ses compatriotes la théorie des mouvemens du soleil & de la lune; il leur expliqua les raisons de l'inégalité des jours & des nuits; il leur apprit l'art de prédire les éclipses du soleil & de la lune, & lui-même mit cet art en pratique sur une éclipse qui arriva peu de tems après. La renommée de son savoir & des choses extraordinaires qu'il enseignoit, lui attira un grand nombre de disciples, qui contribuèrent, à leur tour, à perpétuer & à étendre la même doctrine. Un des plus illustres élèves de Thalès, fut le philosophe Anaximandre, à qui l'on doit l'idée de représenter le ciel étoilé sur la surface d'un globe. On lui attribue aussi le premier usage du gnomon; on prétend qu'il s'en servit à Lacédémone pour déterminer l'obliquité de l'écliptique, les solstices & les équinoxes.

■ L'école que Pythagore avoit fondée en Italie, s'adonna principalement à l'étude des mouvemens célestes. On rapporte que ce Philosophe & ses premiers disciples voyant que les étoiles changeoient de hauteur par rapport à un voyageur qui change sensiblement de place sur la surface de la terre, en conclurent que cette surface n'étoit pas un simple plan, comme on est d'abord porté à le croire, mais qu'elle étoit courbe, & formoit l'enveloppe d'une sphère. Pythagore eut une autre idée, tout aussi vraie & encore plus singulière pour ce tems-là : il jugea que le soleil étoit immobile au centre de notre monde, & que la terre tournoit autour de cet astre. Mais, comme cette idée choquoit ouvertement le témoignage des yeux & les préjugés vulgaires, il se contentoit de l'enseigner en secret à ses disciples, soit que ne pouvant l'établir sur un nombre suffisant d'observations, il ne la regardât que comme une simple conjecture, soit qu'il craignît, en la mettant au grand jour, de s'exposer à la dérision publique, ou peut-être aux persécutions de l'ignorance & du fanatisme : car ces deux ennemis de

(1) M. Cassini, origine & progrès de l'Astronomie, *ans. Mémoires de l'Académie*, tom. VIII.

la raison ont exercé leur despotisme dans tous les siècles. Il n'est pas besoin de descendre aux tems modernes pour en trouver d'insignes exemples : on sait que le philosophe Anaxagore fut accusé d'impiété, & condamné au bannissement, pour avoir dit que le soleil étoit une masse de matière enflammée : quelques auteurs ajoutent qu'il n'échappa au supplice que par le crédit de Pericles, son disciple, & son ami.

Dès les premiers tems de l'Astronomie, on avoit cherché à distinguer les parties du ciel, en distribuant les étoiles par groupes ou *constellations*. La connoissance de la petite ourse, où se trouve l'étoile polaire, est de toute ancienneté. C'étoit par elle que les Phéniciens dirigeoient leurs courses. Les Grecs étendirent & perfectionnèrent la division du ciel étoilé, tantôt en augmentant le nombre des constellations, tantôt en leur donnant des noms qui servoient à les reconnoître facilement. Ces noms étoient tirés de la mythologie, ou de la ressemblance, réelle ou supposée, des constellations avec certains animaux. Une imagination brillante & ingénieuse égayoit l'austérité & la sécheresse du sujet. Par exemple, les Pléiades que l'on nomme ainsi, à cause de leur multitude, étoient les filles d'Atlas & de la nymphe Pléyone : elles sont accompagnées de la constellation d'Orion, brillante par sa grandeur & la lumière : de-là, on seignit qu'Orion étoit un géant qui poursuivoit les Pléiades, & qui vouloit arriérer à leur honneur. Tout le Ciel des Grecs étoit plein d'allusions à des événemens fabuleux ou historiques.

On a beaucoup disputé entre les Savans, sur l'origine & la division du zodiaque. L'opinion la plus accréditée, est que les Grecs ont établi l'ordre & la nomenclature des constellations dont il est composé, vers le tems de Thalès.

Les cinq planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus & Mercure, ont été connues distinctivement, à-peu-près vers le même tems ; mais on n'a commencé à les observer avec une certaine précision, qu'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Les anciens avoient aussi remarqué plusieurs comètes ; mais comme elles ne faisoient que de courtes apparitions, & que souvent elles étoient accompagnées de ces longues *queues*, ou traînées de lumière, qui épouvantoient les yeux & l'imagination, on ne les regardoit pas comme des astres, mais comme de simples météores, signes de la colère céleste, ou précurseurs de quelque grand événement. L'Astronomie des comètes est une science toute moderne. Sénèque a eu cependant le mérite de sentir qu'elles pouvoient être des corps solides, semblables aux planètes, & qu'un jour on parviendroit à connoître leurs mouvemens.

Les premiers Astronomes Grecs chetchèrent avec ardeur, à découvrir le rapport qui existe entre les mouvemens du soleil & de la lune. C'étoit en effet un problème de la plus grande importance. La division du tems, par les révolutions lunaires, étoit fort commode pour régler les affaires civiles & religieuses; mais elle n'avoit pas le même avantage pour l'ordre des saisons, qui dépend du cours du soleil, & auquel il falloit assujettir les semailles, premier besoin de la société.

AN. 27. J. C.
413.

Meton & Euctemon, Astronomes Athéniens, conçurent, d'après les observations, l'idée d'enfermer le mouvement du soleil & de la lune dans une période ou cycle de 19 ans, dont douze étoient composés de douze lunaïsons, & les sept autres, de treize lunaïsons, ce qui formoit en tout deux cens trente-cinq lunaïsons. Cette découverte, qui parut alors réunir la simplicité à la plus grande exactitude, eût un tel succès & un tel éclat dans la Grèce, qu'on fit graver en lettres d'or sur des tables d'airain, l'ordre de la période, d'où lui est venu le nom de *nombre d'or*. Cependant elle avoit réellement le défaut d'anticiper d'environ dix heures sur les révolutions solaires, & d'environ sept heures & demie sur les révolutions lunaires; ce qui produisit au bout de trois ou quatre cycles, une erreur sensible pour le tems de la pleine lune. Callipe, qui vivoit environ cent ans après Meton, essaya de corriger ce défaut, en formant un nouveau cycle de soixante-seize ans, dont il retranchoit un jour au bout de ce tems; ainsi, cette période étoit composée de quatre cycles Metoniens, dont trois comprenoient 6940 jours, & le quatrième, seulement 6939 jours. Quoique plus exacte que celle de Meton, elle anticipoit néanmoins encore de quelque chose, sur les mouvemens du soleil & de la lune; elle fut perfectionnée par d'autres Astronomes: mais faute de connoître, avec une précision suffisante, les mouvemens du soleil & de la lune, les anciens n'ont jamais pu former qu'un calendrier assez imparfait.

A l'exemple des Phéniciens, plusieurs autres peuples entreprirent des navigations & des voyages dans les pays éloignés. C'est ainsi que les Grecs, instruits par leurs Astronomes, avoient osé depuis long-tems se commettre en mer, & qu'ils avoient fondé, loin de chez eux, plusieurs célèbres colonies: comme celles de Marseille, de Tarente, de Sicile, &c.

En favorisant le commerce, l'Astronomie en retiroit, à son tour, l'avantage de se répandre de tous côtés. Nous avons le plaisir de compter nos pères, les anciens Gaulois, au nombre des peuples qui ont eu cette Science en vénération. Jules-César dit, dans ses *Commentaires*, que les Druides, parmi les instructions qu'ils donnoient à la

à la jeunesse, lui enseignoient particulièrement ce qui regarde le mouvement des astres, & la grandeur du ciel & de la terre, c'est-à-dire, l'Astronomie & la Géographie. Si les Gaulois n'ont pas laissé d'observations, ou si le tems les a détruites, nous savons du moins qu'ils étoient très-versés dans la navigation; car, suivant M. Cassini (1), ils avoient fondé des colonies sur les côtes d'Espagne, sur le Pont-Euxin & en plusieurs autres endroits.

Un célèbre Astronome, natif de Marseille, Pytheas, y observa la hauteur méridienne du soleil au tems des solstices, par le moyen du gnomon. L'objet de cette observation étoit simplement de déterminer la latitude de Marseille: quelques Astronomes modernes ont voulu la faire servir à prouver une diminution dans l'obliquité de l'écliptique.

Pytheas poussa ses voyages fort loin vers le pôle arctique, par l'Océan occidental. A mesure qu'il avança vers le nord, il remarquoit un progrès dans les diminutions des nuits au solstice d'été. Étant parvenu à une île, qu'il appella l'île de *Thulé*, il vit que le soleil se levait presque aussi-tôt qu'il étoit couché; ce qui arrive dans l'Islande & dans les parties septentrionales de la Norvège: d'où l'on a conclu que Pytheas avoit pénétré dans ces pays. Les anciens, qui les regardoient comme inhabitables, traitèrent de fabuleuses les relations de Pytheas; mais les navigateurs modernes ont justifié ce Philosophe, & lui ont assuré la gloire d'avoir découvert des régions auparavant inconnues, & d'avoir distingué les climats par la différente longueur des jours & des nuits.

Le goût d'Alexandre pour les Sciences, & sur-tout l'envie de faire connoître à la postérité les pays où il avoit porté ses conquêtes, furent très-avantageux à l'Astronomie. Aristote écrivit plusieurs ouvrages par ordre de ce Prince. Dans celui qui a pour titre de *Céleste*, il prouve la forme sphérique de la terre, par la rondeur de l'ombre qu'elle jette sur la lune dans les éclipses, & par les changemens qui paroissent arriver aux hauteurs des étoiles, à mesure qu'on s'éloigne ou qu'on s'approche des pôles. Le livre de *Mundo*, qu'on attribue au même Philosophe, contient une description assez exacte de l'ancien monde, que l'auteur divise en trois parties, l'Europe, l'Asie & l'Afrique. Mais le plus grand service qu'Alexandre rendit aux Sciences, fut de faire mesurer les pays de sa domination avec une exactitude dont il n'y avoit pas encore d'exemple. Il ne voulut pas qu'on se contentât d'établir les distances des lieux sur l'estime des voyageurs, comme on l'avoit toujours pratiqué, mais

An. av. J. C.
310.

An. av. J. C.
330.

(1) Origine de l'Astronomie.
Tome I. Mathématiques;

qu'on les mesurât chacune en particulier. Il voulut de plus qu'on observât la position des objets terrestres à l'égard des parties du ciel. Callisthène étoit chargé de ce dernier travail. Étant arrivé à Babylone, il y recueillit les observations astronomiques que les Chaldéens avoient faites, suivant quelques Auteurs, pendant l'espace de 1903 ans.

Nous ne dissimulons pas qu'il n'existe aucune preuve que les observations des Chaldéens remontent si haut, ou du moins que les plus anciennes aient été faites avec assez d'exactitude pour en tirer des résultats certains. L'Astronomie chaldéenne ne date d'une manière bien connue, que depuis l'ère de *Nabonassar*, premier Roi de Babylone, qui commença à régner l'an 746 avant Jésus-Christ.

Les Sciences continuèrent de s'accroître rapidement chez les Grecs, dans les deux ou trois premiers siècles qui suivirent la mort d'Alexandre. Les libéralités des nouveaux Rois d'Egypte alloient chercher dans tous les pays du monde les savans les plus illustres, & les attiroient à Alexandrie. Conon y fit plusieurs observations, qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Aristille & Tymocharis y déterminèrent la déclinaison des étoiles fixes, & rendirent par-là un service essentiel à la Géographie & à la Navigation. Le célèbre An. xv. J. C.
295-
An. xv. J. C.
276. Eratosthène fit élever dans le portique du musée d'Alexandrie, dont il étoit bibliothécaire, ces *Armillæ* si fameuses dans l'antiquité, & dont les Astronomes d'Alexandrie se servirent pour faire une immense quantité d'observations.

Il est le premier qui ait entrepris de calculer la circonférence d'un grand cercle de la terre. Ayant observé qu'à Syene, dans la haute Egypte, le soleil à midi, au solstice d'été, éclairoit un puits dans toute sa profondeur, & répondoit par conséquent à son zénith, il établit à Alexandrie, qui est à-peu-près sur le même méridien que Syene, un segment sphérique, évidé, portant un style vertical, dont le sommet répondoit au centre de courbure du segment; & il trouva, avec cet instrument, qu'à midi, au solstice d'été, il s'en falloit d'environ 7 degrés $\frac{2}{3}$, que le soleil n'atteignit le zénith d'Alexandrie. Ainsi, l'arc compris entre Syene & Alexandrie étoit de cette quantité. D'un autre côté, la distance de ces deux villes avoit été trouvée de 5000 stades. D'après ces élémens, la circonférence entière d'un grand cercle de la terre devoit être d'environ 250000 stades. Si l'on suppose, avec quelques auteurs modernes, que le stade d'Eratosthène fut de $104\frac{1}{100}$ toises, cette valeur seroit de 11403 lieues, à raison de 2282 toises par lieue. Selon Pline, la circonférence de la terre est de 252000 stades romains, ce qui, à raison de 95 toises par stade romain, donneroit 10452 lieues. Les

mesures de la terre, prises de notre tems, donnent environ 9000 lieues. Je n'ai pas besoin d'observer que la méthode d'Eratosthène n'étoit pas susceptible d'une grande précision, & que les résultats des modernes méritent la préférence.

Hyparque, né dans la ville de Nicée, en Bithinie, tient, parmi An. av. J. C.
140. les anciens Astronomes, à-peu-près le même rang qu'Archimède parmi les Géomètres. Il commença par observer à Rhodes, & ensuite il vint se fixer à Alexandrie. Un de ses premiers travaux fut de rectifier la longueur de l'année qu'on supposoit, avant lui, de 365 jours 6 heures. Il la diminua d'environ 5 minutes; diminution qui n'étoit pas suffisante, car on sait aujourd'hui que la longueur de l'année est d'environ 365 jours 5 heures 49 minutes; mais Hyparque, avec les données dont il étoit obligé de se servir, ne pouvoit pas approcher davantage de la vérité: il a dû moins fournir aux modernes, un moyen de perfectionner cet élément essentiel de l'Astronomie.

Ses recherches sur le mouvement du soleil, le menèrent à une autre connoissance très-importante. Il trouva que cet astre employoit près de 9. jours de plus à parcourir la partie septentrionale de son orbite que la partie méridionale; d'où il conclut que la terre n'étoit pas placée au centre de l'orbite solaire; il détermina l'excentricité de cette orbite & la position de la ligne des apsidés, d'une manière fort approchante de la vérité. Il fit une remarque semblable sur l'orbite lunaire. Il réduisit les mouvemens du soleil & de la lune en *tables*, les premières que l'on connoisse en ce genre. Son projet étoit de dresser aussi des tables pour les mouvemens des cinq autres planètes; mais, ne trouvant pas des bases suffisamment exactes dans les observations connues de son tems, il abandonna ce travail.

Il fit encore une découverte, capable seule de l'immortaliser. Par la comparaison de ses observations avec celles d'Aristille & de Thymocharis, il reconnut que les étoiles avoient un mouvement lent qui sembloit les emporter d'occident en orient, d'environ un degré en 70 ans; de sorte que les points équinoxiaux devoient faire, dans le sens opposé, une révolution entière en 25200 ans. Suivant les déterminations modernes, la précession moyenne des équinoxes est de 50 secondes par an, ce qui répond à un degré en 72 ans.

Cet Astronome infatigable entreprit, à l'occasion d'une nouvelle étoile qui parut de son tems, un des plus grands ouvrages que les hommes aient jamais tenté: c'étoit le dénombrement & la configuration de toutes les étoiles, pour mettre la postérité en état de reconnoître si le nombre des étoiles étoit fixe, & si elles conservoient toujours entr'elles la même position. Il poussa très-loin

ce travail immense. Plîne le regarde comme un Dieu, d'avoir osé en former le projet : *ainfi, s'écrie-t-il, Hyparque a laiffé le ciel en héritage à ceux qui fe trouveront dignes de le pofféder!*

La parallaxe du foleil, d'où dépend la mefure de la diftance où nous fommes de cet afre, n'a été connue que très-imparfaitement des anciens Aftronomes. Hyparque effaya de la déterminer : il y employoit les éclipses de lune, & d'autres élémens dont il auroit fallu connoître la quantité avec une grande exactitude. Ne foyons donc pas furpris, fi, dans une queftion auffi délicate, les réfultats de fes calculs font éloignés d'une précision, à laquelle les modernes, aidés des meilleurs inftrumens, ne font arrivés que très-tard.

Les bornes de ce difcours me forcent de paffer fous fîlence d'autres ouvrages d'Hyparque, tels que fes recherches fur le Calendrier & fur le Calcul trigonométrique.

Il fut fuivi de plusieurs Aftronomes, qui, fans égalier fon génie & fon fâvoir, travaillèrent inutilement pour affermir les fondemens de la Science, & même pour l'avancer. Les uns firent de nouvelles obfervations fur la pofition des étoiles; les autres perfectionnèrent la théorie des planètes. Plusieurs écrivirent fur les différens branches de l'Aftronomie.

Ab. xv. J. C.
60.

On cite avec éloge, dans ce nombre, le philofophe Pofidonius; ce fameux Stoïcien, qui, dans une vifite que Pompée lui rendit à Rhodes pour écouter l'une de fes leçons, étant faifi d'un violent accès de goutte, laiffa échapper involontairement ce cri de la nature, étouffé auffi-tôt par l'orgueil philofophique : *Douleur! tu ne me vaincras point, jamais je n'avouerai que tu fois un mal.*

Jules-Céfar mérite d'être placé parmi les Aftronomes, par un fâvoir réel & par le fervice qu'il rendit au calendrier romain. Il arrîta Sofigène d'Alexandrie à Rome, pour travailler conjointement avec lui à la réforme de ce calendrier, qui, depuis Numa Pompilius, fon premier auteur, étoit tombé dans une telle confufion; que les mois d'hiver répondoient à l'automne, ceux du printems à l'hiver, &c. Ils fixèrent la durée de l'année à 365 jours 6 heures; & après avoir fuppofé que l'année 708 de Rome feroit de 14 mois pour rétablir l'ordre des faifons, ils réglèrent qu'à l'avenir il y auroit alternativement trois années de 365 jours, & une de 366 jours par l'intercalation d'un jour entre le 6 & le 7 des calendes de mars, ou en comptant deux jours pour un aux calendes, ce qui fit donner le nom de *biffextiles* à ces fortes d'années. Ce nouveau calendrier avoit encore lui-même plusieurs défauts, que les Aftronomes modernes ont cherché à corriger.

Sous le règne de Neron, fleurissoit Menelaüs, qui fut tout-à-la-fois un grand Géomètre & un grand Astronome. Il avoit écrit un *Traité des Cordes*, qui est perdu ; mais on a son *Traité des triangles sphériques* : ouvrage fort savant, où l'Auteur explique la formation de ces triangles, & la méthode *trigonométrique* pour les résoudre dans le plus grand nombre des cas nécessaires à la pratique de l'ancienne Astronomie.

AN. de J. C.
55.

Nous arrivons à Ptolomée, homme d'un savoir immense. Les uns le font naître à Peluse; les autres à Ptolemais; il vint de bonne heure à Alexandrie, & il y exécuta ses travaux. La postérité lui doit de la reconnoissance, pour nous avoir transmis, dans son *Almageste*, toutes les anciennes observations d'où dépendoit la théorie du mouvement des planètes. Ses prédécesseurs s'étoient appliqués à déterminer l'arrangement de notre monde planétaire. On avoit sur-tout cherché à connoître la place que la terre tient dans l'univers, si elle en occupe le centre, comme on est porté à le croire sur les apparences, ou si elle roule dans les espaces célestes, comme Pythagore l'avoit pensé. Après plusieurs contestations, on s'étoit accordé presque unanimement à regarder la terre comme immobile au centre du monde, & à faire circuler autour d'elle, en cet ordre, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter & Saturne. Ptolomée adopta ce système, &, par l'autorité qu'il avoit en Astronomie, le fit recevoir & passer à la postérité sous le nom de *Système de Ptolomée* : autorité malheureusement trop imposante en cette rencontre, puisqu'elle a servi à repousser, pendant plusieurs siècles, les raisons qui démonstroient le vice de cet arrangement.

AN. de J. C.
127.

Ptolomée confirma la Théorie d'Hyparque sur les mouvemens du soleil & de la lune. Il détermina, par de nouvelles observations, les excentricités des orbites de ces deux astres; il remarqua de plus, dans le mouvement de la lune, une autre inégalité, celle qui dépend des différentes positions de cette planète par rapport au soleil, & qui semble, pour ainsi dire, dilater & contracter alternativement l'orbite lunaire.

Il fut moins heureux, lorsque, jugeant qu'Hyparque avoit attribué une trop grande vitesse à la rétrogradation des points équinoxiaux, il réduisit ce mouvement à un degré en cent ans; car cette hypothèse s'éloigne beaucoup plus, par défaut, du résultat des Astronomes modernes, que celle d'Hyparque ne s'en éloigne par excès.

Les planètes présentent, dans leurs courses, plusieurs aspects à la terre. Tantôt elles marchent dans le même sens que nous: tantôt elles paroissent s'arrêter, & ensuite rétrograder. Ptolomée tâche d'expliquer tous ces mouvemens par une multitude de cercles.

concentriques ou excentriques, emboîtés les uns dans les autres ; & formant une telle confusion, qu'Alphonse X, Roi de Léon & de Castille, surnommé l'Astronome, persuadé de la vérité de ce système, qu'il avoit peine à comprendre ; ne put s'empêcher de dire un jour : *si Dieu m'avoit appelé à son conseil dans le tems de la creation, je lui aurois donné de bons avis sur le mouvement des astres* : mot plaisant que les observations modernes ont abîmés d'impïété, & ont tourné contre le système qui l'avoit arraché à l'impatience.

Il y a encore un grand ouvrage de Ptolomée, la *Géographie*, où l'on trouve l'exécution du projet qu'Hyparque avoit donné de fixer la position des lieux terrestres par la *latitude* & la *longitude*. Cette idée heureuse, adoptée aujourd'hui généralement, lie la Géographie avec les observations célestes, & en forme une véritable Science. Ptolomée a donné aussi la première Théorie des projections que l'on emploie dans la construction des cartes géographiques. S'il a commis d'ailleurs plusieurs fautes sur la situation des villes & des pays dont il parle, il faut se souvenir que la perfection de la Géographie est l'ouvrage du tems ; que, dans celui où Ptolomée a vécu, on ne connoissoit qu'une petite partie de l'ancien continent ; & qu'aujourd'hui même où l'Astronomie est incomparablement plus répandue, il reste de l'incertitude sur la position d'une infinité de lieux dans les deux hémisphères.

Ab. de J. C.
470.

De Ptolomée jusqu'aux Arabes, on ne compte, parmi les Grecs, aucun Astronome d'un certain ordre, si ce n'est peut-être Théon d'Alexandrie, qui vivoit sur la fin du quatrième siècle, & dont il nous reste un commentaire sur l'Almageste de Ptolomée. On connoit la beauté, le savoir & la fin tragique de sa fille Hypathia.

—
ACOUSTIQUE.

LA QUATRIÈME PARTIE des Mathématiques, pour le rang d'ancienneré, est l'Acoustique : non pas la Théorie générale des sons (car cette science appartient aux modernes), mais la *Musique*, qui en est une branche principale, & qui considère les sons dans leurs rapports avec d'autres sons.

On sait que le son est produit, en général, par les ébranlemens communiqués à un corps élastique, & transmis par ce corps à l'air environnant qui les apporte à l'oreille. Ainsi, par exemple, on entend un son, quand on frappe une cloche avec un marteau ; quand on pince une corde de violon, quand on souffle dans un tuyau de flûte, &c. Le son a d'autant plus de plénitude ou de force, que le corps sonore est plus dur, plus élastique, & qu'il est plus violemment agité.

Lorsque les vibrations d'un corps sonore se succèdent inégalement & sans aucun ordre, il en résulte une suite de sons irréguliers ou un simple bruit qui ne peut être l'objet d'aucune théorie. Les sons que la musique combine doivent se suivre par des intervalles égaux, & leur ensemble forme une harmonie qui flatte l'oreille. Il n'importe pas, quant aux rapports qu'ils ont entre eux, que les coups, dont l'oreille est frappée, soient forts ou foibles : la seule différence qui provient de cette inégalité, est que chaque son individuel a plus ou moins d'intensité, sans changer d'ailleurs de nature.

Les sons graves & les sons aigus se distinguent les uns des autres, par le nombre des vibrations du corps sonore, dans un tems donné. Qu'on ait deux cordes de violon également tendues, mais de longueurs inégales, & telles que, dans un tems donné, l'une fasse deux vibrations pendant que l'autre n'en fait qu'une : le son produit par la première sera à l'octave du son produit par la seconde. Les huit tons ou notes de la musique sont compris dans l'intervalle de ces deux sons ; ce qui fait dire qu'ils sont à l'octave l'un de l'autre.

On regarde Pythagore comme celui qui, parmi les anciens, a cherché le premier à déterminer les rapports numériques des sons musicaux. Plusieurs écrivains racontent, que, passant un jour devant un atelier de forgerons qui frappaient un morceau de fer sur une enclume, il entendit avec surprise des sons qui s'accordoient aux intervalles de quarte, de quinte & d'octave. En réfléchissant sur la cause de ce phénomène, il jugea qu'elle dépendoit du poids des marteaux ; il les fit peser, & il trouva qu'en rapportant les sons produits par les marteaux à un même son pris pour unité, les poids, qui produisoient la quarte, la quinte & l'octave en haut, étoient entr'eux comme les fractions $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$. De-là, ajoute-t-on, étant de retour chez lui, il voulut vérifier cette première expérience par celle-ci : il attacha horizontalement à un point fixe, une corde qu'il fit passer sur un chevalet, & qu'il chargea de différens poids ; il la mit en vibration, & il trouva que les poids, relatifs à la quarte, à la quinte & à l'octave, étoient entr'eux comme ceux des marteaux. Pour apprécier l'exactitude de ce récit, il faut se rappeler qu'en général le nombre des vibrations que fait en un tems donné, une corde de grosseur uniforme & tendue par un poids, est proportionnel à la racine-quiatrième de ce poids, divisée par la longueur de la corde. Au moyen de ce Théorème, on voit que les longueurs de trois cordes, de même grosseur uniforme, qui, tendues par un même poids, donnent la quarte, la quinte & l'octave en haut, sont

entr'elles comme les trois fractions $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$; mais que, pour faire rendre la quarte, la quinte & l'octave en haut, à une même corde, en la chargeant de différens poids, il faudroit que ces poids fussent entr'eux comme les nombres $\frac{16}{9}$, $\frac{8}{3}$, $\frac{4}{1}$. Il y a donc erreur, ou dans les rapports que Pythagore a trouvez pour les poids des marreaux, ou dans la manière dont les Historiens exposent ses expériences. On aura cru sans doute que les trois poids différens qui, tendant une même corde, donnent la quarte, la quinte & l'octave, étoient entr'eux comme les longueurs de trois cordes différentes également rendues, qui donnent ces trois mêmes sons, ce qui n'est pas vrai. Mais il est certain que ces premières idées de Pythagore ont été la véritable source de la théorie de la musique. Je n'entrerai pas dans un plus grand détail sur ce sujet, parce que la musique proprement dite n'emprunte que très-peu de secours des mathématiques. Mais je reviendrai, dans la suite, à la théorie géométrique des cordes vibrantes & du mouvement de l'air dans un tuyau : théorie qui est née dans ces derniers tems.

MÉCHANIQUE.

Si l'ANTIQUITÉ de la Méchanique datoit des usages qu'on a faits nécessairement du levier, ou de quelques autres machines simples, aussi-tôt qu'on a voulu construire des cabanes, des instrumens propres au labourage, &c. elle remonteroit peut-être plus haut que celle d'aucune autre partie des mathématiques. Mais ces usages n'étoient point fondés sur des principes démontrés. La théorie de la Méchanique n'a commencé à être connue qu'assez tard. Nous voyons, par quelques écrits d'Aristote, que ce Philosophe, & à plus forte raison tous ses prédécesseurs n'avoient que des notions confuses ou même fausses sur la nature de l'équilibre & du mouvement.

Mécanique.

Archimède est le premier qui ait établi les vrais principes de la Statique. Il trouva la propriété générale du centre de gravité, & il fixa la position de ce point dans le triangle, la parabole, le cone, &c. Il fit voir que deux poids en équilibre aux extrémités d'une balance à bras inégaux, étoient réciproquement proportionnels à leurs distances au point d'appui; d'où résultoit toute la théorie du levier. On lui attribue encore la découverte de plusieurs autres machines simples, telles que la poulie, le plan incliné & la vis. On connoît la machine Hydraulique en spirale, qu'on appelle ordinairement *la vis d'Archimède*. L'histoire nous apprend qu'il avoit inventé une multitude de machines composées.

La Méchanique étoit alors tellement au berceau, qu'Archimède jeta dans la plus grande surprise Hieron, Roi de Syracuse, son parent,

parent, lorsqu'il lui dit qu'avec un levier & un point fixe dans le ciel, il souleveroit le globe de la terre. Cette proposition n'est cependant qu'une suite évidente de l'équilibre du levier, puisqu'en augmentant l'un des bras du levier, & appliquant toujours le même poids à son extrémité, le poids appliqué à l'autre bras qui ne change point, doit augmenter en même rapport que le bras variable.

Si Archimède n'eût été que le premier Géomètre de son siècle; il auroit pu, avec ce grand titre de gloire, vivre & mourir dans l'obscurité: il s'attira la plus haute considération par ses machines. Ainsi juge le vulgaire. Peut-il en effet apprécier les spéculations du génie, & ne doit-il pas réserver son hommage pour celui qui étale à ses sens & à son imagination les effets physiques les plus inouis & les plus imposans? Archimède étoit bien éloigné de penser de même. On verra sans doute avec plaisir ce que Plutarque dit à ce sujet, dans la vie de Marcellus. Après avoir raconté qu'au siège de Siracuse, un Ingénieur romain, nommé *Appius*, faisoit jouer plusieurs grosses machines pour détruire les murs de la ville; il s'exprime ainsi, suivant la traduction d'Amiot: « Archimède ne se soucioit pas de » tout cela, comme aussi n'étoit-ce rien en comparaison des engins » qu'il avoit inventés, non que lui en fît autrement cas ni compte, » ni qu'il les eût faits comme des chefs-d'œuvre pour montrer son » esprit: car c'étoient, pour la plupart, jeux de la Géométrie, » qu'il avoit faits en s'ébattant par manière de passe-tems, à l'ins- » tance du Roi Hieron, lequel l'avoit prié de révoquer un peu la » Géométrie de la spéculation des choses intellectuelles à l'action » des corporelles & sensibles, & faire que la raison démonstrative » fût un peu plus évidente & plus facile à comprendre au commun » du peuple, en la mettant par expérience matérielle à l'utilité » publique. » A la suite de ce passage, Plutarque fait l'histoire du long retardement que les machines d'Archimède mirent à la prise de Siracuse: « Et néanmoins, poursuit-il, Archimède a eu le » cœur si haut & l'entendement si profond, & où il y avoit un » trésor caché de tant d'inventions géométriques, qu'il ne daigna » jamais laisser par écrit aucun œuvre de dresser toutes les machines » de ce genre, par lesquelles il acquit lors gloire & renommée, » non de science humaine, mais plutôt de divine sagesse: ainsi » réputant toute cette science d'inventer & composer machines, & » généralement tout art qui apporte quelque utilité à le mettre en » usage, vile, basse, & mercenaire, il employa son esprit & son » étude à écrire seulement choses dont la beauté & la sublimité ne » fût aucunement mêlée de nécessité. Car ce qu'il a écrit sont pro-

positions géométriques qui ne reçoivent point de comparaisons à d'autres, quelles qu'elles soient, pour ce que le sujet qu'elles traitent combat avec la démonstration : leur donnant le sujet, la beauté & la grandeur ; & la démonstration, la preuve si exquise qu'il n'y a que redire, avec une force & facilité merveilleuse : car on ne sauroit trouver en toute la Géométrie de plus difficiles ni plus profondes matières, écrites en plus simples & plus clairs termes, & par plus faciles principes, que sont celles qu'il a inventées. »

Le jugement d'Archimède, sur l'excellence de la Géométrie ; doit s'étendre également à la Mécanique rationnelle & théorique ; car les vérités qu'elle démontre sont aussi certaines, aussi intellectuelles, & quelquefois aussi profondes que celles de la Géométrie pure. Mais il n'est pas permis de placer sur la même ligne la Mécanique pratique, puisqu'un homme, qui étoit tout-à-la-fois un grand Géomètre & un grand Machiniste, nous le défend d'une manière si positive : cependant elle demande souvent beaucoup d'esprit & d'invention, & assurément un Machiniste du premier ordre l'emporte sur un Géomètre ordinaire.

Les anciens n'ont rien ajouté à la théorie qu'Archimède avoit donnée de la statique ; mais ils en ont fait l'application à un grand nombre de machines très-ingénieuses, pour les différens besoins de la société. On admire sur-tout leurs machines militaires.

A l'égard de la Science du mouvement, elle est entièrement dûe aux modernes.

HYDRODYNAMIQUE.

LA MÉCANIQUE des fluides ne seroit qu'une branche de celle des solides, si l'on pouvoit déterminer la figure, le nombre & les masses des atomes élémentaires qui composent un fluide, & soumettre ensuite aux loix générales de la Mécanique les efforts que ces atomes exercent les uns sur les autres, en vertu de la pesanteur, ou de la pression de quelq'agent extérieur. Mais cette manière de traiter la question nous est interdite, parce que nous n'avons pas les données nécessaires, & que d'ailleurs la complication de ces données conditionnelles meniroit à des calculs insurmontables aux forces de l'analyse. Ainsi, pour établir les principes de l'Hydrodynamique, on est forcé d'appeller au secours de la Mécanique, la connoissance expérimentale de quelque propriété primitive des fluides, d'où l'on puisse déduire ensuite toutes les autres. Cette nouvelle difficulté est causée que les anciens ont seulement fait des progrès dans l'Hydrostatique, ou dans cette partie de l'Hydrodynamique, qui considère l'équilibre des fluides ; & c'est encore à Archimède qu'on en est redevable.

Dans son livre de *humido insidentibus*, il prend pour base que les particules d'un fluide étant supposées égales, également pesantes & placées les unes à côté des autres, celle qui est le moins pressée est chassée par les autres; d'où il résulte que, pour l'équilibre, chaque molécule doit souffrir en tout sens une égale pression. Il applique ce principe à l'équilibre d'un corps solide flottant sur un fluide; il fait voir que le volume de la partie plongée est au volume total du corps, comme la pesanteur spécifique de ce corps est à celle du fluide; il éclaircit cette théorie par divers exemples tirés de l'équilibre d'un cône, ou d'un paraboloïde posé sur l'eau. La proposition VII du premier Livre de cet ouvrage peut servir facilement à démontrer que deux corps égaux en volume, plus pesans qu'un fluide dans lequel ils sont plongés, y perdent des parties égales de leurs poids; ou que réciproquement deux corps sont égaux en volume, quand ils perdent, dans le fluide, des parties égales de leurs poids. Je cite ce Théorème, parce que l'opinion des Mathématiciens est qu'Archimède en fit usage pour découvrir la fraude d'un Orfèvre de Syracuse, qui devoit fournir au Roi Hieron une couronne d'or pur, & qui y avoit mêlé de l'argent. On conjecture avec beaucoup de vraisemblance qu'il forma de cette manière deux masses, l'une d'or, l'autre d'argent, égales chacune en volume à la couronne, & qu'ayant ensuite trouvé qu'en plein air la couronne pesoit moins que la masse d'or, & plus que la masse d'argent, il détermina la proportion du mélange par un calcul arithmétique connu aujourd'hui de tout le monde. Quelques Auteurs ajoutent qu'il étoit aux bains quand ces idées se présentèrent à lui, qu'il en sortit transporté de joie, & que, sans songer à l'état de nudité où il étoit, il se mit à courir dans les rues de Syracuse, en criant : *je l'ai trouvé, je l'ai trouvé.*

Hydraulique.

Ctesibius & Heron, son disciple, Mathématiciens de l'Ecole d'Alexandrie, inventèrent plusieurs machines Hydrauliques, dont le jeu dépendoit du poids & du ressort de l'air : telles sont le Syphon recourbé, les pompes, la fontaine de compression, qu'on appelle encore aujourd'hui *la fontaine de Heron*, &c. Mais ils attribuoient les effets de ces machines à une prétendue horreur de la nature pour le vuide. La Physique des anciens étoit remplie de ces qualités occultes. On transportoit du monde moral au monde physique les idées d'affection ou de haine : tout étoit sympathie ou antipathie dans la nature, & on croyoit avoir expliqué un phénomène, quand on pouvoit le rapporter à l'un ou à l'autre de ces principes.

An. av. J. C.
130.

Un Géomètre romain, *Sextus Julius Frontinus*, connu vul-

Hydraulique.

An. de J. C.
100.

gairement sous le nom de *Frontin*, a eu quelques notions théoriques du mouvement des fluides. Sa qualité d'Inspecteur des fontaines publiques à Rome, sous les Empereurs Nerva & Trajan, nous a valu son livre de *Aquæductibus urbis Romæ Commentarius*, dont l'objet est le mouvement des eaux qui coulent dans des canaux ou qui s'échappent par des orifices, des vases où elles sont contenues. Il a vu que le produit d'un ajutage donné est d'autant plus grand, que cet ajutage répond à une plus grande hauteur du fluide: considération très-simple & cependant négligée encore par quelques fontainiers modernes; il a senti pareillement qu'un tuyau destiné à dériver en partie l'eau d'un aqueduc, doit avoir, selon les circonstances, une position plus ou moins oblique par rapport au cours du fluide; il fait plusieurs autres observations vraies sur cette matière; mais on ne trouve d'ailleurs aucune précision géométrique dans ses résultats; il n'a point connu la vraie loi des vitesses, relativement aux hauteurs des réservoirs.

On croit que la découverte des moulins à eau est de la fin du VI^e siècle; mais on employoit au hasard l'effort de l'eau, & on étoit très-éloigné de pouvoir l'évaluer avec une certaine exactitude.

OPTIQUE.

IL PARÔIT que l'école Platonicienne a connu les premiers principes de l'Optique, c'est-à-dire, la propagation de la lumière en ligne droite, & l'égalité des angles d'incidence & de réflexion. On ne doit pas s'arrêter aux explications physiques que les anciens, & Aristote en particulier, ont données des phénomènes de la vision: on y trouveroit l'abus des qualités occultes porté à l'excès.

An. av. J. C.
441.

La connoissance des verres ardents est même antérieure au tems que je viens d'indiquer. En voici la preuve tirée de la première scène du second acte des *Nuées* d'Aristophane: c'est un dialogue entre Socrate & Strepsiade, vieillard fort grossier & fort stupide, qui a trouvé, dit-il, un moyen de ne point payer ses dettes: *STREP. As-tu vu chez les Drogistes cette belle pierre transparente avec quoi on allume du feu? SOC. N'est-ce pas du verre que tu veux dire? STREP. Justement. SOC. Eh-bien! qu'est-ce que tu en feras? STREP. Quand on me donnera une assignation, je prendrai cette pierre-là, & me mettant au soleil, je ferai fondre de loin toute l'écriture de l'assignation. Cette écriture étoit tracée sur de la cire, qui couvroit une matière plus solide. L'effort dont parle Strepsiade pouvoit être opéré par réfraction ou par réflexion; mais les principes de l'Optique font voir d'abord qu'un miroir concave, par refraction, & un miroir convexe, par réflexion, n'ont pas ici la propriété convenable. En pré-*

sentant au soleil, un miroir concave, par réflexion, le Foyer eût été placé en haut; ce qui auroit exigé pour l'assignation une position fort incommode, & dont il n'est pas à présumer que Strepfiade ait voulu parler; mais, si l'on suppose qu'on ait fait usage d'un miroir convexe, par réfraction, le Foyer aura été en bas, & l'effet annoncé par Strepfiade s'explique d'une manière simple & naturelle.

On est surpris, après une preuve si formelle de l'antiquité des verres ardens, que Descartes & plusieurs modernes aient révoqué en doute l'opinion généralement reçue, qu'Archimède s'en étoit servi pour embrâser la flotte des Romains, au siège de Syracuse. Leur incrédulité est venue de la préoccupation où ils étoient qu'Archimède auroit employé des miroirs concaves, par réflexion: moyen dont l'insuffisance est démontrée. En effet, pour qu'un miroir de cette espèce formât un Foyer à la portée du trait, c'est-à-dire, à la distance de 150 pieds, il faudroit que le rayon de sphéricité fût de 300 pieds. Or comment exécuter, avec une certaine précision, des verres d'une si petite courbure? D'ailleurs, dans les miroirs d'un si long foyer, les rayons du soleil ne peuvent pas être regardés comme parallèles; & leur divergence détruit presque totalement l'effet de la convergence produite par le miroir. La combinaison de plusieurs miroirs concaves ne lève pas ces inconvéniens, & ne fait qu'en présenter de nouveaux. Mais le problème change entièrement de nature, si l'on suppose qu'Archimède ait employé des miroirs dénués de toute courbure, ou formant des plans parfaits; car alors on conçoit sans peine que plusieurs verres plans peuvent être disposés entr'eux de telle manière qu'ils portent les rayons du soleil sur un même point, & qu'ils y forment un Foyer capable d'embrâser le bois, ou même de fondre les métaux. Le fait des miroirs d'Archimède est donc possible: mais a-t-il existé? Si on consulte les monumens historiques, on trouvera que plusieurs anciens Auteurs, comme Diodore de Sicile, Heron, Pappus, &c, ont écrit qu'en effet Archimède mit le feu à la flotte des Romains avec des verres ardens. Il est vrai que les ouvrages où ils en parloient sont aujourd'hui perdus; mais ils existoient encore au douzième siècle, puisque Zonaras & Tzetzes, Ecrivains de ce tems-là, en citent des passages relatifs à la question présente. Anthemius, Mathématicien & Architecte de réputation, qui vivoit sous Justinien I, & dont M. Dupuy, de l'Académie Royale des Belles-Lettres, nous a traduit les précieux restes, ne se contente pas d'attester le même fait: il explique la théorie & le mécanisme de ces miroirs.

Envain objecteroit-on ici que Polybe & Titeliue ne font aucune

mention des miroirs d'Archimède. Le silence de ces Historiens n'est qu'une preuve purement négative, qui doit céder aux assertions positives & contraires de ceux que nous avons nommés.

Il me semble que les témoignages de Zonaras & de Tzetzés doivent avoir ici à-peu-près le même poids qu'auroient ceux des anciens Ecrivains sur lesquels ils s'appuient. Après avoir raconté qu'Archimède avoit embrâsé la flotte des Romains, au moyen des rayons solaires, rassemblés & réfléchis par le poli d'un miroir, Zonaras ajoute qu'à cet exemple, Proclus brûla, avec des miroirs d'airain, la flotte de Vitalien qui assiégeoit Constantinople, sous l'Empire d'Anastase, l'an 514 de Jesus-Christ. Tzetzés entre dans un plus grand détail sur les miroirs d'Archimède; il en explique ainsi la construction : « Lorsque Marcellus eut éloigné ses vaisseaux » à la portée du trait, Archimède fit jouer un miroir exagone » composé de plusieurs autres plus petits, qui avoient chacun 24 » angles, & qu'on pouvoit mouvoir, à l'aide de leurs charnières » & de certaines lames de métal; il plaça ce miroir de manière qu'il » étoit coupé en son milieu par le méridien d'hiver & d'été, en » sorte que les rayons du soleil, reçus par ce miroir, venant à se » briser, allumèrent un grand feu qui réduisit en cendres les vais- » seaux des Romains, quoiqu'ils fussent éloignés de la portée du » trait. » Ce passage indique, comme on voit, la manière dont les parties du miroir tournoient pour prendre la position convenable, l'exposition directe où il étoit par rapport au soleil, & enfin la distance à laquelle il portoit le feu.

Le Père Kircher, Jésuite, dit, dans son ouvrage, intitulé : *Ars magna lucis & umbræ*, qu'il avoit fait construire, d'après la description de Tzetzés, un miroir composé de plusieurs verres plans qui, réfléchissant tous la lumière du soleil en un même point, y produisirent une chaleur considérable.

M. de Buffon a exécuté en grand cette expérience, & par-là il a constaté les effets des miroirs d'Archimède. En 1747, il fit construire, par M. Passéman, un miroir par réflexion, composé de 168 glaces planes, mobiles à charnières, & qu'on pouvoit faire jouer toutes à-la-fois, ou seulement en partie. Au moyen de cet assemblage, il embrâsa, au mois d'avril, & par un soleil assez foible, le bois à 150 pieds de distance; il fondit le plomb à 140 pieds; ce qui est plus que suffisant pour démontrer la réalité de la découverte d'Archimède.

Il y a, dans la succession des connoissances humaines, une fatalité qui n'amène presque jamais les plus utiles que les dernières. Les anciens, qui savoient employer, avec tant de succès, la propriété

que les verres ont de brûler, ignoient l'usage bien plus important qu'on en fait pour grossir les objets & aider la vue. L'invention des besicles ou des lunettes à mettre sur le nez, est simplement de la fin du XIII^e siècle. Celle des lunettes astronomiques, ou télescopes, est encore plus récente d'environ 300 ans. Sénèque dit, dans son premier Livre des Questions Naturelles, que *de petites lettres vues au travers d'une boule de verre, pleine d'eau, paroissent plus grosses*. Mais les anciens, égarés par leur mauvaise physique sur la vision, n'ont pas réfléchi sur la nature de ce phénomène, & n'en ont tiré aucune conséquence pour la construction des lunettes. Les verres propres à former ces instrumens doivent être, ou de très-grandes sphères, dont l'usage seroit très-incommode & presque impossible, ou de très-petites portions de grandes sphères; ce qui est d'une pratique facile, & ce qu'on pratique en effet; mais ce moyen suppose l'art de tailler les verres: art inconnu aux anciens, qui faisoient simplement souffler le verre & en former des vases.

L'OPINION VULGAIRE est que les anciens n'avoient aucune notion de l'Analyse, ou de cette Science qui enseigne à combiner ensemble les grandeurs considérées dans un état d'abstraction & de généralité. Il est certain que l'algorithme de l'Analyse, c'est-à-dire l'art d'exécuter les calculs algébriques, & en particulier de résoudre les équations, leur étoit inconnu. Mais, en les lisant avec attention, on aperçoit facilement qu'ils possédoient une espèce d'Analyse géométrique, semblable à celle des modernes. On en trouve des traces dans les Ecrits de Platon: elle se montre d'une manière encore plus marquée dans ceux d'Archimède; car, par exemple, quand il se propose, dans son *Traité de Sphère & cylindre, prop. VII*, de couper une sphère par un plan, de façon que les deux segments soient entr'eux dans un rapport donné, il raisonne sur les grandeurs inconnues comme sur celles qui sont données; & par une suite de conséquences tirées des propriétés de la sphère, il parvient à une proportion qui, étant traduite en calcul algébrique, donneroit immédiatement l'équation du troisième degré, d'où dépend la solution du problème. Mais il y a encore loin de-là jusqu'à la partie technique du calcul algébrique, & aux différens usages dont elle est susceptible.

Diophante, Géomètre de l'Ecole d'Alexandrie, doit être regardé, en quelque sorte, comme l'inventeur de l'Algèbre: du moins on trouve, dans ses ouvrages, des calculs qu'il exécute d'une manière analogue à la méthode qu'on emploie aujourd'hui pour résoudre les équations du premier degré & même celles du second. Il avoit

ANALYSE.

An. de J. C.
330.

écrit treize livres d'*Arithmétique*, dont trois sont perdus : ceux qui restent, contiennent des questions d'une espèce particulière & alors absolument nouvelle. Par exemple, l'auteur enseigne à partager un nombre carré en deux autres carrés; à trouver deux nombres dont la somme soit à celle de leurs carrés, dans un rapport donné; à trouver deux carrés dont la différence soit égale à un carré donné, &c. L'Art qu'il met en usage pour résoudre ces problèmes est très-ingénieux & très-subtil : il a été étendu & perfectionné par les modernes.

II. PÉRIODE.

LES MATHÉMATIQUES sujettes, comme toutes les institutions humaines, à des mouvemens périodiques d'élévation, de médiocrité & de foiblesse, se soutenoient toujours dans l'Egypte & dans la Grèce, par la masse des vérités dont elles s'étoient enrichies successivement, & par le charme attaché à ce genre d'étude. Une tempête s'éleva contre elles, dans ces climats, vers le milieu du VII.^e siècle. Les successeurs de Mahomet, pleins de l'enthousiasme que leur inspiroit une nouvelle Religion toute guerrière, étendant leurs conquêtes, du fond de l'orient à la partie méridionale de l'europe, ravagèrent l'Arabie, la Perse, les Isles de Chypre, de Rhodes, de Candie & de Sicile, l'Egypte, la Lybie & le Royaume des Espagnes. Cette guerre sanglante porta aux exercices du génie le plus terrible coup qu'ils aient jamais essuyé. Les artistes & les savans, rassemblés de toutes parts au Musée d'Alexandrie, furent chassés honteusement. Quelques-uns furent les victimes de la violence des conquérans; les autres allèrent traîner dans les pays éloignés les restes d'une vie malheureuse. On détruisit les lieux & les instrumens qui avoient servi à faire tant de belles observations. Enfin, ce précieux dépôt des connoissances humaines, la Bibliothèque des Rois d'Egypte, qui avoit déjà souffert un incendie sous Jules-César, fut entièrement livrée aux flammes par les Arabes. Le Calife Omar ordonna qu'on brûlât tous ces livres, *parce que, disoit-il, s'ils sont conformes à l'Alcoran, ils sont inutiles; & s'ils y sont contraires, ils doivent être abhorrés & anéantis* : raisonnement bien digne d'un brigant fanatique.

AN. de J. C.
642.

Il sembloit que le sort des Sciences, attaquées & détruites dans le centre de leur Empire, étoit absolument désespéré. Mais cette même vicissitude, qui produit tant de malheurs & tant de crimes, amène aussi quelquefois des révolutions avantageuses au genre humain. Tel fut le changement qui se fit bientôt dans les mœurs des Arabes. Ces peuples,

comme

comme tous ceux de l'Orient, avoient eu autrefois quelques notions des Sciences & principalement de l'Astronomie. Si le fanatisme d'une Religion sanguinaire étouffa d'abord ces germes précieux, il n'éteignit point le principe d'où ils étoient émanés. Lorsque ces différentes Nations furent lassées de s'exterminer mutuellement, leur férocité s'adoucit, & le loisir de la paix rappella l'esprit actif des Arabes à des objets plus réels & plus agréables, que les disputes sur les dogmes de l'alcoran. A peine s'étoit-il écoulé un siècle & demi depuis la mort de Mahomet, qu'ils commencèrent à cultiver eux-mêmes les Arts & les Sciences qu'ils avoient voulu anéantir. Ils eurent bientôt des Poètes, des Orateurs, des Mathématiciens, &c. On compte dans ce nombre plusieurs Califes chez les Arabes, & ensuite plusieurs Empereurs chez les Persans, lorsque ce dernier peuple se fut séparé du premier.

Toutes les parties des Mathématiques attirèrent plus ou moins leur attention. Le système de notre numération Arithmétique, est une découverte à jamais mémorable qui nous vient d'eux. Il a, sur tous ceux des anciens Peuples, l'avantage de la clarté & de la simplicité. On sait qu'avec dix caractères, à qui l'on fait occuper différentes places; on peut exprimer de la manière la plus commode, un nombre immense par la multitude de ses unités. Quelques Ecrivains prétendent que les Arabes tenoient cette idée des Indiens. Les raisons qu'ils en donnent ne me paroissent pas fort convaincantes. Sans chercher à les réfuter, je me contenterai d'observer que nous devons immédiatement aux Arabes l'Arithmétique, telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Le célèbre Gerbert, qui fut dans la suite Pape, sous le nom de Sylvestre II, alla puiser cette Science en Espagne, où les Arabes dominoient alors, & il la répandit dans le reste de l'Europe, vers l'an 960.

Sciences chez les Arabes.

Les Arabes puisèrent dans une Etude assidue des Mathématiciens Grecs, les principes des autres Sciences où ces derniers avoient excellé. Munis de ces connoissances, ils devinrent les Emules de leurs Maîtres, & se mirent en état de les commenter, ou même d'ajouter à leurs découvertes. Euclide, Archimède & Apollonius furent leurs principaux guides dans la Géométrie & la Mécanique. On cite plusieurs Géomètres Arabes. La Trigonométrie leur a des obligations essentielles. Ce sont eux qui ont donné au calcul Trigonométrique, la forme qu'il a encore aujourd'hui, du moins quant aux principes. Ils substituèrent l'usage des *sinus* à celui des *cordes* qu'on employoit auparavant, & par-là, ils rendirent plus simples & plus commodes les opérations de la Géométrie pratique.

Cardan attribue à ce même peuple l'invention de l'Algèbre pro-

Tome I. Mathématiques.

prement dite. On a vu que Diophante avoit indiqué la méthode pour résoudre les équations du premier & du second degré. Les Arabes la développèrent, & on croit qu'ils étoient parvenus jusqu'à résoudre les équations du troisième degré. Il existe en effet, dans la Bibliothèque de Leyde, un manuscrit arabe, où l'Auteur donne, à ce qu'on assure, l'Algèbre des équations cubiques, ou la résolution des problèmes solides.

L'Astronomie est la science que les Arabes ont le plus cultivée; & où ils ont fait les plus nombreuses découvertes. Rien n'égale la magnificence des observatoires & des instrumens qu'ils firent construire pour les progrès de cette science.

Parmi ses différentes branches, la théorie du soleil les occupa long-tems. Ils ne tardèrent pas à reconnoître que Ptolémée avoit trouvée ou supposée trop grande l'obliquité de l'écliptique. Flamsteed rapporte, dans son histoire céleste, la suite de leurs travaux sur ce sujet : on les voit continuellement approcher de la vérité; & enfin, au bout d'environ 700 ans, ils parviennent à déterminer l'obliquité de l'écliptique avec la même exactitude à-peu-près, que la donnent les meilleures observations modernes : résultat d'autant plus surprenant, qu'il n'avoient pas, comme nous, le secours des lunettes.

Nous ne citerons ici que les principaux Astronomes Arabes; & parmi eux, nous distinguerons les Califes qui l'ont mérité, parce que les exemples des Souverains qui éclairent les hommes, ont une autorité que la justice & l'intérêt doivent célébrer.

On trouve, au nombre des premiers Astronomes Arabes, le Calife *Aben-Giafar*, surnommé *Almanfor* ou le *Victorieux*. C'étoit un Prince Philosophe & appliqué, qui donnoit à l'observation des astres, tout le tems dont les devoirs de la Royauté lui permettoient de disposer.

Peu de tems après vivoit *Alfragan*, qui a laissé une espèce de commentaire sur l'*Almageste* de Ptolémée.

Le Calife *Aaron-al-Raschild* eut le goût de la Mécanique & de l'Astronomie : dans une célèbre ambassade qu'il envoya, en 807, à Charlemagne, il lui fit présent d'une horloge dont le mécanisme étoit très-ingénieux : elle sonnoit les heures par le moyen de certaines balles qui tomboient alternativement dans un vase d'airain ; douze Cavaliers se présentoient à douze portes, & les fermoient suivant le nombre d'heures écoulées. Cette machine étonna l'Europe, où l'on ne s'occupoit alors que de la guerre, & de puérilités grammaticales.

Son second fils, *Almamou*, qui régna après son frère, porta plus loin que ses prédécesseurs l'instruction dans les Sciences. Il y

Almanfor com-
mence à régner
en 754, meurt
en 775.

Raschild com-
mence à régner
en 786, meurt
en 807.

Almamou
commence à
régner en 813,
meurt en 833.

avoit été formé par un Médecin Chrétien; il mit tout en usage pour en inspirer le goût à ses Sujets. Il observa lui-même l'obliquité de l'écliptique, & son résultat est déjà plus exact que ceux des anciens Astronomes. Il fit mesurer dans la plaine de Sinjar, sur les bords de la mère-rouge, la valeur d'un degré de la terre. Malheureusement on ne connoit que d'une manière vague le rapport de notre toise avec la mesure arabe qu'on y employa, & on ignore jusqu'à quel point cette valeur s'accorde avec celle qui a été prise dans ces derniers tems. Plein d'estime pour les ouvrages des Grecs, Almamon fit traduire tous ceux qu'il put se procurer. Quelques Auteurs rapportent même que, dans un Traité de Paix où il imposa des loix à Michel le Begue, il exigea qu'on lui donneroit plusieurs Manuserits grecs que possédoient les Empereurs de Constantinople. La ville de Bagdat, située à-peu-près au même endroit que l'ancienne Babylone, fut embellie & accrue par ses soins; elle devint le séjour ordinaire des Califes. Il y avoit, dans cette ville, des écoles pour routes les Sciences, & une en particulier pour l'Astronomie. Almamon emporta dans le tombeau la gloire d'avoir été le Prince le plus humain, le plus sage & le plus savant qui eût encore occupé le Trône des Califes.

Un de ses Sujets, *Thebit-ehn Chora*, se distingua dans l'Analyse & dans l'Astronomie. On cite sur-tout ses recherches sur la durée de l'année. Il imagina de rapporter le mouvement du soleil, non pas aux points équinoxiaux, qui sont mobiles, mais aux étoiles fixes; & il parvint à déterminer la longueur de l'année sydérale, à-peu-près telle qu'on la trouve aujourd'hui. Cette exactitude a pu être l'effet de l'art qu'il eut d'employer & de combiner ensemble les meilleures observations: peut-être aussi faut-il l'attribuer en partie à un hasard heureux; car Ptolomée, dont les Arabes suivoient en général la doctrine, avoit un peu embrouillé les élémens de la question.

Albaregnius, Prince Arabe, rendit les plus importants services à l'Astronomie. Les tables de la lune & du soleil, que Ptolomée avoit construites, lui ayant paru défectueuses, il mit tous ses soins à les corriger, & il en dressa de nouvelles, qui ont eu pendant longtemps une juste célébrité. Il déterminâ d'une manière très-exacte l'excentricité de l'orbite solaire. S'il ne parvint pas à la même précision dans son calcul de la longueur de l'année, c'est qu'il eut trop de confiance aux observations de Ptolomée, & qu'il négligea de comparer immédiatement les siennes avec celles d'Hyparque. Il a reconnu le premier que l'apogée du soleil, regardé auparavant comme immobile, avoit un petit mouvement propre, selon l'ordre

e ij

An. de J. C.
1790

des signes; ce que les observations modernes ont confirmé. Enfin il sentit le défaut de la théorie de Ptolomée sur la précession des équinoxes; il trouva, comme Hyparque, que le mouvement apparent des étoiles fixes d'occident en orient, étoit d'un degré en 70 ans. On sait qu'il étoit Gouverneur de Syrie, & qu'il fit ses observations en partie à Antioche, en partie à Aracte, ville de la Mésopotamie.

Les Arabes portèrent le goût des Mathématiques dans tous les pays soumis à leur puissance: Elles fleurirent pendant long-tems en Espagne. On y trouve Arfachel, qui fit quelques corrections aux tables d'Albategnius. On lui attribue le Recueil, intitulé : *Tabula Toledana*. Si, comme on le croit, il a découvert, dans le mouvement du soleil, certaines inégalités dont les observations modernes & la théorie Newtonienne ont depuis constaté l'existence, il doit passer pour un Astronome très-exact & très-attentif.

Alhazen vivoit aussi en Espagne; il a laissé un Traité d'Optique, où l'on trouve le premier essai de théorie qu'on ait donné de la réfraction & du crépuscule. On prétend qu'il n'a fait que traduire ou commenter un ouvrage que Ptolomée avoit écrit sur la même matière : ouvrage cité par d'autres Ecrivains Arabes, & aujourd'hui perdu. Quoi qu'il en soit, il est certain que les anciens & Ptolomée lui-même n'avoient point égard à l'effet des réfractions dans les observations astronomiques; & du moins Alhazen a la gloire d'avoir indiqué cet effet.

Averroës, célèbre Médecin de Cordoue, abrégé & commenta l'Almageste de Ptolomée. Il étoit très-savant, pour son tems, dans la Physique, la Médecine & les Mathématiques.

Les Chrétiens, qui, dès le X.^e siècle, avoient commencé à chasser les Arabes de quelques parties de l'Espagne, ne dédaignèrent pas de s'instruire parmi ces mêmes Maures dont ils abhorroient la Religion. Quand Alphonse X, Roi de Castille, voulut établir dans son Royaume une espèce de Collège ou de Lycée, pour l'avancement de l'Astronomie, il fut obligé d'en confier la principale direction à des Arabes. Il observoit & calculoit lui-même avec eux; ce travail commun, produisit les fameuses *Tables Alphonfines*, plus exactes & plus complètes que toutes les précédentes. L'étude de l'Astronomie se maintint pendant quelque tems dans la Castille, après la mort d'Alphonse.

Les intérêts de l'ambition, à qui rien ne résiste, finirent par rompre toute communication entre les Chrétiens & les Maures, & plongèrent l'Espagne dans les plus profondes ténèbres. A mesure que les victoires des premiers se multiplioient, les Sciences alloient

Alphonse com-
mence à régner
en 1252, meurt
en 1284.

Sciences en Es-
pagne.

An. de J. C.
1080.

An. de J. C.
1100.

An. de J. C.
1180.

en déclinant : elles périrent, enfin , quand la domination des Maures cessa en Espagne, par la perte de Grenade : événement à jamais déplorable, si la Religion Chrétienne n'en eût profité, en s'étendant sur les ruines du Mahométisme.

An. de J. C.
1492.

Retournons en orient : nous y verrons les Persans, qui jusques-là n'avoient formé qu'un même peuple avec les Arabes, secouer le joug des Califes, vers le milieu du XI.^e siècle, sans abandonner l'étude des Sciences. L'Astronomie fut sur-tout l'objet de leur curiosité. Les anciens Perles, dès le règne de *Darius Ochus*, comptoient le tems par les révolutions solaires. Ils supposoient l'année un peu trop longue. Quand ils reçurent la loi des Arabes, l'usage où étoient les vainqueurs de compter par les révolutions lunaires, devint aussi celui des vaincus. Mais les Persans reprirent leur ancienne coutume, lorsqu'ils furent libres. Alors l'Astronome *Omar - Cheyam*, pour rectifier le calendrier persan, introduisit un système d'intercalation qui revient au même que si l'on supposoit l'année de 365 jours, & que l'on inferât huit jours dans un espace de trente-trois ans : système fondé sur des combinaisons très-ingénieuses, & fort approchant de la vérité.

Sciences chez
les Persans.

Un Conquérant rapide, *Holagu-ilecou - Kan*, petit-fils de Gengiskan, ayant subjugué la Perse, vers l'année 1254, ne sembla plus occupé que d'y ramener le goût des Sciences, & principalement celui de l'Astronomie, dans laquelle il étoit très-versé. Il fit construire, dans la ville de Maragha, voisine de Tauris, un observatoire où il rassembla un grand nombre d'Astronomes, & dont il donna la présidence à *Nassir-Eddin*, le plus célèbre d'entre eux. Cette société étoit une espèce d'Académie, d'autant plus florissante qu'elle recevoit toutes sortes d'encouragemens d'un Prince magnifique. Nassir-Eddin composa plusieurs ouvrages, entr'autres une Théorie des mouvemens célestes, un Traité de l'Astrolabe, & ses Tables Astronomiques,* qu'il nomma *ilecaliques*, pour laisser un monument de sa reconnoissance envers son bienfaiteur. On raconte que *Holagu*, se sentant près de sa fin, se fit transporter au milieu des savans, & qu'il voulut rendre les derniers soupirs entre leurs bras, les regardant comme ses enfans & comme les véritables Héritiers de sa gloire.

An. de J. C.
1254.

Son exemple fut surpassé par un Prince de la même nation, le fameux *Ulug-Beigh*, petit-fils de Tamerlan. Non-seulement Ulug-Beigh encouragea les Sciences comme Souverain : il est compté lui-même au nombre des plus savans hommes de son siècle. Il établit dans la ville de Samarcande, capitale de son Empire, une nombreuse Assemblée ou Académie d'Astronomes, & il fit conf-

truire , pour leur usage , les instrumens les plus grands & les plus parfaits qu'on eût encore vus. Il s'informoit de tous leurs travaux : il ob servoit lui-même avec assiduité. Quelques Historiens rapportent que , pour déterminer la latitude de Samarcande , il employa un quart de cercle , dont le rayon égaloit la hauteur du Temple de Sainte-Sophie à Constantinople , laquelle est d'environ 180 pieds romains ; mais la construction d'un si grand quart de cercle est physiquement impossible : il y a toute apparence que les Historiens dont il s'agit , peu au fait de l'Astronomie , ont pris un simple gnomon pour un quart de cercle.

Ulug-Belgh avoit composé plusieurs ouvrages. On cite principalement son Catalogue d'étoiles , & ses Tables astronomiques , si célèbres dans tout l'Orient. Il est le premier qui ait déterminé l'obliquité de l'écliptique avec une précision presque égale à celle que donnent les instrumens & les observations modernes. Les talens & les vertus de ce Prince méritoient les hommages de toute la terre : il fut assassiné par son propre fils , à l'âge de 58 ans.

An. de J. C.
1643.

Les troubles qui commencèrent à désoler la Perse peu de tems après la mort d'Ulug-Belgh , & qui ne firent qu'augmenter dans la suite , éteignirent insensiblement le goût des Sciences dans ces pays. Elles s'y sont détériorées à tel point , qu'aujourd'hui l'Astronomie des Persans n'est plus , pour ainsi dire , qu'un amas de visions d'astrologie judiciaire , & qu'à peine savent-ils calculer grossièrement une éclipse.

Sciences chez
les Chinois.

LA CHINE ne nous présente aucune découverte remarquable ; pendant la période que nous considérons. L'Arithmétique & la Géométrie de cette nation demeurent toujours très-imparfaites : nulle théorie nouvelle , nulle application intéressante des principes de la Mécanique. Nous trouvons , à la vérité , que les Chinois ont beaucoup observé les astres : mais toutes leurs observations roulent sur les objets les plus communs de l'Astronomie , comme les éclipses , les positions des planètes , les hauteurs solstiales du soleil , les occultations d'étoiles par la lune , &c. On n'en voit sortir aucun résultat important pour le progrès de la Science. Nous devons seulement remarquer que l'Empereur *Kobilai* , le cinquième successeur de Gengiskan à la Chine , & celui qui y fonda la Dynastie des Iven en 1271 , fut un très-grand protecteur de l'Astronomie. Il étoit frère de Holagu-ilecou-Kan , & il avoit à-peu-près les mêmes goûts. Il établit pour Chef du Tribunal des Mathématiques *Co-cheou-King* , observateur laborieux , qui porta dans l'Astronomie Chinoise une précision à laquelle on n'étoit pas encore arrivé. Mais cet éclat ne fut que passager. L'Astronomie chinoise retomba dans sa pre-

mière langue, & ne s'en releva un peu qu'environ un siècle après, sous les Empereurs d'une nouvelle Dynastie, qui donnèrent la direction du Tribunal des Mathématiques à des Astronomes Mahométans.

Nous ferons encore plus courts sur l'Histoire des Sciences chez les Indiens au même tems. Ils ne savoient, comme autrefois, que les principes les plus simples & les plus élémentaires de l'Astronomie. A peine savent-ils aujourd'hui calculer les éclipses d'une manière un peu exacte.

Sciences chez
les Indiens.

Les savans, qui, à la destruction de l'Ecole d'Alexandrie, s'étoient réfugiés dans la Grèce, contribuèrent d'abord à y entretenir l'étude des Mathématiques. Mais, dans l'état d'abandon où elles étoient réduites, elles devoient nécessairement pencher sans cesse vers leur ruine. Cependant les Grecs montrèrent, dans ce tems de décadence, quelques étincelles du génie qui avoit animé Archimède, Apollonius, Hyparque, &c. Nous avons déjà cité Zonaras & Tzetzes, à l'occasion des miroirs ardents d'Archimède. On doit citer encore, avec plus de distinction, Moscopule, qui fit, un peu avant le milieu du XV.^e siècle, l'ingénieuse découverte des *Quarrés magiques*. La prise de Constantinople par Mahomet II, en 1453, fut l'époque de la ruine totale des Mathématiques dans la Grèce.

Sciences chez
les Grecs modernes.

Quoique les Chrétiens occidentaux aient d'abord montré en général, pendant long-tems, un grand éloignement pour les Sciences, on rencontre néanmoins parmi eux, dans cette période, plusieurs hommes qui méritent d'être remarqués, ou par l'étendue de leurs connoissances, relativement au tems où ils ont vécu, ou par les preuves de génie qu'ils ont données, & dont la société auroit retiré les plus grands avantages, si le faux zèle & la superstition, armés du pouvoir, n'y avoient souvent mis obstacle.

Sciences chez
les Chrétiens.

Je ne citerai pas au nombre des inventions qui doivent faire honneur aux Européens, celle de la Boussole : pur effet du hasard, ou de quelque circonstance que l'on ignore. La propriété qu'a l'aimant, d'attirer le fer, a été connue des anciens Grecs, dès le tems de Thalès ; elle a été connue aussi des Chinois, plus de 300 ans avant Jésus-Christ ; mais on ne savoit pas, avant le commencement du XII.^e siècle, qu'une pierre d'aimant suspendue, ou flottante sur l'eau au moyen d'un liège, se dirige toujours vers le nord par un même côté : on savoit encore moins qu'une aiguille de fer aimantée a la même vertu. Il paroît, par les ouvrages de Guy de Provins, l'un de nos Poètes du XII.^e siècle, que les *Mariniers françois* sont les premiers qui aient employé la Boussole pour diriger la route des vaisseaux, d'où on lui donna le nom de *Marineute*. L'usage de sus-

Boussole

pendre l'aiguille aimantée sur un pivot, est très-ancien parmi nous. Cependant les Italiens, les Allemands & les Anglois, nous disputent la découverte de la Boussole. Ces prétentions réciproques peuvent être soutenues, soit parce qu'il est possible qu'on trouve la même chose en divers endroits, soit parce que la Boussole ayant été perfectionnée successivement, les nations qui y ont contribué, chacune pour son utilité particulière, ont cru pouvoir s'attribuer la totalité de l'invention. S'il est vrai, comme plusieurs Historiens le prétendent, que les Chinois aient fait servir, avant les Européens, la Boussole à la navigation, ils ont toujours été du moins bornés à une pratique grossière; car leur méthode constante de faire flotter l'aimant sur l'eau, n'est pas comparable à la suspension sur un pivot.

Frédéric II
commence à
régner en 1212,
meurt en 1250.

Dans le XIII.^e siècle, l'Empereur Frédéric II, au milieu d'une vie très-agitée & des guerres continuelles qu'il eut à soutenir contre les Papes, fonda l'université de Naples, cultiva lui-même les Sciences & les beaux Arts, composa quelques ouvrages, & fit traduire du grec en latin, ceux d'Aristote, & l'Almageste de Ptolomée.

Ce même siècle produisit plusieurs Savans dans nos climats. On cite, entr'autres, Vitellion & le Cordelier Roger Bacon.

An. de J. C.
1260.

Le premier, né en Pologne, établi en Italie; a laissé un *Traité d'Optique* en dix livres: cet ouvrage n'est, dans le fond, que celui d'Alhazen, mais plus clair & plus méthodique.

Roger Bacon conserve encore la célébrité qu'il eut de son tems. Il a écrit un grand nombre d'ouvrages qui ont été imprimés successivement: ils montrent beaucoup de génie & d'invention. On distingue, parmi ces ouvrages, son *Traité d'Optique*, qui contient des remarques vraies, & alors nouvelles, sur la réfraction astronomique, sur les grandeurs apparentes des objets, sur la grosseur extraordinaire du soleil & de la lune, vus à l'horizon, sur le lieu des foyers sphériques, &c. Quelques Anglois, un peu trop prévenus en faveur de Bacon, leur compatriote, ont cru voir, dans ce *Traité*, que l'Auteur avoit eu connoissance des bécasses, & même du télescope; mais M. Smith, Anglois plus impartial & juge irréfutable, détruit cette opinion, d'après la discussion exacte des passages qui y ont donné lieu. On a voulu aussi attribuer à Bacon, la découverte de la poudre à canon: en effet il y touchoit, car il étoit grand Chimiste pour son tems, & il connoissoit les effets du salpêtre; mais elle lui est réellement postérieure de quelques années. Il fut persécuté par ses confreres, accusé de magie, enfermé dans un cachot, & obligé, pour en sortir, de prouver à ses Supérieurs & au Pape Nicolas IV, qu'il n'avoit jamais eu de commerce avec le diable. Il étoit né en 1214, il mourut en 1294.

L'invention

L'invention des besicles est des dernieres années du XIII.^e siècle. On la doit aux Italiens. Il existe des preuves certaines que les premières lunettes ont été construites par un frere Jacobin, nommé *Alexandre de Spina*, mort à Pise en 1313.

Le XIV.^e siècle fut, chez les Nations occidentales de l'Europe, un tems d'ignorance & de barbarie pour les Mathématiques. On y voit paroître des Théologiens scholastiques, beaucoup d'Alchimistes, quelques Littérateurs estimables : le Roi Charles V. fonde la Bibliothèque des Rois de France ; il encourage les arts & les belles-lettres ; mais les Mathématiques sont presque généralement oubliées ; elles ne produisent qu'un petit nombre d'Astronomes, dont tout le mérite est d'avoir fait quelques observations isolées. Ajoutons cependant que, vers le milieu de ce siècle, Jacques de Dondis, Vénitien, dont la famille subsiste encore, se fit une grande réputation dans la Mécanique & l'Astronomie, par la construction d'une horloge qui marquoit les heures, le cours du soleil, celui de la lune & des autres planettes, les mois & les fêtes de l'année.

Nous avançons vers des tems plus heureux. Le XV.^e siècle est fécond en Savans, & sur-tout en Astronomes. Il s'ouvre par un mouvement qui se fait dans l'Algèbre. Léonard de Pise voyage en Arabie ; il y puise les principes de l'Algèbre, & vient les répandre en Italie. Il avoit écrit sur cette Science & sur la Géométrie des ouvrages qui n'ont jamais été imprimés, mais qui furent très-utiles en leur tems. La fin de ce même siècle en produisit de semblables. En 1494, un Franciscain, nommé *Lucas de Burgo*, qui, après avoir voyagé long-tems en orient, étoit devenu Professeur de Mathématiques à Venise, fit imprimer les *Elémens d'Euclide* en italien, pour l'usage de ses Disciples ; ce qui contribua beaucoup à former des Géomètres. Peu de tems après, il publia un *Traité d'Algèbre*, intitulé : *de Summa Arithmetica & Geometrica*. On trouve, dans ce *Traité*, les règles ordinaires de l'Arithmétique, & quelques inventions dûes aux Arabes, comme, par exemple, les règles de fausses positions : l'Algèbre y est portée jusqu'à la résolution des équations du second degré ; on prétend que *Lucas de Burgo* n'a pas été aussi loin que les Arabes, ni même que Léonard de Pise, quoiqu'il lui soit postérieur.

Dans tous ces tems, l'Astronomie a été la Science la plus cultivée. Elle eut des obligations à *Jean Gmunden*, qui la professoit en l'Université de Vienne, vers l'année 1406, & au fameux Pierre Dailli, qui proposa au Concile de Constance quelques moyens de réformer le calendrier, & de concilier le mouvement du soleil avec celui de la lune.

Tome I. Mathématiques.

f

An. de J. C.
1494.

An. de J. C.
1430.

Le Cardinal *de Cusa* est célèbre parmi les savans, pour avoir entrepris de faire revivre le système des Pythagoriciens sur le mouvement de la terre. Cette idée n'avoit pas encore la maturité que les observations devoient lui donner. Mais on doit trouver un peu extraordinaire qu'un Cardinal soutienne dans ce tems là, sans que personne en soit scandalisé, une opinion pour laquelle, 200 ans après, Galilée fut enfermé dans les cachots de l'Inquisition.

Purbachius,
né en 1421,
mort en 1461.

Purbachius & son Disciple *Regiomontanus* sont regardés comme les Restaurateurs ou les deux plus grands Promoteurs de l'Astronomie dans le XV.^e siècle. Le premier, après avoir long-tems voyagé pour puiser dans le commerce des savans une ample connoissance de l'Astronomie, dont il avoit appris les principes sous Jean Gmunden, vint se fixer à Vienne, où les bienfaits de l'Empereur Frédéric III l'attirèrent, & où il succéda à la place que Jean Gmunden avoit occupée dans l'Université. Dès lors il entreprit un ouvrage utile & nécessaire : c'étoit une bonne traduction de l'Almageste de Ptolomée; car toutes celles qu'on en avoit donné en latin fourmilloient de fautes, par l'ignorance des traducteurs dans l'Astronomie. Il ne s'avoit ni le grec ni l'arabe; mais la parfaite intelligence du sujet lui servit à rectifier ces mauvaises traductions, & à se procurer, du moins quant au sens, le véritable ouvrage de Ptolomée. Bientôt après il écrivit, en faveur de ses Disciples, différents Traités concernant l'Arithmétique, la Géométrie, les hauteurs solsticiales du soleil, la description & l'usage des horloges portatives, le calcul du degré de chaque parallèle, relativement au degré de l'équateur, &c. Comme il joignoit aux connoissances théoriques l'adresse de la main, il construisit lui-même des instrumens utiles à la gnomonique, & des globes célestes sur lesquels étoit marqué le mouvement des étoiles en longitude, depuis Ptolomée jusqu'à l'année 1450. Il détermina, par ses propres observations, l'obliquité de l'écliptique; il fit diverses corrections à la théorie du mouvement des planètes, que les anciennes Tables représentoient d'une manière defectueuse; enfin il introduisit quelques abréviations dans le calcul trigonométrique.

Regiomontanus,
né en 1436,
mort en 1476.

Sa plus grande gloire est d'avoir formé *Regiomontanus*. Ils observèrent ensemble à Vienne, pendant dix ans. Après la mort de *Purbachius*, le second se rendit à Rome pour y chercher les moyens d'apprendre facilement le grec, & de pouvoir lire dans les originaux, non-seulement Ptolomée, mais encore les autres Mathématiciens grecs, car il avoit un génie avide de toutes les Sciences. Ses progrès dans ce genre d'étude furent si heureux, qu'en très-peu de tems il traduisit du grec en latin les *Coniques* d'Appollonius, les *Cylindres*

driques de Serenus, les ouvrages de Ptolomée, les *Questions mécaniques* d'Aristote, les *Pneumatiques* de Héron, &c. Il cortigea sur le texte grec l'ancienne version d'Archimède, faite par Jacques de Cremona. Il ne se borna pas à traduire; il fut lui-même Auteur original de plusieurs excellens ouvrages. Son Traité de Trigonométrie est remarquable en particulier, parce qu'on y trouve une belle méthode, & la première qu'on ait donnée, pour résoudre, en général, un triangle sphérique quelconque, lorsque l'on connoît les trois angles ou les trois côtés; ce qui étoit alors un grand effort de génie & d'invention. La réputation de Regiomontanus détermina le Sénat de Nuremberg à l'appeller dans cette ville. Il s'y forma un observatoire muni d'excellens instrumens qu'il avoit perfectionnés ou inventés lui-même, & avec lesquels il fit des observations qui le mirent en état de rectifier & d'étendre les anciennes Théories. Plusieurs Astronomes avoient attribué; d'après quelques observations mal interprétées dont il donne le détail, un mouvement irrégulier aux étoiles, tantôt dirigé vers l'orient, tantôt dans le sens contraire: Regiomontanus réfuta cette opinion. En 1472, il eut occasion d'observer une comète dont le mouvement, d'abord très-lent, s'accéléra bientôt tellement qu'elle parcourut vers son périhé plus de 30 degrés en 24 heures; elle traînoit à sa suite une queue de plus de 30 degrés de longueur.

Le Pape Sixte IV, voulant faire travailler à la réforme du calendrier, invita Regiomontanus à se rendre à Rome pour cet objet; il lui fit des promesses magnifiques; il le nomma même à l'Evêché de Ratisbonne. Regiomontanus partit; mais, après quelques mois de séjour à Rome, il y mourut à l'âge de 40 ans. On répandit le bruit que les enfans de *Georges de Trebizonde*, l'un des traducteurs de Ptolomée & de Theon, l'avoient fait empoisonner, parce qu'il avoit relevé publiquement plusieurs fautes dans l'ouvrage de leur père.

En quittant Nuremberg, Regiomontanus y laissa un élève bien capable de suivre ses vues & d'y en ajouter de nouvelles: c'étoit *Waltherus*, riche Citoyen, qui fit construire tous les instrumens que Regiomontanus avoit imaginés, & qui, depuis la mort de son maître, continua d'observer le ciel pendant 40 ans. La suite de ses observations, qui présentent des phénomènes de toute espèce, est un trésor précieux pour les Astronomes. Malheureusement l'Astronomie pratique n'avoit pas alors la perfection que lui ont procurée dans la suite les lunettes d'approche & la recherche la plus scrupuleuse dans la construction des instrumens. On a reproché à Waltherus d'avoir

Waltherus, né
en 1450, mort
en 1504.

fij

Navigation.

été peu communicatif, & de s'être réservé exclusivement l'usage des manuscrits de Regiomontanus, dont il étoit dépositaire.

Depuis la découverte de la boussole, la navigation, toujours aidée de l'Astronomie, se perfectionnoit de jour en jour, & s'ouvroit un champ plus étendu. Les anciens, qui n'avoient aucun moyen de connoître à chaque instant la position du vaisseau sur le globe, osoient rarement perdre de vue les côtes de la mer. La boussole leva cet obstacle; & on put entreprendre, avec sûreté, de marcher à travers les mers comme à travers les terres. En 1420, le Prince Henri, fils de Jean I, Roi de Portugal, alla chercher sur l'océan de nouvelles régions; il découvrit l'Isle de Madere; puis, tournant vers l'Orient & le midi, il parcourut une partie de la côte occidentale de l'Afrique. Il eut une foule d'imitateurs: on connoît les expéditions de *Vasco de Gama*, de *Christophe Colomb*, d'*Americ Vesputce*, & de plusieurs autres: ce n'est pas ici le lieu d'en parler. Pour représenter la route que le vaisseau devoit suivre, & pour le diriger en effet suivant cette route, le Prince Henri imagina les cartes marines, connues sous le nom de *cartes plates*. L'usage des globes terrestres étoit très-ancien: celui des cartes, plus récent, avoit la préférence, depuis que Ptolomée & les Arabes avoient donné des méthodes géométriques pour projeter les cercles de la terre sur une simple surface plane; mais le prince Henri, qui vouloit marquer par des lignes droites, les différens rhumbs de vent d'un vaisseau, ne pouvoit y employer ces cartes, & il fut obligé d'imaginer une autre construction. Il suppose que les méridiens sont exprimés par des lignes droites parallèles, & les cercles parallèles à l'équateur, par d'autres lignes droites parallèles, perpendiculaires aux premières; il trace sur la carte la rose des vents; ensuite, pour marquer la route d'un vaisseau qu'il suppose suivre un même rhumb de vent, il mène du lieu de départ au lieu d'arrivée une ligne droite, & il croit que la ligne des vents, parallèle à celle-là, remplit l'objet proposé. Mais ces cartes ne peuvent réellement servir que pour de petites étendues du globe. Lorsque les espaces sont considérables, les degrés des cercles parallèles à l'équateur ne peuvent pas être représentés, d'un cercle à l'autre, par des lignes égales, comme l'auteur le suppose; car on sait que les circonférences de ces cercles diminuent continuellement de l'équateur aux poles. De plus, la route, par un même rhumb de vent, n'est pas, dans cette construction même, une simple ligne droite, si ce n'est dans les deux hypothèses très-bornées où le vaisseau suivroit toujours le même méridien ou le même parallèle. On sentit bientôt ces inconvénients, & on y apporta du remède dans les deux siècles suivans.

III. PÉRIODE.

Les progrès que les nations occidentales de l'Europe ont faits dans les Sciences, depuis le XVI.^e siècle jusqu'à nos jours, effacent tellement ceux des autres peuples, que je ne m'occuperai plus que des premiers dans la suite de ce discours. Que sont en effet les observations astronomiques des Chinois ou des Indiens, en comparaison de toutes les belles recherches dont les Européens modernes ont enrichi la Géométrie, l'Analyse, la Mécanique, &c? Il y a une différence essentielle entre l'Histoire du monde politique & celle du monde savant : dans le premier, chaque jour produit quelque événement grand ou petit, qu'il faut écrire pour donner un corps à la chronologie ; dans le second, où les événemens sont les nouvelles vérités, si une découverte vient se lier à une théorie plus étendue & plus importante, elle perd son existence individuelle, & on peut l'exclure sans scrupule du tableau général des connoissances humaines.

Toutes les Sciences se sont accrues dans l'intervalle de tems qui nous occupe ici. L'Algèbre fit en particulier, avant le milieu du XVI.^e siècle, un pas où l'on est encore arrêté aujourd'hui. Elle eut un succès d'un autre genre : l'esprit de ses opérations, appliqué à l'Arithmétique, fit découvrir, dans les nombres, plusieurs propriétés qu'on n'auroit jamais déduites de leur formation immédiate. Je vais donc comprendre, sous le nom générique d'*Analyse*, les progrès de l'Algèbre & ceux de l'Arithmétique.

DEPUIS que l'ouvrage de *Lucas de Burgo* avoit paru, on possédoit parfaitement la méthode de résoudre les équations des deux premiers degrés. Mais le passage aux degrés supérieurs étoit difficile. L'Italie eut la gloire de donner à cet égard une nouvelle extension à l'Algèbre.

Cardan rapporte, dans son livre, intitulé : *de Arte Magna*, & publié en 1545, que Scipion Ferrei, Professeur de Mathématiques à Bologne, est le premier qui ait donné la formule pour résoudre les équations du troisième degré ; qu'environ trente ans après, un Vénitien, nommé Florido, instruit de cette découverte par son Maître Ferrei, proposa à Nicolas Tartaglia, célèbre Mathématicien de Brescia, divers problèmes dont la solution dépendoit de cette formule ; & que Tartaglia, en méditant sur ces problèmes, parvint à la trouver. Dans un autre endroit, Cardan fait l'aveu que, sur ses instances prières, Tartaglia lui communiqua cette même formule,

Analyse

Cardan, né
en 1501, mort
en 1576.Tartaglia, né
en 1499, mort
en 1557.

mais sans y ajouter la démonstration ; & qu'ayant trouvé cette démonstration, avec le secours de son Disciple, Louis Ferrari, jeune homme d'une grande pénétration, il avoit cru devoir donner le tout au public. Mais Tartaglia fut très-mécontent du procédé de Cardan ; il prétendit être seul inventeur de la formule ; il soutint que Florido ne la connoissoit pas lui-même, & que Cardan étoit coupable tout-à-la-fois d'infidélité & de plagiat, pour avoir publié une formule qu'on lui avoit confiée sous le sceau du secret, & à laquelle il n'avoit aucun droit.

La résolution des équations du quatrième degré suivit de près celle des équations du troisième. Nous apprenons encore de Cardan que Louis Ferrari fit cette nouvelle découverte. Sa méthode, aujourd'hui connue de tous les Analistes, consistoit à disposer les termes de l'équation du quatrième degré, de telle manière qu'en ajoutant à chaque membre une même quantité, ces deux membres pussent se résoudre par la méthode du second degré. En satisfaisant à cette condition, on est mené à une équation du troisième degré : de sorte que la résolution complète du quatrième degré est liée avec celle du troisième, & que les difficultés de celui-ci affectent également l'autre.

Je dis *les difficultés* : il y a effectivement, dans le troisième degré, un cas qui est devenu la torture de tous les Analistes, & que, par cette raison, on appelle *cas irréductible*. Ce cas embrasse les équations où les trois racines sont réelles, inégales & incommensurables entr'elles. Alors les formules, qui les représentent, comprennent des parties imaginaires, & on seroit d'abord porté à croire que ces expressions sont imaginaires, si un examen attentif de leur nature, n'empêchoit de précipiter son jugement. Tartaglia & Cardan n'osèrent rien prononcer à ce sujet. Le dernier s'attacha seulement à résoudre quelques équations particulières qui paroissoient s'y rapporter, & où la difficulté s'évanouissoit fortuitement.

Raphaël Bombelli, Bolonois, un peu postérieur à Cardan, fit voir le premier, dans son Algèbre imprimée en 1579, que les parties de la formule qui représente une racine dans le cas irréductible, formoient, par leur assemblage, un résultat réel. Cette proposition étoit alors un paradoxe ; mais le paradoxe disparut, quand on vit, par la démonstration de Bombelli, que les quantités imaginaires, comprises dans les deux membres de la formule, devoient nécessairement se détruire par l'opposition des signes dont elles étoient affectées. On sent combien une telle remarque étoit importante. On l'a démontrée depuis de plusieurs manières ; mais, quelques efforts qu'on ait faits pour obtenir directement & en termes finis, dans le cas

irréductible, les racines sous une forme débarrassée d'imaginaires, on n'a pas encore pu y parvenir. Le seul progrès qu'on ait fait dans cette théorie, est de pouvoir représenter les racines par des formules réelles très-approchées, ou par des lignes que la Géométrie enseigne à déterminer.

Il étoit naturel de penser que les méthodes pour le troisième & le quatrième degrés, devoient s'étendre plus loin, ou faire naître du moins de nouvelles vues sur les formes des racines dans les degrés supérieurs au quatrième. Mais, si l'on excepte les équations qui, par des transformations de calcul, se réduisent en dernière analyse aux quatre premiers degrés, l'art de résoudre en rigueur les équations n'a fait aucun progrès depuis les travaux des Italiens que nous venons de citer.

Maurolie, Abbé de *Sainte-Marie-du-Port*, en Sicile, profond dans toutes les parties des Mathématiques, s'attacha à une autre branche du calcul analytique, alors presque inconnue : c'étoit la formation de plusieurs suites de nombres, comme la suite des nombres naturels, celle de leurs quarrés, celle des nombres triangulaires, &c. Il donna, sur ce sujet, des Théorèmes remarquables par la subtilité de l'invention & la simplicité des résultats.

Maurolie, né en 1494, mort en 1571.

On voit que nous rendons justice avec plaisir aux savans étrangers. La même équité demande que l'on attribue à Viète, l'un de nos illustres compatriotes, la gloire d'avoir généralisé l'Algorithme de l'Algèbre, & d'y avoir fait plusieurs découvertes importantes. Avant lui, on ne résolvait que des équations du genre de celles qu'on appelle *équations numériques* ; on représentait l'inconnue par un caractère particulier, ou par une lettre de l'alphabet ; les autres quantités étoient des nombres absolus. Il est vrai qu'ensuite la méthode appliquée à une équation pouvoit être appliquée également à une autre équation semblable. Mais il étoit à désirer que toutes les grandeurs indistinctement fussent représentées par des caractères généraux, & que toutes les équations particulières d'un même ordre ne fussent que de simples traductions d'une même formule générale. Viète procura cet avantage à l'Algèbre, en y introduisant les lettres de l'alphabet pour représenter toutes sortes de grandeurs, connues ou inconnues ; notation facile & commode, tant parce que l'usage des lettres nous est très-familier, que parce qu'une lettre peut exprimer indifféremment un poids, une distance, une vitesse, &c. Lui-même fit plusieurs usages très-heureux de ce nouvel algorithme. Tels sont, par exemple, les moyens qu'il donne de transformer une équation en une autre, dont les racines soient plus grandes ou plus petites, d'une quantité arbitraire ; de multiplier ou

Viète, né en 1540, mort en 1603.

de diviser les racines par un nombre quelconque, &c. Ces différentes préparations le conduisent à une méthode ingénieuse & nouvelle pour résoudre les équations du troisième & du quatrième degré. Enfin, au défaut d'une résolution rigoureuse des équations de tous les degrés, il donne une résolution approchée : elle est fondée sur ce principe, qu'une équation quelconque n'est qu'une puissance imparfaite de l'inconnue ; & l'auteur y emploie à-peu-près les mêmes procédés, que pour trouver, par approximation, les racines des nombres qui ne sont pas des puissances parfaites. Si nous possédons aujourd'hui des moyens plus simples & plus commodes pour arriver au même but, n'en admirons pas moins ces premiers efforts du génie.

Hariot, né en
1560, mort en
1627.

Les Anglois firent, peu de tems après Viète, des découvertes intéressantes dans l'Algèbre. Hariot, dans un ouvrage, intitulé : *Artis Analytica praxis*, rassembla tout ce qui avoit été écrit de plus important sur cette Science, & y ajouta plusieurs nouveautés. Il simplifia les notations de Viète, en substituant les lettres minuscules à la place des majuscules, & quelques nouveaux signes pour abréger le discours ; il est le premier qui ait imaginé de mettre d'un même côté tous les termes d'une équation, & qui par-là ait vu distinctement, ce que l'Analyste françois n'a fait qu'indiquer d'une manière confuse, que, dans toute équation, le coefficient du second terme est la somme des racines prises avec des signes contraires ; que le coefficient du troisième est la somme des produits des racines prises deux à deux, &c. On lui doit d'avoir observé que toutes les équations qui passent le premier degré peuvent être regardées comme produites par la multiplication d'équations du premier degré : de sorte que, substituant à la place de l'inconnue l'une des valeurs données par ces équations composantes, la totalité des termes de l'équation proposée devient égale à zéro. Ces Théorèmes ont facilité la résolution complète de plusieurs équations.

L'Angleterre a produit une autre théorie analytique très-ingénieuse & très-importante par ses usages : celle des logarithmes. Tout le monde fait qu'il y a, pour les calculs numériques, quatre règles principales ; l'addition, la soustraction, la multiplication & la division. Les deux premières sont toujours faciles à pratiquer, & il ne faut qu'une médiocre attention pour exécuter facilement les calculs qu'elles prescrivent. Il n'en est pas ainsi des deux autres : elles exigent souvent des opérations longues, fatigantes, & où il peut aisément se glisser des erreurs. En observant la correspondance réciproque de la progression géométrique & de la progression arithmétique, on s'aperçut que, dans le passage d'un terme à l'autre, la progression géométrique

emploie

emploie la multiplication ou la division de la même manière que la progression arithmétique emploie l'addition ou la soustraction. De-là le Baron de Nepper, Ecossois, imagina de construire des Tables où des nombres se répondoient les uns aux autres, suivant les loix de la progression géométrique & de la progression arithmétique ; par ce moyen, il réduisit tous les calculs à de simples additions & soustractions : idée heureuse, qui rend des services immortels à toutes les parties des Sciences, & sur-tout à l'Astronomie. Les savans, qui ont pris la peine de calculer ces Tables, Nepper lui-même, Henri Brigg, Ulacq, Gardiner, &c. ont droit à la reconnaissance de la postérité.

AN. 1614.

Personne n'a plus contribué aux progrès de l'Analyse que notre illustre Descartes. La nature lui avoit donné le génie & l'audace nécessaires pour remuer toutes les bornes des connoissances humaines. Il apprit aux hommes, dans *sa Méthode*, l'art de chercher la vérité ; il joignit l'exemple au précepte dans ses ouvrages de Mathématiques. La gloire que ces ouvrages lui ont acquise ne périra jamais, parce que les vérités qu'il a découvertes sont de tous les tems ; mais on ne peut pas dissimuler que la plupart de ses systèmes philosophiques, enfantés par l'imagination, & contredits par la nature, ont déjà disparu, & n'ont produit d'autre avantage que d'abolir la tyrannie du Péripatétisme. L'Algèbre lui doit plusieurs découvertes importantes. Il introduisit dans les multiplications répétées d'une même lettre, la notation des puissances par les exposans, ce qui simplifie le calcul, & ce qui a été le germe de la Méthode pour développer les quantité radicales en séries. Les Analystes, qui l'avoient précédé, ne connoissoient point l'usage des racines négatives dans les équations, & ils les rejetoient comme inutiles ; il fit voir qu'elles sont tout aussi réelles, tout aussi propres à résoudre une question que les racines positives, la distinction qu'on doit mettre entre les unes & les autres n'ayant d'autre fondement que la différente manière d'envisager les quantités dont elles sont les symboles ; il enseigna à connoître, dans une équation qui ne contient que des racines réelles, le nombre des racines positives & celui des racines négatives, par la combinaison des signes qui précèdent les termes de l'équation ; la Méthode des *indéterminées*, entrevue par Viète, fut développée par Descartes, qui en fit une application claire & distincte aux équations du quatrième degré ; il feint que l'équation générale de ce degré est le produit de deux équations du second, qu'il affecte de coefficients *indéterminés* ; & , par la comparaison des termes de ce produit avec ceux de l'équation proposée, il parvient à une équation réduite au troisième degré, laquelle donne les coefficients

Descartes, né en 1596, mort en 1650.

Tome I. Mathématiques.

g

inconnus. Cette méthode s'applique à une infinité de problèmes, dans toutes les parties des Mathématiques.

Hudde, mort
très-jeune en
1704.

Je ne ferai pas ici mention de plusieurs savans Algébristes qui, peu de tems après la mort de Descartes, étendirent & même perfectionnèrent ses Méthodes. Il y en a cependant un qui mérite une attention particulière : c'est le célèbre Hudde, Bourguemestre d'Amsterdam, qui publia en 1658, dans le commentaire de Schooten sur la Géométrie de Descartes, une méthode très-ingénieuse pour reconnoître si une équation d'un degré quelconque contient plusieurs racines égales, & pour déterminer ces racines.

Pascal, né en
1623, mort en
1662.

Pascal se fraya, dans l'Analyse, une route nouvelle, par son fameux *Triangle arithmétique*. C'est une espèce d'arbre généalogique, où, par le moyen d'un nombre arbitraire ; écrit à la pointe du triangle, l'Auteur forme successivement, & de la manière la plus générale, tous les nombres figurés, détermine les rapports qu'ont entr'eux les nombres de deux cases quelconques, & les différentes sommes qui doivent résulter de l'addition des nombres d'une même rangée prise dans tel sens que l'on voudra. Il fait ensuite plusieurs applications intéressantes de ces principes. Celle où il détermine les *partis* qu'on doit établir entre deux Joneurs qui jouent en plusieurs parties, mérite principalement d'être remarquée, puisqu'elle a donné la naissance au calcul des probabilités, dans la Théorie des jeux de hasard. Quelques Auteurs ont attribué les *Elé-*

Huguens, né
en 1629, mort
en 1694.

mens de ce calcul à Huguens, qui publia, en 1657, un excellent Traité, intitulé : *de Raciociniis in Ludo aleæ* ; mais Huguens avertit lui-même, avec une modestie digne d'un si grand homme, que cette matière avoit déjà été agitée entre les plus grands Géomètres de la France, & qu'il ne prétend rien à la gloire de l'invention. En effet, on voit, par les lettres de Pascal & de Fermat, imprimées dans les Œuvres de ce dernier, que les principes du Triangle arithmétique étoient répandus en France, dès l'année 1654, quoique les ouvrages, où Pascal les explique en détail, n'aient paru, par la voie de l'impression, qu'après la mort de l'Auteur.

Fermat, né
en 1596, mort
en 1665.

Dans le tems que Pascal approfondissoit à Paris la nature des nombres figurés, Fermat, de son côté, en découvroit à Toulouse plusieurs belles propriétés, en suivant une autre méthode. Ces deux grands hommes se rencontroient souvent dans les résultats de leurs recherches. Loin qu'une pareille concurrence altérât l'amitié que la conformité d'études avoit fait naître entr'eux, sans qu'ils se fussent jamais vus, ils se rendoient mutuellement justice avec un abandon que la médiocrité ne peut connoître.

La prédilection de Fermat pour les recherches numériques se

P R E L I M I N A I R E. lj

porta sur-tout vers la Théorie des nombres premiers, qu'on n'avoit pas encore examinée, & où il a fait de profondes découvertes. On sait que tout nombre n'est qu'un rapport avec l'unité de numération; mais il est souvent difficile de reconnoître si ce rapport est simple, ou s'il est produit par la multiplication de plusieurs autres. Fermat établit des caractères généraux & distinctifs, propres à faire discerner, dans une infinité d'occasions, les nombres qui ont des diviseurs d'avec ceux qui n'en ont pas. L'analyse de Diophante exerça également son génie. Bâchet de Meziriac, Editeur & Commentateur du Géomètre grec, avoit déjà résolu plusieurs nouveaux problèmes dépendans de la doctrine de son Auteur : Fermat porta plus loin la même matière. Toutes ces recherches ont été étendues & perfectionnées par de grands Géomètres modernes.

Meziriac, né
en 1577, mort
en 1659.

En 1655, Wallis publia, en Angleterre, son *Arithmétique des infinis*; ouvrage plein de génie, & dont l'objet, comme celui du Triangle arithmétique, étoit de sommer différentes suites de nombres. Par cette Méthode, on quarre les courbes, quand les ordonnées sont exprimées par un seul terme; on peut aussi quarret les courbes à ordonnées complexes, en développant ces ordonnées en séries, dont chaque terme est un monome. Nous parlerons ci-dessous de la dispute que l'auteur eut avec Pascal au sujet de la Cycloïde. Wallis étoit un profond Analyste: c'est à lui qu'on doit la notation des radicaux par des exposans fractionnaires, & celle des exposans négatifs. Descartes n'avoit employé les exposans que pour les puissances entières & positives.

Wallis, né en
1616, mort en
1703.

Le chemin de la vérité étant sans cesse hérissé d'écueils où la foiblesse de l'esprit humain vient se briser, on ne sauroit trop multiplier les moyens de les éviter, ou d'approcher du but, lorsqu'il n'est pas possible d'y atteindre en rigueur. Tel est l'avantage que procure la Théorie des fractions continues, quand une fraction irréductible est exprimée par de trop grands nombres pour qu'on puisse l'appliquer à la pratique, sous sa forme immédiate. Elle substitue à une expression compliquée, une expression simple & à-peu-près équivalente. Cette Théorie, dont le Lord Brouncker avoit donné les élémens, fut étendue & perfectionnée par Hâguens: elle a été appliquée depuis à plusieurs usages importans.

Brouncker,
né en 1610,
mort en 1656.

Toutes ces branches particulières de l'analyse ne faisoient pas perdre de vue le problème de la résolution générale des équations. Neuton, jeune alors, la chercha long-tems: il ne la trouva point; mais il recula d'ailleurs considérablement les bornes de l'Algèbre. Il donna une Méthode pour décomposer, lorsque la chose étoit possible, une équation en facteurs commensurables: Méthode qui s'étend à tous

g ij

les degrés & dont la pratique est aussi simple qu'on puisse le désirer ; il somma les puissances quelconques des racines d'une équation ; il enseigna l'art d'extraire les racines des quantités en partie commensurables, en partie incommensurables ; il apprit à former des suites infinies, pour trouver d'une manière approchée les racines des équations numériques & littérales de tous les degrés, &c. La plupart de ces recherches ont été éclaircies & commentées dans des ouvrages modernes.

Géométrie pure.

Dès le commencement du XVI.^e siècle, l'ancienne Géométrie fut cultivée en Europe, avec un succès qui alla toujours en augmentant. On prit pour guides les Géomètres grecs, dont la plupart furent traduits en latin ou en italien. L'étude des anciennes langues, alors fort en vogue, multiplioit les objets & les moyens d'instruction.

Werner, né
en 1468, mort
en 1518.

On cite Werner comme un savant Géomètre. En 1522, il publia à Nuremberg quelques Traités, concernant presque tous la Théorie des sections coniques.

Tartaglia & Maurolic, dont nous avons déjà parlé, se rendirent utiles à la Géométrie, non seulement comme traducteurs de plusieurs anciens ouvrages, mais encore comme Auteurs. Le premier a composé un Traité italien, intitulé : *de Numeri è Misura*, dans lequel on trouve, pour la première fois, la détermination de l'aire d'un triangle, par le moyen de ses trois côtés, & sans le secours de la perpendiculaire abaissée de l'un de ses angles sur le côté opposé : Le second a écrit sur plusieurs sujets : son Traité des Sections Coniques est remarquable par la clarté & l'élégance qui y règnent. M. de la Hire n'a fait, dans la suite, qu'amplifier & appliquer à de nouveaux usages la Méthode du Géomètre Sicilien.

Nonius, né
en 1492, mort
en 1577.

Nous ne devons pas oublier Nonius, né en Portugal, auteur de plusieurs ouvrages très-estimables, & à qui l'on doit en particulier la subdivision des petites parties d'un instrument par des lignes transversales, que l'on appelle ordinairement *Division de Nonius*.

Commandin,
né en 1509,
mort en 1575.

Commandin, qu'on ne peut placer qu'au rang des Commentateurs, mérite du moins la louange qui n'est pas commune, d'avoir bien entendu les Auteurs qu'il a traduits, & d'en avoir éclairci les endroits difficiles, par des notes exactes & précises. Il a publié ainsi, en latin, Euclide, Archimède, quelques ouvrages de Ptolomée, les Pneumatiques de Heron, la Geodesie du Géomètre arabe Mehemet de Bagdar, &c.

Ramus, né en
1508, mort en
1572.

Le célèbre Ramus n'a fait aucune découverte dans les Mathématiques : ses élémens de Géométrie & d'Arithmétique sont médiocres ; mais il a d'ailleurs bien mérité des sciences, par le zèle qu'il mit à les répandre, & par le sacrifice qu'il leur fit de son repos, de sa fortune & même de sa vie.

Je m'abstiens de citer plusieurs autres Géomètres qui écrivirent des ouvrages utiles pour ce tems-là, mais peu profonds, & aujourd'hui presque entièrement oubliés. Je nommerai seulement *Pierre Metius*, *Adrianus Ronanus*, & *Leudolphe-van-Ceulen*, qui calculèrent d'une manière beaucoup plus approchée qu'on ne l'avoit fait encore, le rapport de la circonférence au diamètre. Celui de 355 à 113, donné par Metius, approche singulièrement de la vérité, eu égard au petit nombre de chiffres par lesquels il est exprimé.

On trouve, dans les ouvrages de Régiomontanus, de Tartaglia & de Bombelli, quelques problèmes de Géométrie, résolus par le moyen de l'Algèbre. Mais ces solutions isolées, & où l'on employoit, dans chaque cas particulier, de simples nombres pour exprimer les lignes connues, n'étoient pas fondées sur une méthode régulière & générale d'appliquer l'Algèbre à la Géométrie. Viète est le premier qui ait donné une telle méthode. Le secours mutuel que ces deux Sciences se prêtent, fut pour notre auteur la source de plusieurs importantes découvertes. Par exemple, il observa que toute équation du troisième degré, contenant, en général, ou une seule racine réelle & deux imaginaires, ou trois racines réelles; la racine réelle, dans le premier cas, se trouvoit par la duplication du cube; & les trois racines réelles, dans le second, par la trisection de l'angle. On ne doit pas oublier néanmoins qu'il n'avoit qu'une idée confuse des racines négatives, & que Descartes a commencé à les faire connoître distinctement.

Géométrie
mise.

Les élémens de la doctrine des *Sections angulaires*, sont encore une invention de Viète. On sait que l'objet de cette théorie est de trouver les expressions générales des cordes ou des sinus, pour une suite d'arcs multiples les uns des autres: Et réciproquement, les expressions des arcs, quand on connoît les cordes ou les sinus: elle a reçu des accroissemens entre les mains de Hermann, Jacques Bernoulli & Euler.

On regarde ordinairement Descartes comme l'inventeur de l'application de l'Algèbre à la Géométrie: on lui accorde à cet égard un peu plus qu'il ne doit prétendre; mais il a fait réellement de cette méthode un usage si heureux, si original & si étendu, qu'on a pu oublier les droits de ses prédécesseurs, & lui attribuer la découverte toute entière. Il établit, sur ce sujet, les principes les plus lumineux; il commence par la solution d'un problème où tous les anciens Géomètres avoient échoué, & qu'on peut énoncer ainsi: *Etant données de position, ou trois lignes, ou quatre lignes, &c; trouver un point duquel on puisse mener autant d'autres lignes, telles qu'elles fussent avec les premières des angles donnés, & que le*

rectangle formé sur deux de ces lignes ainsi tirées d'un même point, ait un rapport donné avec le quarré de la troisième, s'il n'y en a que trois; ou bien avec le rectangle des deux autres, s'il y en a quatre, &c. Mais ce qui appartient absolument à Descartes, & ce qui lui fera un honneur immortel, c'est d'avoir appliqué l'Algèbre à la théorie des lignes courbes. Il regarde une courbe comme engendrée par les extrémités d'une suite de lignes variables, qui répond à d'autres lignes variables; & après avoir formé une équation qui exprime la loi suivant laquelle ces deux suites de lignes varient les unes par rapport aux autres, il construit la courbe; il suit sa marche dans l'espace; il détermine ses tangentes, ses perpendiculaires, & en général toutes les affections qui la caractérisent. Cette méthode réunit sous un même point de vue la simplicité & la généralité. Ainsi; par exemple, une même équation du second degré, entre l'abscisse & l'ordonnée combinées avec des quantités constantes, peut représenter, en général, la nature des trois sections coniques; ensuite les valeurs & les rapports des quantités constantes déterminent l'équation à exprimer, dans les cas particuliers, une parabole, une ellipse ou une hyperbole.

On doit encore à Descartes la manière d'envisager & de construire les courbes à double courbure, en les projetant sur deux plans perpendiculaires entr'eux, où elles forment des courbes ordinaires, qui ont une abscisse & une ordonnée communes.

De tous les problèmes qu'il résout dans sa Géométrie, aucun ne lui fit autant de plaisir, comme il le dit lui-même, que sa méthode pour mener les tangentes à une courbe. Cette méthode donne les tangentes par le moyen des perpendiculaires aux points de contingence. L'Auteur feint que, d'un point quelconque, pris sur l'axe de la courbe, on décrive un cercle lequel coupe la courbe au moins en deux points; il cherche l'équation qui exprime les lieux des intersections; il suppose ensuite que le rayon du cercle diminue jusqu'à ce que deux intersections voisines viennent à coïncider: alors les deux rayons correspondans n'en forment qu'un seul qui est perpendiculaire à la courbe; & la question est réduite à former, d'après ces élémens, une équation qui contienne deux racines égales. Dans la suite, Descartes proposa une autre méthode pour les tangentes: il prend ici hors de la courbe, & sur le prolongement de son axe, un point autour duquel il fait tourner une ligne droite, qui coupe la courbe au moins en deux points; il fait coïncider les deux points d'intersection, en assujettissant, comme tout-à-l'heure, l'équation des intersections à contenir deux racines égales. On voit que les deux méthodes sont fondées sur le même principe; elles sont l'une

& l'autre fort ingénieuses, quoique bien moins simples & moins directes que celle du calcul différentiel.

Fermat avoit trouvé, avant que la Géométrie de Descartes parût; sa méthode pour déterminer les *maxima* & les *minima* dans les quantités qui croissent d'abord, puis décroissent; ou qui commencent à diminuer, puis viennent à augmenter. Elle porte sur cette remarque, qu'en deçà & en delà du point de *maximum* ou de *minimum*, il y a deux grandeurs égales: Fermat cherche les expressions de ces grandeurs; il les égale entr'elles; &, supposant ensuite que l'intervalle des deux grandeurs est infiniment petit, il trouve une équation qui donne le *maximum* ou le *minimum*. On détermine facilement, par ce moyen, les tangentes des courbes, en considérant une tangente comme une sécante, & en faisant évanouir l'intervalle compris entre les deux ordonnées qui répondent aux deux points d'intersections. Ce même principe est, comme on voit, la base du calcul différentiel que Fermat n'a pas cependant trouvé, parce qu'il falloit de plus soumettre la méthode à un algorithme de calcul régulier & débarrassé de toutes les opérations superflues.

Nous rapportons à la Géométrie mixte plusieurs ouvrages qui parurent dans le dernier siècle, avant la naissance des calculs différentiel & intégral: non pas que les méthodes qu'on y emploie soient toutes fondées sur le calcul algébrique, mais parce qu'elles sont toujours au moins dirigées par l'esprit de ce calcul.

Un des plus originaux est la Géométrie des indivisibles de Cavalieri. La méthode des anciens pour déterminer les surfaces & les solidités des corps, avoit l'inconvénient d'exiger plusieurs détours: il falloit inscrire & circoncrire des polygones à une figure, & chercher la limite du rapport entre le dernier polygone inscrit & le dernier polygone circonscrit. Cavalieri marche plus directement au but; il regarde les plans comme formés par des sommes infinies de lignes, les solides, par des sommes infinies de plans; & il prend pour principe que les rapports de ces sommes infinies de lignes ou de plans sont les mêmes que ceux des plans ou des solides. Cette nouvelle Théorie donne sans peine non-seulement les problèmes de l'ancienne Géométrie, qui sont de nature à y être fournis, mais encore plusieurs autres d'un genre plus difficile.

Il paroît que la méthode des indivisibles, sur laquelle la Géométrie de Cavalieri est fondée, n'étoit pas inconnue en France, quand cet ouvrage parut: car, un peu avant cette époque, Roberval avoit employé une semblable méthode pour déterminer l'aire de la cycloïde & les solides qu'elle engendre en tournant, soit autour de sa base, soit autour du diamètre de son cercle générateur.

Cavalieri, né
en 1598, mort
en 1647.

Roberval, né
en 1602, mort
en 1675.

Toricelli, né
en 1608, mort
en 1647.

Quelques années après, Toricelli donna ces Théorèmes concernant la cycloïde, comme de son invention. Roberval voulut le faire passer pour plagiaire; mais on juge, par le tour des démonstrations de Toricelli, qu'il étoit parvenu, de son côté, aux mêmes vérités que Roberval, dont vraisemblablement il ne connoissoit pas l'ouvrage.

Descartes & Fermat résolurent, au sujet de la même courbe, un autre problème alors très-difficile : ils enseignèrent à mener ses *tangentes*.

Grégoire de
Saint-Vincent,
né en 1584,
mort en 1667.

Un Géomètre des Pays-bas, Grégoire de Saint-Vincent, se fit de la réputation dans les Mathématiques, par un ouvrage où il cherchoit la quadrature du cercle, qu'il ne trouva point, mais rempli d'ailleurs de Théories exactes & profondes sur la mesure des onglets de différens corps formés par la révolution des sections coniques.

Beaune, né
en 1601, mort
en 1651.

Beaune, ami & commentateur de Descartes, proposa un problème qui a donné naissance à la célèbre *méthode inverse des tangentes*. Ce problème consistoit à trouver une courbe telle que l'ordonnée fût à la sous-tangente, comme une ligne donnée est à la partie de l'ordonnée, comprise entre la courbe & une ligne qui, coupant l'ordonnée, fait avec l'axe un angle connu. Descartes indiqua la construction & plusieurs propriétés de la courbe demandée.

An. 1656.

Wallis avoit connu & indiqué le principe de la rectification des courbes, mais sans en faire aucun usage. Un Géomètre, rempli de sa doctrine, Guillaume Neil, développa ce principe, & en fit l'application à la seconde parabole cubique, où le cube de l'ordonnée est proportionnel au carré de l'abscisse : premier exemple d'une courbe rectifiée.

La cycloïde commençoit à être un peu oubliée des Géomètres, lorsque Pascal la ramena sur la scène en 1658, & proposa de nouveaux problèmes sur cette courbe, en promettant des prix à ceux qui les résoudroient. Ces problèmes consistoient à trouver la mesure & le centre de gravité d'un segment quelconque de cycloïde, les dimensions & les centres de gravité des solides, quart de solides, &c, qu'un pareil segment produit, en tournant autour de l'abscisse ou de l'ordonnée. Huguens quitta le segment compris depuis le sommet jusqu'au quart du diamètre du cercle générateur; Sluze mesura l'aire de la courbe par une méthode très-élégante; Wren détermina la longueur & le centre de gravité de l'arc cycloïdal, compris depuis le sommet jusqu'à l'ordonnée; & les surfaces des solides de révolution que cet arc produit; Fermat & Roberval, sur le simple énoncé des Théorèmes du Géomètre Anglois, en trouvèrent les démonstrations. Mais toutes ces recherches ne répondoient pas,

Sluze, né en
1621, mort en
1685.

Wren, né en
1632, mort en
1727.

pas, du moins entièrement, aux questions du Programme. Aussi ne furent-elles pas envoyées au concours. Wallis & le P. Lallouere, Jésuite, furent les seuls qui, ayant traité tous les problèmes proposés, prétendirent aux prix. Mais Pascal leur démontra à l'un & à l'autre qu'ils s'étoient trompés en plusieurs points. Lui seul donna la solution véritable & complète de ses problèmes; il y en ajouta plusieurs autres qui achevèrent d'établir sa supériorité en Géométrie, & de perfectionner la théorie de la Cycloïde.

Barrow eut une idée heureuse, & qu'on peut regarder comme un nouveau pas vers l'analyse infinitésimale, en formant son *triangle différentiel*, pour mener les tangentes des courbes. On sait que ce triangle a pour côtés l'élément de la courbe, & ceux de l'abscisse & de l'ordonnée. La méthode de Barrow est celle de Fermat, simplifiée & généralisée à quelques égards; elle donne facilement les tangentes des courbes dont les ordonnées sont rationnelles; mais ce n'est pas encore le calcul différentiel.

Barrow, né
en 1630, mort
en 1677.

Une autre branche de la Géométrie occupa Sluze, qui la porta au plus haut degré d'élégance: c'est la construction des équations par les lieux Géométriques.

La Théorie des développées que Huguens publia, en 1673, dans son *Traité de Horologio Oscillatorio*, sera toujours regardée comme l'une des plus grandes découvertes de la Géométrie. Une courbe étant donnée, on forme une autre courbe, en menant à la première, une suite de perpendiculaires qui touchent la seconde: ou réciproquement, étant donnée une courbe qui se forme par une suite de lignes droites qui la touchent, on détermine la courbe qui coupe perpendiculairement toutes ces tangentes. Par-là, Huguens parvint à rectifier plusieurs courbes; il trouva la belle propriété qu'à la cycloïde de produire, en se développant, une cycloïde égale & semblable, posée dans une situation renversée. Les usages de la théorie des développées, dans toutes les parties des Mathématiques, sont innombrables.

Les Anglois continuoient d'enrichir la Géométrie de plusieurs nouveautés remarquables. Brouncker donna une suite infinie, pour représenter l'aire de l'hyperbole; Nicolas Mercator parvint, de son côté, à la même découverte. Wallis avoit enseigné, depuis longtemps, à quarrer les courbes, dont les ordonnées sont des monomes; sa méthode s'appliquoit également aux courbes, qui ont pour ordonnées des quantités complexes élevées à des puissances entières & positives, en faisant le développement de ces puissances, par les principes ordinaires de la multiplication. Il voulut étendre aussi cette théorie aux courbes qui ont des ordonnées complexes & radi-

cales, en cherchant à interpoler, pour ce cas, de nouvelles suites, aux suites de la première espèce; mais il ne put y réussir. Neuton surmonta la difficulté; il fit plus, il résolut le problème d'une manière directe & beaucoup plus simple, au moyen de la formule qu'il trouva pour développer, en une suite infinie, une puissance quelconque d'un binôme, quelque soit l'exposant de la puissance, entier ou rompu, positif ou négatif. La suite infinie qui résulte de-là, pour la quadrature du cercle, fut trouvée d'une autre manière par Jacques Grégori. Ce même Géomètre forma plusieurs autres suites très-curieuses: dans un ouvrage qui est resté manuscrit, mais dont on a conservé le précis, il donnoit la tangente & la sécante par l'arc, & réciproquement l'arc par la tangente ou la sécante: il formoit deux suites pour trouver immédiatement le logarithme de la tangente ou de la sécante, quand l'arc est donné; & réciproquement le logarithme de l'arc, par celui de la tangente ou de la sécante: enfin il appliquoit cette théorie des suites à la rectification de l'ellipse & de l'hyperbole.

L'usage des suites, dans la géométrie, fit aussi des progrès en Allemagne. Leibnitz donna une méthode pour transformer une surface curviligne en une autre dont les parties, supposées égales à celles de la première, eussent d'ailleurs une figure & une position, telles qu'on pût appliquer à la quadrature de cette dernière courbe les méthodes de Mercator & de Wallis.

Astronomie.

Nous trouvons, sous cette période, une foule d'Astronomes; parmi lesquels il y a des génies du premier ordre.

Copernic, né
en 1472, mort
en 1543.

Ce titre est dû à Copernic, qui s'offre ici à nous des premiers. Quoique né en 1472, il ne put se livrer entièrement à son goût, pour l'Astronomie, que vers l'année 1507. L'explication des mouvemens célestes, dans le système de Ptolomée, avoit d'abord choqué sa raison. Il y trouvoit un embarras & une obscurité qu'il ne pouvoit concilier avec la simplicité des loix ordinaires de la nature. Instruit que les Pythagoriciens avoient transporté, du soleil à la terre, le mouvement de révolution dans l'écliptique, & que d'autres Philosophes anciens, en laissant la terre au centre de notre monde planétaire, lui avoient attribué d'ailleurs un mouvement de rotation autour de son axe, pour expliquer les vicissitudes des jours & des nuits; il combina ensemble ces deux idées, & il se convainquit, par une longue suite de méditations, que la terre avoit en effet ce double mouvement. Alors les directions, les stations, & les rétrogradations des planètes, vinrent s'expliquer avec une facilité qui l'étonna lui-même. Il répondit, d'une manière victorieuse, aux principales objections qu'on pouvoit lui opposer: celles qui laissoient

encore quelque nuage, furent levées dans la suite par les observations même, comme il l'avoit prédit. Toute la doctrine est expliquée dans son fameux Livre *de revolutionibus cœlestibus*, qui fut composé vers l'an 1530, mais qui ne parut qu'en 1543 : l'auteur mourut le jour même qu'il en reçut le premier exemplaire entièrement imprimé.

Le système de Copernic étoit si simple, si satisfaisant, si conforme à toutes les loix de la Méchanique & de la Physique céleste, qu'il auroit été d'abord adopté de tous les astronomes, si un zèle religieux, mal entendu, n'avoit crû en trouver la condamnation dans quelques passages de l'Ecriture Sainte, comme si les Ecrivains sacrés, dans une question de pure philosophie, devoient se conformer à la vérité astronomique, qui ne peut être entendue que des Savans, & non pas au langage vulgaire, qui est à la portée de tous les hommes ! Nous voyons avec peine, que Tycho-Brahé ait sacrifié ses lumières, & peut-être sa conviction intime à des considérations qui ne sembloient pas faites pour l'ébranler ; mais pardonnons-lui cette erreur, ou cette foiblesse, en faveur des nombreuses observations & découvertes dont il a enrichi l'Astronomie. En rendant à la terre la prétendue immobilité, il faisoit circuler au-tour d'elle, d'abord la lune, ensuite le soleil, qui emportoit dans sa sphère de révolution, les autres planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter & Saturne. Il expliquoit ainsi, d'une manière assez satisfaisante, les apparences des phénomènes célestes alors connus. Je dis *alors connus*, parce que la Théorie de l'*aberration* de la lumière des étoiles fixes ne permet plus aujourd'hui de douter que la terre autour du soleil. Mais Tycho étoit trop éclairé d'ailleurs, pour ne pas reconnoître que son système choquoit, presque autant que celui de Ptolomée, les loix de la Méchanique. Sa vraie gloire est d'avoir été un excellent observateur, & d'avoir jeté les fondemens des nouvelles théories astronomiques, ou par ses propres travaux, ou par ceux des disciples & des coopérateurs qu'il s'étoit associés dans sa petite Ville d'Uranibourg. Il détermina, plus exactement qu'on n'avoit fait encore, le mouvement des planètes : celui que l'on connoît à la lune, sous le nom de *variation*, est l'une de ses découvertes. L'Astronomie des comètes, qui place ces astres au nombre des planètes, & qui cherche à calculer leurs orbites, a pris naissance entre ses mains.

Nous n'oublions pas Guillaume IV, Landgrave de Hesse-Cassel, Contemporain de Tycho. Ce Prince fit bâtir, dans sa Capitale, un observatoire qu'il garnit des meilleurs instrumens alors connus ; & il y observa lui-même la position de plusieurs étoiles, & les hauteurs solsticiales du soleil en 1585 & 1587.

Tycho-Brahé,
né en 1546,
mort en 1601.

Guillaume IV,
né en 1532,
mort en 1592.

Réforme du
Calendrier, en
1582.

Ce tems est encore célèbre par la réforme du calendrier. Le désordre qui s'étoit introduit dans la manière de régler la fête de Pâques, parmi les Chrétiens, demandoit qu'on y apportât enfin du remède, & on s'en occupoit effectivement depuis près d'un siècle. Cet ouvrage fut achevé, en 1582, sous le Pontificat de Grégoire XIII. On fait que les Juifs célébroient leur *Pâques* le quatorzième jour du *premier mois*, c'est-à-dire du mois où la pleine lune arrivoit le jour même de l'équinoxe, ou le jour qui suivoit immédiatement. Dans la primitive Eglise, on avoit statué que la Pâques des Chrétiens, instituée en mémoire de la résurrection de Jesus-Christ, seroit célébrée le premier dimanche qui arrivoit après la Pâques Juive; parce que Jesus-Christ étoit ressuscité à pareil jour; mais on étoit souvent embarrassé à le fixer, & on le choisissoit ordinairement au hasard. Le Concile tenu à Nicée, en 325, supposant que l'équinoxe du printemps arrivoit toujours le 21 Mars, avoit ordonné d'ailleurs, qu'on régleroit le mois lunaire & l'âge de la lune, d'après le cycle de Meton; mais il y avoit, dans cette disposition, deux petites erreurs astronomiques, dont les effets accumulés dans une suite de siècles; étoient devenus très-sensibles. L'équinoxe du printemps qui, en 325, tomboit au 21 Mars, tomboit au 11 Mars en 1582; & d'un autre côté, l'âge de la lune ne quadroit point avec les suppositions du cycle Méronien. Grégoire XIII, par une bulle donnée au mois de Mars 1582, retrancha tout d'un coup 10 jours au mois d'Octobre, pour ramener l'équinoxe du printemps, au 21 Mars de l'année suivante; & il fixa les corrections qu'exigeoient pour l'avenir, la précession des équinoxes & les inégalités du mouvement de la lune, que l'on commençoit à mieux connoître. Le nouveau calendrier, après avoir essuyé plusieurs contradictions, sur-tout de la part des Protestans, est aujourd'hui en usage dans tous les pays Chrétiens; mais il est encore sujet à des imperfections. On ne peut pas nier que sa forme ne soit très-compiquée & très-incommode. Il seroit à désirer qu'on abandonnât tout cet appareil des épâctes & des lettres dominicales, quelque ingénieux qu'on le suppose, & qu'on déterminât immédiatement, par le calcul astronomique ordinaire, la fête de Pâques & les autres fêtes mobiles, ce qui est exact & n'a aucune difficulté.

Kepler, né en
1571, mort en
1630.

Kepler, doué d'un profond génie, & guidé par les observations de Tycho, s'est immortalisé pour avoir substitué l'ellipse au cercle, dans les mouvemens planétaires, & pour avoir découvert ces deux loix célèbres qui sont la base de la Physique céleste moderne, & en particulier, de la théorie Newtonienne : 1.^o Que les planètes décrivent autour du soleil, des aires proportionnelles au tems. 2.^o Que

les carrés des tems des révolutions des planètes sont comme les cubes de leurs moyennes distances au soleil.

L'invention du Télescope, qui se fit au commencement du XVII^e siècle, & qu'on attribue le plus vraisemblablement à Jacques Metius, père d'Adrien Metius, dont nous avons parlé, servit non-seulement à perfectionner l'ancienne Astronomie, mais encore à découvrir, dans les espaces célestes, de nouveaux corps que la simple vue ne pouvoit distinguer. Muni de cet instrument, Galilée aperçut le premier, en 1610, les Satellites de Jupiter. Il reconnut, par le même moyen, les phases de Vénus, qui sont à peu-près semblables à celles de la lune; & il mit, dans plusieurs observations des planètes, une précision que l'on ne connoissoit pas. Tout le monde fait, qu'ayant adopté le système de Copernic, avec un éclat peut-être indiscret dans le pays qu'il habitoit, il fut cité au tribunal qui usurpe le nom de Saint-Office, enfermé dans ses cachots, & obligé, pour recouvrer la liberté, de rétracter à genoux une opinion dont il étoit intérieurement convaincu. La postérité n'a pas oublié cet outrage fait à la raison; & tôt ou tard, le tribunal de l'inquisition expiera ce crime, & tant d'autres qu'un fanatisme absurde lui a fait commettre.

Si la découverte du Télescope fut, comme on le croit, l'effet du hasard, elle donna du moins la naissance à des recherches sur la réfraction de la lumière, qui firent de cette branche de l'optique, une science toute nouvelle. *Antonio de Dominis*, Archevêque de Spalatro, Capitale de la Dalmatie, esquissa la théorie de l'arc-en-ciel, perfectionnée depuis, & portée au dernier degré de précision & d'évidence. *Snellius*, Mathématicien Hollandois, découvrit que lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu dans un autre, il change de direction, de telle manière que, dans tous les cas, il existe un rapport constant entre deux lignes qu'il assigne, & qu'on trouve proportionnelles au sinus de l'angle d'incidence, & au sinus de l'angle rompu. L'ouvrage, où il établissoit cette propriété remarquable de la réfraction, n'a jamais été imprimé. Descartes a donné, sous la forme que nous venons d'indiquer, le même Théorème, sans citer *Snellius*; d'où quelques François ont conclu qu'il en étoit l'inventeur; mais *Huguens* assure que Descartes avoit vu les manuscrits de *Snellius*.

On est d'abord porté à croire que la réfraction de la lumière dépend, comme celle des corps solides, de la résistance des milieux; mais cette idée, si naturelle en apparence, se trouve fautive. Un rayon lumineux qui passe d'un milieu dans un autre plus dense, s'approche de la perpendiculaire à la surface qui sépare les deux milieux, au lieu de s'en éloigner, comme il devroit le faire, s'il

Télescope ou
Lunette Astro-
nomique.

Galilée, né
en 1564, mort
en 1642.

Progrès de la
Dioptrique.

Antonio de
Dominis, né en
1561, mort en
1612.

Snellius, né
en 1571, mort
en 1626.

étoit détourné de sa direction par la résistance du milieu, puisqu'une plus grande densité doit produire une plus grande résistance. Descartes voulant assimiler la réfraction de la lumière à celle des corps solides, expliquoit le premier phénomène d'une manière qui éprouva les plus vives contradictions de la part de plusieurs Géomètres ses Contemporains. Fermat, entr'autres, la combattit par des raisons qui, sans être absolument péremptoires, la rendoient au moins fort douteuse. Il essaya de résoudre lui-même la question par une autre voie. Les anciens avoient supposé qu'un rayon mu toujours dans un même milieu, va d'un point à l'autre par le chemin le plus court, d'où il résulteroit que dans le cas de la réflexion, l'angle de réflexion devoit être égal à l'angle d'incidence. Fermat crut que pour la réfraction, le rayon passant d'un milieu dans un autre, devoit faire le chemin total par le *tems le plus court*; & il concluoit en effet de-là, que, d'un milieu rare à un milieu dense, le rayon s'approcheroit de la perpendiculaire. La même métaphysique conduisit dans la suite Leibnitz, à envisager ce problème sous un autre point de vue. Il prétendit que le rayon de lumière devoit prendre, d'un milieu à l'autre, le *chemin le plus facile*, estimant cette facilité par le rapport inverse composé de la longueur du chemin & de la densité du milieu. Mais toutes ces solutions, fondées sur les loix des causes finales, sont fort hypothétiques & très-souvent illusoires. Un examen appuyé sur la Géométrie & la Mécanique, a banni ces explications de la Physique, & a fait trouver, dans la théorie générale de l'attraction; la véritable cause de la réfraction de la lumière.

Microscope.

A mesure qu'on approfondissoit l'optique, elle fournissoit de nouveaux instrumens utiles aux Sciences. De ce nombre est le Microscope, qu'on employa bientôt pour faire une multitude d'observations de Physique & d'histoire naturelle, où la vue a essentiellement besoin d'être aidée par le secours de l'art.

*Couronnes
parhéliques, par-
asélènes.*

On avoit expliqué avec succès les phénomènes de l'arc-en-ciel: on réussit également à expliquer ceux des couronnes, des parhéliques & des parasélènes. Je n'ai pas besoin de dire que les couronnes sont des anneaux circulaires de lumière que l'on voit quelquefois pendant le jour, autour du soleil, & pendant la nuit, autour de la lune; les parhéliques, des faux soleils, ou des soleils apparents autour du véritable; & de même, les parasélènes, de fausses lunes. Ces phénomènes ont été aperçus dans tous les tems; mais on a commencé seulement, dans le siècle dernier, à les observer avec exactitude. Car Aristote, & Cardan dix-huit siècles plus tard, avoient qu'on ne voit jamais plus de deux parhéliques ensemble, tandis que

réellement, en y apportant l'attention nécessaire, on en remarque souvent un plus grand nombre. Par exemple, on vit cinq soleils à Rome, le 29 Mars 1629; sept à Dantzick, le 20 Février 1661, &c. Or, est-il probable, dit Huguens, qu'il ait paru, en un si petit nombre d'années, six ou sept parhélies tout à-la-fois, & que le même phénomène n'eût jamais paru dans les tems antérieurs? Sans doute on ne regardoit autrefois, comme de vrais parhélies, que les deux parhélies latéraux, qui sont en effet les plus considérables, & on ne faisoit pas attention aux autres, comme plus foibles & plus languissans. Descartes entreprit d'expliquer toutes ces apparences; mais son explication étoit un peu vague, & même fautive à certains égards. Huguens la rectifia, & fournit la matière à une théorie lumineuse & convaincante. En général, personne n'a plus contribué que lui à perfectionner les différentes parties de l'Optique.

L'Astronomie avança toujours. En 1631, Gassendi vit mercure sur le soleil, & c'est la première observation de ce genre; Horoccius en fit une semblable pour vénus, en 1639. Morin indiqua la manière de résoudre le fameux problème des longitudes, par le moyen des observations Astronomiques; & pour faire ces observations avec plus d'exactitude, il proposa d'appliquer une lunette au quart de cercle, idée que l'on a attribuée mal-à-propos à des Astronomes postérieurs. Hévélius, outre un grand nombre d'observations sur les taches du soleil & sur les éclipses, donna une excellente description de la figure de la lune; il perfectionna de plus la théorie des Comètes. Je pourrois citer plusieurs autres Astronomes distingués, si je n'étois forcé d'abrégier.

On cherchoit depuis quarante ans, si, à l'exemple de la terre & de jupiter, les autres planètes n'avoient pas des sarclires. En 1655, Huguens en découvrit un à saturne, celui qui est aujourd'hui le quatrième dans l'ordre de la distance à cette planète. Bientôt après, il fit une découverte encore plus importante. Galilée avoit reconnu, avec le secours du télescope, les principales apparences que produit cette espèce d'anneau dont saturne est environné; mais il ne put en assigner la véritable cause, ni en prédire exactement les phases. D'autres Astronomes n'eurent pas un succès plus heureux. Enfin, Huguens, aidé d'une excellente lunette qu'il avoit construite lui-même, trouva que l'anneau de saturne étoit un corps solide, mince, détaché de cette planète, & incliné sur le plan de l'écliptique. De nouvelles observations lui fournirent le moyen de développer davantage cette théorie, & d'en établir la vérité avec une pleine évidence.

Gassendi, né en 1592, mort en 1655.

Horoccius, né en 1619, mort en 1661.

Morin, né en 1593, mort en 1655.

Hévélius, né en 1611, mort en 1687.

Quatrième sarclire de Saturne.

Anneau de Saturne.

An. 1655.

Pendant que les Sciences, appuyées sur la Géométrie & l'Observation, marchaient si rapidement, la raison abandonnée à elle-même, ou égarée par les subtilités de la Métaphysique, ne secouoit qu'avec peine le joug de certaines opinions superstitieuses & chimériques. Par exemple, on croyoit, en ce tems-là, que le nombre des planètes principales, & celui des planètes secondaires devoient être égaux. Huguens lui-même en étoit si persuadé, qu'après avoir trouvé un satellite à Saturne, ce qui établissoit l'égalité dont nous venons de parler, il ne craignoit pas d'avancer que le système planétaire étoit complet, & qu'on ne devoit plus espérer de voir à l'avenir de nouveaux satellites. Cependant le célèbre Dominique Cassini découvrit encore successivement quatre satellites à Saturne : savoir, le 3.^e, le 5.^e, le 1.^{er} & le 2.^e. Il s'étoit déjà fait la réputation d'un grand Astronome, qu'il soutint & augmenta durant sa longue carrière.

Dom. Cassini,
né en 1625,
mort en 1712.

L'Académie des Sciences de Paris, établie en 1666, ne se borna pas à les cultiver paisiblement dans l'enceinte de cette ville. Plusieurs de ses membres entreprirent de longs voyages, dans l'intention principalement de perfectionner l'Astronomie. On fit des observations de toute espèce; on étudia la théorie des réfractions qui altèrent continuellement la position des astres pour le spectateur; on détermina les parallaxes des planètes, d'où dépendent les dimensions de leurs orbites. Malgré les soins qu'on se donna, on ne put alors fixer, avec une certaine précision, la parallaxe du soleil : on la trouvoit d'environ douze secondes; les observations faites de nos jours ne la portent guère au-dessus de huit secondes.

Picard, né en
... mort en
1682.
Mesure d'un
degré du méridien.

L'Abbé Picard, Astronome distingué par son exactitude dans le choix & l'usage des instrumens propres aux observations, s'occupa de la mesure de la terre, objet essentiel à la Navigation & à la Géographie. Tous les moyens que les Grecs, les Arabes, & même plusieurs Astronomes modernes avoient employés pour cette mesure, n'étoient pas susceptibles d'une précision suffisante. Le seul Fernel, Médecin de Henri II, en suivant une méthode très-incertaine, avoit néanmoins déterminé, par une espèce de hasard, à-peu-près la valeur exacte d'un degré de la terre. Picard mit en pratique, dans cette recherche, des opérations conformes aux loix de l'Astronomie & de la Géométrie. Il mesura l'arc céleste, compris entre Sourdun, en Picardie, & Malvoisine, dans les confins du Gatinois & du Hurepoix; ensuite, par la comparaison de cette mesure, avec celle de l'arc terrestre, déterminée au moyen d'une suite de triangles qui se lioient les uns aux autres, & dont le premier étoit établi sur une base connue, il conclut que la longueur du degré terrestre étoit de

AR. 1679.

57060

57060 toises, & la circonférence entière d'un grand cercle de la terre, de 20541600 toises.

On attribuoit généralement à la terre la forme d'une sphère parfaite. Mais cette hypothèse n'étoit pas vraie à la rigueur. Une expérience, à jamais célèbre, que Richer fit à Cayenne, fut le germe d'une nouvelle Théorie sur ce sujet, & de toutes les grandes opérations que l'on a faites dans ce siècle pour en comparer les résultats avec ceux de la nature. Cet Astronome attentif trouva qu'il falloit diminuer d'environ une ligne & un quart la longueur du pendule qui battoit les secondes à Paris, afin de lui faire battre aussi les secondes à Cayenne. Après plusieurs discussions sur la cause de ce phénomène, on reconnut enfin qu'on ne pouvoit l'expliquer que par une diminution de la gravité, en allant des poles vers l'équateur. Mais cette diminution de la pesanteur, comment l'expliquer elle-même? Huguens observa qu'en vertu du mouvement de rotation de la terre autour de son axe, la force centrifuge devoit diminuer la gravité, depuis un pole jusqu'à l'équateur; que cet effet avoit eu lieu dans la formation du globe terrestre; & que par conséquent ce globe avoit dû prendre la forme d'un sphéroïde applati vers les poles. Newton étoit parvenu, de son côté, à la même conclusion. Ils différoient d'ailleurs sur la figure du sphéroïde & sur la quantité de l'applatissement, parce qu'ils avoient employé, pour les déterminer, des élémens qui n'étoient pas tout-à-fait les mêmes. Toutes les mesures modernes ont constaté le fond de cette Théorie, c'est-à-dire, l'abaissement de la terre vers les poles.

La découverte de la propagation successive de la lumière, est à-peu-près de la même époque. Depuis que l'on connoissoit les satellites de Jupiter, on s'étoit appliqué avec soin à déterminer leurs mouvemens; & Dominique Cassini étoit parvenu à construire des Tables qui représentoient, avec beaucoup d'exactitude, leurs révolutions, & leurs éclipses causées par l'ombre de Jupiter. Cependant Roemer, qui observoit assidûment le premier satellite, s'aperçut que, dans les éclipses, il sortoit de l'ombre, en certains tems quelques minutes plus tard, & en d'autres quelques minutes plutôt qu'il n'auroit dû faire. De plus, en comparant ces tems les uns avec les autres, il reconnut que le satellite sortoit plus tard de l'ombre, lorsque la terre, par son mouvement annuel, s'éloignoit de Jupiter, & plutôt quand elle s'en approchoit. De-là il forma cette conjecture ingénieuse, bientôt convertie en démonstration, que le mouvement de la lumière n'est pas instantanée, & qu'elle emploie un certain tems pour arriver du corps lumineux à l'œil de l'Observateur. Suivant les premiers calculs, elle devoit mettre environ onze minutes à

Figure de la terre.

Richer, né en 1651, mort en 1696.

An. 1672.

Propagation successive de la lumière.

Roemer, né en 1644, mort en 1710.

An. 1696.

parcourir le rayon de l'orbite terrestre; il trouva depuis que la vitesse de ce fluide étoit un peu plus grande. Aucun phénomène n'est plus remarquable que celui-ci dans la Physique céleste, ni plus essentiel, comme élément, dans les théories Astronomiques : il assure l'immortalité au nom de Roemer.

A chaque pas que fait une Science, les arts accessoires, sui-tout ceux qui sont utiles à la société, prennent des accroissemens proportionnés. La Navigation & la Gnomonique ont ainsi éprouvé l'influence des progrès de l'Astronomie.

Navigation.

An. 1550.

En bornant toujours l'usage des cartes plates à représenter de petites étendues de terrain, on pouvoit éviter l'inconvénient qu'elles ont d'exprimer par des lignes égales les degrés des deux cercles parallèles qui terminent la carte nord & sud, & donner la proportion convenable aux expressions de ces degrés. Gerard Mercator, Géographe des Pays-bas, en fit la remarque, qui est d'ailleurs fort simple & fort élémentaire. Edouard Wright, le même dont il reste des observations astronomiques parmi celles de Horoccius, développa l'idée de Mercator, ou plutôt envisagea la question sous un nouveau point de vue. Ayant remarqué que le rayon d'un parallèle, en allant de l'équateur au pôle, diminue en même raison qu'augmente la sécante de la latitude, il proposa de construire des cartes d'après ce principe. On les appella *cartes réduites*. L'invention en est très-ingénieuse : elles s'introduisirent dans la Marine, vers l'année 1630. On a calculé depuis des Tables pour en perfectionner la théorie & la pratique. La *Loxodromie* ou la route que suit le vaisseau sur la surface du globe, par un même rhumb de vent, est une courbe à double courbure : sur la carte réduite, elle est une courbe ordinaire dont la longueur est d'autant plus facile à calculer, que, dans la pratique, le problème se simplifie encore. Jamais le vaisseau ne suit une même Loxodromie pendant une longue Navigation : car toutes les mers sont interrompues par des îles ou par des continens; & d'ailleurs on change souvent de direction, soit pour chercher des vents favorables, soit pour éviter des écueils, &c. La route entière du vaisseau est donc composée de plusieurs parties de Loxodromies différentes; & chacune de ces parties, considérée séparément, peut se confondre dans la plupart des cas, sans erreur sensible, avec la simple ligne droite.

La Navigation tira un nouveau secours de l'Astronomie, en s'appropriant l'usage de plusieurs instrumens pour diriger la route du vaisseau d'après l'inspection des astres. Mais on sent qu'à cause de la mobilité continuelle du vaisseau, les observations en mer ont dû être, pendant long-tems, fort imparfaites.

L'art de construire des cadrans est très-ancien. Rien n'étoit en effet plus naturel & plus utile que de chercher à connoître la position du soleil au-dessus de l'horizon, pour un instant quelconque de la journée; & on ne fut pas long-tems à s'appercevoir qu'un moyen mécanique très-simple, pour y parvenir, étoit de marquer la route de l'ombre que jette sur un plan ou sur une surface quelconque, un corps opaque exposé au soleil. On fit aussi, d'après cette même idée, des cadrans éclairés par la lune ou par les étoiles. L'invention des cadrans solaires est d'Anaximandre, selon Diogène de Laërce; & d'Anaximène, selon Plin. Vitruve, qui vivoit au tems d'Auguste, fait une longue énumération de cadrans construits par divers Philosophes; mais il n'en explique point les principes théoriques. On ne commence à trouver que dans les Ecrivains du seizième siècle, la Science de la Gnomonique. On croit que Munster & Oronce-Finé sont les premiers qui en aient publié des Traités. Maurolic donna la Théorie géométrique & astronomique de la construction des cadrans. Le Père Clavius, Jésuite, publia, en 1581, un Traité très-estimable de Gnomonique. On a depuis tant écrit de semblables ouvrages, que le détail en seroit aussi fastidieux qu'inutile.

Gnomonique.

On trouve aussi dans les Auteurs du seizième siècle la Perspective réduite en art scientifique. La Perspective est si essentielle à la Peinture, que les anciens n'ont pu manquer d'en connoître au moins la pratique. Vitruve entre, à ce sujet, dans des détails qui prouvent que les Grecs avoient porté cette pratique fort loin. Mais il paroît que *Pietro-Delburgo*, en Italie, & *Albert Durer*, en Allemagne, sont les premiers qui aient donné des règles précises & certaines pour mettre les objets en perspective. En 1600, *Guido Ubaldi* traita cet art d'une manière conforme aux principes de la Géométrie & de l'Optique.

Munster, né en 1419, mort en 1512.
Oronce-Finé, né en 1494, mort en 1555.
Clavius, né en 1517, mort en 1612.

Perspective.

La Mécanique statique ne fit, quant à la Théorie, aucun progrès depuis Archimède, jusqu'au dix-septième siècle. Seulement on imagina de tems en tems des machines très-ingénieuses, fondées sur les principes de cette Science. Stevin, Mathématicien Flamand, paroît être le premier qui ait donné le véritable rapport du poids à la puissance; pour un corps en équilibre sur un plan incliné. Il a traité plusieurs autres questions de Statique. Les moyens qu'il emploie pour déterminer les conditions de l'équilibre entre plusieurs forces dont les directions concourent en un même point, reviennent, dans le fonds, au fameux principe du parallélogramme des forces; mais il ne paroît pas en avoir senti l'importance & la fécondité.

Albert Durer, né en 1471, mort en 1528.
Ubaldi, né en 1511, mort en 1617.

Mécanique.

Stevin, né en 1580, mort en 1655.

En 1592, Galilée composa un petit Traité de Statique, qu'il réduisit à ce principe : *il faut toujours la même quantité absolue de puissance, pour élever un fardeau de deux livres à la hauteur d'un pied, ou pour élever un fardeau d'une livre à la hauteur de deux pieds*; d'où il étoit aisé de conclure que, dans toutes les machines en équilibre, les forces qui se combattent sont réciproquement proportionnelles aux espaces qu'elles tendent à parcourir dans le même tems. Descartes employa, dans la suite, ce même principe pour déterminer de la manière la plus simple & la plus claire les conditions de l'équilibre, pour toutes les machines simples.

La Théorie du mouvement, inconnue aux anciens, doit son origine à Galilée. Je ne parle pas du mouvement uniforme, car les principes en sont si simples, si élémentaires, que la plus légère attention suffit pour les comprendre. Mais la Science du mouvement varié & celle des loix suivant lesquelles plusieurs corps agissent les uns sur les autres, par le choc, ou de toute autre manière, étoient totalement ignorées, lorsque Galilée ouvrit cette nouvelle carrière, & s'y couvrit d'une gloire qui ne le cède point à celle qu'il a méritée par ses découvertes astronomiques.

En voyant tomber une pierre, on jugeoit sans peine que son mouvement n'étoit pas uniforme, & qu'il s'accélére de plus en plus, puisque la pierre, dont la masse demeure la même, frappe un coup d'autant plus fort qu'elle tombe de plus haut. Mais il falloit trouver la proportion suivant laquelle ce mouvement s'accélére. Galilée pensa que chaque molécule dont un corps est composé étoit elle-même un petit corps; que tous ces petits corps élémentaires étant supposés égaux, la pesanteur les affectoit également ou leur imprimoit des vitesses égales; & qu'enfin les coups de la pesanteur se renouelloient continuellement en quantités égales, pendant les parties égales & successives du tems. D'où il résulloit que le mouvement des corps graves devoit être uniformément accéléré. Toutes les expériences ont confirmé cette idée, qui est devenue une loi fondamentale de la Mécanique. Heureusement Galilée ne s'étoit préoccupé l'imagination d'aucun système sur la cause de la pesanteur; car, s'il avoit cru, par exemple, comme quelques-uns des Philosophes ses successeurs, que les corps sont poussés vers le centre de la terre par les coups d'une matière subtile ambiante, il auroit manqué la vérité, les coups dont il s'agit n'étant point égaux, ni proportionnels aux masses.

Parmi les Philosophes qui saisirent & commentèrent la Théorie de Galilée sur la chute des graves, on doit distinguer Toricelli, son Disciple, qui publia, en 1644, un ouvrage très-élegant, intitulé : *De Motu gravium naturaliter accelerato*.

Toricelli, né
en 1608, mort
en 1647.

Les Loix de la communication des mouvemens n'avoient pas encore été examinées. Descartes les chercha, & crut les avoir trouvées. Ses principes métaphysiques l'avoient conduit à supposer qu'il existe toujours la même quantité absolue de mouvement dans le monde. Ainsi, selon lui, lorsque deux corps se choquent, la somme de leurs mouvemens, après le choc, est égale à la somme de leurs mouvemens avant le choc. Mais la proposition n'est vraie que pour le cas où les deux corps marchent dans le même sens avant le choc : elle est fausse, quand les deux corps viennent à la rencontre l'un de l'autre; car alors la somme des mouvemens, après le choc, est égale, non pas à la somme, mais à la différence des mouvemens avant le choc. Descartes n'a donc rencontré la vérité que pour les mouvemens dirigés dans le même sens; il s'est trompé pour les autres.

Loix du mouvement.

En 1661, Huguens, Wallis & Wren découvrirent, chacun de leur côté, & sans s'être rien communiqué (car les preuves en ont été bien établies), les véritables Loix du choc des corps. La base de leurs recherches, à ce sujet, est que, dans la percussion mutuelle de plusieurs corps, la quantité absolue de mouvement du centre de gravité est la même après qu'avant le choc; ce qui comprend la première proposition de Descartes, & rectifie la seconde. De plus, lorsque les corps sont élastiques, la vitesse respecttive est la même après qu'avant le choc.

Quelques tems après, la Méchanique fit un nouveau pas plus grand encore que celui dont nous venons de parler. Huguens, dans son *Traité de Horologio Oscillatorio*, étendit la théorie de la chute des graves au mouvement curviligne, & résolut le célèbre problème du centre d'oscillation du pendule composé, où Descartes & plusieurs autres grands Géomètres de ce tems-là avoient échoué. Dans l'examen particulier du mouvement des graves le long d'un arc de cycloïde, il trouva cette proposition remarquable, qui suffiroit seule pour l'immortaliser : qu'un corps grave parcourant un arc de cycloïde renversée arrive toujours à la verticale, en tems égaux, de quelque point qu'il soit supposé partir. Sa Théorie des centres d'oscillation a été la source de cette classe nombreux & intéressante de problèmes où il s'agit de déterminer les mouvemens que prennent plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres par des fils, par des arcs, ou d'une manière équivalente. Il y employa un principe très-vrai, & néanmoins contesté par de savans Géomètres, parce que tel est en général, le sort des vérités nouvelles, dont la liaison avec les vérités déjà connues est difficile à saisir. Ce principe porte que, si, lorsque le centre de gravité d'un pendule composé est descendu d'un point

An. 1673.

quelconque jusqu'à la ligne verticale qui passe par le point de suspension, tous les poids dont il est composé venoient à se détacher subitement, & que chacun d'eux remontoit alors verticalement avec la vitesse qu'il a en ce moment, le centre de gravité du système monteroit précisément à la hauteur d'où le centre de gravité du pendule composé est descendu. Il devint célèbre dans la suite, sous le nom de *Principe de la Conservation des forces vives*.

Ce même ouvrage de Huguens contient la Théorie des développées & celle des forces centrales dans le cercle. En appliquant ces deux Théories aux loix astronomiques de Kepler, on en voit naître tout le système de la gravitation universelle. Huguens a préparé les matériaux : Newton a élevé l'édifice.

Hydrostatique.

ON ARRIVE depuis Archimède jusqu'à Stevin, sans rencontrer personne qui ait écrit sur la théorie de l'Hydrostatique, ou qui ait du moins ajouté quelque vérité intéressante à cette théorie. Le Géomètre Flamand détermine la pression des fluides contre les surfaces qui les soutiennent : il prouve qu'elle est toujours comme le produit de la base par la hauteur ; mais, quoiqu'il ait connu & démontré exactement les principales propositions de l'Hydrostatique, il n'en a pas assez fait sentir la liaison réciproque. Le premier traité méthodique & vraiment original que les modernes aient publié sur l'Hydrostatique, est celui de *l'équilibre des liqueurs* de Pascal. L'Auteur démontre, d'une manière rigoureuse & uniforme, les propriétés de l'équilibre des fluides ; il résout toutes les difficultés que certaines propositions pouvoient encore offrir : telle étoit, par exemple alors, le fameux paradoxe, qui n'en est plus un aujourd'hui, qu'un filet d'eau & une colonne cylindrique, pressant sous même hauteur, un même fond, exercent des pressions égales.

La pesanteur de l'air, ignorée des anciens, l'étoit encore de Galilée, même long-tems après qu'il eut trouvé la théorie de l'accélération des graves. Il y a apparence que depuis l'invention des pompes jusqu'à ce Philosophe, on n'avoit pas eu l'idée ou l'occasion de placer le piston dans la pompe aspirante, à une hauteur qui excédât celle de trente-deux pieds au-dessus du réservoir : autrement on auroit rencontré la difficulté qui fut proposée à Galilée, par les Fontainiers de Cosme de Médicis, grand Duc de Florence. Quoi qu'il en soit, on doit à une expérience tentée par ces ouvriers, la découverte, ou plus exactement, une démonstration évidente de la pesanteur de l'air. Ils avoient construit une pompe aspirante, où il auroit fallu que l'eau s'élevât, sous le piston, à plus de trente-deux pieds de hauteur ; & voyant qu'elle refusoit de passer trente-deux pieds, ils en demandèrent la raison à Galilée. L'honneur de la phi-

lophilie ne permettoit pas de différer la réponse. Les anciens attribuoient l'ascension de l'eau dans les pompes, à l'horreur de la nature pour le vuide : Galilée indiqua cette cause aux Fontainiers, ajoutant, par rapport au cas présent, que l'horreur de la nature pour le vuide, cessoit, quand l'eau étoit parvenue à la hauteur de trente-deux pieds. Cette explication fut regardée comme un oracle, & personne ne s'avisait de la contredire. Mais, en y réfléchissant de plus près, Galilée soupçonna que cette horreur de la nature pour le vuide, & cette limite qu'il lui avoit donnée, n'étoient que des chimères. Il n'alla pas d'ailleurs plus loin; & quoiqu'il commençât à connoître la pesanteur de l'air par des expériences d'un autre genre, il n'eut pas l'idée d'employer ici cet agent.

Toricelli, son disciple, pensa que le poids de l'eau pouvoit mettre quelque obstacle à son élévation dans les pompes : idée simple & heureuse, incomparable avec le système de l'horreur du vuide; car pourquoi le poids de l'eau auroit-il borné la force de cette horreur? En conséquence, il fit avec un instrument, d'où le Baromètre ordinaire a tiré sa forme & son origine, une expérience analogue à celle des pompes : il trouva que le mercure, dont le poids est quatorze fois aussi grand que celui de l'eau, se tenoit à une hauteur quatorze fois moindre. Alors, Toricelli conclut que les deux phénomènes étoient produits par la même cause; puis, faisant un nouveau pas, il affirma que cette cause étoit la pesanteur de l'air.

Les partisans invétérés du système de l'horreur du vuide, opposèrent quelques doutes à l'explication de Toricelli; mais ces doutes furent entièrement dissipés par la célèbre expérience du Puy de Dôme, près de Clermont en Auvergne : expérience exécutée par Perier, d'après le projet que Pascal, son beau-frère, en avoit donné, & où l'on vit, pour la première fois, le mercure baisser dans le Baromètre, à mesure que l'on s'élevoit le long de la montagne, ou que la colonne d'air diminueoit de hauteur & de poids.

Nous devons encore à Toricelli les élémens de la Science du mouvement des fluides. L'observation qu'un jet d'eau sortant d'un petit ajutage, s'élance verticalement presque à la hauteur du réservoir, lui fit juger que la vitesse du fluide, au sortir de l'ajutage, étoit la même que celle d'un corps grave tombant de cette hauteur; & que par conséquent les vitesses des écoulemens, sous différentes charges d'eau, suivoient la raison sous-doublée des hauteurs, abstraction faite de la résistance des obstacles. L'expérience confirma cette idée qui fut accueillie de tous les Savans, & qui sert encore aujourd'hui de base à la théorie, pour les écoulemens par de petits orifices; mais quand les orifices sont un peu grands, le problème

Hydraulique.

demande d'autres considérations. Le Théorème de Toricelli, & les conséquences qu'il en tire sont partie de son ouvrage, de *motu gravium naturaliter accelerato*, que nous avons déjà cité.

Ce Théorème donna le jour à plusieurs ouvrages sur cette matière. Dans ce nombre, nous distinguons le *Traité du mouvement des eaux* de Mariotte. Il contient plusieurs expériences en grand sur le mouvement des eaux, & plusieurs vues qui ont contribué au progrès de l'hydraulique pratique.

Physique
écrite.

Dans le tems où les découvertes de Galilée, sur le mouvement, commençoient à diriger de ce côté les études des Savans, Descartes conçut la pensée d'expliquer, par les loix de la Mécanique, le mouvement général qui entraîne les planètes d'Occident en Orient. Les anciens regardoient le ciel planétaire, comme composé d'orbes solides & mobiles, dont chacun emportoit la planète qui lui étoit attachée. On sent l'horrible confusion, ou plutôt l'impossibilité absolue de tous ces mouvemens, sur-tout dans le système de Ptolomée; Descartes transporta dans le Ciel le mécanisme infiniment plus simple d'une barque flottant sur une rivière, & emportée par le courant : il imagina que les planètes nageoient dans un vaste tourbillon qui tournoit d'Occident en Orient, de telle manière néanmoins que, dans le tourbillon général, il se trouvoit pour chaque planète des courans particuliers qui coupoient l'écliptique sous différentes obliquités. Cette idée vraisemblable & imposante, séduisit plusieurs illustres Philosophes qui s'en déclarèrent publiquement les défenseurs. On étoit alors trop peu avancé dans la théorie du mouvement des solides & des fluides, pour entreprendre de la soumettre à un examen critique, fondé sur cette théorie : elle s'est même soutenue pendant long-tems contre les plus fortes objections ; enfin elle a succombé sous les coups redoublés qui lui ont été portés par l'Astronomie, & la Mécanique, dont elle blessoit les loix fondamentales.

IV. P É R I O D E.

DE TOUTES les découvertes qui se sont jamais faites dans les Sciences, il n'y en a point d'aussi importante, ni d'aussi féconde en applications, que celle de l'analyse infinitésimale. A cette époque, les Mathématiques changent de face ; des problèmes inaccessibles aux anciennes méthodes, ou dont elles n'auroient pu même donner l'idée, sont facilement résolus ; toute la masse des Sciences prend du mouvement, & de nouvelles forces tendent sans cesse à le perpétuer & à l'augmenter.

On

On fait que l'analyse ordinaire compare les grandeurs finies. Dans l'analyse infinitésimale, certaines grandeurs sont supposées augmenter ou diminuer de quantités infiniment petites : & on se propose de trouver, ou par la relation des grandeurs, celle de leurs élémens, ou par la relation des élémens, celle des grandeurs. On voit que l'un de ces problèmes est l'inverse de l'autre. Le premier est l'objet du calcul *différentiel* ou de la méthode directe des fluxions ; le second, celui du calcul *intégral* ou de la méthode inverse des fluxions. Une fonction quelconque étant donnée, on peut en trouver l'élément ou la différentielle ; mais on ne peut pas toujours également remonter d'une différentielle à l'intégrale, soit par l'imperfection de l'art, soit parce que certaines différentielles sont purement fictives & n'ont point d'intégrale. Ainsi, le calcul différentiel, considéré en lui-même, & indépendamment des applications qu'on en peut faire, est entièrement trouvé : le calcul intégral ne l'est encore qu'en partie, & tous les jours il reçoit de nouveaux accroissemens.

Fermat, Descartes, Pascal & Barrow, avoient préparé la naissance de l'analyse infinitésimale. En 1684, Leibnitz publia, dans les actes de Léipsick, les principes, la notation, & l'algorithme de ce nouveau genre de calcul ; & il en fit voir l'usage pour résoudre généralement les problèmes des *tangentes*, & celui des *maxima & minima*, parmi les ordonnées des courbes : problèmes auxquels les méthodes connues ne s'appliquoient que dans un nombre de cas, assez limité.

Leibnitz, né en 1646, mort en 1716.

Trois ans après, Newton donna ses *principes Mathématiques de la Philosophie naturelle*. Toutes les grandes questions de la Mécanique & de l'Astronomie sont résolues ou enramées dans cet ouvrage. L'Auteur approfondit la nature & les propriétés du mouvement dans les sections coniques. La théorie des forces centrales de Huguens, généralisée & appliquée aux loix Astronomiques de Kepler, apprit au Géomètre Anglois, que les planètes sont attirées vers le soleil, avec une force réciproquement proportionnelle aux carrés de leurs distances à cet astre, & que cette attraction modifiée ou altérée par la force centrifuge, produit leur mouvement elliptique. Mais comme dans ce système, la gravitation doit être universelle & réciproque entre toutes les planètes, Newton essaya encore de déterminer les inégalités que le mouvement elliptique de chacune d'elles doit subir en vertu des attractions qu'elle éprouve de la part des autres. Il a également ébauché, suivant les mêmes principes, l'explication du phénomène des marées, & celle de la précession des équinoxes. Dans toutes ces sublimes recherches,

Newton, né en 1642, mort en 1727.

Neuton semble avoir pris plaisir à cacher la méthode qui le dirige ; il est extrêmement avare de paroles dans les endroits où elles seroient le plus nécessaires. Aussi son ouvrage resta-t-il pendant longtemps dans une espèce d'obscurité. On ne commença à l'étudier & à l'entendre qu'au commencement de ce siècle : alors on vit que la clef de Neuton étoit la nouvelle analyse, ou, comme disent les Anglois, la méthode des fluxions.

La manière dont Neuton emploie cette méthode, prouve qu'il la tenoit de lui-même. Quand elle eut acquis, dans le monde savant, l'éclat que son utilité devoit lui donner, il s'en arrogea l'invention exclusive, sans vouloir admettre Leibnitz au partage. J'examinerai leurs droits réciproques ; mais, pour suivre l'ordre historique, il faut que j'expose auparavant le progrès des idées que Leibnitz avoit jetées dans les actes de Léipsick.

En 1686, il eut une dispute avec les Cartésiens sur la mesure des forces, & sur les avantages qu'ils attribuoient à l'analyse ordinaire, pour la résolution des problèmes de Géométrie & de Mécanique. Cette dispute dégénéra bientôt en subtilités Métaphysiques. Ne pouvant forcer les Adversaires dans de pareils retranchemens, Leibnitz leur proposa comme un défi & comme un moyen de terminer la question, de trouver la courbe *isochrone*, c'est-à-dire, une courbe telle qu'un corps grave, en la parcourant, s'approche de l'horizon, de hauteurs égales en tems égaux. Leur silence confondit la vanité de leurs prétentions. Huguens, étranger d'ailleurs à la querelle, jugea le problème digne de son application ; il le résolut, & publia, en 1687, les propriétés de la courbe cherchée, sans en ajouter les démonstrations. Leibnitz, après avoir attendu longtemps la réponse des Cartésiens, donna, en 1689, la solution & l'analyse de son problème ; & pour leur offrir, disoit-il, la revanche ; il leur proposa de trouver la courbe *isochrone paracentrique*, où les approches égales devoient se faire, non plus vers l'horizon, comme dans le premier cas, mais vers un point fixe. La même année, il appliqua son calcul à des recherches concernant le mouvement des planètes & la résistance des milieux.

Ces premiers rayons de l'analyse de Leibnitz, frappèrent vivement les yeux des deux illustres frères Jacques & Jean Bernoulli. L'aîné (Jacques) déjà célèbre par différens ouvrages de Géométrie, de Mécanique & de Physique, avoit initié son frère aux mêmes connoissances. Tous deux s'approprièrent tellement la Géométrie des infiniment petits, & en firent un si grand nombre d'applications importantes & difficiles, qu'elle leur est presque aussi redevable qu'à Leibnitz même. Tous deux ont été successivement Professeurs de

Jacques Bernoulli, né en 1654, mort en 1705.

Jean Bernoulli, né en 1667, mort en 1748.

Mathématiques à Basse, leur patrie; & leur école peut être comparée à celle d'Alexandrie, par le mérite des Eleves qu'ils ont formés.

A son début dans cette nouvelle carrière, Jacques Bernoulli donna une solution très-élégante du problème de la courbe isochrone : il trouva, comme Léibnitz & Huguens, que cette courbe étoit la seconde parabole cubique. Il prit de-là occasion de proposer à son tour aux Géomètres un problème que Galilée avoit autrefois inutilement attaqué : c'étoit de trouver la courbe que forme la *chainette*, c'est-à-dire, un fil parfaitement flexible, attaché par ses extrémités à deux points fixes.

Pendant qu'on s'en occupoit, il publia deux Mémoires dans lesquels il détermine les longueurs de deux courbes fameuses, la spirale parabolique, & la spirale logarithmique; les espaces qu'elles enferment; & les solides qu'elles produisent, en tournant autour d'une ligne donnée de position. De plus, comme la spirale logarithmique, & la loxodromie, ont la propriété analogue de couper sous des angles égaux, l'une, les rayons du cercle, l'autre, les méridiens de la terre, Jacques Bernoulli examine à ce sujet plusieurs questions curieuses, relatives aux longitudes & à la navigation. Ces deux Mémoires contiennent les premiers essais de calcul intégral, un peu développés. Léibnitz fit aussi des remarques intéressantes sur la construction, les usages, & la projection de la courbe loxodromique.

Le problème de la chainette fut résolu par Huguens, Léibnitz & Jean Bernoulli. Il fournit aux Géomètres un sujet de méditations nouvelles & utiles sur la théorie & les usages des nouveaux calculs. Jacques Bernoulli étendit la solution au cas où l'épaisseur de la chainette ne seroit pas constante, mais variable suivant une loi donnée.

La considération de la chainette donna lieu au même Jacques Bernoulli, d'examiner plusieurs autres courbes que la nature place continuellement sous nos yeux : telles sont, par exemple, celle que forme une voile enflée par le vent, celle d'un arc tendu, celle d'une lame élastique, dont une extrémité seroit attachée solidement à un plan, & l'autre extrémité porteroit un poids donné, &c. Il fit voir que la voile enflée par un vent horizontal, se courberoit en chainette; & que si cette même voile étoit enflée par un fluide qui pesât sur elle verticalement, elle formeroit la courbe *élastique*. La solution de ces problèmes, & principalement l'analyse de la courbe élastique, sont d'une profonde recherche. Jean Bernoulli chercha la courbure de la voile dans l'hypothèse du vent horizontal, & parvint au même résultat que son frère,

An. 1690.

An. 1691.

An. 1692.

An. 1692.

Viviani, né
en 1622, mort
en 1703.

Viviani, Géomètre Italien, proposa, en 1692, le problème de la voûte *hémisphérique quarrable* : il étoit question de percer un dôme en plein cintre, de quatre fenêtres égales, telles que le reste de la superficie du dôme fut absolument quarrable. Le jour même que Leibnitz & Jacques Bernoulli reçurent le programme de Viviani, ils répondirent à sa question de plusieurs manières ; & sans doute les Géomètres de la même école en auroient fait autant, si elle étoit parvenue assez tôt à leur connoissance. Mais nous devons ajouter que la propre solution de Viviani, fondée sur la méthode synthétique des anciens, est recommandable par sa simplicité. Il démontre qu'on satisfait au problème, en élevant perpendiculairement, à la base de l'hémisphère, quatre cylindres qui se toucheroient deux à deux, & dont les bases touchent, par leurs circonférences, celle de la base de l'hémisphère.

L'Hopital, né
en 1661, mort
en 1704.

La Géométrie des infiniment petits s'accroissoit tous les jours ; elle en étoit principalement redevable aux freres Bernoulli. Un problème que le cadet proposa, & dont l'objet étoit de *trouver une courbe telle que toutes ses tangentes terminées à l'axe, fussent en raison donnée avec les parties de l'axe comprises entre la courbe & ces tangentes*, contribua au progrès de la méthode pour intégrer les équations différentielles. Il fut résolu par Huguens, Leibnitz, Jacques Bernoulli, & le Marquis de l'Hopital. A cette occasion, Huguens rendit un témoignage d'autant plus honorable aux nouveaux calculs, que ce grand homme ayant fait plusieurs sublimes découvertes, sans ces calculs, pouvoit être dispensé d'en célébrer les avantages : il avoua qu'il voyoit, avec surprise & avec admiration, *l'étendue & la fécondité de cet art ; que de quelque côté qu'il tournât la vue, il en découvroit de nouveaux usages, & qu'enfin il y concevoit un progrès & une spéculation infinie.*

Ann. 1694.

La courbe *isochrone paracentrique*, dont Leibnitz avoit demandé la nature, paroissoit oubliée des Géomètres. Sans doute ils avoient été arrêtés par la difficulté d'intégrer l'équation différentielle à laquelle on est conduit, lorsque l'on rapporte cette courbe à des coordonnées perpendiculaires entr'elles. Enfin Jacques Bernoulli, prenant pour abscisses des lignes qui partoient d'un point fixe, & les ordonnées parallèles entr'elles, parvint à une équation où les indéterminées étoient séparées. Son frère, qui eut connoissance de cette solution, en trouva une autre un peu plus simple en apparence, mais la même quant au fond. Leibnitz étoit arrivé depuis long-tems à des résultats semblables ; mais il les tenoit cachés, pour laisser aux autres Géomètres le tems & le plaisir de les trouver.

On voit, par le commerce de lettres de Leibnitz & de Jean

Bernoulli, que, dès l'année 1694, ces deux grands Géomètres avoient inventé, chacun de leur côté, cette branche particulière de la nouvelle analyse, qu'on appelle le *calcul exponentiel*. Léibnitz a la priorité de date pour la découverte ; mais Bernoulli y est arrivé par lui-même ; il publia, en 1697, les règles & l'usage de ce genre de calcul, & on croit ordinairement qu'il en est le premier inventeur.

Les principes du calcul différentiel, épars de tous côtés dans les Journaux, furent rassemblés en corps d'ouvrage par le Marquis de l'Hopital, qui y ajouta plusieurs choses nouvelles. Ce Livre intitulé, *Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes*, contient le calcul différentiel, & ses usages pour déterminer les tangentes des courbes, leurs plus grandes & leurs moindres ordonnées, les points d'inflexion & de rebroussement, les rayons des développés, & les propriétés de ces courbes connues en optique, sous les noms de *caustiques*, soit par réflexion, ou par réfraction. Il fut reçu avec un applaudissement universel, & l'Auteur se vit placer à-peu-près sur la même ligne que Léibnitz, Neuton & les frères Bernoulli.

AN. 1694.

Il jouiroit encore de toute sa gloire, si la reconnoissance avoit pu empêcher la vanité de revendiquer des droits incertains, ou du moins exagérés. Jean Bernoulli étoit venu à Paris en 1692, & le Marquis de l'Hopital l'avoit emmené dans sa Terre d'Ourques, où ils passèrent quatre mois entiers à étudier ensemble la Géométrie des infiniment petits. Bientôt le Marquis de l'Hopital fut en état de résoudre les grands problèmes que les Géomètres se proposoient ; & on observe que Jean Bernoulli ne laissoit échapper aucune occasion de lui prodiguer, dans les Journaux, les éloges les plus magnifiques. A peine eût-il les yeux fermés, que Jean Bernoulli réclama en différens tems & par degrés, presque toute l'analyse des infiniment petits. L'envie, qui poursuit jusqu'aux morts, applaudit à cette espèce de flétrissure imprimée à la mémoire d'un homme célèbre : la morale condamna Jean Bernoulli qui obligé, par de solides raisons, à taire les services scientifiques qu'il pouvoit avoir rendus au Marquis de l'Hopital, se croyoit maintenant quitte de ses engagements, & se permettoit de remuer la cendre d'un bienfaiteur généreux, homme d'un profond savoir, & peut-être seulement un peu trop ambitieux des honneurs & de la réputation que l'on n'acquiert jamais sans honte & sans danger, que par ses propres travaux.

Hâtons-nous de revenir à Jean Bernoulli, comme Géomètre. Il propose de trouver la courbe *Erachystochrone*, c'est-à-dire, la

AN. 1697.

courbe que doit décrire un corps grave, pour arriver dans le moindre tems possible, d'un point à un autre, ces deux points n'étant pas situés dans la même ligne verticale. Au premier coup-d'œil, on est porté à croire que la ligne droite, comme le chemin le plus court d'un point à l'autre, doit être aussi le chemin de la plus vite descente; mais on est arrêté par cette réflexion, que dans une courbe dérite d'un point à l'autre, le mobile peut d'abord descendre plus verticalement, & par conséquent acquérir une plus grande vitesse qu'il ne seroit le long du simple plan incliné, ce qui produit une compensation capable de faire arriver le corps plus promptement suivant la ligne courbe, que suivant la ligne droite. Le calcul seul doit décider la question. Or, en y appliquant la méthode des infiniment petits, on trouva que la ligne de la plus vite descente étoit un arc de cycloïde : nouvelle propriété très-singulière de cette courbe, que les recherches de Pascal & de Huguens avoient déjà rendue si célèbre. Leibnitz résolut le problème, le jour même qu'il en eut connoissance; & le lendemain; il envoya sa solution à Jean Bernoulli, en le priant de ne pas se presser de la publier, non plus que la sienne propre, afin de donner aux autres Géomètres, le tems de s'exercer sur une si belle question. Jean Bernoulli consentit à leur accorder un an pour cette recherche. Dans cet intervalle, outre les solutions de Leibnitz & de Jean Bernoulli, il en parut trois autres, dont les Auteurs étoient Neuton; le Marquis de l'Hopital, & Jacques Bernoulli. Celle de Neuton parut anonyme dans les *transactions philosophiques* de Londres; mais Jean Bernoulli connut la main d'où elle parloit, *tanquam*, dit-il, *ex ungue leonem*. Le Marquis de l'Hopital eut beaucoup de peine à trouver la sienne; ce qui paroît d'autant plus surprenant, qu'on peut résoudre facilement le problème par une méthode qu'il emploie lui-même, lorsqu'il cherche (1) la route que doit suivre un voyageur pour arriver dans le moindre tems possible d'un lieu à un autre, en traversant deux campagnes, où il éprouve des résistances qui sont varier les vitesses dans un rapport donné; car si l'on regarde les deux campagnes, comme les deux élémens d'une courbe, & si l'on suppose, conformément à la théorie de la chute des graves, que les vitesses du mobile, le long d'une courbe quelconque, soient comme les racines quarrées de ses distances, à une ligne horizontale fixe, on parviendra, en un instant, à l'équation différentielle de la cycloïde. Mais cette remarque ne prouve rien en faveur de la prétention de Jean Bernoulli sur le Livre des infiniment petits,

(1) Analyse des inf. *pet. art.* 59.

car il ne l'a pas faite ; & les deux solutions qu'il a données successivement de son problème , sont fondées sur d'autres principes. Jacques Bernoulli fut aussi quelque tems sans publier sa solution : en la cherchant , il s'étoit élevé à des problèmes d'une spéculation encore plus profonde , qu'il vouloit d'abord résoudre , & puis proposer aux Géomètres. Son Frère hasarda quelques malignes réflexions sur cette prétendue lenteur : il s'en seroit abstenu , sans doute , s'il avoit prévu qu'elle étoit employée à lui préparer des chagrins d'aurant plus amers , qu'à un talent supérieur pour la Géométrie , il avoit la foiblesse de joindre un amour-propre excessif , qui n'est pardonnable qu'à l'homme médiocre.

Il y avoit déjà long-tems que la mésintelligence régnoit entre les deux Frères. Le Cadet ayant été nommé Professeur de Mathématiques à Groningue , en 1695 , ils ne conservèrent bientôt plus de relations particulières ; ils ne se parloient que dans les Journaux , & c'étoit pour se proposer les problèmes les plus difficiles. Léibnitz tenant la balance entr'eux , étoit , pour ainsi dire , l'ame de leurs travaux : il les encourageoit sans cesse par des louanges privées & publiques ; il paroissoit plus occupé de leur gloire , que de la sienne propre.

Enfin ils en vinrent à une rupture ouverte. L'un vouloit peut-être trop conserver ce ton de supériorité que lui avoit donné le droit d'aînesse , & la qualité d'instituteur de son Frère en Mathématiques : celui-ci oublia les loix de la reconnaissance , & même les égards qu'il devoit , nous ne dirons pas simplement aux liens du sang , mais à un homme illustre & modéré , occupé de la Science , & toujours prêt à répondre aux questions que l'on proposoit. Jacques Bernoulli , qu'importunoient depuis long-tems les attaques & les critiques de son ancien Elève , saisit l'occasion de se venger d'une manière éclatante , mais en même-tems utile à la Géométrie , en proposant aux Savans , & nommément à son Frère , avec la promesse d'un prix , le problème général des isopérimètres. Il demandoit une courbe , telle que des puissances quelconques de ses ordonnées ou de ses arcs , formaient sur l'axe des abscisses un plus grand espace , que ne feroient de pareilles puissances des ordonnées ou des arcs de toute autre courbe d'égal contour , & construire sur la même abscisse. La propriété qu'a le cercle de comprendre , sous un contour donné , un *maximum* d'espace , ne doit être , comme on voit , qu'un corollaire très-particulier de la solution générale.

Aussi-tôt que Jean Bernoulli eut reçu ce programme , il se hâta de faire imprimer , dans les Journaux , le résultat d'une solution qu'il assuroit y satisfaire , s'applaudissant d'ailleurs lui-même de

n'avoir employé que deux ou trois minutes pour tenter, commencer & achever d'approfondir tout le mystère, & demandant hautement le prix que son Frère avoit promis. Mais Jacques Bernoulli, qui ne trouva pas ce résultat conforme au sien, fit imprimer, à son tour, un avis, où il soutenoit que la méthode de son Frère étoit défectueuse : il accordoit encore quelque tems aux Géomètres pour chercher la véritable solution ; & si personne ne la donnoit, il s'engageoit à trois choses. 1.^o *A deviner au juste l'analyse de son Frère.* 2.^o *Quelle qu'elle fût, à y faire voir des paralogismes, si on vouloit la publier.* 3.^o *A donner la véritable solution du problème dans toutes ses parties : ajoutant que s'il se trouvoit quelqu'un qui s'intéressât assex à l'avancement des Sciences, pour proposer quelque prix pour chacun de ces trois articles, il s'engageoit à perdre autant, s'il ne s'acquittoit pas du premier ; le double, s'il ne réussoit pas au second ; & le triple, s'il manquoit au troisième.*

Cette admonition fraternelle obligea Jean Bernoulli de revoir sa méthode ; il reconnut qu'en effet il s'étoit trompé en quelque chose, & il attribuoit sa méprise à une trop grande précipitation : il envoya aux Journaux une solution différente, à certains égards, de la première, mais sans prendre un ton plus modeste. A son Ecrire, Jacques Bernoulli repliqua laconiquement en ces termes : *Avant que de publier ma réponse aux solutions de mon frere, je le prie de repasser tout de nouveau sa dernière, d'en examiner attentivement tous les points, & de nous dire ensuite si tout va bien : lui déclarant qu'après que j'aurai donné la mienne, les prétextes de précipitation ne seront plus écoutés.* Mais cet avertissement & une autre remarque semblable, un peu plus étendue, ne firent aucune impression sur Jean Bernoulli, qui soutint que sa seconde solution étoit bonne dans tous les points.

Presqu'en même tems on imprima une lettre de Jacques Bernoulli à Varignon, dans laquelle l'Auteur, joignant la plaisanterie à la discussion, expliquoit une analyse défectueuse en elle-même, où néanmoins des faussetés redressées par d'autres faussetés faisoient arriver, en certains cas, à une conclusion vraie ; & trouvoit, au moyen de cette analyse, les mêmes équations que son frere ; d'où il conjecturoit que, selon toutes les apparences, elles en étoient émanées. Cette imputation mit Jean Bernoulli hors de lui-même, & lui arracha, contre son frere, un torrent d'injures que je ne garderai bien de répéter.

La querelle ne pouvoit être terminée que par des Arbitres. Jean Bernoulli en demandoit ; il étoit déjà sûr de l'approbation de Leibnitz, qui n'avoit pas sans doute examiné la matière avec toute l'attention

l'attention qu'elle méritoit. De son côté, Jacques Bernoulli consentit que Leibnitz, Newton & le Marquis de l'Hopital fussent pris pour Juges, pourvu qu'on lui donnât tout le tems de parler. Le procès traîna en longueur. En 1701, Jean Bernoulli envoya à l'Académie des Sciences de Paris sa solution, sous une enveloppe qui ne devoit être ouverte qu'après que son frère auroit publié la Méthode. Celui-ci donna, en 1704, l'analyse & la solution complète de ses problèmes : prodige de sagacité & d'invention; il mourut l'année suivante, à l'âge de cinquante ans.

La Méthode de Jean Bernoulli parut dans les Mémoires de l'Académie pour l'année 1706. Elle étoit effectivement défectueuse; comme Jacques Bernoulli l'avoit toujours soutenu; & voici en quoi consistoit l'erreur.

Dans tous les problèmes du même genre que celui de la plus vite descente, où il s'agit simplement de remplir la condition du *minimum* ou du *maximum*, il suffit d'appliquer cette condition à deux élémens consécutifs de la courbe, pour en trouver l'équation différentielle. Mais, dans ceux où l'on est obligé de remplir tout-à-la-fois deux conditions, l'une qu'une certaine propriété soit la même, l'autre qu'une seconde propriété soit un *minimum* ou un *maximum*, il faut employer trois élémens consécutifs de la courbe : ou, si l'on veut n'en employer que deux, il faut multiplier les deux fonctions proposées, par des coefficients constans, ajouter ensemble les produits; & alors la somme résultante se rapporte aux problèmes du premier genre (1). C'est à quoi Jean Bernoulli ne prit pas garde, & ce qui lui fit donner des solutions fausses, excepté dans les cas où une courbe ne peut pas satisfaire à l'une des deux conditions proposées, sans satisfaire en même-tems à l'autre. Jacques Bernoulli avoit considéré trois élémens de la courbe; & par-là il étoit parvenu à une solution exacte & complète.

La force de la préoccupation empêcha long-tems Jean Bernoulli de reconnoître la vérité, & de lui rendre hommage. Enfin il reprit cette matière en 1718; il convint qu'il s'étoit trompé; & abandonnant ses anciennes Méthodes, il en donna une autre où il emploie, comme son frère, trois élémens de la courbe, & d'où il tire, d'une manière fort simple, les véritables équations du problème.

Il résulte de cet exposé, que Jacques Bernoulli eut, dans la question des Isopérimètres, un avantage marqué sur son frère. Mais il faut se souvenir que celui-ci, pendant sa longue carrière, n'a cessé

(1) Voyez l'ouvrage de M. Euler, intitulé : *Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes*.

d'enrichir les Mathématiques, & d'en reculer les limites. Tous deux ont été des génies du premier ordre. Sans prétendre décider la prééminence entr'eux, je crois que Jacques avoit plus de profondeur, Jean plus de flexibilité, & de cet esprit qui se porte indifféremment vers tous les objets. Le premier a donné plusieurs ouvrages, tels que la Théorie des spirales, le Problème de la courbe élastique, celui des Isopérimètres, & le livre de *Arte Conjectandi*, qui n'appartiennent qu'à lui seul, & où il a déployé un génie vraiment original : le second embrassoit toutes les parties des Mathématiques ; il avoit un air particulier de proposer & de résoudre de nouveaux problèmes : quelque sujet que l'on présentât à ses recherches, il y entroit promptement, & il n'en a jamais traité aucun, sans le montrer sous le jour le plus lumineux, & sans y faire quelque découverte importante. Je compare Jacques Bernoulli à Newton, & Jean Bernoulli à Leibniz.

En proposant le problème des Isopérimètres, Jacques Bernoulli y en avoit joint un autre : c'étoit de trouver, parmi toutes les cycloïdes d'une même origine, & construites sur une même base horizontale, celle qu'un corps grave doit suivre pour arriver, dans le moindre tems possible, à une ligne verticale donnée de position. Jean Bernoulli le résolut sans peine, & il lui donna même plus de généralité : à la simple ligne verticale, il substitua une courbe quelconque, & il fit voir que la cycloïde de la moindre descente étoit celle qui coupoit cette courbe à angles droits. Sa solution étoit fondée sur les propriétés de la courbe *synchrone*, dont la nature est de couper une infinité de cycloïdes, ou de courbes semblables, de manière que les arcs soient parcourus en tems égaux. Il restoit cependant une difficulté : La courbe synchrone est facile à tracer par points ; mais, pour en trouver l'équation différentielle, il falloit soumettre au calcul & à la loi de continuité le passage de l'une quelconque des courbes coupées, à la courbe contiguë. Jean Bernoulli ne put y parvenir : il s'en ouvrit par lettres à Leibniz, qui surmonta la difficulté (1), & qui donna, en cette rencontre, une extension très-importante à l'analyse infinitésimale : j'entends la méthode de différentier de *curva in curvam*, en faisant varier le paramètre. La réponse de Leibniz saisit de joie & d'admiration Jean Bernoulli, qui aussitôt développa cette idée, & en fit plusieurs applications intéressantes. Ils convinrent ensemble de tenir la méthode cachée, jusqu'à ce qu'ils s'en fussent servis pendant un tems suffisant. Leibniz ne l'a jamais publiée lui-même ; car il le voyoit souvent à ouvrir

(1) Voyez *Leibnizii & Joan. Bernoulli commercium epistolicum*, tome 1.^{er}, page 319.

de nouvelles routes, & il abandonnoit volontiers aux autres le plaisir de les étendre & de les perfectionner. Il paroît, par les Œuvres Posthumes de Jacques Bernoulli, qu'il avoit aussi trouvé, de son côté, une méthode semblable, & qu'il l'avoit employée pour résoudre les problèmes que son frère lui proposoit, pendant la dispute sur les isopérimètres : il se contentoit de donner ses solutions sous des lettres transposées, voulant éviter toute diversion, avant que l'affaire des isopérimètres fût terminée.

J'omets plusieurs autres problèmes moins importants par leur objet, quoique très-difficiles en ce tems-là. Tel est, par exemple, celui de la courbe d'égalé pression, qui fut proposé en 1700, par Jean Bernoulli, & résolu par le Marquis de l'Hopital.

Dans cette lice de combats scientifiques, qui durèrent pendant plus de trente ans, on ne vit point paroître Varignon, qu'on regardoit néanmoins, en France, comme un grand Géomètre. Mais avouons-le sans détour : quoique Lahire, Sauveur, Lagni, &c, reconnoissent sa supériorité, il étoit loin d'égaliser Leibnitz, Newton, les frères Bernoulli, & même le Marquis de l'Hopital. Cependant on ne peut pas nier qu'il n'eût beaucoup de savoir & de facilité dans le travail. Son projet d'une nouvelle Méchanique, & la manière adroite dont il applique le parallélogramme des forces aux loix de l'équilibre, lui feront toujours honneur. Il est un des premiers qui ait entendu & commenté le Livre de Newton. Il possédoit singulièrement l'art de généraliser les méthodes, & d'épuiser, pour ainsi dire, un sujet. Par malheur ses solutions générales ne renfermoient presque jamais d'autres difficultés, que celles des solutions particulières, données par d'autres Géomètres : c'est ce qui faisoit dire, assez plaisamment à Jean Bernoulli, quand il avoit résolu quelque problème nouveau & difficile ; *M. Varignon nous généralisera cela.*

Cette plaisanterie pourroit être souvent renouvelée, & peut être même appliquée avec plus de justice. Les moyens d'augmenter nos connoissances, & de les rapprocher les unes des autres, étant aujourd'hui fort variés & fort étendus, rien n'est moins rare, parmi les Savans, que cette faculté de l'esprit, qui semble quelquefois imaginer, tandis qu'elle ne fait réellement qu'imiter & amplifier. Elle est l'appanage de certains hommes studieux qui, dépourvus foncièrement de génie, trouvent dans les écrits des inventeurs, quelques idées accessoires & peu développées qu'ils s'approprient, & auxquelles ils ont l'art de donner l'apparence de la nouveauté. La nature leur accorde ordinairement une opinion très-avantageuse d'eux-mêmes, & le secret de l'inspirer en partie à la médiocrité ou à l'ignorance. Mais les justes appréciateurs du mérite cortigent cette erreur, mettent

Varignon, né
en 1654, mort
en 1722.

chacun à sa place, & regardant avec indifférence de vastes édifices de calcul, bâtis sur les fonds d'autrui, qui ne présentent qu'un amas de formules insignifiantes, inutiles au progrès de l'Analyse, & destinées seulement à couvrir les pages d'un livre malheureux.

Dispute entre
Léibnitz & New-
ton, sur la de-
couverte de la
nouvelle Ana-
lyse.

Il semble que la nouvelle Géométrie offroit un aliment suffisant à la curiosité humaine, & qu'on auroit dû se contenter de cultiver en paix ce champ inépuisable de recherches. Mais plus ces objets étoient grands, plus l'orgueil, toujours prêt à étendre son empire, fut habile à susciter, entre Léibnitz & Newton, une querelle sur les droits à l'invention de la méthode; & il faut avouer que si les mouvemens de cette passion pouvoient jamais être excusables, ils le seroient ici, par l'importance de la découverte dont on vouloit connoître le véritable Auteur.

La première étincelle de la guerre fut excitée par Fatio de Duiller, Gênois, retiré en Angleterre, le même qui, dans la suite, donna un étrange spectacle de démence, en voulant ressusiter publiquement un mort dans l'Eglise de S. Paul de Londres, mais qui avoit alors la tête saine & même de la réputation parmi les Géomètres. Poussé d'un côté par les Anglois, de l'autre, par un ressentiment personnel contre Léibnitz dont il prétendoit avoir reçu de trop foibles marques d'estime, il s'avisa de dire dans un petit Traité sur la courbe de la plus vite descente, & sur le solide de la moindre résistance, qui parut, en 1699, que Neuron étoit le premier inventeur des nouveaux calculs; qu'il parloit ainsi pour l'honneur de la vérité & l'acquit de sa conscience; & qu'il laissoit à d'autres le soin de décider ce que Léibnitz, second inventeur, pouvoit avoir emprunté du Géomètre Anglois. Léibnitz fit, à cette attaque imprévue, une réponse modérée, & suffisante pour détruire une assertion hasardée & dénuée de preuves.

Quelque tems après, Keil renouvela l'accusation de Fatio. Léibnitz répondit que Keil, qu'il appelloit d'ailleurs un homme Savant, étoit trop nouveau pour porter un jugement certain de choses arrivées depuis un grand nombre d'années, & qu'il s'en rapportoit là-dessus à Newton même. Keil revint à la charge, & dans une lettre adressée à Hanloane, Secrétaire de la Société Royale, il ne se contenta plus de dire que Newton étoit le premier inventeur: il fit entendre assez clairement que Léibnitz, après avoir puisé la méthode dans les écrits de Newton, se l'étoit appropriée, en y appliquant seulement une notation particulière, ce qui étoit, en termes équivalens, le taxer de plagiat. Léibnitz indigné d'une pareille inculpation, en porta de vives plaintes à la Société Royale, & demanda hautement que l'on reprîmât les clameurs d'un homme incon-

fidéré qui attaquoit, sans raison & sans pudeur, sa réputation & sa bonne foi. La Société Royale nomma des Commissaires pour examiner tous les écrits qui regardoient ce sujet, & elle les publia, en 1712, avec le rapport des Commissaires, sous ce titre : *Commercium Epistolicum de Anatysi promota*. Sans être absolument affirmative, la conclusion du rapport est que Keil n'a pas calomnié Leibnitz. J'observerois que Newton étoit alors président de la Société Royale, s'il avoit montré le désir, ou s'il avoit eu le pouvoir de faire pencher la balance en sa faveur.

La Société Royale n'avoit ni le droit, ni l'intention de juger le procès sans appel ; & puisqu'elle a fait imprimer les pièces qui y sont relatives, elle a laissé la liberté de les discuter & d'en dire son avis. Je demande donc la permission de me livrer à cet examen : j'y apporterai toute l'impartialité dont je suis capable. Leibnitz & Newton me sont indifférens : je n'ai reçu d'eux, si je puis employer une expression de Tacite, *ni bienfait, ni injure*. La sublimité de leur génie exige un profond hommage ; mais on doit encore plus de respect à la vérité.

Newton tenant de la nature une intelligence supérieure, & né dans un tems où Hariot, Wren, Wallis, & Barrow, avoient déjà rendu les Mathématiques florissantes en Angleterre, eut de plus l'avantage de recevoir, dans son enfance, les leçons de Barrow à l'université d'Oxford. Toutes les forces de son génie se portèrent vers ce genre d'études : les succès qu'il y obtint furent prodigieux. Fontenelle lui a appliqué ce que Lucain avoit dit du Nil : *qu'il n'a pas été donné aux hommes de le voir foible & naissant*. Dès l'âge de vingt-cinq ans, il avoit jetté les fondemens des grandes theories qui l'ont rendu depuis si fameux. Leibnitz, plus jeune de quatre ans, ne trouva en Allemagne que de médiocres secours pour son instruction. Il se forma, pour ainsi dire, tout seul. Son génie actif & dévorant, secondé par une mémoire extraordinaire, embrassoit toutes les branches des connoissances humaines : littérature, histoire, poésie, droit des gens, sciences exactes, physique, &c. Cette multiplicité de goûts nuisit nécessairement à la rapidité de ses progrès dans chaque genre. Il ne s'annonça donc, comme un grand Mathématicien, que sept ou huit ans après Newton.

Ces deux grands hommes possédoient la nouvelle Analyse long-tems avant que de la mettre au jour. Si la priorité de la publication emportoit la priorité de l'invention, Leibnitz auroit gain de cause : mais ce moyen n'est pas suffisant pour prononcer avec assurance ; & il faut remonter à des faits antérieurs, appuyés sur des titres authentiques.

Le *commercium epistolicum* contient d'abord, à dater de l'année 1669, plusieurs belles découvertes Analytiques de Neuton. Dans la pièce intitulée : *de Analyfi per aquationes numero terminorum infinitas*, outre la méthode pour résoudre les équations par approximation, dont il ne s'agit pas ici, Neuton enseigne à quarrer les courbes qui ont, pour ordonnées, des expressions monomes, ou l'assemblage de plusieurs monomes; & lorsque les ordonnées sont des radicaux complexes, il ramène la question au premier cas, en développant l'ordonnée en une suite infinie de termes simples, au moyen de la formule du binome, ce que personne n'avoit fait encore. Sluze & Grégori avoient trouvé, chacun de leur côté, une méthode pour les tangentes : Neuton, dans une lettre à Collins, en date du 10 Décembre 1672, prouve qu'il l'avoit aussi trouvée : il l'applique à un exemple, sans y ajouter la démonstration : il dit ensuite qu'elle n'est qu'un corollaire d'une autre méthode générale qu'il a pour mener les tangentes, quarrer les courbes, trouver leurs longueurs & leurs centres de gravité, &c, sans être arrêté par les quantités radicales, comme Hudde l'est dans sa méthode pour les *maxima* & les *minima*. Les Anglois voyent clairement la méthode des fluxions dans ces deux écrits de Neuton; mais les Géomètres des autres Nations ne pensent pas tout-à-fait de même. En convenant que le développement des radicaux en séries est un pas considérable que Neuton a fait, ils ne peuvent s'empêcher de reconnaître d'ailleurs, que les méthodes de Fermat, de Wallis & de Barrow, pouvoient servir à trouver les résultats concernant les quadratures des courbes, que Neuton se contente de donner, sans indiquer la marche qui l'y a conduit. Ils avouent que les deux pièces dont il s'agit, contiennent une indication vague de la méthode des fluxions; indication peut-être suffisante pour montrer que Neuton possédoit alors les premiers principes de cette méthode, mais trop obscure pour en donner l'intelligence au lecteur. Et ce qui rend cette conjecture très-vraisemblable, c'est qu'Oldenbourg, Secrétaire de la Société Royale, envoyant (10 Juillet 1673) à Sluze, un exemplaire de la méthode de celui-ci pour les tangentes qu'on avoit imprimée à Londres, rapporte un fragment de lettre de Neuton, où après avoir dit que cette méthode appartient bien véritablement à Sluze, Neuton poursuit ainsi : *quant aux méthodes* (il entend celles de Sluze & la sienne propre), *elles sont les mêmes, quoique je les croye tirées de principes différens. Je ne sais cependant si les principes de M. Sluze sont aussi seconds que les miens, qui s'étendent aux équations affectées de termes irrationnels, sans qu'il soit nécessaire d'en changer la forme. Auroit-il parlé avec tant de réserve;*

P R E L I M I N A I R E. lxxvij

& n'auroit-il pas dit nettement que la méthode de Sluze, & celle des fluxions, étoient différentes, s'il avoit possédé la dernière dans un degré aussi parfait qu'on l'a prétendu depuis? La modestie peut-elle consister à cacher la vérité? Quoi qu'il en soit, Leibnitz n'a pas eu communication de ces deux écrits de Neuton, ou il n'en a tiré aucune lumière, avant que d'avoir trouvé son calcul différentiel: c'est un point important que les défenseurs de Leibnitz n'ont pas assez discuté jusqu'ici, & dont je donnerai bientôt la preuve démonstrative.

Leibnitz vint en France, en 1672, au sortir des universités d'Allemagne, où il s'étoit principalement occupé du droit & de l'histoire: il étoit néanmoins déjà initié aux Mathématiques, puisqu'en 1666, il avoit publié un petit Livre sur quelques propriétés des nombres. Il passa à Londres, au commencement de 1673; il y vit Oldenbourg, & ils lièrent ensemble un commerce de lettres. Dans une de ces lettres, écrite de Londres même à Oldenbourg, Leibnitz expose qu'ayant trouvé une manière de sommer certaines suites par le moyen de leurs différences, on lui avoit montré cette méthode déjà imprimée dans un Livre de Mouron, Chanoine de S. Paul de Lyon, sur les diamètres du soleil & de la lune; qu'alors il imagina une autre manière qu'il explique, de former les différences, & d'en conclure les sommes des suites; qu'il est en état de sommer une suite de fractions, dont les numérateurs sont l'unité, & dont les dénominateurs sont, ou les termes de la suite des nombres naturels, ou ceux de la suite des nombres triangulaires, &c. Toutes ces recherches sont ingénieuses, & semblent avoir un rapport, au moins éloigné, au calcul des différences.

Après quelques mois de séjour à Londres, Leibnitz revint à Paris, où il se lia d'amitié avec Huguens, qui lui ouvrit le sanctuaire de la plus profonde Géométrie. Il trouva bientôt la suite, qui donne, pour la quadrature du cercle, une expression analogue à celle que Mercator avoit donnée pour la quadrature de l'hyperbole. Il la communiqua à Huguens, qui en fit de grands éloges, & à Oldenbourg, qui lui répondit que Neuton avoit déjà trouvé des choses semblables, non-seulement pour le cercle, mais encore pour toutes sortes de courbes, & qui en envoya des essais. En effet, la théorie des suites étoit très-avancée dès ce tems-là en Angleterre; & quoique Leibnitz y eut pénétré fort avant de son côté, il a toujours néanmoins reconnu que les Anglois, & principalement Neuton, l'avoient précédé & surpassé dans cette branche de l'analyse; mais elle n'est pas le calcul différentiel, & les Anglois ont montré une partialité trop évidente, en cherchant à lier ensemble ces deux objets.

Econrons & pesons l'histoire que Leibnitz fait de sa découverte du calcul différentiel. Il raconte que joignant ses anciennes remarques sur les différences des nombres, à ses nouvelles méditations de Géométrie, il trouva ce calcul vers l'année 1676; qu'il en fit de merveilleuses applications à la Géométrie; qu'étant obligé, en ce même tems, de retourner à Hanover, il ne put suivre entièrement le fil de ses méditations; que cherchant néanmoins à *faire valoir* sa nouvelle découverte, il passa par l'Angleterre & par la Hollande; qu'il resta quelques jours à Londres, où il fit connoissance avec Collins, qui lui montra plusieurs lettres de Gregori, de Neuton, & d'autres Mathématiciens, lesquelles rouloient principalement sur les Séries. D'après cet exposé, il sembleroit que Leibnitz, voulant répandre sa *nouvelle découverte*, auroit dès-lors fait connoître le calcul différentiel en Angleterre. Ajoutons que, dans une lettre de Collins à Neuton, du 5 Mars 1676, il est dit que Leibnitz ayant passé une semaine à Londres, au mois d'Octobre 1676, *avoit remis à Collins quelques écrits* (1), dont Neuton recevroit incessamment des extraits ou des copies. Collins ne désigne point la nature de ces *écrits*, & on n'en trouve aucun vestige dans le *commercium epistolicum*. Mais si le récit de Leibnitz est fidèle, ou si sa mémoire ne l'a pas trompé, quand il a dit qu'il possédoit le calcul différentiel avant ce second voyage en Angleterre, il lui survint sans doute alors quelque raison particulière de tenir encore sa découverte cachée, contre le projet qu'il avoit formé d'abord de la *faire valoir*; car, dans cette même lettre, Collins en rapporte une autre de Leibnitz à Oldenbourg, écrite d'Amsterdam, le 16 Novembre 1676, où Leibnitz propose de construire des Tables de formules, tendantes à perfectionner la méthode de Sluze, au lieu d'expliquer, ou, au moins, d'indiquer le calcul différentiel, comme beaucoup plus expéditif & plus commode. Les Anglois ont donc eu raison de dire qu'à son passage à Londres, en 1676, Leibnitz ne leur a pas appris le calcul différentiel; mais ils devoient reconnoître que la même lettre prouve, avec la dernière évidence, qu'il n'a non plus rien appris d'eux sur ce sujet. En effet, si, comme ils l'ont avancé depuis, on lui ~~est~~ donné connoissance de la méthode des fluxions, ne faudroit-il pas qu'il fût tombé en démence pour oser proposer, un mois après, au Secrétaire de la Société Royale, les moyens de perfectionner la méthode de Sluze en elle-même, sans

(1) Ce passage & plusieurs autres grands morceaux de cette lettre ont été supprimés dans le *Commercium Epistolicum*. Voyez-la en entier dans les *Œuvres de Wallis*, t. III, page 646.

parler, le moins du monde, d'une autre méthode beaucoup plus simple qu'on venoit de lui enseigner en Angleterre ? Ainsi, de deux choses l'une : ou Leibnitz ne vit point, au mois d'Octobre 1676, l'ouvrage de *Analyse per æquationes*, & la lettre de Newton, du 10 Décembre 1672 : ou s'il vit ces deux pièces, il n'en tira aucun secours, non plus que les Géomètres Anglois, qui avoient eu tout le tems de les méditer. Ses Adversaires n'ont jamais dit formellement qu'il eût vu l'ouvrage de *Analyse per æquationes* ; ils se sont contentés d'avancer qu'il avoit vu la lettre du 10 Décembre 1672 ; mais cette lettre est si vague & si obscure, que leur assertion, fut-elle vraie, ne prouve rien contre Leibnitz.

Il n'y a, dans toute cette affaire, que trois pièces véritablement décisives : savoir, 1.^o une lettre de Newton à Oldenbourg, du 24 Octobre 1676 ; lettre communiquée, l'année suivante, à Leibnitz, 2.^o La réponse que Leibnitz fit à Oldenbourg, le 21 Juin 1677, relativement à cette lettre. 3.^o Le Scholie qui accompagne la proposition VII du Livre II, des *principes Mathématiques* de Newton, ouvrage publié en 1686.

La lettre de Newton contient, indépendamment de différentes recherches sur les suites, qu'il faut ici mettre de côté, plusieurs Théorèmes qui ont la méthode des fluxions pour base ; mais il en cache les démonstrations ; il se contente de dire qu'il les a tirées de la solution d'un problème général qu'il énonce énigmatiquement sous des lettres transposées, & dont le sens est : *étant donnée une équation qui contienne des quantités fluentes, trouver les fluxions, & réciproquement*. Il est évident, par cette lettre, que Newton possédoit alors la méthode des fluxions, ou le calcul différentiel.

Leibnitz, dans sa réponse, commence par dire qu'il avoit reconnu, comme Newton, que la méthode de Sluze pour les tangentes étoit imparfaite. Ensuite il explique celle du calcul différentiel, assurant que depuis long-tems, il s'en étoit servi pour mener les tangentes des courbes. Il donne ainsi ouvertement la solution du problème que Newton avoit proposé en énigme.

Le Scholie, cité du Livre des *principes*, porte : *dans un commerce de lettres que j'entretenois, il y a dix ans (1), avec le très-savant Géomètre M. Leibnitz, ayant mandé que je possédois une méthode pour déterminer les maxima & les minima, mener les tangentes, & faire autres choses semblables, laquelle réussissoit également dans les quantités rationnelles & dans les quantités radicales, & ayant caché cette méthode sous des lettres transposées*

(1) Par l'entremise d'Oldenbourg.
Tome I. *Mathématiques*.

qui signifioient : étant donnée une équation qui contienne un nombre quelconque de quantités fluentes , trouver les fluxions , & réciproquement : cet homme célèbre répondit qu'il avoit trouvé une méthode semblable , & il me communiqua sa méthode qui ne différerait de la mienne, que dans l'énoncé & la notation. L'édition de 1714 ajoute, & dans l'idée de la génération des quantités.

Il est constant, par ces trois pièces, que Neuton semble avoir trouvé le premier la méthode des fluxions, mais que Léibnitz l'a trouvée également de son côté, sans rien emprunter de Neuton. Ces deux grands hommes sont arrivés, par la force de leurs génies, au même but, par des chemins différens : l'un, en regardant les fluxions comme de simples rapports de quantités qui naissent ou s'évanouissent au même instant ; l'autre, en considérant que dans une suite de quantités qui croissent ou décroissent, la différence entre deux termes consécutifs peut devenir infiniment petite, c'est-à-dire, plus petite que toute grandeur finie déterminable.

Cette opinion, aujourd'hui reçue universellement, excepté en Angleterre, a été celle de Neuton même, dans un tems où la vérité étoit encore proche de sa source, & où les passions ne l'avoient pas altérée. Envain, entraîné dans la suite par la flatterie de ses disciples, a-t-il changé de langage : envain a-t-il prétendu que la gloire d'une découverte appartenait toute entière au premier inventeur, & que les seconds inventeurs n'y avoient aucune part ; la proposition a besoin d'être modifiée : deux hommes, qui font chacun une même découverte importante, ont un droit égal à l'admiration : celui qui la publie le premier, a le premier droit à la reconnaissance publique.

Le projet de dépouiller Léibnitz, & de le faire regarder comme plagiaire, fut porté si loin en Angleterre, qu'on osa dire, & Neuton lui-même n'eut pas honte d'appuyer l'objection, que le calcul différentiel de Léibnitz n'étoit autre chose que la méthode de Barrow. A quoi pensez-vous, répondit Léibnitz, de me faire un pareil reproche ? Vous voulez, tout à-la-fois, que le calcul différentiel soit la méthode de Barrow, & que M. Neuton en soit l'inventeur. Faut-il que la passion vous aveugle au point de ne pas sentir cette contradiction manifeste ? Si le calcul différentiel étoit réellement la méthode de Barrow, (& vous savez très-bien qu'il ne l'est pas), qui mériterait plus justement d'être appelé plagiaire, ou de M. Neuton qui a été le disciple, l'ami de Barrow, qui a été à portée de puiser dans la conversation des vues que Barrow n'a pas mises dans ses livres : ou de moi, qui n'ai pu connaître que les livres, & qui n'ai jamais eu de relations avec l'Auteur ?

Jean Bernoulli, qui avoit appris conjointement avec son Frère, l'Analyse infinitésimale dans les écrits de Leibnitz, opposa au *commercium epistolicum*, une lettre où il mit en avant, que Neuton n'avoit pas d'abord songé à son calcul des fluxions, ou qu'il ne l'avoit réduit à des opérations analytiques générales en forme d'algorithme, qu'après que le calcul différentiel étoit déjà répandu dans tous les Journaux de Hollande & d'Allemagne. Les raisons qu'il en donne sont, 1.^o que dans le *commercium epistolicum*, on ne voit pas que Neuton ait jamais employé les lettres pointées, pour désigner les fluxions. 2.^o Que dans le Livre des *principes*, où l'Auteur avoit si souvent occasion d'employer ce calcul, & d'en donner l'algorithme, il ne l'a point fait; qu'il procéda par-tout par les lignes & les figures, sans aucune analyse déterminée, & seulement à la manière de Huguens, Roberval, Cavalleri, &c. 3.^o Que les lettres pointées n'ont commencé à paroître que dans le troisième volume des œuvres de Wallis, plusieurs années après que le calcul différentiel étoit connu par-tout. 4.^o Que la vraie méthode de différencier les différences, ou de prendre les fluxions des fluxions, étoit ignorée de Neuton, puisque dans son *Traité des quadratures des courbes*, publié en 1706, il donne, pour trouver les différentielles de tous les ordres, une règle qui est fautive, excepté dans le seul cas des premières différences.

A cette lettre, on répondit que la notation ne constituoit pas la méthode; que les principes du calcul des fluxions étoient contenus dans les lettres & dans le grand ouvrage de Neuton; que la règle du *Traité des quadratures*, pour trouver les fluxions de tous les ordres, étoit vraie en supprimant les dénominateurs, & donnoit par conséquent des quantités *proportionnelles* aux véritables fluxions. Les partisans de Leibnitz répliquèrent que les avantages d'une méthode analytique tiennent en grande partie à la simplicité de l'algorithme; que la caractéristique de Leibnitz avoit déjà fait faire des progrès considérables à la nouvelle Analyse, dans un temps où presque personne n'entendoit le Livre de Neuton; & qu'enfin la règle donnée par Neuton, pour trouver les fluxions de tous les ordres, prouve qu'il ne possédoit pas, même en 1706, la nouvelle Analyse, avec autant d'évidence & de sûreté, que les Géomètres de l'Ecole de Leibnitz.

La question étoit ainsi dégénérée en disputes, qui ne faisoient que l'embrouiller & l'obscurcir. Elle parut terminée par la mort de Leibnitz, qui arriva en 1716. Les Anglois poursuivant l'ombre de ce grand Homme, publièrent en 1726 une édition du Livre des *principes*, où l'on supprima le scholie qui concernoit Leibnitz,

C'étoit avouer sa découverte d'une manière bien authentique & bien mal-adroite. Ne devoient-ils pas sentir que l'on attribuerait à une prévention nationale, ou peut-être à un sentiment encore plus injuste, le dessein chimérique d'ancêtre l'hommage qu'une noble émulation avoit autrefois rendu à la vérité ?

Il s'est trouvé dans les tems postérieurs, des Géomètres qui, sans prendre un parti décisif entre Neuton & Leibnitz, ont objecté au dernier que la métaphysique de sa méthode étoit obscure ou même défectueuse; qu'il n'y a point de quantités infiniment petites, & qu'il reste des doutes sur l'exactitude d'une méthode où ces quantités sont introduites. Mais Leibnitz peut répondre : je n'ai proposé l'existence des quantités infiniment petites, que comme une simple hypothèse qui sert à abrégier le calcul & les raisonnemens sur lequel il est fondé; je n'ai pas besoin qu'il y ait des quantités infiniment petites à la rigueur; il me suffit, comme je l'ai imprimé dans plusieurs ouvrages, que mes différences soient moindres que toute quantité finie que vous voudrez assigner, & que par conséquent l'erreur qui peut résulter de ma supposition, soit au-dessous de toute erreur déterminable, c'est-à-dire, absolument nulle. La manière dont Archimède trouve la proportion de la sphère au cylindre, a pour base des principes semblables. M. de Fontenelle, qui étoit d'ailleurs bien intentionné pour moi, a eu tort de se contenter de dire, à la tête de sa *Géométrie de l'infini*, qu'après avoir admis d'abord les infiniment petits, je m'étois relâché dans la suite, jusques au point de réduire les infiniment petits de différens ordres, à n'être que des *incomparables*, dans le sens qu'un grain de sable seroit incomparable au globe de la terre : il devoit ajouter que cette comparaison ne me sert qu'à présenter une idée sensible & grossière de mes différences à l'imagination de certains lecteurs, & que, dans le *Mémoire* (1) auquel il fait allusion, je finis par remarquer expressément, qu'au lieu de l'infini ou de l'infiniment petit, il faut prendre des quantités aussi grandes ou aussi petites qu'il est nécessaire, pour que l'erreur soit moindre que toute erreur donnée. La métaphysique de mon calcul est donc entièrement conforme à celle de la méthode d'*exhaustion* des anciens, dont jamais personne n'a révoqué la certitude en doute. Et, quoiqu'on ait voulu dire, mon rival n'a réellement, à cet égard, aucun avantage sur moi.

Enfin on a dit que Neuton avoit poussé plus loin que Leibnitz, les applications de la nouvelle Analyse à de grands objets, & que cet avantage forme un préjugé pour faire regarder le premier comme

(1) Voyez *Leibnitzii opera*, tome III, pag. 370.

le véritable inventeur. Ce raisonnement demande une explication.

Il n'a peut-être pas existé d'homme plus doué que Newton, de cette intelligence & de cette vigueur de tête, capables de soutenir une longue méditation, de concevoir & d'exécuter un vaste plan. La preuve en est dans son Livre des *principes*, l'un des plus beaux monumens de l'esprit humain, par la variété, l'enchainement & l'importance des matières qui y sont traitées. Leibnitz n'a point donné de Livre semblable. Trop emporté par la vivacité de son génie, & par la multitude de ses occupations, de ses voyages & de ses correspondances avec la plupart des Savans de son tems, il ne pouvoit s'astreindre à creuser long-tems un même sujet, ni à poursuivre en détail toutes les conséquences d'un grand principe. Mais le recueil de ses ouvrages, & son *commerce épistolaire* avec Jean Bernoulli, portent le plus haut caractère de l'invention. Il sème par-rout des idées neuves & des germes de Théories, dont le développement produiroit quelquefois des traités entiers. S'il n'a pas égalé Newton du côté de la profondeur, il paroît le surpasser par cette pénétration rapide & cette pointe d'esprit, qui vont saisir dans une matière, les questions les plus subtiles & les plus piquantes. L'un a laissé une plus grande masse des vérités Géométriques; l'autre a plus accéléré, en son tems, les progrès de la Science, par la notation simple & commode de son calcul, les applications nombreuses qu'il en fit lui-même, ou qu'il mit les Savans à portée d'en faire, les encouragemens qu'il leur donnoit, & les routes nouvelles qu'il ouvroit continuellement à leurs méditations.

La dispute dont je viens de rendre compte ne fut pas bornée au seul genre polémique : elle alluma heureusement entre les Anglois & les Partisans de Leibnitz, une guerre de problèmes, dont la Géométrie retira plusieurs avantages considérables. On en étoit venu à s'accuser de part & d'autre de ne pas bien entendre la nouvelle analyse. Leibnitz, pour tâter le pouls aux Anglois, comme il disoit, leur fit proposer, peu de tems avant sa mort, le fameux problème des trajectoires orthogonales, ou la recherche des courbes qui coupent sous un angle donné une suite de courbes de la même espèce, comme toutes les hyperboles d'un même sommet & d'un même centre. Cet exemple des hyperboles étoit indiqué pour fixer clairement l'état de la question; car il n'étoit pas d'ailleurs bien difficile à résoudre; & le jeune Nicolas Bernoulli, fils de Jean, en donna une solution fort élégante. Mais Leibnitz exigeoit une méthode générale, d'où l'on pût tirer, dans chaque cas particulier, la construction de la trajectoire; du moins en supposant la quadrature des courbes. Newton ayant vu cet épouvé, indiqua tout de suite une

AN. 1713.

solution fondée sur ces principes : que la nature des courbes coupées donnoit les tangentes aux points d'interfection ; que les angles d'interfection donnoient les perpendiculaires ; que les perpendiculaires donnoient le centre de courbure , ou le rayon osculateur , d'où l'on pouvoit toujours arriver à l'équation différentielle de la trajectoire. Quant à l'intégration de cette équation , il la renvoyoit au calcul intégral , prétendant qu'elle ne faisoit plus partie du problème. Mais Jean Bernoulli, chargé de la cause de Leibnitz qui venoit de mourir , se moqua hautement de ce projet de solution : il soutint que rien n'étoit plus facile que de parvenir à l'équation de la trajectoire ; qu'on avoit même traité depuis long-tems avec succès plusieurs cas particuliers de ce problème ; que la grande difficulté étoit d'assigner , en général , les cas où l'équation de la trajectoire étoit intégrale , & de réduire l'intégration à la quadrature des courbes. La dispute s'échauffant de plus en plus , eut de longues suites. On voyoit , d'un côté , les Disciples de Neuton (car il ne paroissoit plus dans la lice) , & de l'autre , Jean Bernoulli leur faisant tête , & soutenant seul sur un pont , comme Horatius Cocles , tout l'effort de l'armée angloise , suivant l'ingénieuse comparaison de Fontenelle.

Du problème des trajectoires orthogonales , on passa à celui des trajectoires réciproques ou des courbes qui se coupent mutuellement sous un angle donné. Toutes ces recherches tenoient à des principes semblables. Elles demandoient une Géométrie très-délicate & très-profonde. Jean Bernoulli y déploya toutes les ressources de l'art & du génie. Il avoit entre les mains un instrument qu'il manioit avec dextérité : la méthode de différentier *de curva in curvam*.

Parmi les combattans Anglois , on distingua principalement Taylor ; qui résolut la plupart des problèmes de l'ennui commun. Avant ce tems-là , il avoit publié un ouvrage célèbre , intitulé : *Methodus incrementorum directa & inversa*. C'est-là qu'on trouve les premiers essais de la nouvelle analyse appliquée aux différences finies : essais présentés d'une manière très-obscur , & que Nicole eut le mérite de développer clairement , & de pousser plus loin (1). Taylor a donné , dans ce même ouvrage , la première solution du problème des cordes vibrantes , en supposant que tous les points de la corde arrivent en même tems à l'axe. Nous verrons ce qu'on a ajouté depuis à cette Théorie.

Keil ne fut pas aussi heureux. Il osa , pour sa propre honte , provoquer Jean Bernoulli sur un autre sujet. Neuton avoit déterminé , dans le livre des *Principes* , la courbe que décrit un projectile dans

An. 1716.

An. 1717, 1718.

An. 1721.

Taylor , né
en 1690 , mort
en 1724.Nicole , né en
1682 , mort en
1758.

An. 1717.

(1) Mém. de l'Acad. 1717, 1723, 1724, 1727.

un milieu résistant comme la simple vitesse; mais il n'avoit pas touché au cas, beaucoup plus difficile, où le milieu résiste comme le carré de la vitesse. Keil proposa ce cas à Jean Bernoulli, qui non-seulement le résolut en très-peu de tems, mais qui étendit la solution à l'hypothèse générale où la résistance du milieu seroit comme une puissance quelconque de la vitesse du mobile. Quand cette Théorie fut trouvée, l'Auteur offrit, à différentes reprises, de l'envoyer à un homme de confiance à Londres, sous la condition que Keil remettrait aussi sa solution. Mais Keil, vainement interpellé, garda un profond silence : la raison en étoit facile à deviner; il n'avoit pas résolu son problème : en le proposant, il s'étoit attendu que personne ne trouveroit ce qui avoit échappé à la sagacité de Neuton. Il se trompa dans sa conjecture; & son défi, plus qu'indiscret, lui attira de la part du Géomètre de Basle, une réprimande d'autant plus humiliante, que le seul moyen solide d'y répondre étoit de résoudre le problème, & que Keil ne put trouver ce moyen, ni dans ses propres forces, ni dans les secours de ses amis. Le triomphe de Jean Bernoulli fut complet. Dans l'ivresse de sa victoire, il se permit, contre ses rivaux, des sarcasmes & des plaisanteries qui n'étoient pas de bon goût, mais pardonnables sans doute au caractère franc & loyal d'un homme attaqué insidieusement, ayant à venger ses propres outrages & ceux d'un illustre ami dont il pleuroit encore la perte.

Toutes ces discussions scientifiques, malgré l'aigreur qu'y mêloient les passions humaines, échauffoient les esprits, & formoient de tous côtés des prosélytes à la Géométrie. L'Ecole de Basle avoit déjà produit, sous Jacques Bernoulli, plusieurs hommes célèbres dans les Sciences, entr'autres Herman, Auteur d'un excellent Traité de *Phoronomie*, & Nicolas Bernoulli, neveu, profond dans l'analyse des jeux de hasard, & le premier qui ait donné la fameuse équation de condition, d'où dépend la réalité de l'équation aux différences partielles entre trois grandeurs variables. De nouveaux Elèves, excités par les leçons de Jean Bernoulli, & sur-tout par le spectacle de ses combats avec les Anglois, se montrèrent dignes d'un tel maître. Son fils aîné, Nicolas, s'élevoit rapidement aux régions supérieures de la Géométrie, quand la mort vint le frapper à l'âge de 27 ans. Il eut, dans son frère Daniel Bernoulli, & dans Euler leur compatriote, des rivaux, qui, nés avec un génie égal au sien, mais ayant vécu plus long-tems, ont fait aussi de plus grands pas dans la même carrière. En Italie, Gabriel Manfredi avoit publié, dès l'année 1707, un savant ouvrage sur l'analyse des courbes & des équations différentielles : ouvrage où, par la seule conformité des esprits & de la

Herman, né en 1650, mort en 1724.

Nicolas Bernoulli, né en 1687, mort en 1740.

Nicolas Bernoulli, né en 1690, mort en 1736.

D. Bernoulli, né en 1700, mort en 1712.

Euler, né en 1707, mort en 1783.

Gabriel Manfredi, né en 1681, mort en 1761.

doctrine, l'Auteur s'étoit rencontré avec Jean Bernoulli dans la Théorie générale des équations différentielles homogènes.

Rien n'a plus contribué à augmenter le nombre & l'émulation des favans, que l'établissement des Académies dans les principales villes de l'Europe. On connoît les riches collections de Mémoires publiés par ces illustres Compagnies : souvent encore leurs membres ont donné séparément des ouvrages considérables. La nouvelle Géométrie a été appliquée à toutes les autres parties des Mathématiques, & toutes l'ont forcée de se perfectionner elle-même, en offrant sans cesse des problèmes qui finissent par se réduire à de pures questions d'Analyse.

Mécanique.

Nous trouvons d'abord, dans la Mécanique, une preuve sensible de cette dépendance mutuelle. Il n'y a point de Science à qui le secours d'une profonde Géométrie soit plus nécessaire qu'à la Théorie générale de l'équilibre & des mouvemens variés. On en avoit déjà vu plusieurs exemples; & cette source étoit loin de tarir.

AN. 1726.

Emportés par le plaisir de résoudre de nouveaux problèmes, les Géomètres s'étoient peu attachés à examiner si les principes de la Mécanique avoient l'évidence nécessaire pour servir de base à un système de connoissances véritablement scientifiques. M. Daniel Bernoulli entreprit cet examen : il éclaircit quelques propositions; il en démontra rigoureusement d'autres qui en avoient besoin : telle est, en particulier, celle de la composition & décomposition des forces qui vont concourir en un point. Quand il eut ainsi assuré sa marche, il voulut, à son tour, résoudre des problèmes de Mécanique.

AN. 1728.

Je citerai d'abord celui des *chainettes*, considéré généralement, c'est-à-dire, en supposant le fil soumis à l'action de puissances quelconques; & celui de la courbure que doit prendre une lame élastique, en ayant égard à sa pesanteur que l'on n'avoit pas encore fait entrer dans le calcul. M. Euler, qui traita de son côté les mêmes questions, parvint à des résultats semblables.

AN. 1686.

La découverte que Huguens avoit faite du *tautochronisme* de la cycloïde, dans l'hypothèse du vuide & de la gravité ordinaire, excita la curiosité des Géomètres à chercher les courbes tautochrones pour d'autres hypothèses. Newton fit voir que la cycloïde est encore la courbe tautochrone, lorsque le corps toujours pesant à l'ordinaire, éprouve de la part du milieu où il se meut, une résistance proportionnelle à sa simple vitesse : résultat curieux & remarquable. Mais on desiroit envain depuis long-tems de connoître la tautochrone pour un milieu résistant comme le quarré de la vitesse. M. Euler & M. Jean Bernoulli résolurent ce problème à-peu-près dans le même tems. En 1734, M. Fontaine donna, sur ce sujet, une nou-

AN. 1729.
Fontaine, né
en 1705, mort
en 1771.

velle

velle méthode plus générale, & d'un tour vraiment original : où faisant varier les lignes de deux manières, l'une relative à la différence entre deux arcs finis consécutifs, l'autre au mouvement le long de l'un de ces arcs, il parvient à une équation d'où l'on tire sans peine tous les cas connus, tandis qu'auparavant chacun d'eux exigeoit une solution particulière. Il trouva de plus que la tautochrone est la même quand le milieu résiste comme le carré de la vitesse, & quand il résiste comme le carré de la vitesse plus le produit de la vitesse par un coefficient constant : Théorème non moins singulier que celui de Newton.

Dans tous les mouvemens de rotation, on avoit toujours regardé l'axe comme fixe. M. Daniel Bernoulli étendit les loix de la Méchanique à des problèmes où l'axe lui-même est mobile ; tel est celui des oscillations d'une chaîne suspendue verticalement, qu'il résolut, en considérant cette chaîne comme l'assemblage d'une infinité de petits poids mobiles à charnière, & en supposant qu'ayant été d'abord un peu détournée de la ligne verticale, puis abandonnée à elle-même, tous ses points arrivent à la verticale dans le même tems. M. Euler, invité par M. Bernoulli à chercher aussi la solution de ce problème, la trouva également. Ces deux grands Géomètres se communiquoient volontiers & sans mystère les objets de leurs méditations, & souvent ils ont traité les mêmes sujets. L'étroite amitié qu'ils avoient liée ensemble, dans leur jeunesse, ne fut jamais altérée par le tems, ni par de fréquentes discussions scientifiques où ils n'étoient pas de même avis.

An. 1714.

Le problème de la *percussion excentrique* les occupa l'un & l'autre. Il consistoit, en général, à déterminer le mouvement que doit prendre un corps frappé ou poussé suivant une direction quelconque. Les solutions qu'ils en donnèrent étoient un supplément nécessaire à la Théorie du choc des corps, où l'on avoit toujours supposé auparavant que les corps se frappaient suivant des lignes qui passaient par leurs centres de gravité. Mais elles supposaient elles-mêmes que le corps choqué, quelle que soit sa figure, ne prend, outre le mouvement de translation, qu'un mouvement de rotation autour d'un seul axe qui conserve son parallélisme : on a déterminé, à l'occasion d'un autre problème dont nous parlerons plus loin, le mouvement pour un nombre quelconque d'axes, quand le cas a lieu.

An. 1727.

Pendant que les deux plus illustres Elèves de Jean Bernoulli mouroient d'un si grand pas dans la carrière qu'il leur avoit ouverte : lui-même, nonobstant son âge avancé, conservoit tout son goût & toute son activité pour les Sciences. Il étoit infatigable à proposer & à résoudre de nouveaux problèmes. On admire, comme une

recherche alors très-délicate, la méthode pour trouver le *centre spontané* de rotation d'un corps qui se meut librement en vertu d'une percussion excentrique.

Clairaut, né
en 1713, mort
en 1765.
D'Alembert,
né en 1717,
mort en 1783.

A la mort de Pascal & de Fermat, la France avoit un peu perdu, dans les Sciences, l'équilibre avec les Nations voisines ; mais elle a su le reprendre & le conserver, à-peu-près depuis l'époque du problème des *tautochrones* dans les milieux résultans, où elle remporta un avantage marqué. Bientôt après, M. Clairaut & M. d'Alembert se distinguèrent par de profondes recherches de Dynamique. On fait que les problèmes de cette classe ont pour objet les mouvemens de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque. Pour les résoudre, les Géomètres se servoient, suivant les Loix de la Mécanique, certaines règles qu'ils combinoient, au besoin, avec les propriétés du mouvement, déjà connues. C'est ainsi que Jean Bernoulli employoit le principe des *tensions* ; M. Euler, celui des *pressions* ; M. Daniel Bernoulli, la puissance virtuelle qu'a un système de corps de se rétablir dans son premier état, quand il en a été dérangé, &c. L'adresse étoit ensuite d'y ramener chaque problème particulier, & d'intégrer les équations auxquelles on étoit conduit. M. d'Alembert, remontant aux notions primordiales de l'équilibre & du mouvement, a imaginé un principe général, dont tous les autres ne sont que des corollaires. Il regarde le mouvement qu'a chacun des corps du système, en un instant quelconque, comme formé du mouvement qu'il avoit dans l'instant précédent, & d'un autre mouvement qu'il a perdu ; ensuite, observant que la connoissance des mouvemens perdus doit mener nécessairement à celle des mouvemens conservés, il exprime les conditions de l'équilibre entre les premiers ; & par-là il réduit toujours la question à un simple problème de statique.

AN. 1747.

Ce même homme, qui réunissoit dans le plus haut degré la Science de l'Analyse à celle de la Mécanique, généralisa le problème des cordes vibrantes, que Taylor & ensuite d'autres Géomètres n'avoient résolu que dans la seule hypothèse où tous les points de la corde arrivent en même tems à l'axe, soit parce que cette hypothèse avoit paru suffisante pour rendre raison des principaux phénomènes des sons musicaux, soit parce qu'on n'avoit pu réussir à surmonter les difficultés de calcul que l'on rencontre, lorsqu'on s'en écarte. Un Théorème de M. Euler sur les fonctions aux différences partielles, & de nouvelles considérations analytiques dont M. d'Alembert ne fut redevable qu'à son propre génie, le conduisirent à une équation de la courbe vibrante, où il entroit deux fonctions variables indéterminées, comme il entre des constantes indéterminées

dans les intégrations ordinaires. Il ne s'agissoit plus que de subordonner ces fonctions à l'état initial de la corde; & , dans cette généralité, la solution fondée sur l'hypothèse de Taylor étoit comprise comme un cas très-particulier. M. Euler fut frappé de ce nouveau genre d'Analyse : il donna une solution qui ressembloit à celle de M. d'Alembert , dans plusieurs points essentiels. M. d'Alembert , craignant sans doute de partager avec un autre la gloire d'une si belle découverte, ne vit dans la solution de M. Euler que les traits de ressemblance avec la sienne, & ne voulut pas reconnoître le mérite qu'elle avoit d'être un peu plus directe, plus analytique & plus facilement applicable à toutes les questions de cette espèce. M. Daniel Bernoulli avoua que tous ces calculs étoient ce que l'Analyse devoit encore produire de plus abstrait & de plus épineux ; mais en même tems il entreprit de faire voir que la corde vibrante forme toujours , ou une trochoïde simple, telle que la Théorie de Taylor la donne, ou un assemblage de ces trochoïdes; & que toutes les courbes déterminées par MM. d'Alembert & Euler ne pouvoient être admises, & n'étoient réellement applicables à la nature, qu'autant qu'elles étoient réduites à une pareille forme. Cette discussion lui donna lieu d'approfondir la formation physique du son, que l'on ne connoissoit encore que très-imparfaitement; il explique, par exemple, avec toute la netteté possible, comment une corde mise en vibration, ou en général un corps sonore quelconque, peut rendre à-la fois plusieurs sons différens, formant un même système. Mais, en admirant son adresse à simplifier le sujet, & à prêter l'appui de l'expérience à ses raisonnemens, les Géomètres conviennent que sa solution est moins générale & moins parfaite que celles de MM. d'Alembert & Euler.

Malgré la conformité qui se trouvoit entre les principaux résultats de ces deux derniers, ils eurent ensemble une longue dispute sur l'étendue qu'on pouvoit donner aux fonctions arbitraires qui entrent dans l'équation de la corde vibrante. M. d'Alembert vouloit que la courbure initiale de la corde fût assujettie à la loi de continuité : M. Euler la croyoit absolument arbitraire, & introduisoit dans le calcul les fonctions discontinues. D'autres Géomètres ont cru que cette discontinuité des fonctions pouvoit être admise, mais qu'elle devoit être assujettie à une loi, & qu'il falloit que trois points consécutifs de la courbe initiale appartenissent toujours à une courbe continue. Mais jusqu'ici il ne paroît pas que personne ait donné des preuves entièrement démonstratives de son opinion : & il ne faut pas s'en étonner. Cette question tient à des idées métaphysiques; & les problèmes de Mécanique, ou de pure Analyse, auxquels on

a appliqué ce nouveau genre de calcul, n'ont encore fourni aucun moyen de discerner celle de ces opinions, qui donnoit des résultats conformes ou contraires à des vérités déjà reconnues & avouées universellement.

Au problème des cordes vibrantes succéda bientôt une autre question de même genre : celle du mouvement oscillatoire & réciproque d'une masse d'air que l'on a tirée de l'état de repos. M. Euler traita ce nouveau sujet avec la même généralité que le premier ; &, pour vaincre les difficultés de calcul qui y sont attachées, il déploya toutes les forces, toutes les ressources du génie analytique. M. Daniel Bernoulli trouva le moyen d'éviter la plupart de ces difficultés, en se bornant à discuter, avec sa pénétration & son adresse ordinaires, les hypothèses les plus conformes à l'expérience : il parvint ainsi à établir une très-belle Théorie Physique & Mathématique des sons produits par les tuyaux d'orgue. Si je ne m'étois imposé silence sur les découvertes des hommes vivans, j'aurois commencé par citer, au sujet du problème de la propagation du son, un Géomètre dont l'Italie & l'Allemagne s'honorent, l'une pour lui avoir donné la naissance, l'autre parce qu'il est à la tête de sa plus célèbre Académie.

Hydrodynamique.

Les progrès de l'Hydrodynamique ont été plus lents que ceux de la Mécanique des solides. Avant M. Daniel Bernoulli, on ne favoit déterminer avec exactitude l'écoulement des fluides par des orifices, que dans le seul cas où ces orifices pouvoient être regardés comme infiniment petits : car je ne crois pas devoir parler de la Théorie générale que Neuton entreprit de donner sur ce sujet, parce qu'il y emploie des suppositions précaires & même incompatibles avec les loix de l'Hydrostatique. M. Bernoulli s'appuie sur l'expérience : il suppose simplement que la surface d'un fluide qui sort d'un vase par un orifice de grandeur quelconque, demeure toujours de niveau, & que tous les points d'une même tranche s'abaissent verticalement avec des vitesses égales : il applique à cette hypothèse le principe de la conservation des forces vives, & parvient à des formules remarquables par l'élégance du calcul & la simplicité des résultats. Jamais l'esprit d'invention, la Géométrie & la Physique n'ont été réunis plus avantageusement.

Ann. 1738.

Ann. 1742.

MM. Maclaurin & Jean Bernoulli traitèrent les mêmes questions ; au moins les principales, mais en employant d'autres méthodes. Le choix de ces méthodes étoit fondé sur des motifs bien différens. Maclaurin plaçoit le principe de la conservation des forces vives au nombre des vérités secondaires, & ne croyoit pas qu'on pût le prendre pour base d'une solution : au contraire, Jean Bernoulli l'avoit toujours regardé comme une loi fondamentale de la Mécanique, &

il s'en étoit servi pour résoudre un grand nombre de problèmes; mais, devenu un peu jaloux de son fils depuis que l'Académie des Sciences avoit partagé entr'eux le prix de l'année 1734, il prétendit que ce principe étoit indirect dans la question du mouvement des fluides.

Celui de M. d'Alembert ne craignoit aucun reproche; & l'Auteur, après l'avoir appliqué aux plus difficiles problèmes de Dynamique, en montra également l'usage pour déterminer le mouvement des fluides. Il fait les mêmes suppositions que M. Daniel Bernoulli, & il parvient aux mêmes résultats, de la manière la plus simple & la plus directe. Sa méthode a l'avantage d'embrasser tous les cas, au lieu que la loi de la conservation des forces vives souffre une restriction, lorsque la vitesse change brusquement d'un instant à l'autre, ou quand il y a une percussion de corps durs.

Les calculs de tous ces grands Géomètres étant fondés sur l'hypothèse du parallélisme des tranches, laissoient encore un petit scrupule sur la parfaite exactitude des résultats, parce que cette hypothèse n'a pas lieu en rigueur, & qu'elle ne peut même être admise en certains cas. M. d'Alembert donna une nouvelle solution, où il ne supposoit autre chose, sinon que les particules demeurent toujours contiguës les unes aux autres, & qu'une petite masse élémentaire, de figure quelconque, en passant d'un endroit à l'autre, conserve le même volume lorsque le fluide est incompressible, ou change de volume suivant une loi donnée lorsque le fluide est élastique. D'après ce principe conforme à la nature des fluides, les nouvelles équations de M. d'Alembert sont plus générales & plus rigoureuses que les premières; mais il n'a fait, pour ainsi dire, que les indiquer, sans pousser l'Analyse aussi loin qu'il étoit nécessaire pour former des résultats précis & satisfaisans. M. Euler a traité la matière sous le même point de vue, mais avec plus de clarté & d'étendue. Le recueil des Mémoires qu'il a donnés sur ce sujet, formeroit le Traité Théorique le plus complet qui ait encore paru de l'équilibre & du mouvement des fluides.

Ceux qui desiroient qu'on rendit l'Hydrodynamique utile à la société, & qui sentoient l'impossibilité d'appliquer à cette fin un système de formules compliquées, invitoient depuis long-temps les Géomètres à faire une suite d'expériences en grand sur le mouvement des fluides, à discuter soigneusement ces expériences, & à les comparer avec la Théorie. Ce travail long & pénible a été entrepris: on ne me dispensera d'en parler.

Il semble que l'expérience de Richer à Cayenne, & les raisonnemens théoriques de Haguens & Newton ne permettoient plus de douter que la terre fût un sphéroïde applati vers les poles. Cepen-

Ab. 1752.

Ab. 1779.

Figure de la terre par les observations.

dant les mesures que MM. Cassini avoient prises, en divers tems; des degrés du méridien dans toute l'étendue de la France, avoient rendu la question comme problématique : car, selon ces mesures, la longueur du degré terrestre augmentoit en allant du nord de la France au midi, ce qui supposeroit que la terre, au lieu d'être un sphéroïde applati, seroit au contraire un sphéroïde allongé. A ce résultat, les Géomètres convaincus de l'applatissement de la terre, oppoïent que les opérations de MM. Cassini n'étoient pas suffisantes pour résoudre le problème, que ces opérations avoient été faites en des lieux trop voisins les uns des autres, & qu'il n'étoit pas possible de connoître les quantités précises des petites différences qui se trouvoient entre les degrés mesurés, ni même le sens dans lequel elles avoient lieu. On ne pouvoit donc sortir de cette incertitude, qu'en mesurant les degrés du méridien en des endroits dont les latitudes fussent très différentes. La France envoya, pour cet effet, des Académiciens en Laponnie & au Pérou ; la première troupe étoit composée de MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus, & le Monnier, auxquels se joignirent M. l'Abbé Cuthier, Chanoine de Bayeux, & M. Celsius, Professeur d'Astronomie à Upsal ; la seconde, de MM. Godin, Bouguer, & la Condamine, accompagnés de M. de Jussieu, Botaniste, & de deux Officiers Espagnols, Dom Antonio de Ulloa, & Dom Georges Juan. On trouva que la longueur d'un degré du méridien, au cercle polaire, étoit de 57438 toises, & que celle du premier degré de latitude étoit de 56753 toises. Ainsi, voilà une différence très-sensible entre deux degrés terrestres du méridien, mesurés à de très-grandes distances l'un de l'autre. Il résulte de cette différence que les degrés terrestres du méridien vont en diminuant du pôle à l'équateur, & que par conséquent la terre est un sphéroïde applati vers les pôles. Cette conséquence se trouve également par la comparaison de chacun des degrés mesurés au nord & au midi avec le degré moyen déterminé par MM. Picard & Cassini. C'est ainsi que la France a eu successivement la gloire d'indiquer d'abord, & puis de démontrer sans réplique l'applatissement de la terre.

Mais il ne suffisoit pas de savoir que la terre est applatie : il falloit encore trouver son axe, & le diamètre de l'équateur : M. de Maupertuis détermina ces deux lignes par le moyen des longueurs de deux degrés du méridien, en considérant la terre comme un sphéroïde elliptique.

De tous les Académiciens qui ont eu part aux expéditions du nord & du Pérou, il n'en reste qu'un seul : célèbre par d'excellens ouvrages, cher à sa famille & à ses amis par de solides vertus.

AN 1715.

Maupertuis, né en 1698, mort en 1759.
Camus, né en 1690, mort en 1763.

Godin, né en 1704, mort en 1760.

Bouguer, né en 1695, mort en 1758.

La Condamine, né en 1701, mort en 1774.

AN. 1717.

La recherche de la figure de la terre, par la voie de la théorie, présentait des difficultés, soit pour le choix des vrais élémens de la question, soit pour la manière de les employer. Huguens étoit parti de ce principe, que la gravité primitive, supposée constante & dirigée au centre, étant modifiée par l'action de la force centrifuge, il en doit résulter une pesanteur actuelle dirigée perpendiculairement à tous les points de la surface de la terre : Newton, de celui-ci, que la gravité primitive, considérée comme formée de toutes les attractions des parties de matière dont le sphéroïde terrestre est composé, doit se combiner avec la force centrifuge, de telle manière que le poids d'une colonne centrale équatorienne, & celui d'une colonne centrale polaire, soient égaux entr'eux, sans s'embarasser d'ailleurs si la direction de la pesanteur actuelle est perpendiculaire ou non à la surface de la terre, & sans rien prononcer sur la figure précise du méridien. M. de Maupertuis & M. Bouguer, voulant savoir si les deux principes de Huguens & de Newton donnoient la même courbe pour le méridien, trouvèrent que dans plusieurs hypothèses de pesanteur, cette identité n'avoit pas lieu; & ils conclurent que tous deux devoient être observés en même tems, pour l'équilibre de la terre à la surface & dans l'intérieur. Mais ces hypothèses n'étoient pas celles de la nature : il falloit trouver directement la figure de la terre, suivant la théorie de l'attraction réciproquement proportionnelle au quarré des distances; & prouver l'équilibre, par cette loi fondamentale de l'Hydrostatique, qu'un fluide ne sauroit demeurer en repos, à moins que chacune de ses parties ne soit également pressée en toutes sortes de sens. La solution de Newton étoit insuffisante, en ce qu'il n'avoit pas donné l'équation du sphéroïde terrestre, & qu'il s'étoit contenté de le regarder tacitement comme elliptique. M. Maclaurin est le premier qui ait démontré en rigueur ce beau Théorème : que toutes les particules de la terre regardée comme fluide, étant supposées soumises à l'attraction Newtonienne & à l'action d'une force centrifuge, elle sera en équilibre, si elle a la forme d'un sphéroïde elliptique homogène, quelque soit d'ailleurs le rapport des axes. Il étendit cette proposition au cas où les particules de la terre sont de plus attirées par le soleil & par la lune : il apprit à déterminer l'attraction d'un sphéroïde elliptique homogène sur un point placé en un endroit quelconque du prolongement de son axe, ou du prolongement d'un diamètre de l'équateur. Tous ces problèmes étoient alors de la plus grande difficulté; l'Auteur les résout par la méthode synthétique des anciens, avec une adresse & une élégance admirées des Géomètres.

La théorie n'auroit rien laissé à désirer, si elle eût donné pour le

Figure de la terre par l'Hydrostatique.

An. 1734.

Maclaurin, né en 1698, mort en 1744. An. 1740.

rapport de l'axe de la terre au diamètre de l'équateur une fraction sensiblement égale à celle que donnoient les mesures immédiates. Mais les termes de la première fraction étoient les nombres 230 & 231; ceux de la seconde, les nombres 177 & 178. On voit que la différence méritoit quelque attention. Ne falloit-il pas, pour l'expliquer, abandonner l'hypothèse de l'homogénéité de la terre? M. Clairaut, intéressé personnellement à l'examen de cette question, comme ayant eu part à la mesure du nord, entreprit de la traiter de nouveau en détail suivant les principes de l'Hydrostatique. Il ne se borne pas à regarder la terre comme homogène; il la suppose composée de différentes couches fluides ou solides; il cherche la loi des densités de ces couches, & les erreurs qu'il faudroit attribuer aux observations, afin que les dimensions du sphéroïde terrestre soient à-peu-près telles que la comparaison des mesures le demande. Dans tous ses calculs de l'attraction des parties de la terre, il regarde le sphéroïde terrestre comme elliptique. M. d'Alembert a depuis généralisé davantage la question, en déterminant, ce que personne n'avoit fait encore, l'attraction pour un sphéroïde dont l'équation comprend la suite des puissances du sinus de la latitude d'un point quelconque. Il a tiré de cet important problème plusieurs conséquences relatives à la figure de la terre; &, par une suite de réflexions, il a proposé, en différens tems, un grand nombre de remarques nouvelles & utiles sur les loix générales de l'équilibre des fluides.

Application
de l'Hydrody-
namique à la
Navigation.

L'architecture navale & la manœuvre des vaisseaux ressentent les progrès de l'Hydrodynamique. On savoit depuis long-tems qu'afin qu'un corps solide, flottant sur un fluide, demeure en équilibre, il faut que le centre de gravité de ce corps, & celui de sa partie submergée, considérée comme homogène, soient placées dans une même ligne verticale. M. Daniel Bernoulli fit voir de plus qu'en égard aux diverses situations respectives de ces deux points sur la ligne verticale, il existe diverses situations d'équilibre, qui ont plus ou moins de consistance; que l'équilibre est toujours *ferme*, ou que le corps, dérangé de cet état, y revient en vertu de sa pesanteur & de la poussée verticale de l'eau, lorsque son centre de gravité est placé au-dessous de celui de la partie submergée; que la *fermeté* de l'équilibre diminue, à mesure que le premier centre s'élève, & qu'enfin, lorsqu'il est arrivé à une certaine limite au-dessus du second, l'état d'équilibre devient versatile. Il paroît que M. Euler avoit trouvé, de son côté, dans le même tems, de semblables résultats: ils sont expliqués fort au long dans son ouvrage, intitulé: *Scientia Navalis*. Le Mémoire de M. Daniel Bernoulli, sur ce sujet, étoit public depuis

An. 1738.

An. 1740.

depuis quelques années, lorsque M. Bouguer, traitant de la construction & des mouvemens du navire, donna cette même théorie de l'équilibre des corps flottans, d'une manière nouvelle & très-simple : il fit connoître, sous le nom de *Métacentre*, la limite au-dessous de laquelle il faut qu'un vaisseau ait son centre de gravité, pour n'être pas exposé à verser, quand l'impulsion du vent & l'agitation des lames viennent à l'incliner.

Les problèmes relatifs aux mouvemens du vaisseau sont plus compliqués & plus difficiles. MM. Jean Bernoulli, Bouguer & Euler en ont résolu un grand nombre. Mais leurs travaux sur cet objet n'ont été que d'un médiocre secours à la Navigation, parce que dans la plupart de ces problèmes, on est obligé d'avoir égard à l'impulsion du vent contre les voiles, & à la résistance que le Navire éprouve en divisant l'eau, & que les méthodes connues & employées pour déterminer ces efforts, sont fondées sur des principes contraires à l'expérience, en plusieurs points essentiels.

On seroit étonné des progrès que l'Astronomie a faits depuis cent ans, si l'on ne songeoit aux secours qu'elle a tirés de la Mécanique, de la Physique & de la Géométrie, soit pour la construction des instrumens, soit pour le calcul des observations. Tout a concouru à perfectionner les différentes parties de cette Science. Un des travaux les plus nécessaires & les plus pénibles qu'on ait entrepris, est le Catalogue des étoiles visibles dans nos climats, auquel Flamsteed a donné plus de trente ans. En 1703, Halley se rendit à l'île Sainte-Hélène, pour dresser un semblable catalogue des étoiles australes. De notre tems, M. l'Abbé de la Caille a fait, dans la même vue, le voyage du Cap de Bonne-Espérance; il vouloit de plus vérifier plusieurs élémens de l'Astronomie, tels que les parallaxes des planètes, l'obliquité de l'écliptique, &c, au moyen d'observations correspondantes à celles qu'on étoit convenu de faire en quelques villes de l'Europe. En général, on a porté dans toutes les théories Astronomiques une recherche, une précision, auparavant inconnues, & sans lesquelles néanmoins il étoit impossible de fixer exactement à chaque instant la position d'un astre dans le ciel. Je m'arrêterai un moment aux deux plus grandes découvertes de l'Astronomie moderne.

Parmi les raisons qu'on opposa dans le tems contre le système de Copernic, on dit que, si la terre tourne en effet autour du soleil, les étoiles fixes devoient paroître en des lieux différens pour un observateur placé successivement aux deux extrémités d'un diamètre de l'orbite terrestre : différence que l'on n'avoit pas encore remarquée. L'objection étoit solide, & les Astronomes, persuadés de

Tom. I. Mathématiques.

An. 1746.

Astronomie.

Flamsteed, né
en 1746, mort
en 1717.
Halley, né en
1616, mort en
1742.
La Caille, né
en 1713, mort
en 1762.

Théorie de
l'aberration des
étoiles.

l'existence de cette parallaxe, n'avoient cessé depuis Copernic de chercher à la déterminer; mais trouvant constamment qu'elle étoit insensible, & ne voulant pas abandonner le système de Copernic, si bien prouvé d'ailleurs, ils avoient fini par conclure qu'il falloit compter pour rien la distance de la terre au soleil, en comparaison de la distance de la terre aux étoiles fixes. Cependant on observoit quelques changemens sensibles dans les positions des étoiles; mais ils étoient contraires à ceux qu'auroit dû produire la parallaxe du grand orbe: on n'en connoissoit point la cause, & on les désignoit sous le nom général d'*aberration apparente des étoiles fixes*. En 1725, M. Molyneux & M. Bradley s'appliquèrent à observer ces mouvemens avec plus de suite & plus de précision, qu'on n'avoit fait encore, mais toujours sans pouvoir en trouver l'explication.

An. 1727.

Enfin M. Bradley, d'après de nouvelles observations qu'il fit avec un excellent Secteur de Graham, conçut l'idée ingénieuse & vraie, que l'aberration apparente des étoiles étoit produite par la combinaison du mouvement progressif de la lumière avec le mouvement de la terre dans son orbite. Il y fut conduit par ce raisonnement: la Théorie de Roemer m'apprend que la vitesse de la lumière n'est pas instantnée, & qu'elle a un rapport fini, celui de 10000 à 1, à la vitesse de la terre dans son orbite; donc un rayon de lumière, parti d'une étoile, & apportant l'impression de cette étoile à mon œil, n'arrive qu'après que la terre a changé sensiblement de place depuis l'instant où il est parti: ainsi, quand mon œil reçoit le coup, il doit rapporter l'étoile à un endroit différent de celui où il l'auroit rapportée, si j'avois toujours conservé la même place. Rien de plus clair & de plus conséquent. Aussi, avec cette clef, tous les phénomènes de l'aberration s'expliquent d'une manière simple, exacte & précise. Il en est résulté en même tems la démonstration physique la plus complète du mouvement de la terre, & de la propagation successive de la lumière.

Nutation de
l'axe de la terre.

M. Bradley observa encore, dans les étoiles fixes, un petit mouvement apparent, dont il rendit raison avec le même succès, en attribuant, conformément aux principes de la gravitation universelle, un balancement ou une *nutation* à l'axe de la terre par rapport au plan de l'écliptique. La quantité moyenne de la nutation est d'environ neuf secondes, & sa période s'achève en 18 ans. Cette découverte n'est pas moins importante que celle de l'aberration; & toutes deux placent M. Bradley au rang des Astronomes du premier ordre.

Physique
écrite.

Si l'Angleterre a jeté les fondemens de la véritable Physique céleste, en découvrant le principe & la loi de la gravitation univer-

selle, l'Allemagne & la France ont, en grande partie, élevé l'édifice. La tendance d'une planète vers le soleil étant supposée proportionnelle au carré inverse de la distance, la planète décrit une ellipse, dont le soleil occupe le foyer ; & son mouvement doit se conformer exactement aux loix astronomiques de Kepler. Mais les observations faites avec une grande précision apprennent que le mouvement elliptique & les conséquences qui en résultent ; n'ont pas lieu en rigueur. Chaque planète, principale ou secondaire, éprouve non-seulement l'attraction du soleil, ou de la planète principale, mais encore les attractions de toutes les autres planètes. Or ces dernières forces, moins considérables, à la vérité, que la première, peuvent néanmoins en altérer l'effet d'une manière sensible ; & , pour connoître la vraie courbe que décrit une planète principale ou un satellite, il faut avoir égard à toutes les forces dont cet astre est animé, en se permettant seulement de négliger, pour la simplicité du calcul, celles dont l'influence est comme infiniment petite. Newton a donné quelques essais sur les effets de l'attraction, considérés avec cette généralité ; mais l'Analyse n'avoit pas fait, de son tems, d'assez grands progrès pour traiter ces problèmes avec la précision que les Géomètres de nos jours y ont apportée.

La première question qu'ils aient ainsi approfondie, suivant les principes de l'attraction newtonienne, est celle du flux & reflux de la mer, que l'Académie des Sciences proposa pour sujet du prix de l'année 1740. MM. Daniel Bernoulli, Maclaurin & Euler partagèrent ce prix. Leurs pièces, excellentes à divers égards, contiennent une explication complète des marées comme produites par les attractions de la lune & du soleil.

AN. 1740.

Il en est de l'atmosphère comme de la mer ; les attractions du soleil & de la lune, qui produisent le flux & reflux des eaux, doivent exciter de semblables mouvemens dans la masse de l'air. L'examen de ces derniers mouvemens est l'objet d'une pièce de M. d'Alembert sur la cause générale des vents. Cet ouvrage est remarquable par la solution de plusieurs nouveaux problèmes, & sur-tout parce qu'on y trouve les premiers germes du calcul intégral aux différences partielles.

AN. 1746.

C'est encore aux soins de l'Académie des Sciences qu'on doit la Théorie générale du mouvement des planètes, en faisant entrer dans le calcul tous les élémens du problème. Elle proposa pour sujet du prix de l'année 1748 la recherche des mouvemens de Jupiter & de Saturne. M. Euler remporta ce prix. Sa pièce contient une profonde analyse & plusieurs séries d'une espèce absolument

nouvelle. Il perfectionna encore ses Méthodes dans une pièce qui remporta le prix de l'année 1752, sur le même sujet.

Pendant qu'on s'occupoit de cette question, le même M. Euler, M. Clairaut & M. d'Alembert examinoient le mouvement de la lune. Tous trois reconnurent que l'attraction Newtonienne rendoit raison des principaux mouvemens de cette planète : cependant une difficulté les arrêta quelque tems. Un premier calcul approché ne donnoit pour le mouvement de l'apogée de la lune, qu'environ la moitié de ce qu'il est en effet. Cette différence entre la Théorie & l'observation fit beaucoup de bruit. On crut d'abord, & les Cartésiens en triomphoient déjà, que le système de l'attraction Newtonienne alloit être renversé. M. Clairaut, partisan de ce système, mais plus amateur encore de la vérité, annonça dans une assemblée publique de l'Académie des Sciences que la loi du quarré inverse des distances lui paroissoit insuffisante pour rendre une entière raison des inégalités de la lune. Mais un examen plus attentif de ses calculs, lui fit appercevoir qu'il n'avoit pas poussé assez loin l'approximation de la série qui représentoit le mouvement de l'apogée : ayant mis dans cette opération l'exactitude nécessaire, il trouva l'autre moitié du mouvement de l'apogée. M. d'Alembert & M. Euler firent, chacun de leur côté, la même remarque. Alors l'attraction Newtonienne fut rétablie avec honneur dans les espaces célestes, d'où les Cartésiens avoient espéré de la voir bannir.

An. 1747.

Mayer, né en
1720, mort en
1761.

M. Mayer dressa, en partie sur la Théorie de M. Euler, en partie sur les observations, de nouvelles Tables de la lune, plus exactes que toutes les précédentes. M. Clairaut en construisit aussi de très-bonnes, sur sa propre Théorie.

On a soumis par degrés aux loix de l'attraction Newtonienne le mouvement de toutes les planètes principales, & celui des satellites. M. Euler a porté, à différentes reprises, la Théorie de la lune à un point de perfection que l'on ne passera guères, à moins qu'il n'arrive dans l'Analyse quelque révolution qui en recule considérablement les limites.

Les mêmes principes ont été appliqués au mouvement des comètes. On sait que ces astres décrivent autour du soleil des orbites très-excentriques. Quand ils passent dans le voisinage d'une planète considérable, leur mouvement est altéré par l'attraction qu'elle exerce sur eux. C'est ainsi que les attractions de Jupiter & de Saturne ont troublé le mouvement de la comète de 1759. M. Clairaut avoit prédit, par sa Théorie, le moment du passage de cette comète au périhélie; & son calcul s'est trouvé, à moins d'un mois près, d'accord

avec l'observation : résultat qu'on peut regarder comme fort juste, eu égard à l'incertitude de plusieurs élémens du problème. M. d'Alembert & M. Euler ont aussi publié de très-belles recherches sur le mouvement des comètes.

On doit à M. d'Alembert la solution d'un autre problème alors très-difficile : c'est celui de la précession des équinoxes, & de la nutation de l'axe de la terre dans le système Newtonien. Il falloit que l'Auteur, après avoir soumis la question aux loix de l'équilibre, au moyen de son principe de Dynamique, trouvât encore ces loix pour des forces de quantités & de directions quelconques : car, avant lui, on n'avoit guères considéré l'équilibre que pour des forces dirigées dans un même plan. Les recherches de M. d'Alembert sur cette matière ont produit une révolution dans la Méchanique : elles ont été successivement perfectionnées & généralisées, soit par lui-même, soit par d'autres Géomètres. M. Euler est celui qui a le plus étendu cette branche de la Méchanique. Il a donné en général les équations du mouvement d'un corps sollicité par des puissances quelconques ; il a exécuté des intégrations très-difficiles, & il en a tiré une foule de Théorèmes remarquables.

Comme un rayon de lumière, en se réfléchissant, fait toujours l'angle de réflexion égal à celui d'incidence, on suit facilement sa marche dans l'espace, quelque soit le nombre de réflexions. La construction des miroirs par réflexion, simples ou composés, n'a donc aucune difficulté. Il n'en est pas ainsi des verres par réfraction. Lorsqu'un rayon passe d'un milieu dans un autre, il change de route, de telle manière que les sinus de réfraction & d'incidence sont toujours entr'eux dans un rapport constant pour tous les angles relatifs à ces deux milieux ; mais ce rapport n'est pas le même pour deux autres milieux, & il doit être déterminé, dans chaque cas, par la voie de l'expérience. De plus, Newton a fait voir que la lumière n'est pas homogène ; qu'il existe sept espèces principales de rayons ; & que tous ces rayons, à raison d'une différence dans les masses ou dans les vitesses, ne font pas le même angle de réfraction pour le même angle d'incidence. De-là résulte un inconvénient : tous les rayons ne vont pas se réunir en un même point ; ils forment un foyer d'une certaine étendue que l'on appelle aberration de *réfrangibilité*. Il y a encore une aberration : celle de *sphéricité*, occasionnée par la forme sphérique des objectifs ; ce qui oblige à leur donner peu d'ouverture.

Ces obstacles à la perfection des lunettes dioptriques avoient tourné les vues des sçavans vers les miroirs par réflexion ; & on étoit parvenu

An. 1749.

Optique.

An. 1704.

à leur conférer à-peu-près tous les avantages dont ils sont susceptibles. Mais on ne fut pas long-tems à remarquer qu'il se perd plus de rayons par la réflexion du miroir de métal, le plus poli, que par la réfraction des verres dioptriques; & qu'ainsi ces verres seroient préférables aux miroirs par réflexion, si l'on pouvoit donner une plus grande ouverture aux objectifs, & détruire en même tems les couleurs produites par la diverse réfrangibilité des rayons.

Newton proposa de corriger l'aberration de sphéricité, en composant l'objectif de deux verres entre lesquels il y auroit de l'eau. Il pensoit aussi à détruire l'aberration de réfrangibilité, par un moyen semblable; mais la proportion qu'il trouva, par l'expérience, entre les différentes réfrangibilités pour différens milieux, lui fit conclure que cette destruction étoit impossible.

Malgré une autorité si imposante, M. Euler se persuada fortement que l'aberration de réfrangibilité pouvoit être anéantie par la combinaison de plusieurs matières diaphanes: il citoit en exemple l'œil humain, où les rayons, après avoir traversé les différentes humeurs dont il est composé, vont se réunir en un même foyer. Il éleva des doutes sur l'exactitude de l'hypothèse que Newton avoit adoptée, d'après ses expériences, sur la proportion des réfrangibilités des rayons pour différens milieux: il en proposa une autre, plus plausible en apparence, mais dénuée elle-même de preuves suffisantes, & sujette à l'inconvénient de donner une trop grande courbure aux lentilles. M. Dollond, célèbre Opticien anglois, aussi savant dans la théorie que dans la pratique de son art, attaqua le sentiment de M. Euler, auquel il opposoit le nom & les expériences de Newton, avec de nouveaux raisonnemens appuyés sur ces mêmes expériences. La question demeurait à ces termes, lorsque M. Klingenstierna fit voir, par des raisons métaphysiques & géométriques, l'incertitude, pour ne pas dire la fausseté absolue, de l'hypothèse de Newton. Alors M. Dollond reconnut la nécessité de faire de nouvelles expériences; il en fit, & il trouva que Newton s'étoit trompé en effet. Sans adopter certaines formules de M. Euler, qui lui paroisoient trop hypothétiques, il convint que le fond de son projet étoit vrai, & pouvoit se réaliser. Mais, au lieu de combiner ensemble du verre & de l'eau dans la construction des lunettes, ce qui avoit plusieurs inconvéniens, il employa deux espèces différentes de verres connus en Angleterre sous les noms de *finiglass* & *crown glass*; & il parvint à construire des lunettes *achromatiques*, dont l'effet étoit très-supérieur à celui des lunettes ordinaires.

Les expériences de M. Dollond donnèrent lieu à MM. Euler;

Clairaut, d'Alembert, &c, de chercher, par la Théorie, les dimensions des objets qu'il avoit employés. Leurs méthodes s'étendent à un nombre quelconque de verges. Toutes ces recherches demandoient beaucoup de sagacité, & d'adresse à manier le calcul. M. Euler a rassemblé ses principales idées en un corps d'ouvrage; & c'est le Traité de Dioptrique le plus clair, le plus profond & le plus complet qui ait encore paru. On doit à ce grand homme la révolution que les lunettes achromatiques ont opérée dans l'Optique.

L'Algèbre n'a pas encore pu résoudre, en général, les équations qui passent le quatrième degré. En 1683, Tschirnhaus proposa sur cet objet une méthode qui consistoit à faire disparaître tous les termes intermédiaires au premier & au dernier. Sans remplir les vues générales de l'Auteur, elle donne en effet la résolution de plusieurs équations de tous les degrés: on l'a développée & perfectionnée de notre tems. Tschirnhaus s'est principalement rendu célèbre par la découverte des caustiques par réflexion & par réfraction:

Cotes a trouvé, dans les propriétés du cercle, un moyen très-ingénieux de décomposer en facteurs un binôme dont les termes sont des puissances semblables de deux quantités. Cette Théorie a été étendue par M. de Moivre à des formules plus générales: il décompose en facteurs, ou il abaisse à un degré inférieur les équations ou les polynômes de tous les degrés, lorsque les termes également éloignés des extrêmes sont affectés des mêmes coefficients.

La Théorie des suites ne lui a pas moins d'obligations. Il a observé le premier la nature & la formation des suites récurrentes: il y fut conduit par des problèmes relatifs à l'Analyse des jeux de hasard. M. Daniel Bernoulli, M. Euler, &c, ont fait diverses autres applications très-belles de ces suites.

L'art d'éliminer les inconnues, ou de réduire les équations d'un problème au plus petit nombre possible, est une partie essentielle de l'Analyse. Plusieurs Géomètres s'en sont occupés. M. Cramer l'avoit déjà fort simplifiée. M. Bezout en a fait l'objet d'un savant Traité, où il a porté la matière beaucoup plus loin qu'elle ne l'avoit été encore.

C'est principalement dans la Géométrie mixte qu'on reconnoît l'usage & la fécondité des Théories analytiques. Ici je suis forcé plus que jamais de me contenir: car il me faudroit un espace très-étendu, si je voulois rapporter avec quelque détail les découvertes qu'on a faites en ce genre. Je ne citerai donc pas l'énumération des lignes du troisième ordre par Newton, ni les méthodes ingénieuses de Stirling pour les interpolations des séries & pour les quadratures des

Analyse.

Tschirnhaus, né en 1651, mort en 1708.

Cotes, né en 1650, mort en 1722.

Moivre, né en 1666, mort en 1754.

Cramer, né en 1704, mort en 1752.

Bezout, né en 1730, mort en 1783.

AN. 1790.

courbes, ni l'Analyse des courbes algébriques de M. Crâmet, ni un semblable ouvrage de M. Euler, &c. Je passerai sous silence, dans un autre genre, les méthodes de MM. Jean Bernoulli, Maupertuis Nicole, pour trouver des courbes rectifiables sur la surface de la sphère, l'extension que M. Euler a donnée à ce problème, les recherches du même Auteur sur les trajectoires réciproques, sur la courbure des surfaces, & sur une infinité d'autres objets dont il a enrichi les actes de Leipfick, les Mémoires des Académies de Berlin & de Petersbourg, &c. Mais je dois un peu plus d'attention à quelques Théories générales, qui, par leur usage ou leur difficulté, forment des points remarquables dans la chaîne des vérités Mathématiques.

De ce genre est le calcul des sinus & des cosinus, inventé par M. Euler. La simplicité de ce calcul & l'Algorithme commode auquel l'Auteur l'a soumis, facilitent la solution de certains problèmes que l'on seroit quelquefois obligé d'abandonner, si on vouloit employer les sinus & les cosinus sous leur forme ordinaire, ou même sous la forme exponentielle.

La Méthode que le même Géomètre a donnée pour résoudre le problème des isopérimètres dans le sens le plus étendu, est un effort de génie, aussi admirable par le fond des principes, que par l'adresse & la sagacité avec lesquelles l'Auteur attaque & surmonte les difficultés d'Analyse. Il manquoit cependant encore à cette Méthode un degré de perfection, qu'un autre Géomètre y a donné : M. Euler a reconnu, en grand Homme, les avantages de la nouvelle solution, & lui-même s'est appliqué à la présenter dans son plus beau jour.

Ann. 1754.

Le Comte de Fagnani, Géomètre Italien, s'est illustré par une découverte que Jean Bernoulli & Leibnitz regardoient, sinon comme impossible, au moins comme supérieure à l'Analyse de leur tems : il détermine, avec un art très-ingénieux & très-adroit, des arcs d'ellipse ou d'hyperbole, dont la différence est égale à une quantité algébrique. M. Euler a depuis fort enrichi cette nouvelle branche de la Géométrie.

Toutes les parties du calcul intégral ont fait, de notre tems, des progrès qui étonneroient les premiers inventeurs, s'ils pouvoient en être les témoins. Il n'y a pas de Géomètre d'un certain nom, qui n'y ait contribué. M. d'Alembert a donné les Elémens du calcul intégral aux différences partielles : car cette nouvelle Analyse porte essentiellement sur la nécessité & la manière, qu'il a expliquées, d'introduire des fonctions arbitraires dans les intégrations des formules

aux

aux différences partielles. M. Euler a présenté cette Théorie sous une forme si claire & si commode pour les calculs analytiques, que plusieurs Géomètres lui attribuent toute la gloire de l'invention. Leur zèle pour lui va un peu trop loin, & ne respecte pas assez les droits de M. d'Alembert. Mais les hommes justes & indifférens reconnoissent d'ailleurs que M. Euler a porté en général la Science de l'Analyse proprement dite à un si haut degré, que personne ne peut lui disputer la prééminence dans cette partie.

On le rencontre sans celle, soit comme Inventeur, soit comme Promoteur de toutes les Théories Mathématiques. Ainsi, dans l'Analyse dont il est ici question, on distingue ses recherches sur les intégrales qui doivent répondre à des points déterminés. On cite également l'extension qu'il a donnée au calcul intégral aux différences finies, dont Taylor & Nicole n'avoient fait qu'indiquer & exposer les élémens, & qui depuis ce tems-là paroïssoit entièrement oublié. C'est une nouvelle branche de l'Analyse, importante par sa difficulté & par ses applications à la Théorie des suites & à celle des probabilités. Elle a fort occupé & elle occupe encore plusieurs Géomètres vivans, parmi lesquels il s'en trouve un qui, à des talens du premier ordre pour les Sciences, joint celui d'écrire comme Tacite & Voltaire.

S'il est des problèmes qui demandent une profonde méditation & toute la Science du calcul, il en est d'autres qui, tenant à la finesse de l'esprit & à une Métaphysique subtile, sont quelquefois aussi difficiles à résoudre que les premiers, lorsqu'on veut employer tous les Elémens essentiels à la question, & apprécier exactement l'influence que chacun d'eux peut avoir sur le résultat. On en trouve des exemples dans plusieurs questions de Géométrie ou de Méchanique : c'est aux différentes manières d'envisager le problème des cordes vibrantes, qu'il faut attribuer les disputes qu'il a excitées entre MM. Daniel Bernoulli, Euler & d'Alembert. La même diversité dans les principes a conduit M. Daniel Bernoulli & M. d'Alembert à donner souvent des solutions très-oppoées de problèmes qui appartiennent à la Théorie des jeux de hasard & à celle de l'inoculation de la petite vérole : mais, de quelques suppositions qu'ils soient partis, on admire toujours leur marche.

TEL EST LE TABLEAU très-abrégé des progrès que les Mathématiques ont faits pour arriver à l'état où elles se trouvent aujourd'hui. Les grands Hommes, dont nous avons exposé les principales découvertes, ont laissé plusieurs dignes successeurs qui, réunissant

Tome. I. Mathématiques.

P

CONCLUSION.

le génie, le goût de l'étude & l'amour de la gloire, ajouteront encore de nouvelles connoissances au dépôt qu'ils ont reçu. Pourroient-ils en effet repousser les succès & les honneurs qui les attendent ? Si la carrière devient tous les jours plus difficile, & si, à mesure qu'on avance, l'empreinte des pas est moins sensible aux yeux du vulgaire : les vrais Juges savent mesurer l'effort à la résistance, & distribuer avec impartialité les biens de l'opinion, entre les morts qui ne sont plus à craindre, & les vivans dont ils ne redoutent pas davantage la vanité ou les prétentions ; parce que la justice est toujours courageuse, & qu'elle doit compte de ses arrêts à la postérité.

F I N.



ERRATA.

Au lieu de miroir, lisez verre, page 28, lig. 40; & pag. 29, lig. 4.

ABATTEMENT;



ABAISSEMENT, *f. m.* (*Alg.*) On appelle *abaissement* d'une équation, la réduction de cette équation à la forme la plus simple, dont elle est susceptible. Par exemple, l'équation $x^4 + nx^3 + px = 0$, qui paroit être du 4^e degré, s'abaisse au 3^e & devient $x^3 + nx^2 + p = 0$, en divisant tout par $x = 0$. De même l'équation $x^4 + ax^3 - 5a^2x - 2a^3 = 0$, se décompose (*Voyez* DIVISEUR COMMENSURABLE) en ces deux-ci : $x - 2a = 0$, $x^3 + 3ax + a^3 = 0$; & par conséquent elle s'abaisse réellement au premier degré, ou au second.

Dès, *abaïsser une équation*, & *reduire une équation à sa forme la plus simple*, sont des expressions synonymes.

En géométrie, on dit *abaïsser* une perpendiculaire d'un point placé hors d'une ligne, sur cette ligne; & alors le mot *abaïsser* veut dire *mener*.

ABAISSEMENT de l'horizon visible, est la quantité dont l'horizon visible est abaissé au-dessous du plan horizontal qui touche la terre. Pour faire entendre en quoi consiste cet *abaissement*, soit *T* le centre de la terre (*Fig. 27. Astronom.*) & *BSC* le cercle ou globe de la terre. Ayant tiré d'un point quelconque *O* élevé au-dessus de la surface du globe, les tangentes *OB*, *OC* & la ligne *OT*, il est évident qu'un spectateur, dont l'œil seroit placé au point *O*, verroit toute la portion *BSC* de la terre terminée par les points touchans *B* & *C*; de sorte que le plan qui passe par *BC* est proprement l'horizon du spectateur placé en *O*. *Voyez* HORIZON.

Ce plan est abaissé de la quantité *SG*, au-dessous du plan horizontal qui touche la terre en *S*, & si la distance *SO* est très-petite par rapport au rayon de la terre, la ligne *OS* est presque égale à la ligne *SG*. Donc, si l'on a la distance *SO*, ou l'élevation de l'œil du spectateur, évaluée en pieds, on trouvera facilement le sinus versé *SG* de l'arc *BS*. Par exemple, soit *SO* = 5 pieds, le sinus versé *SG* de l'arc *BS* sera donc de 5 piés, le sinus total ou rayon de la terre étant de 19200000 piés en nombre ronds; ainsi, on trouvera que l'arc *BS* est d'environ deux minutes & demie; par conséquent l'arc *BSC* sera de cinq minutes; & comme un degré de la terre est de 25 lieues, il s'ensuit que, si la terre étoit parfaitement ronde & une fois aucune éminence, un homme de taille ordinaire devroit découvrir à la distance d'environ une lieue à la ronde, car la courbure de la terre pour 2400 toises, est de 5 piés 3 pouces; à la hauteur de 20 piés, l'œil devroit découvrir à 2 lieues à la ronde; à la hauteur de 50 piés, 5 lieues, ou plus exactement 7382 toises; pour voir à un degré de distance ou 75069 toises, il faudroit être élevé de 2988 piés.

Les montagnes sont quelquefois que l'on découvre *Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.*

plus loin ou plus près que les objets précédentes. Par exemple, une montagne placée entre *O* & le point *B*, empêcheroit le spectateur *O* de voir la partie *B*; & au contraire, une montagne placée au-delà de *B*, seroit que ce même spectateur pourroit voir les objets terrestres situés au-delà de *B*, & placés, sur cette montagne, au-dessus du rayon visuel *OB*.

ABAISSEMENT des planètes par l'effet de la parallaxe, (*Astron.*) c'est la quantité dont nous les voyons nécessairement plus basses que si nous étions placés au centre de la terre, ou il faudroit être pour voir les mouvements célestes plus uniformes. Cet *abaissement* est de plus d'un degré pour la lune dans certains cas; on ne peut faire usage d'aucune observation qu'on ne la corrige par l'effet de cet *abaissement*. *Voyez* PARALLAXE.

ABAISSEMENT des signaux, (*Astronomie.*) Lorsque, pour mesurer la grandeur de la terre, les astronomes ont été obligés de former de grands triangles, & de placer des marques ou *signaux*, à de très-grandes distances, pour y appuyer leurs triangles, l'*abaissement de ces signaux* au-dessous de l'horizon rationnel, rendoit l'observation des angles plus difficile, & le calcul beaucoup plus long; on doit même y faire attention dans l'arpentage & en levant des cartes topographiques. On trouvera cette matière savamment discutée dans les ouvrages qu'on donne, sur la mesure de la terre, Bouguer, la Condamine, & M. Boïovich. (*M. DE LA LANDE.*)

ABAISSEMENT du cercle crépusculaire, (*Astronomie.*) c'est la quantité dont le soleil est abaissé au-dessous de l'horizon, lorsque le crépuscule du soir est totalement fini, ou lorsque l'aurore commence; c'est-à-dire, quand on commence à voir les plus petites étoiles le soir après le coucher du soleil, ou qu'on cesse de les voir le matin. Suivant l'opinion commune, cet *abaissement* est de dix-huit degrés, ou de la vingtième partie du tour du ciel; mais ces dix-huit degrés doivent se mesurer perpendiculairement sous l'horizon, le long d'un cercle vertical, qui passe par le zénith & le nadir, & par le centre du soleil; il ne doit pas se mesurer le long du cours oblique du soleil. Le tems que le soleil emploie à descendre de dix-huit degrés, ou à parvenir à l'*abaissement* du cercle crépusculaire, est au moins d'une heure douze minutes; mais il est plus long pour un observateur qui n'est pas placé sous la ligne équinoxiale, & dans tous les cas où le soleil n'est pas précisément dans l'équateur. *Voyez* CRÉPUSCULE. (*M. DE LA LANDE.*)

L'*abaissement d'une étoile sous l'horizon* est mesuré par l'arc d'un cercle vertical, qui se trouve au-dessous de l'horizon, entre cette étoile & l'horizon. *Voyez* ÉTOILE, VERTICAL.

ABAISSEMENT du Pole. Autant on fait de chemin en degrés de latitude, en allant du pôle vers l'équateur, autant est grand le nombre de degrés dont le pôle s'abaisse, parce qu'il devient continuellement plus proche de l'horizon. *V. HAUTEUR du Pole.*

ABAQUE, f. f. (*Arith. & Géom.*) table sur laquelle les premiers mathématiciens faisoient leurs calculs, ou traçoient leurs figures; c'étoit originellement une planche bienunie que l'on couvrait de poussière, & qui par-là étoit propre à recevoir toutes sortes d'empreintes: témoins Marcus Capella & ce passage de Perse, *Sat. l. v. 131: Nec qui abaco numeros, & scido in pulvere metas*

Scit rissit vaser.

On employa ensuite, pour les comptes & les calculs, une espèce de quadre long & divisé par plusieurs cordes d'airain, parallèles entr'elles, qui enfiloient chacune une même quantité de petites boules d'ivoire ou de bois, mobiles comme des grains de chapellets: ces petites boules, par l'arrangement qu'on leur donnoit, & par la correspondance des inférieures avec les supérieures, représentoient tous les nombres, & servoient à faire toutes sortes de calculs. Cette manière de calculer, usitée parmi les Grecs, fut aussi connue & employée parmi les Romains. Peu à peu elle fut abandonnée, & on trouva plus court de compter avec des jetons. A la Chine, & dans quelques cantons de l'Asie, les négociants comptent encore avec de petites boules d'ivoire ou d'ébène, enfilées dans un fil de laiton, qu'ils portent accroché à leur ceinture.

L'abaque de Pythagore, est ce qu'on appelle aujourd'hui la *table de multiplication*. *Voyez MULTIPLICATION.*

ABATRE du bois au tréflac, c'est étaler beaucoup de dames de dessus le premier tas, pour faire plus facilement des cases dans le courant du jeu. *Voyez CASE.*

ABE, f. f. ouverture pratiquée à la baie d'un moulin, par laquelle l'eau tombe sur la grande roue & fait mouvoir. Cette ouverture s'ouvre & se ferme avec des pales ou lambris.

ABEILLE. (*Astronomie.*) constellation méridionale: on l'appelle aussi *mouche indienne*; en latin *Musca* ou *Apis*; on ne la voit point en Europe. Elle ne renferme que quatre étoiles remarquables, dont trois sont de la quatrième grandeur; les autres sont plus petites. La principale étoile est marquée dans le *Catalogue d'étoiles* de l'abbé de la Caille, pour 1750, à 185° 38' 44" d'ascension droite, & à 67° 45' 19" de déclinaison australe. *Voyez CONSTELLATION. (M. DE LA LANDE.)*

ABENEZRA, c'est un des noms de la belle étoile du taureau. *Voyez ALDEBARAN.*

ABERRATION, (*Astronomie.*) changement apparent dans la situation des étoiles, par lequel elles paroissent éloignées, quelquefois de 20

secondes, de leur véritable situation, par un effet du mouvement annuel de la terre combiné avec le mouvement de la lumière. La découverte de l'*aberration* étant une des plus singulières que l'on ait faites en astronomie, & la plus intéressante de ce siècle-ci, il importe à l'histoire des progrès de l'esprit humain de faire voir comment Bradley a dû y parvenir. On étoit persuadé, avant les observations de Picard, faites en 1672, que les étoiles ne changeoient point de position pendant le cours d'une année. Tycho-Brahé & Riccioli croyoient s'en être assurés par leurs observations; ils en concluoient que la terre ne tournoit point autour du soleil, puisqu'il n'y avoit point de *parallaxe annuelle* dans les étoiles. *Voyez PARALLAXE annuelle.* Picard, dans la relation de son voyage d'Uranibourg, fait en 1672, dit que l'étoile polaire, en divers tems de l'année, a des variations de quelques secondes, qu'il observoit depuis environ dix ans. Les savans, qui étoient déjà convaincus du mouvement de la terre, étoient portés à en conclure que ces variations étoient l'effet de la *parallaxe annuelle* ou *parallaxe du grand orb.*

Flamsteed crut, d'après les observations & celles que le docteur Hook avoit publiées, qu'il y avoit réellement une *parallaxe annuelle* dans les étoiles, Cassini & Manfredi soutinrent qu'il n'y en avoit point; mais il étoit impossible de démêler la nature & les causes des variations annuelles qu'on appercevoit dans la position des étoiles, à moins qu'on n'en déterminât les circonstances par des observations très-exactes & très-multipliées. C'est ce qu'entreprit, en 1725, un riche particulier d'Angleterre, nommé Samuel Molyneux, amateur des sciences; il fut heureusement secondé par Graham, cet horloger célèbre dans les arts & même dans les sciences, qui fit construire un scéléur de vingt-quatre piés de rayon, avec lequel une seule seconde étoit sensible. Cet instrument fut placé à Kew; on y observa l'étoile γ du dragon, & l'on ne tarda pas à reconnaître que les variations de cette étoile étoient tout-à-fait opposées à celles que produiroit la *parallaxe annuelle*.

Suivant les loix de cette *parallaxe*, une étoile située au pôle de l'écliptique, paroîtroit décrire, dans une année, un petit cercle parallèle à l'orbite de la terre, mais dont elle paroîtroit toujours occuper la partie opposée à celle où se trouve la terre; ce phénomène étoit tout différent dans les nouvelles observations. Bradley, qui avoit observé avec Molyneux, se trouva fort embarrassé pour assigner une cause à ce nouveau phénomène. Sa première idée fut d'examiner si cela ne prouvoit point quelque mutation dans l'axe de la terre, produite par l'action du soleil ou de la lune, à cause de l'aplatissement de la terre, ainsi que cela devoit avoir lieu par l'attraction. *Voyez PRÉCESSION & NUTATION.* Mais d'autres étoiles, observées en même tems, ne permettoient pas d'adopter cette hypothèse. Une petite étoile, qui étoit à même

distance du pôle, & opposée en ascension-droite à 7 du dragon, auroit dû avoir, par l'effet de cette mutation, le même changement en déclinaison; cependant elle n'en avoit en environ que la moitié, comme cela parut en comparant jour par jour les variations de l'une & de l'autre, observées en même tems; c'étoit la trente-cinquième étoile de la giraffe dans le catalogue britannique.

Bradley remarquoit que les changements de déclinaison de cette étoile, par rapport à son lieu moyen, étoient comme les sinus des distances du soleil au solstice; cela sembloit indiquer un rapport avec le mouvement de la terre. Mais il falloit des observations sur un plus grand nombre d'étoiles, pour savoir si cette règle étoit constante. Bradley fit donc faire un autre secteur en 1717; il observa beaucoup d'étoiles, & il reconnut que la règle précédente n'avoit lieu que pour les étoiles qui répondoient au solstice; mais une règle générale, qui ne pouvoit guère lui échapper, étoit que chaque étoile paroïssoit stationnaire, ou dans son plus grand éloignement, vers le nord ou vers le sud, lorsqu'elle passoit au zénit vers six heures du soir ou du matin; que toutes les étoiles avançaient d'un jour à l'autre vers le sud, lorsqu'elles passaient le matin, & vers le nord, lorsqu'elles passaient le soir, & que le plus grand écart étoit à-peu-près comme le sinus de la latitude de chacune. Enfin, lorsqu'au bout d'une année, il eut vu toutes les étoiles reparoître, chacune au même lieu où elle avoit d'abord paru, Bradley, muni d'un assez bon nombre d'observations, s'occupa à trouver la cause de ces variations.

Il avoit reconnu que le plus grand effet du nord au sud étoit comme le sinus de la latitude de chaque étoile; que, lorsqu'une étoile passoit au méridien à six heures, elle paroïssoit ou le plus haut, ou le plus bas; elle étoit alors à 90° de l'endroit où elle auroit dû être; suivant les loix de la parallaxe annuelle. Delà il étoit naturel de conclure que l'étoile en opposition seroit la plus orientale, au lieu d'être la plus méridionale, comme l'auroit exigé la parallaxe.

Soit ABC l'orbite de la terre (fig. 132 d'*Astronomie*).; EG , le rayon vrai de l'étoile; BE , un rayon incliné de 20° vers l'orient, pour marquer le lieu apparent de l'étoile; car Bradley avoit déjà reconnu que la plus grande aberration étoit d'environ 20°. On favoit, par la découverte de Roemer, que la lumière employoit environ un demi-quart d'heure à parcourir un espace EG , égal au rayon de l'orbite terrestre. Voyez PROPAGATION de la lumière. Or un arc BG de 20°, sur l'orbite terrestre, exige aussi environ un demi-quart d'heure; ainsi, il étoit clair que la vitesse EG de la lumière, & la vitesse BG de la terre formoient les deux côtés d'un parallélogramme, dont le rayon visuel BE étoit la diagonale, & faisoit un angle de 20°. Bradley dut donc penser qu'il y avoit quelque rapport entre le mouvement de la terre & le mouvement de la lumière, qui pouvoit faire paroître

les étoiles dans l'endroit où l'on devoit les voir un quart-d'heure plutôt. Enfin il eut l'idée heureuse de combiner le mouvement de la lumière avec celui de la terre, suivant les loix de la décomposition des forces; il essaya cette hypothèse, & voyant qu'elle s'accordoit parfaitement avec toutes les observations, il rendit compte de la découverte au mois de décembre 1718, dans une lettre au docteur Halley, *philosophical transactions*, n.° 406; il essaya son hypothèse sur un grand nombre d'étoiles; il les trouva d'accord dans tous les tems de l'année, presque toujours dans la même seconde que l'observation.

Nous allons expliquer comment cette aberration est produite par le mouvement de la terre. Soit E une étoile, fig. 133, placée à une distance prodigieuse, CB le chemin que fait le rayon de l'étoile en un quart-d'heure de tems, AB le chemin que la terre fait en même tems sur son orbite, qui est 1313 fois moindre, en sorte que l'angle BCA soit de 20 secondes: le corpuscule de lumière B vient frapper notre œil avec la vitesse CB ; mais, puisque l'œil en même tems va de A en B avec la vitesse AB , il vient aussi frapper le rayon, en sorte qu'il y a un double choc tout à-la-fois; celui de la lumière qui vient contre l'œil avec la vitesse CB ; celui de l'œil qui va contre la lumière avec la vitesse AB . A la place de ce dernier choc, on peut imaginer, sans rien changer à l'effet qui en résulte, que le corpuscule soit venu de F en B frapper l'œil avec une vitesse FB , égale à AB ; ainsi, l'œil reçoit une impression suivant CB , & une suivant FB . De ces deux impressions faites suivant les côtés CB , & FB du parallélogramme CF , il résulte une impression unique & composée, qui se fait sentir suivant la diagonale DB ; donc l'on appercevra l'étoile dans la direction BD , ou dans la direction AC , qui lui est parallèle, & non dans la direction BCE du véritable rayon.

M. Bradley, M. d'Alembert & M. Clairaut présentent, chacun à leur manière, cette composition des forces; on les verra toutes dans mon *Astronomie*, & celle que je viens d'expliquer me paroît la plus facile à concevoir; mais des exemples familiers seront peut-être encore mieux comprendre le mécanisme de ces impressions composées. Soit un vaisseau $GCEA$, fig. 134, qui va de droite à gauche; que, d'un angle C de ce vaisseau, on ait jeté une pierre à l'autre angle A , & que, dans le tems où elle a parcouru CA , le vaisseau ait avancé de la quantité CD ou AB ; celui qui est dans le vaisseau en A , se trouvera alors parvenu au point B , & sera frappé de la même manière que si le vaisseau n'avoit eu aucun mouvement; la pierre lui paroîtra venir de l'angle D , suivant DB , comme elle lui auroit paru venir de C , suivant CA , si le vaisseau eût été immobile. L'impression sera la même, puisque la relation du point C au point A , leur situation, leur distance, ne dépendent en aucune façon du mouvement du

vaifseau. Ce mouvement est commun à la pierre & au vaifseau, & il est nul par rapport au choc ; néanmoins, dans l'espace absolu, cette pierre est venue de *C* en *B* ; ainsi, elle a fait le même chemin réel qu'aurait fait une pierre qui, du rivage *R*, eût été jetée directement suivant *R C B*. Voilà donc deux pierres ; l'une qui vient du rivage *R*, & qui a parcouru la ligne *C B* ; l'autre qui est partie du point *C* du vaifseau, & qui a de même parcouru *C B* ; à cause du mouvement du vaifseau : or celle-ci s'est fait sentir suivant la direction *D B* ; donc celle qui aura été jetée du rivage *R*, se seroit fait sentir aussi suivant la direction *D B*, à celui qui, étant dans l'angle du vaifseau, se seroit trouvé transporté de *A* en *B*, tandis que la pierre venoit de *C* en *B*. Voyez COMPOSITION des forces.

Un fait dont les voyageurs font l'expérience, pourroit servir à ceux pour qui les notions de mécanique ne sont pas familières. Je suppose que, dans un tems calme, la pluie tombe perpendiculairement, & qu'on soit dans une voiture ouverte sur le devant : si la voiture est en repos, on ne reçoit pas la moindre goutte de pluie : si la voiture avance avec rapidité, la pluie entre sensiblement, comme si elle avoit pris une direction oblique : c'est une chose que chacun peut éprouver, & dont la raison est évidente ; le mouvement par lequel nous allons contre la pluie, fait que nous recevons celle qui est en l'air, avant qu'elle soit tombée ; & cela revient au même que si la pluie avoit pris une direction oblique, en suivant la diagonale d'un parallélogramme dont les côtés seroient la vitesse de la pluie de haut en bas, & la vitesse de la voiture horizontalement ou en avant.

On trouve dans la plupart des cabinets de physique, sur-tout à Amsterdam, une machine de Sicis, qui rend visible cette décomposition du mouvement. Un petit chariot mobile, par un ressort, roule sur le parquet d'une salle ; une balle placée au fond d'une cuvette est au-dessus d'un ressort ; une détente fait partir le ressort, & jette la balle en l'air, pendant que le chariot avance avec rapidité ; la balle s'élève & retombe ensuite ; & quoique le chariot ait avancé, elle retombe dans la même cuvette ou coquille, comme si cette coquille fût restée à la même place ; on distingue très-bien que la balle, au lieu de s'élever perpendiculairement, & de descendre verticalement, a décrit deux lignes obliques, ou deux branches d'une parabole, une en s'élevant, & l'autre en retombant sur le chariot, & qu'elle l'a accompagné dans sa course.

Ainsi, le mouvement de la balle est évidemment composé de deux mouvements, celui que le chariot avoit communiqué horizontalement à la balle, & celui que le ressort lui a donné de bas en haut ; la balle décrit la diagonale de ces deux directions, & cette diagonale est courbe, parce qu'une des deux vitesses est retardée, & ensuite accélérée, tandis que l'autre est uniforme, & qu'on a par con-

séquent une suite de diagonales qui sont différemment inclinées, parce que le rapport des côtés varie continuellement.

On doit être convaincu, par les démonstrations précédentes, qu'une étoile nous paroît toujours plus avancée du côté où nous marchons, & cela de la quantité de l'angle *B C A* (fig. 121) ; la valeur de cet angle dépend du rapport de la vitesse *A B* de la terre, à la vitesse *C B* de la lumière ; ce rapport est celui de 1 à 10312 ; ce qui donne un angle de 20', dans le cas où *C B* est perpendiculaire à *A B* ; ainsi, l'aberration sera toujours de 20', quand la route de l'œil sera perpendiculaire au rayon de l'étoile ; mais, lorsque le rayon de lumière *M F* (fig. 132), est incliné sur la route *F L* de l'œil, alors l'angle d'aberration *F M L* devient moindre ; il est alors mesuré par *L N*, au lieu d'être mesuré par le mouvement entier *F L* de la terre ; & parce *F L* est à *L N* comme le sinus de l'angle *N* est au sinus de l'angle *F*, il suit que l'aberration est comme le sinus de l'inclinaison du rayon *M F* sur la route de l'œil, c'est-à-dire, qu'il est égal à 20', multipliées par le sinus de l'angle que fait la route de l'œil avec le rayon de lumière ; enfin, si la ligne *F L* s'inclinoit jusqu'à se confondre avec la ligne *M F*, l'angle *M* s'évanouiroit, & il n'y auroit plus d'aberration, comme cela arrive quand la terre est en *C* : cela est évident, puisqu'alors le rayon de lumière arrive toujours sous la même direction que si la terre n'avoit point de mouvement.

Supposons maintenant que l'œil, au lieu d'avancer de *B* en *G*, aille de *D* en *H* ; en sorte que le rayon arrive en *H* en même tems que l'œil ; on verra, par le même raisonnement, que l'étoile paroît plus à droite, au lieu de paroître plus à gauche ; toujours l'aberration porte une étoile du côté où va la terre. Quand la terre est au point *G* de son orbite *G C D*, & ensuite au point *D*, elle paroît aller en deux sens opposés ; dans le premier cas, l'étoile est en opposition, & paroît à gauche du lieu moyen *E* ; dans le second cas, la terre allant de *D* en *H*, l'étoile est en conjonction avec le soleil, & paroît de 20 secondes à droite, c'est-à-dire, à l'occident du point *E*.

Quand nous avons supposé l'étoile au point *E*, nous n'avons pas prétendu dire que les étoiles n'étoient pas plus éloignées de nous que le soleil ; elles le sont deux cents mille fois plus : la lumière emploie peut-être trois ans à venir des étoiles jusqu'à nous ; mais, comme l'effet est toujours le même, nous ne pouvons nous en apercevoir ; nous ne pouvons juger que du tems qu'elle emploie à parcourir *E G*, parce que l'effet de cette partie étant successivement en plus & en moins, il devient sensible par cela même ; tout le reste ne peut s'apercevoir.

D'après les principes établis ci-dessus, on peut calculer l'effet de l'aberration sur la longitude & la latitude de différentes étoiles. L'aberration d'une

Étoile qui seroit située au pôle même de l'écliptique, est le plus simple de tous, & nous commencerons par celui-là, en faisant voir que l'étoile paroitra décrire un cercle de 40° de diamètre autour de son vrai lieu, c'est-à-dire, autour du pôle de l'écliptique. Le cercle $ABCD$ (fig. 122) représentant l'écliptique ou l'orbite de la terre, que l'on suppose circulaire, parce que la différence de ses diamètres est ici négligeable, concevons que le point P exprime le pôle de cette orbite; il faut le concevoir élevé perpendiculairement au-dessus du plan de la figure; autour du pôle P , on décrira un petit cercle, dont le diamètre est de 40° ; lorsque la terre est en A , & va de A vers B , l'étoile située au pôle de l'écliptique, paroitra 20° plus avancée du même côté, c'est-à-dire en a ; quand la terre sera en B , l'étoile paroitra en b , delà en c , d , & elle aura parcouru, dans l'espace d'un an, le petit cercle $abcd$, décrit autour du pôle de l'écliptique, toujours plus avancée de 90 degrés dans son petit cercle, que la terre ne l'est dans le sien, & ayant toujours 20° de moins en latitude, qu'elle n'auroit dans son vrai lieu, puisqu'elle est toujours éloignée de 20° du pôle de l'écliptique.

Pour les étoiles qui sont dans le plan même de l'écliptique, comme l'étoile E , le point G est celui où se trouve la terre quand l'étoile est en opposition, D le point où est la terre quand l'étoile est en conjonction avec le soleil; dans l'opposition, la terre allant de B en G , ou d'occident vers l'orient, l'étoile paroitra plus avancée de 20° vers l'orient, c'est-à-dire, que la longitude sera augmentée de 20° ; mais, dans la conjonction de la terre, allant dans un sens contraire, par rapport à l'étoile, c'est-à-dire, de D vers H , la longitude de l'étoile sera diminuée de 20° . Dans les quadratures, la terre étant en A & en C , l'aberration sera nulle, parce que le rayon qui se dirige à l'étoile, & qui est parallèle à GE , à cause de la grande distance des étoiles, devient la tangente de l'orbite, & la route de l'œil se confondant avec cette tangente, il n'y a plus d'aberration.

Pour trouver l'aberration en longitude hors des conjonctions ou des oppositions, c'est-à-dire, dans les situations intermédiaires, soit FL le petit espace de 20° , parcouru en $8'$ de tems par la terre, en un point de son orbite, qui est éloigné du point G de l'opposition de la quantité GL , soit MF le chemin de la lumière pendant le même tems, ML l'angle d'aberration; le rayon MF de l'étoile étant parallèle à la ligne EG , l'angle MLF ou l'angle LFN (car on peut prendre ici l'un pour l'autre, puisqu'ils ne diffèrent pas de 20°), ont pour mesure l'arc CF ; ainsi, l'angle d'aberration est égal à 20° sin. F , ou 20° sin. CF , ou 20° cos. FG . Donc l'aberration en longitude est proportionnelle au sinus de la distance à la quadrature, ou de la distance au point où elle est nulle ou proportionnelle au cosinus de la distance au point

où elle est la plus grande, distance que nous appelons l'argument d'aberration.

Ce que nous avons démontré pour l'aberration en longitude d'une étoile située dans le plan de l'écliptique, a lieu pour une étoile située au-dessus ou au-dessous de l'écliptique, à quelque latitude que ce soit. En effet, que l'on conçoive le point M du triangle d'aberration MFL , élevé au-dessus du plan de la figure, & dirigé en haut vers une étoile, la base LN demeurant toujours dans le plan de la figure, alors le mouvement de la terre, dans le sens de LN , ou vers la gauche, étant toujours le même, l'aberration, dans le sens de la longitude, ne changera pas; mais, pour le réduire à l'écliptique, il faudra le diviser par le cosinus de la latitude. Voyez RÉDUCTION à un grand cercle.

L'aberration en latitude peut se déduire des mêmes principes; car, en concevant le point M , relevé au-dessus du plan de la figure, le mouvement de la terre, dans la direction FN , produira l'aberration perpendiculairement à l'écliptique, c'est-à-dire, l'aberration en latitude; &, comme FN est proportionnelle au sinus de l'arc GF , ou à la distance à la conjonction, cette aberration en latitude ira en augmentant jusqu'à la quadrature, où elle sera la plus grande. Le rayon visuel est incliné sur le plan de l'écliptique; le mouvement de la terre, dans le sens perpendiculaire à ce rayon, devient plus petit à proportion du sinus de l'angle ou du sinus de la latitude; ainsi, la plus grande aberration en latitude est égale à 20° , multipliées par le sinus de la latitude de l'étoile, & elle augmente depuis les syzygies jusqu'aux quadratures, dans le même rapport que le sinus de l'arc parcouru par la terre, ou le sinus de la distance du soleil à l'étoile. Toutes ces règles sont expliquées beaucoup plus en détail dans mon *Astronomie*.

M. Bradley avoit joint lui-même à sa théorie des formules, pour calculer l'aberration des fixes en longitude, latitude, ascension droite & déclinaison: ces formules ont été démontrées en deux différentes manières, & réduites à un usage fort simple par M. Clairaut, dans les *Mémoires de l'Académie pour 1737*. Elles ont aussi été démontrées par Simpson, de la Société royale de Londres, dans un *Recueil de différens opusculs Mathématiques*, imprimé en Anglois à Londres 1740. Enfin M. Fontaine des Crues a publié, sur le même sujet, un traité à Paris en 1744. On ne peut en placer ici que le résultat. Chaque étoile paroît décrire dans le cours d'une année, par l'effet de l'aberration, une ellipse dont le grand axe est de 40° , & dont le petit axe perpendiculaire à l'écliptique, est de 40° , multipliées par le sinus de la latitude de l'étoile. L'extrémité orientale du grand axe marque le lieu apparent de l'étoile, le jour de l'opposition; & l'extrémité du petit axe, qui est la plus éloignée de l'écliptique, marque sa situation trois mois après, comme on le voit pour Arcturus & pour Sirius, dans les fig. 135 & 136,

où j'ai tracé les ellipses d'aberration, & marqué la place de l'étoile, pour le premier jour de chaque mois, au dehors de chaque ellipse.

La plus grande aberration est égale à 20'', divisées par le cosinus de la latitude; elle est la plus grande quand la longitude du soleil est égale à la longitude de l'étoile.

La plus grande aberration en latitude est égale à 20'', multipliées par le sinus de la latitude; elle est la plus grande soustractive quand la longitude du soleil surpasse de trois signes celle de l'étoile; ainsi, la latitude en sera diminuée avant l'opposition, ou vers la première quadrature, & augmentée après l'opposition, soit dans les étoiles boréales, soit dans celles dont la latitude est australe.

Pour trouver l'aberration en déclinaison, il faut commencer par calculer l'angle de position, ou l'angle du cercle de latitude & du cercle de déclinaison, qui passent par l'étoile; alors le sinus de la latitude de l'étoile est au rayon, comme la tangente de l'angle de position est à la tangente d'un arc, qui est la distance entre le lieu du soleil, au tems de la conjonction, c'est-à-dire le lieu même de l'étoile, & le lieu du soleil quand l'aberration en déclinaison est nulle. Ce lieu du soleil, augmenté de trois signes, est celui qui a lieu quand l'aberration en déclinaison est la plus grande. Pour avoir la quantité de cette plus grande aberration, on dira : le cosinus de l'élongation de l'étoile au tems

de la plus grande aberration en déclinaison, est au sinus de l'angle de position, comme 20'' sont à la plus grande aberration en déclinaison.

Pour l'aberration en ascension droite, on dira d'abord : le sinus de la latitude de l'étoile est au rayon, comme la tangente de l'angle de position est à la tangente de la différence entre la longitude de l'étoile & celle du soleil, au tems où l'aberration en ascension droite est nulle. Quand le lieu du soleil est plus avancé de trois signes, l'aberration en ascension droite est la plus grande.

Le sinus de la différence trouvée est au cosinus de l'angle de position, comme 20'' sont à la plus grande aberration en ascension droite.

L'aberration actuelle, dans les quatre cas que nous venons de parcourir, est égale à la plus grande aberration multipliée par le cosinus de la différence entre la longitude du soleil au tems où elle étoit la plus grande, & la longitude actuelle du soleil, pour le tems donné, que l'on retranche de la première.

On trouve des tables détaillées de toutes ces aberrations en ascension droite & en déclinaison, dont les astronomes font un usage continu, dans la *Connaissance des Temps de 1760*, & des années suivantes; on les a réunies dans le volume de 1781, & M. Mezirac en a donné un recueil plus complet à Mannheim, en 1778, sous ce titre : *Tabulae aberrationis*. Voici les principaux articles pour dix étoiles principales, vers 1790.

Noms des étoiles.	Lieu du ☉ au tems de la plus gr. aberr. en ascension droite.	La plus grande aberration, en ascension droite.	Lieu du ☉ au tems de la plus gr. aberr. en déclinaison.	La plus grande aberration en déclinaison.
Étoile polaire . . .	0° 11' 38"	8' 38", 4	3° 8' 48"	19", 9
Aldebaran	2 7 10	0 20, 6	1 6 46	3, 8
La Chèvre	2 15 43	28, 5	5 1 36	8, 1
Sirius	3 7 48	20, 8	6 3 45	12, 8
Regulus	4 26 28	19, 3	10 25 3	6, 8
L'Épi de la Vierge .	6 19 30	28, 6	6 25 14	7, 6
Arcturus	7 33 15	20, 1	5 0 55	12, 4
Antares	8 5 24	21, 8	8 29 40	3, 9
La Lyre	9 6 33	25, 5	0 5 1	17, 6
L'Aigle	9 22 48	19, 9	0 6 37	10, 3

Pour qu'on puisse voir dans les ellipses, fig. 135 & 136, les changemens d'ascensions droites & de déclinaisons, je les ai disposées sur un parallèle à l'équateur, représenté par *AB*, on voit qu'au mois de juillet Arcturus paroît à gauche, & Sirius à droite ou à l'occident, sur son ellipse d'aberration; ainsi, leur différence d'ascension droite augmente en été; mais leur différence de déclinaison varie peu, parce qu'elles sont à-peu-près vues dans les mêmes tems aux parties supérieures ou inférieures de leurs ellipses.

Nous n'avons eu égard, dans tout ce qui pré-

cède, qu'au mouvement annuel de la terre, & non point au mouvement diurne, parce qu'il est trop lent pour qu'il puisse avoir un effet sensible. En effet, la vitesse du mouvement diurne est à celle du mouvement annuel, en raison inversée des tems, & en raison directe des distances; elle n'est donc que $\frac{1}{365}$ de la vitesse du mouvement annuel; ce qui seroit une aberration de deux tiers de seconde dans l'espace de douze heures, quantité absolument insensible.

L'aberration a lieu dans les planètes, aussi-bien que dans les étoiles fixes; mais elle est plus facile

à calculer, quand on connoît leur mouvement & leur distance. L'aberration d'une planète est toujours égale à son mouvement vu de la terre, pendant le tems que la lumière emploie à venir de la planète jusqu'à la terre. Par exemple, la lumière emploie 8' 8" à venir du soleil jusqu'à nous; le mouvement du soleil pendant ces 8' est de 20": d'où il suit que le soleil à 20" d'aberration en longitude en tout tems; & comme l'aberration fait paroître la planète du côté où va la terre, opposé à celui où la planète paroît aller, il s'ensuit que, si la longitude est croissante, l'aberration la diminue, & il faudra l'ôter de la longitude calculée, pour avoir la longitude apparente. On en fera de même de la latitude, de l'ascension droite, de la déclinaison, pourvu qu'on prenne le mouvement géocentrique en latitude, en ascension droite, en déclinaison, pendant le tems que la lumière emploie à venir de la planète jusqu'à nous. On peut voir des formules & des méthodes particulières de M. Clairaut, à ce sujet, dans les *Mém. de l'Acad. 1746*; & celles de M. Euler, dans les *Mém. de Berlin, 1746, tome II*; & j'ai donné de nouvelles tables d'aberration pour toutes les planètes, calculées avec soin par M. de Lalande, dans le 8^e volume des *Ephémérides de Paris*, publié en 1783; on y voit que l'aberration peut aller jusqu'à une minute ou 60" pour Mercure, 44" pour Vénus, 38" pour Mars, 29" pour Jupiter, & 26" pour Saturne.

L'aberration dépend toujours du rapport entre la vitesse de la lumière & celle de l'observateur; d'après ce principe, M. Boscovich écrivoit, en 1766, qu'il avoit imaginé un moyen de voir si la vitesse de la lumière est plus grande dans l'eau que dans l'air, en se procurant deux mesures différentes de l'aberration. Il suppose, sur un même instrument, une lunette ordinaire & une lunette dont le tube seroit plein d'eau depuis l'objectif jusqu'au réticule; celui-ci seroit formé par une plaque de verre, l'on y traceroit les lignes nécessaires pour observer la distance d'une étoile au zénith. La vitesse de la lumière dans la lunette d'eau étant augmentée, son rapport avec la vitesse de la terre deviendroit plus grand; il faudroit par conséquent une moindre inclinaison dans cette lunette d'eau, pour que le rayon de l'étoile parvint à la ligne du réticule; donc l'aberration, dans la lunette d'eau, seroit moindre; donc elle donneroit la vraie distance au zénith plus ou moins que cette nouvelle aberration; & en retournant l'instrument, on auroit le double de cette distance plus ou moins le double de l'aberration; donc on observeroit la double distance dans une des lunettes plus grande que dans l'autre du double de la quantité dont l'aberration de la lunette ordinaire surpasseroit l'aberration de la lunette d'eau.

On a objecté, contre cette idée, que le rayon, en sortant de la lunette d'eau, devroit perdre l'augmentation de vitesse qu'il avoit acquise en y entrant;

mais on répond que le rayon arrivé une fois au trait du micromètre intérieur, la direction de l'étoile est déterminée par là même; le rayon intercepté ne sort plus, & il n'importe plus que les rayons, en sortant de la lunette, changent de direction & de vitesse; ainsi, l'inclinaison de la lunette sera toujours différente.

Il paroît par les rapports de réfraction de l'air dans l'eau, que les vitesses de la lumière y sont comme 3 à 4; ainsi, le cercle d'aberration des étoiles ayant 40" par la vitesse de la lumière dans l'air, il auroit 30" seulement par la vitesse de la lumière dans l'eau; il y auroit donc 10" de différence dans l'observation, si, comme on le croit, la vitesse du rayon augmente dans l'eau. (DE LA LANDE.)

ABERRATION, (*Optique*.) dispersion des rayons de lumière, qui, partant d'un objet & traversant un verre de lunette, au lieu d'aller se réunir en un même point ou foyer, se répondent sur une petite étendue, & forment en conséquence une image, un peu confuse de l'objet.

Il y a deux causes d'aberration; la première cause est la sphéricité des verres ou des miroirs; la seconde est la diverse réfrangibilité des rayons. L'aberration de sphéricité vient de ce qu'un verre de figure exactement circulaire, tel qu'on les travaille dans les halles pour faire les lunettes d'approche, ne peut pas rassembler en un seul point tous les rayons de lumière qui, partant de l'objet, traversent les différents points du verre; cette aberration est d'autant plus grande que le verre a une plus grande ouverture: il faut voir à ce sujet le *Traité d'Optique* de Smith, imprimé à Cambridge en 1738, en deux volumes in-4, traduit par le P. Péczenas, à Avignon, 1767; & par M. Duval le Roi, à Brest, 1767. Ces deux dernières éditions renferment beaucoup d'augmentations nouvelles, sur-tout par rapport aux lunettes achromatiques.

L'aberration de réfrangibilité vient de la décomposition d'un faisceau de rayons, qui, en traversant un milieu diaphane tel qu'un verre de lunette, se divise en différentes couleurs, dont les plus remarquables sont les sept couleurs suivantes, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Dans une lunette de 27 piels, les rayons rouges se réunissent dans un foyer qui diffère de près d'un pied du foyer des rayons violets. Il faudroit cependant que tous ces rayons se rassemblaient au même point, pour que l'image d'un objet fut tranchée, nette & distincte; c'est pour remédier à cette aberration de réfrangibilité & de sphéricité, que M. Euler chercha le moyen de faire des verres de lunettes, composés de différentes substances, & c'est ce qui a donné naissance à la nouvelle invention des lunettes achromatiques, qui diminuent en effet considérablement les deux espèces d'aberrations dont nous venons de parler. (Foyer ACHROMATIQUE. M. DE LA LANDE.)

ABONDANT, adj. (*Arithm.*) Nombre abondant, est un nombre dont les parties aliquotes,

prises ensemble, forment un heu plus grand que le nombre. Par exemple, 12 a pour parties aliquotes 1, 2, 3, 4, 6, dont la somme 16 surpasse 12. Le nombre *abondant* est opposé au nombre *defectif*, qui est plus grand que la somme de ses parties aliquotes, comme 14 dont les parties aliquotes sont 1, 2, 7; & au nombre *parfait* qui est égal à la somme de ses parties aliquotes, comme 6 dont les parties aliquotes sont 1, 2, 3. Voyez *NUMÉRIQUE* & *ALIQUOTE*.

ABOUTIR, en *Hydraulique*, c'est raccorder un gros tuyau sur un petit. S'il est de fer, de grès, ou de bois, ce sera par le moyen d'un collet de plomb, qui viendra en diminuant du gros au petit. Quand le tuyau est de plomb, l'opération est encore plus aisée; mais, quand il s'agit de raccorder une conduite de six pouces sur une de trois, il faut un tambour de plomb fait en cone, en prenant une table de plomb dont on forme un tuyau que l'on soude par-dessus. (K.)

ABRACHALEUS, (*Astr.*) c'est un des noms de la seconde étoile des Gémeaux, marqué β , & qu'on appelle aussi Polliv.

ABSCISSE, f. f. (*Geom.*) du mot latin *abscondere*, partie quelconque de l'axe ou du diamètre d'une courbe, comprise depuis un point fixe où toutes les *abscisses* prennent leur origine, jusqu'à une autre ligne nommée *ordonnée*, qui se termine à la courbe. Ainsi, (*Idem*, fig. 37.) *A* étant un point fixe, *AP* est une *abscisse* de la courbe *OMM'*; *PM* est l'ordonnée correspondante; de même *AP'* est une autre *abscisse*, *P'M'* l'ordonnée correspondante.

L'*abscisse* & l'ordonnée correspondante, considérées ensemble, se nomment les *coordonnées* de la courbe.

ABSENT. (*Calcul des probabilités*.) Lorsque M. Nicolas Bernoulli, l'un des célèbres Jacques & Jean Bernoulli, foudra à Bale, en 1709, la thèse de docteur en droit; comme il étoit grand géomètre, aussi-bien que jurisconsulte, il ne put s'empêcher de choisir une matière qui admit de la Géométrie. Il prit donc pour sujet de sa thèse, de *usu artis conjeclandi in Jure*; c'est-à-dire, de l'application du calcul des probabilités aux matières de Jurisprudence, & le troisième chapitre de cette thèse traite du tems où un *absent* doit être réputé pour mort. Selon lui, il doit être censé tel, lorsqu'il y a deux fois plus à parier qu'il est mort que vivant. Supposons donc un homme parti de son pays à l'âge de vingt ans, & voyons, suivant la Théorie de M. Bernoulli, en quel tems il peut être censé mort.

Suivant les Tables données par M. Deparcieux, de l'Académie Royale des Sciences, de 814 personnes vivantes à l'âge de 20 ans, il n'en reste, à l'âge de 72 ans, que 271, qui sont à-peu-près le tiers de 814; donc il en est mort les deux tiers de plus jusqu'à 72, c'est-à-dire, en 52 ans; donc, au bout de 52 ans, il y a deux fois plus à parier

pour la mort que pour la vie d'un homme: qui s'absente & qui disparaît à 20 ans. J'ai choisi ici la Table de M. Deparcieux, & je l'ai préférée à celle dont M. Bernoulli paroit s'être servi, me contentant d'y appliquer mon raisonnement; mais je crois notre calcul trop fort en cette occasion, à un certain égard, & trop foible à un autre; car, 1.^o d'un côté, la Table de M. Deparcieux a été faite sur des rentiers de rentes, qui, comme il le remarque lui-même, vivent ordinairement plus que les autres, parce qu'on ne met ordinairement à la rente que quand on est assez bien constitué, pour se flatter d'une longue vie. Au contraire, il y a à parier qu'un homme qui est absent, & qui depuis long-tems n'a donné de ses nouvelles à sa famille, est au moins dans le malheur ou dans l'indigence, qui, joints à la saignée des voyages, ne peuvent guère manquer d'abréger les jours. 2.^o D'un autre côté, je ne vois pas qu'il fût juste pour qu'un homme soit censé mort, qu'il y ait seulement deux contre un à parier qu'il l'est, surtout dans le cas dont il s'agit. Car, lorsqu'il est question de disposer des biens d'un homme, & de le dépouiller sans autre motif que sa longue absence, la loi doit toujours supposer sa mort certaine. Ce principe me paroit si évident & si juste, que, si la Table de M. Deparcieux n'étoit pas faite sur des gens qui vivent ordinairement plus long-tems que les autres, je croirois que l'*absent* ne doit être censé mort que dans le tems où il ne reste plus aucune des 814 personnes âgées de 20 ans, c'est-à-dire, à 93 ans. Mais, comme la Table de M. Deparcieux seroit, dans ce cas, trop favorable aux *absents*, on pourroit, ce me semble, faire une compensation, en prenant l'année où il ne reste que le quart des 814 personnes, c'est-à-dire, environ 75 ans. Cette question seroit plus facile à décider, si on avoit des Tables de mortalité des voyageurs: mais ces Tables nous manquent encore, parce qu'elles sont très-difficiles & peut-être impossibles dans l'exécution.

M. de Buffon a donné, à la fin du troisième volume de son *Histoire Naturelle*, des Tables de la durée de la vie, plus exactes & plus commodées que celle de M. Deparcieux, pour résoudre le problème dont il s'agit, parce qu'elles ont été faites pour tous les hommes sans distinction, & non pour les rentiers seulement. Ces Tables seroient peut-être encore un peu trop favorables aux voyageurs, qui doivent généralement vivre moins que les autres hommes. Mais, comme elles le sont moins que les autres, au lieu d'y prendre les trois quarts, comme nous avons fait dans les Tables de M. Deparcieux, il seroit bon de ne prendre que les $\frac{1}{2}$ ou peut-être les $\frac{1}{3}$. Le calcul en est aisé à faire; il nous suffit d'avoir indiqué la méthode. (O.)

D'ailleurs la solution de ce problème suppose une autre théorie sur la probabilité morale des événements que celle qu'on a suivie jusqu'à présent. Cette théorie nouvelle est de M. de Buffon, & nous allons

allons mettre le lecteur en état de se satisfaire lui-même sur la question présente des *absens réputés pour morts*, en lui indiquant les principes qu'il pourroit suivre. Il est constant que, quand il s'agit de décider par une supposition du bien-être d'un homme, qu'on n'a contre lui que son absence, il faut avoir la plus grande certitude possible que la supposition est vraie. Mais comment avoir cette plus grande certitude morale possible ? Où prendre ce *maximum* ? Comment le déterminer ? Voici comment M. de Buffon veut qu'on s'y prenne, & l'on ne peut douter que son idée ne soit très-ingénieuse, & ne donne la solution d'un grand nombre de questions embarrassantes, telles que celles du problème sur la somme que doit parier à croix ou pile un joueur A contre un joueur B qui lui donneroit un écu, si lui B amenoit pile du premier coup ; deux écus, si lui B amenoit encore pile au second coup ; quatre écus, si lui B amenoit encore pile au troisième, & ainsi de suite ; car il est évident que la mise de A doit être déterminée sur la plus grande certitude morale possible que l'on puisse avoir, que B ne passera pas un certain nombre de coups ; ce qui fait rentrer la question dans le fini, & lui donne des limites. Mais on aura, dans le cas de l'*absent*, la plus grande certitude morale possible de sa mort, ou d'un événement en général, par celui où un nombre d'hommes seroit assez grand pour qu'aucun ne craignit le plus grand malheur, qui devroit cependant arriver infailliblement à un d'entre eux. Exemple : prenons dix mille hommes de même âge, de même santé, &c. parmi lesquels il en doit certainement mourir un aujourd'hui ; si ce nombre n'est pas encore assez grand pour délivrer entièrement de la crainte de la mort chacun d'eux, prenons-en vingt. Dans cette dernière supposition, le cas où l'on auroit la plus grande certitude morale possible qu'un homme seroit mort, ce seroit celui où de ces vingt mille hommes vivans, quand il s'est absenté, il n'en resteroit plus qu'un.

Voilà la route qu'on doit suivre ici & dans toutes autres conjonctures pareilles, où l'humanité semble exiger la supposition la plus favorable. Cette Addition est de M. Diderot.

Nous avons cru devoir ajouter à cet article, tiré de la première édition de l'Encyclopédie, les réflexions suivantes :

I. La nouvelle Théorie que M. de Buffon a proposée, ne nous paroît point pouvoir être admise.

1.^o Elle est inexacte en elle-même, puisqu'elle tend à confondre deux choses de nature différente, la probabilité & la certitude.

2.^o Elle ne peut servir qu'à simplifier le calcul, dans le cas où le résultat, auquel cette hypothèse conduiroit, ne différerait que d'une manière infensible des résultats rigoureux ; ainsi, elle ne doit pas être employée à résoudre aucune des difficultés

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

qui peuvent s'élever sur les principes même du calcul.

3.^o On ne se permet, dans le calcul, d'employer comme absolue une détermination approchée, que pour une quantité dont on connoît une valeur très-peu différente de la réelle, & dont la valeur réelle est incertaine ; or ici la valeur de la certitude est déterminée & égale à l'unité. Ainsi, il n'y a aucune raison pour supposer dans le calcul, ni aucune probabilité égale à l'unité, ni la certitude égale à une fraction peu différente de l'unité.

4.^o Lorsqu'on se permet de négliger une quantité, c'est toujours par la raison qu'on la regarde comme nulle, par rapport à celle que l'on veut connoître, & c'est ce qui ne peut avoir lieu ici. Toutes les fois que la probabilité d'un événement est très-peu différente de l'unité, la probabilité de l'événement contraire est une très-petite quantité. Ainsi, je puis bien regarder comme étant également probables les événements dont les probabi-

liés 10	10000	-1 & 10	10001	-1 sont très - peu
10	10000	10	10001	
différentes.				

Mais il n'en est pas de même des événements

contraires, dont les probabilités	1	10000,
	10	

10000 sont dans le rapport d'un à dix.

5.^o Un *maximum* de probabilité est une expression qui ne peut s'entendre en mathématiques ; la *maximum* de la probabilité seroit 1, & elle ne peut y atteindre. Mais on peut fixer un *minimum* de probabilité, c'est-à-dire, une probabilité au-dessous de laquelle, par exemple, il ne peut être permis ni de condamner un homme, ni de le dépouiller de son bien, ni de le réputer mort. Cette idée est absolument l'opposée de celle que propose M. de Buffon, & c'est la seule que l'on doive admettre.

II. Dans les questions relatives aux biens des *absens*, il faut examiner séparément les trois hypothèses suivantes :

Celle où l'*absent* reviendroit au bout d'un certain tems, celle où l'*absent* ne reviendra jamais, mais où l'époque de sa mort est connue ; & celle où l'on ignore cette époque à perpétuité.

Cela posé, nous demanderons d'abord d'après quel principe on doit régler l'administration des biens d'un *absent*, pour que, dans le cas où il reviendrait, il n'eût éprouvé aucune injustice.

Il est clair qu'à son retour, il reprendrait ses droits sur tous les biens, & qu'il s'agit donc seulement de déterminer à quelle époque on peut cesser de les lui laisser en séquestre, & permettre à les héritiers

riers de les partager; & en dispoſer, en dormant, pour leur ſûreté, les canſons convenables, & au bout de quel tems on peut même les diſpenſer formalifés.

Pour le 1.^{er} cas, on voit que, du moment où la vie d'un homme eſt incertaine, on lui fait une injuſtice, dans le cas où il vivroit, en permettant à ſes héritiers de diſpoſer de ſon bien, & que, s'il eſt mort, on en fait une à ſes héritiers en les privant de la ſucceſſion. Soit donc a la probabilité du riſque auquel vous expoſeriez un *absent*, en permettant de diſtribuer ſon bien au bout d'un nombre n d'années d'abſence; la valeur de la perte à laquelle il ſeroit expoſé ſera exprimée par ab , & si u eſt la probabilité qu'il eſt vivant, ſon riſque ſ'exprimera

par $ua b$

Maintenant, quelle eſt la perte de l'héritier, ſi on reſuſe de le mettre en jouiſſance? Le bien eſt ici toujours b : ſoit $1-r$, la probabilité qu'il en jouira toujours, ſans être obligé de ſe rendre c'eſt-à-dire, la probabilité que l'*absent* ne reviendra pas; $1-r \cdot b$ eſt le tort fait à l'héritier.

Mais ce tort n'eſt pas irréparable, puifque, ſi l'on lui rend b , augmenté de l'intérêt, l'année d'après il n'aura rien perdu: ſoit donc u' la probabilité qu'il ne mourra pas dans l'année; $1-u' \cdot 1-r \cdot b$, exprimera le riſque qu'on lui fait courir, en ne lui remettant pas la diſpoſition au commencement de cette même année; ainſi, pour livrer le bien de l'*absent* aux héritiers même, en exigeant une caution, il ſaut que $1-r \cdot 1-u' \cdot > ua$. Le cas où l'on peut ceſſer d'exiger les formalités de cautions, ſe réſolvera de même, à cela près que a doit être alors plus grand. On peut, ſans beaucoup d'erreur, ſuppoſer $1-r = 1-u + \frac{1}{2}$; en eſſet $1-r$ eſt la probabilité que l'*absent* ne reviendra jamais; mais la probabilité qu'il eſt mort eſt $1-u$, & on peut ſuppoſer que, s'il eſt vivant, il y a autant à parier qu'il reviendra, qu'à parier qu'il ne reviendra pas.

Cette 1.^{re} condition ne ſuffit pas; il ſaut encore que, dans le cas où l'on ſauroit un jour l'époque fixe de la mort de l'*absent*, il ne réſultât des diſpoſitions faites de ſes biens, aucune injuſtice à l'égard de ſes héritiers.

Il eſt clair que les biens doivent être partagés définitivement, comme ſi la ſucceſſion étoit ouverte du jour de ſa mort. Ainſi, ſuppoſons que b eſt, à une époque donnée, la portion du bien que demande un héritier A ; & que, par la mort de A , cette portion paſſeroit à B , le tort fait à A eſt ici comme ci-deſſus $1-r \cdot a$, $1-u' \cdot b$. Pour évaluer le tort fait à B , on trouvera:

1.^o Que a peut exprimer le danger auquel on l'expoſe;

2.^o Que ce danger n'a lieu qu'autant que A mourroit avant l'*absent*; donc, ſi u' exprime la probabilité que A meure avant l'*absent*, on aura $u' \cdot a \cdot b$ pour le riſque auquel B eſt expoſé, ſi on donne une partie de l'héritage à A . Ainſi, il faudra, pour laiſſer à A la diſpoſition de ſa poſſion, que $1-r \cdot 1-u' > u' \cdot a$.

Cette condition doit être remplie dans toutes les combinaifons qui peuvent avoir lieu dans l'ordre de mortalité des différens héritiers.

Suppoſons enſin qu'il ſoit queſtion de régler le partage des biens, en ayant également égard à la juſtice, dans la ſuppoſition que l'*absent* ne reviennne jamais, & qu'on doive ignorer l'époque de ſa mort. Nous connoiſſons, 1.^o l'époque où l'on peu, ſans injuſtice, faire le partage de ſes biens. Soit b le bien; puifqu'il y a $1-u$ à parier qu'il eſt mort, il faudra d'abord prendre une partie $1-u \cdot b$.

2.^o Si, depuis l'incertitude de ſon tort juſqu'à cette époque, il y a pour une ou deux autres époques $A \cdot B$ des variations dans l'ordre de la ſucceſſion, il faudra, ſi $1-u \cdot x$, $1-u \cdot x + \frac{1}{2}$ repréſentent la probabilité de la mort à ces époques, partager $1-u \cdot x \cdot b$, comme à l'époque A ; $1-u \cdot \frac{1}{2} \cdot b$, comme à l'époque B ; $1-u \cdot 1-x \cdot b$, comme à l'époque de la diſtribution. Le reſte peut être diſtribué provisoirement, mais toujours à la condition que, ſ'il ſurvient un changement dans l'ordre de la ſucceſſion, une partie de ce reſte proportionnelle à la probabilité que la mort n'eſt pas arrivée avant ce changement, ſera diſtribué comme elle l'auroit été, ſi on eût appris que ſa mort eſt arrivée après ce changement. Enſin, l'orſque la probabilité de la mort de l'*absent* aura ſurpaſſé ce *minimum* de certitude morale dont nous avons parlé ci-deſſus, il faudra diſtribuer définitivement tous les biens, ſuivant la même règle (*): d'où il réſulte que c'eſt la ſeule époque à laquelle les formalités de cautions, &c. doivent être ſupprimées.

Ces principes ſuffiſent pour résoudre toutes les queſtions qui peuvent ſe préſenter ſur cet objet; ils ſe bornent à cette règle très-ſimple, de ſuppoſer proportionnel à la probabilité de la vie & de la mort de l'*absent*, le tort qui réſulte pour lui ou pour ſon héritier, de la ſuppoſition qu'il eſt mort ou vivant à chaque époque que l'on conſidère, & d'attendre, pour toute deciſion irrévoicable, que la probabilité de la mort ſoit au-deſſus du *minimum* de probabilité, pour lequel il peut être permis de priver un homme de ſes droits. (Voyez l'art. PROBABILITÉ.) Les queſ-

* Voyez, ſur le principe général de diſtribuer les ſommes proportionnellement à la probabilité du droit, l'art. PROBABILITÉ.

tions relatives à la distribution des successions qui peuvent échoir à un *absent*, aux droits des créanciers sur ces biens, &c. doivent se résoudre par les mêmes principes.

Nous nous sommes bornés ici à des principes généraux, parce que leur application à la pratique, dépend des loix de chaque pays sur les cautions, sur la prescription, sur l'ordre de succession, sur le plus ou moins de liberté des dispositions testamentaires. Ainsi, dans chaque nation, pour faire à sur cet objet, une loi conforme à la raison & à la justice, il faudroit, après avoir résolu, dans tous les cas, les questions qui peuvent se présenter, chercher à déduire de tous les résultats qu'on auroit obtenus par le calcul, quelques règles générales & simples, qui n'exposeroient à commettre des injustices, que dans des cas presque impossibles à supposer. (*M. D. C.*)

ABSIDES. Voyez **APSIDES**.

ABSOLU, nombre *absolu*, en Algèbre, est la quantité ou le nombre connu, qui fait un des termes d'une équation. Voyez **EQUATION** & **RACINE**.

Ainsi, dans l'équation $xx + 16x = 36$, le nombre *absolu* est 36, qui égale x multiplié par lui-même, ajouté à 16 fois x .

C'est ce que Vette appelle *homogeneum comparationis*. Voyez **HOMOGENEUM** de comparaison.

ABSTRAIT, adj. (*Arith.*) nombre *abstrait*, collection d'unités considérées en elles-mêmes, & qui ne désignent point de choses particulières & déterminées. Par exemple, 3 est un nombre *abstrait*; 3 fois est aussi un nombre *abstrait*; mais, quand on dit 3 hommes, 3 écus, le nombre 3 est *concret*. Voyez **CONCRET**.

On appelle *mathématiques abstraites*, ou *mathématiques pures*, la classe des mathématiques qui considèrent la grandeur en elle-même, & d'une manière générale. Voyez **MATHÉMATIQUES**.

ABSURDE. (*Géom.*) En Géométrie, on démontre presque toutes les convertes, en les réduisant à l'*absurde*; c'est-à-dire, en prouvant que, si la converte n'étoit pas vraie, une proposition, déjà démontrée, seroit fautive. Or il est contraire au sens commun, il est *absurde* qu'une proposition démontrée ne soit pas vraie. (*J. D. C.*)

ABUTER, v. a. Aux quilles, avant que de commencer le jeu, chaque joueur en prend une, & la jette vers la boule placée à une distance convenue entre les joueurs; voilà ce qu'on appelle *abuter*. Celui qui *abute* le mieux, c'est-à-dire, dont la quille est la plus proche de la boule, gagne l'avantage de jouer le premier.

ACADEMIE. Voyez **ASTRONOMIE**.

ACARNAR. Voyez **ACARNAN**.

ACAMPTE, adj. (*Opt.*) mot employé par Leibnitz, (*Op. Leib.* tom. III, p. 203.) pour désigner une figure qui, étant opaque & polie, & par conséquent douée des propriétés nécessaires pour réfléchir la lumière, n'en réfléchit point. Voyez, dans l'endroit cité des *Œuvres de Leibnitz*, l'explication de ce paradoxe.

ACCELERATION, dans le moyen mouvement de la lune, & dans celui de Jupiter. Voyez **EQUATION** *sidérale*.

ACCELERATION diurne des étoiles. (*Astronomie.*) c'est la quantité dont leurs levers & leurs couchers avancent chaque jour, ainsi que leurs passages au méridien; elle est de $3' 56''$. Cette *accélération*, dont les astronomes font un usage continuel, vient du retardement effectif du soleil; son mouvement propre vers l'orient, qui est de $59' 8''$ de degré tous les jours, fait que l'étoile, qui passoit au méridien hier en même tems que le soleil, est plus occidentale aujourd'hui de $59' 8''$, ce qui exige $3' 56''$ de tems; elle passera donc plutôt, de la même quantité.

Pour calculer rigoureusement la quantité de cette *accélération*, il faut faire la proportion suivante $360^{\circ} 59' 8'' 204$, sont à $24^{\circ} 0' 0''$, comme $360^{\circ} 0'$ sont à $23^{\circ} 56' 4'' 098$; c'est la durée moyenne de la révolution diurne des étoiles fixes, qui diffère de 24 heures solaires moyennes de $3' 55'' 902$.

Il y a eu des astronomes célèbres qui se sont mépris à cet égard, & qui faisoient l'*accélération* de $3' 56' 55''$; ils commençoient la proportion par 360° , & dès-lors ils supposoient implicitement que l'*accélération* étoit comptée en heures du premier mobile ou des étoiles fixes, au lieu que tous les tems doivent se compter en heures solaires moyennes; ou bien ils supposoient que l'*accélération* se comptoit sur l'horloge du tems moyen; mais au moment où le soleil passe par le méridien, au lieu de la compter au moment du passage de l'étoile, c'est le retardement du soleil qu'ils prenoient; au lieu de l'*accélération* des étoiles.

Le vrai passage d'une étoile au méridien, n'avance pas tous les jours de $3' 56''$, ni tous les jours également, par rapport au soleil vrai qui règle nos cadrans, mais seulement par rapport à un soleil moyen supposé uniforme, que les astronomes imaginent pour construire leurs tables & pour régler leurs horloges: le tems moyen diffère d'un quart d'heure du tems vrai en certain tems de l'année. Voyez **EQUATION** du tems; & il s'en suit de la même quantité que les *accélérations* diurnes des étoiles ne faillent des sommes toujours égales. L'*accélération* n'est que de $3' 35''$ le 19 de septembre, & cette *accélération* va jusqu'à $4' 27''$ le 21 de décembre. L'*accélération* diurne sert à régler des pendules; si je vois une étoile fixe se coucher derrière une montagne ou un clocher, lorsque ma pendule marquait $7^{\text{h}} 4' 0''$, & que le lendemain, mon oril étant fixé à la même place, l'étoile disparoit à $7^{\text{h}} 0' 4''$, j'en conclus que la pendule

est bien réglée quant à son mouvement, ou à sa marche d'un jour à l'autre; mais, pour la mettre à l'heure, il faut savoir le tems vrai par des hauteurs correspondantes, par une méridienne ou par quelque autre moyen. (*M. DE LA LAMBE.*)

ACCELERATION, f. f. (*Mécanique*). augmentation de vitesse que reçoit un corps en mouvement. Ce mot est opposé à *retardation*, qui signifie diminution de vitesse. Par exemple, un corps qui tombe librement par sa pesanteur, reçoit continuellement une *accélération* de vitesse; car, si la vitesse demeurait toujours la même, le choc de ce corps contre un obstacle seroit toujours le même, de quelque hauteur que le corps tombât; ce qui est contraire à l'expérience, qui nous apprend qu'à une plus grande hauteur de chute répond un plus grand choc. Voyez **ACCELÉRÉ**. Au contraire, un projectile qui se meut dans un espace ou milieu résistant, par exemple, un boulet de canon, éprouve une *retardation* de vitesse, qui dénature la courbe qu'il décrirait en vertu de la force d'impulsion initiale, & de la pesanteur. Voyez **PROJECTILE**.

ACCELERATRICE, *Force (Méch.)*. On appelle, ainsi, en Mécanique, la force ou cause qui accélère le mouvement d'un corps. Lorsqu'on examine les effets produits par de telles causes, & qu'on ne connoît point ces causes en elles-mêmes, les effets doivent toujours être donnés indépendamment de la connoissance de la cause, puisqu'ils ne peuvent en être déduits; c'est ainsi que, sans connoître la cause de la pesanteur, nous apprenons, par l'expérience, que les espaces décrits par un corps qui tombe, sont entr'eux comme les quarrés des tems. En général, dans les mouvements variés, dont les causes sont inconnues, il est évident que l'effet produit par la cause, soit dans un tems fini, soit dans un instant, doit toujours être donné par l'équation entre les tems & les espaces; cet effet une fois connu, & le principe de la force d'inertie supposé, on n'a plus besoin que de la Géométrie seule & du calcul, pour découvrir les propriétés de ces sortes de mouvements. Il est donc inutile d'avoir recours à ce principe, dont tout le monde fait usage aujourd'hui, que la force accélératrice ou retardatrice est proportionnel à la cause. Nous n'examinons point si ce principe est de vérité nécessaire; nous avouons seulement que les preuves qu'on en a données jusqu'ici, ne nous paroissent pas fort convaincantes; nous ne l'adoptons pas non plus, avec quelques Géomètres, comme de vérité purement contingente; ce qui nuieroit la certitude de la Mécanique, & la réduiroit à n'être plus qu'une science expérimentale. Nous nous contenterons d'observer que, vrai ou faux, clair ou obscur, il est inutile à la Mécanique, & que par conséquent il doit en être banni. (O.)

ACCELERÉ, adj. (*Méch.*) mouvement accéléré, mouvement qui reçoit continuellement de

nouveaux accroissemens de vitesse, &, par opposition, mouvement retardé, mouvement qui perd continuellement des parties de sa vitesse. On désigne, en général, ces sortes de mouvements sous le nom commun de *mouvements variés*. Voyez **MOUVEMENT**.

Lorsque les accroissemens ou les décroissemens de vitesse sont égaux en tems égaux, le mouvement est dit *accéléré* ou *retardé uniformément*.

Nous allons donner ici brièvement la théorie du mouvement uniformément accéléré: elle s'appliquera, dans un ordre renversé, au mouvement uniformément retardé.

I. Tout corps en repos ou en mouvement persévère dans cet état, jusqu'à ce qu'une cause extérieure l'en retire. (*Voyez INERTIE & MOUVEMENT*.) Ainsi, 1.^o un corps ne peut pas de lui-même accélérer son mouvement; il a besoin, pour cela, d'être poussé par une force accélératrice.

2.^o Pour que l'accélération soit continue, il faut que la force accélératrice agisse continuellement.

3.^o La force accélératrice, en se répétant continuellement, doit donner, en des instans égaux, des coups égaux au mobile, afin que les degrés de vitesse, produits par ces coups, soient égaux, & que le mouvement soit uniformément accéléré, conformément à l'hypothèse.

II. On voit par là que la vitesse finale d'un corps qui se meut d'un mouvement uniformément accéléré (j'entends la vitesse qu'a le mobile, au bout d'un certain tems, en vertu des coups successifs & égaux de la force accélératrice) est toujours proportionnelle au tems écoulé depuis le moment où la force accélératrice a commencé d'agir. Car le mobile reçoit continuellement, pendant les instans égaux & successifs du tems, des degrés égaux de vitesse, en vertu de la force accélératrice; & il conserve ces degrés de vitesse, en vertu de son inertie. D'où il résulte que la vitesse finale, qui n'est autre chose que la somme des degrés de vitesse acquis & conservés, est proportionnelle à leur nombre, ou au nombre des instans du tems, ou enfin au tems même.

Nous supposons, comme on voit, qu'au premier instant où la force accélératrice commence d'agir, la vitesse est zéro, ou que le mobile n'a aucune vitesse primitivement acquise: la même supposition aura lieu dans la comparaison que nous allons faire de deux mouvements uniformément accélérés.

III. Lorsque deux corps se meuvent avec des mouvements uniformément accélérés, les espaces qu'ils parcourent sont entr'eux comme les produits des tems par les vitesses finales.

En effet, représentons le tems du mouvement de l'un des corps, par le côté *AB* du triangle rectangle *ABC* (*Méch. fig. 6*), & la vitesse finale par l'autre côté *BC*. Ayant partagé le tems en une infinité d'instans *AD*, *DE*, &c. menons parallèlement à *BC* les ordonnées *DF*, *FG*: ces lignes

exprimeront les vitesses correspondantes à la fin des tems AD , AF , de même que BC exprime la vitesse correspondante à la fin du tems AB , puisque les vitesses finales sont entr'elles comme les tems, par l'article précédent, & qu'à cause des triangles semblables ADE , AFG , ABC , (*V. TRIANGLE*) les droites DE , FG , BC , sont entr'elles comme les droites AD , AF , AB . Considérons les deux vitesses LM , NO , qui répondent l'une au commencement, l'autre à la fin d'un instant quelconque LN , & menons Mm parallèle à AB : il est clair que les deux vitesses LM , NO , qui ne diffèrent l'une de l'autre que de la quantité MO infiniment petite par rapport à chacune d'elles, peuvent être regardées comme égales, ou que le mouvement peut être censé uniforme pendant l'instant LN . Or, dans le mouvement uniforme, l'espace parcouru est comme le produit du tems par la vitesse. (*Voyez UNIFORME*). Ainsi, le petit espace parcouru pendant l'instant LN , est proportionnel au produit $LN \times LM$; c'est-à-dire, au rectangle $LMNn$, ou au trapèze $LMON$, qui en diffère infiniment peu, & qui est un des éléments du triangle ABC . D'où il résulte que l'espace total, parcouru pendant le tems AB , est proportionnel à l'aire du triangle ABC .

Semblablement, si l'on représente le tems du mouvement de l'autre corps, par le côté ab du triangle rectangle abc (*Méch. fig. 6, n.° 2*), & la vitesse finale par bc , on trouvera que l'espace total, parcouru pendant le tems ab , est proportionnel à l'aire du triangle abc .

Donc, en notant respectivement E & e les espaces parcourus par les deux corps, T & t les tems des mouvements, V & v les vitesses finales, on aura $E :: \frac{TV}{2} :: \frac{t}{2} :: TV :: tv$.

Cette proportion donne la formule (*A*) $E = \frac{TV^2}{2}$.

IV. Les produits des forces accélératrices, qui animent les deux mobiles, par les tems de leurs applications, sont entr'elles comme les produits des masses par les vitesses finales.

Car la force accélératrice, qui anime l'un ou l'autre corps, lui donne autant de coups égaux, qu'il y a d'instans égaux dans la durée du mouvement de ce corps; & la somme de tous ces coups est la cause de la quantité finale de mouvement, ou du produit de la masse par la vitesse finale. Donc si l'on nomme P & p les forces accélératrices des deux mobiles, M & m leurs masses, V & v leurs vitesses finales, T & t les tems des mouvements, on aura $PT :: MV :: mv$.

De-là suit la formule (*B*) $PT :: MV :: mv$.

V. Les forces accélératrices, multipliées par les quarrés des tems, sont comme les produits des masses par les espaces parcourus.

Car si l'on divise membre à membre, la formule

(*B*) par la formule (*A*), on aura $\frac{PT^2}{2} :: \frac{mvT^2}{2}$, d'où l'on tire $PTT :: mv :: ME :: me$.

De-là suit la formule (*C*), $PTT :: mv :: ME :: me$.

VI. Les forces accélératrices, multipliées par les espaces parcourus, sont comme les produits des masses par les quarrés des vitesses finales.

Car, en divisant les deux membres de la formule (*B*), par ceux de la formule (*A*), pris en croix, on aura $\frac{PT}{E} :: \frac{mv}{E}$; d'où l'on tire $PE :: mv :: MV :: mv$.

De-là suit la formule (*D*) $PE :: mv :: MV$.

VII. Les quatre formules (*A*), (*B*), (*C*), (*D*), renferment toute la théorie du mouvement uniformément accéléré; c'est-à-dire, toutes les relations possibles entre les forces accélératrices, les masses, les tems, les espaces & les vitesses finales, pour deux corps dont les mouvements sont uniformément accélérés; de manière que, connaissant tout ce qui est relatif à l'un de ces mouvements, on connoitra aussi tout ce qui est relatif à l'autre. Nous allons appliquer ces formules aux mouvements des corps qui tombent librement par la pesanteur, ou qui glissent sur des plans inclinés: donnons auparavant, sur ce sujet, deux propositions générales de la plus grande utilité.

VIII. Si un corps, après s'être mis d'un mouvement uniformément accéléré, pendant un certain tems, vient à se mouvoir d'un mouvement uniforme, pendant le même tems, avec une vitesse égale à celle qu'il a au dernier instant du mouvement uniformément accéléré, il parcourra un espace double de celui qu'il a parcouru par le même mouvement.

En effet, nous avons vu (*III*) qu'en représentant le tems d'un mouvement uniformément accéléré par le côté AB du triangle rectangle ABC , la vitesse finale du mobile par le côté BC ; l'espace parcouru est représenté par l'aire du triangle ABC . Or, si durant le même tems AB , le mobile se meut d'un mouvement uniforme, avec une vitesse égale à BC , l'espace qu'il parcourra sera représenté par l'aire du rectangle $ABCV$, double du triangle ABC , puisque, dans ce dernier mouvement, à chaque élément du tems, répond constamment une vitesse égale à BC , & que, dans le mouvement uniforme, l'espace parcouru est comme le produit de la vitesse par le tems. Donc, &c.

Cette proposition sert à comparer le mouvement uniformément accéléré, avec le mouvement uniforme.

IX. Si un corps, lancé avec une certaine vitesse, éprouve l'action d'une force retardatrice constante, il perdra entièrement cette vitesse dans le même tems qu'il auroit employé à l'acquiescer, en vertu d'une force accélératrice constante égale à la force retardatrice; & les espaces parcourus, dans les deux cas, seront égaux.

Cela est évident par lui-même, puisque les deux forces étant égales, mais contraires, doivent pro-

duire des effets égaux & contraires. C'est ainsi que les corps graves peuvent remonter à la hauteur d'où ils sont descendus; que les jets d'eau s'élèvent à la hauteur des réservoirs, &c. En effet, on va démontrer que le mouvement des graves se rapporte à la théorie précédente.

X. Le mouvement des corps qui tombent par la pesanteur, est *accélééré*; Galilée est le premier qui ait découvert la loi de cette accélération; il supposa qu'elle se faisoit par des degrés égaux, ou que le mouvement des corps graves étoit uniformément *accélééré*; & l'expérience ayant confirmé cette hypothèse, elle est devenue une vérité & une loi fondamentale dans la théorie de la chute des graves.

On doit observer cependant que le mouvement des graves n'est uniformément *accélééré*, ou, ce qui en est la cause, que la pesanteur n'est une force accélératrice constante, que pour des chûtes d'une médiocre hauteur: car, à la rigueur, la pesanteur est variable, & proportionnelle au carré inverse de la distance au centre de la terre (*V. ATTRACTION*); mais, lorsque la hauteur, dont un corps tombe, est peu sensible par rapport au rayon de la terre, on peut supposer que la pesanteur est constante; & c'est ce que nous supposons ici avec Galilée.

XI. Quelle que soit la cause de la pesanteur, cette force pénètre toute la masse des corps; elle agit également sur toutes les molécules égales de matière; & le poids total d'un corps est proportionnel au nombre de molécules qui composent sa masse totale. Car, suivant l'expérience, deux corps de masses très-inégaux, par exemple, une balle de plomb & une plume tombent également vite dans un espace vuide, ou très-peu résistant, tel qu'est le récipient de la machine pneumatique, après qu'on en a pompé l'air. D'où il suit que les poids des corps, c'est-à-dire, les forces accélératrices qui les font descendre, suivent la raison des masses. En effet, il est évident que, pour mouvoir, avec la même vitesse, deux masses qui sont exprimées, par exemple, par les nombres 100 & 1, il faut que la première force soit centuple de la seconde, puisque la masse 100 peut être décomposée en 100 masses, qui sont chacune 1, & qui demandent chacune, pour être mue, une force 1.

XII. Il suit de-là que, si l'on a deux corps M & m , dont les poids soient P & p , on aura $P : p :: M : m$; ce qui donne $Pm = pm$. Ainsi, en appliquant aux mouvements de deux corps qui tombent librement par leurs pesanteurs, les formules générales des mouvements uniformément *accéléérés*, on voit que les trois formules (B), (C), (D), se simplifient, puisque, dans chacune d'elles, les deux membres peuvent être divisés par les quantités égales Pm & pm . Nous aurons donc, au lieu de ces trois formules, les trois suivantes, (H) $Tv = \sqrt{V}$; (I) $FTr = ut$; (K) $Evv = \sqrt{V}$, dont la première nous apprend que les vitesses

finales de deux corps qui tombent, sont comme les tems; la seconde, que les espaces parcourus sont comme les quarrés des tems; la troisième, qui est une suite des deux autres, que les espaces parcourus sont comme les quarrés des vitesses finales.

Quant à la formule (A), elle subsiste toujours; mais elle est inutile à considérer ici, comme trop générale; elle ne demande point que, pour deux corps, les vitesses finales soient comme les tems, ou, ce qui revient au même, que les forces accélératrices soient proportionnelles aux masses. La supposition de cette proportionnalité est un cas particulier auquel se rapporte le mouvement des corps graves; & les trois formules (H), (I), (K), suffisent pour toute la théorie de ce mouvement.

XIII. On voit, par la formule (I), que, lorsqu'on connoît l'espace qu'un corps grave parcourt pendant un tems donné, on connoît aussi l'espace que ce corps, ou tout autre corps grave parcourt pendant un tems aussi donné. Or l'expérience apprend que tout corps grave parcourt, à très-peu près, 15 pieds pendant la première seconde de sa chute. Si donc on veut connoître, par exemple, combien de pieds un corps grave parcourra pendant 7 secondes, on fera cette proportion (I'): (7) :: 15 pieds :: $x = 735$ pieds.

XIV. Il suit de la même formule, que, si l'on partage le tems de la chute d'un grave en parties égales, les espaces parcourus, pendant chacune de ces parties séparément, seront entr'eux comme la suite des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, &c. Car, en représentant la suite des tems, à compter toujours depuis zéro, par la suite des nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5, &c.; la suite des espaces parcourus, à compter aussi depuis zéro, est représentée par la suite des quarrés 1, 4, 9, 25, &c. Ainsi, 1 est l'espace parcouru pendant la première partie du tems; 4 est l'espace parcouru pendant les deux premières parties du tems; 9 est l'espace parcouru pendant les trois premières parties du tems, &c. Donc, pour avoir l'espace parcouru pendant la seconde partie du tems seule, il faut retrancher 1 de 4, ce qui donne 3 pour cet espace; pour avoir l'espace parcouru pendant la troisième partie du tems, seule, il faut retrancher 4 de 9, ce qui donne 5 pour cet espace, &c. D'où l'on voit que les espaces parcourus, pendant chacun des intervalles égaux du tems, en particulier, sont représentés par les termes de la suite, 1, 3, 5, 7, &c. Ainsi, par exemple, si on veut connoître l'espace parcouru pendant la septième seconde seule, on fera cette proportion, 1 : 13 :: 15 pieds :: $x = 195$ pieds.

XV. On a souvent besoin, dans la Mécanique, du problème suivant: Un corps parcourt uniformément un espace E , pendant le tems t ; déterminer la hauteur H dont il devoit tomber, par sa pesanteur, pour acquies la vitesse avec laquelle il se meut. Or, pour résoudre ce problème, je nomme a la hauteur connue dont tombe un corps grave

pendant le tems θ ; & j'observe qu'en vertu de la formule (K) , la vitesse finale de ce corps sera représentée par $\sqrt{a}$, & que, s'il tomboit de la hauteur h , la vitesse finale seroit représentée par $\sqrt{h}$. D'un autre côté, on voit, par l'article VIII, que, si le même corps vient à le mouvoir uniformément, pendant le tems θ , avec la vitesse $\sqrt{a}$, il parcourra un espace $= 2a$; & comme, par hypothèse, le mobile du problème parcourt uniformément l'espace E , pendant le tems t , avec une vitesse qui doit être représentée par $\sqrt{h}$, & que, dans les mouvements uniformes, les espaces parcourus sont comme les produits des vitesses par les tems, il s'en suit qu'on aura la proportion $2a : E :: \sqrt{a} : \sqrt{h}$; d'où l'on tire $h = \frac{E^2}{4a} \times \frac{1}{t^2}$.

Soient, par exemple, $a = 100$ pieds, $t = 3$ secondes, & supposons $a = 15$ pieds, & par conséquent $\theta = 1$ seconde, on trouvera $h = 18\frac{1}{3}$ pieds. Ainsi, pour qu'un corps acquière, par la pesanteur, une vitesse capable de lui faire parcourir uniformément 100 pieds en 3 secondes, il faut qu'il tombe de $18\frac{1}{3}$ pieds de hauteur.

On trouve, par la même méthode, la hauteur à laquelle remontera un corps grave, lancé verticalement avec une vitesse capable de lui faire parcourir uniformément un espace donné dans un tems donné. Car il remontera (IX) à la hauteur d'où il auroit dû tomber pour acquiescer cette vitesse.

XVI. Je passe aux mouvements des corps qui glissent sur des plans inclinés; (Voyez ce qu'on entend par plan incliné, au mot PLAN INCLINÉ.) Soit un corps A (Méch. fig. 7) qui descende le long d'un plan incliné BD ; représentons son poids par la verticale AN , & décomposons cette force en deux autres AM , AO , l'une perpendiculaire, l'autre parallèle au plan incliné; il est clair que la première est détruite, & que la seconde est la seule qui fasse glisser le corps; nous faisons abstraction du frottement & de toute autre résistance. En nommant p le poids absolu du corps, ou la force AN , F la pesanteur relative ou la force qui pousse le corps parallèlement à BD , on aura $F = p \times \frac{AO}{AN}$. Or, à cause des triangles semblables

$\triangle ANB$, $\triangle BCD$, on a $\frac{AO}{AN} = \frac{BC}{BD}$; donc $F = p \times \frac{BC}{BD}$. Par où l'on voit que le mouvement du corps A est de même nature que celui des corps qui tombent librement par la pesanteur, c'est-à-dire, uniformément accéléré, puisque la force accélératrice F , est à la pesanteur absolue p , dans le rapport constant de la hauteur BC du plan incliné à sa longueur BD . Ainsi, on peut appliquer aux mouvements de deux corps qui glissent sur des plans inclinés, les formules générales (A) , (B) , (C) , (D) des mouvements uniformément accélérés.

XVII. Soient donc deux plans inclinés comme on vendra, parcourus par deux mobiles, & nommés respectivement :

Les longueurs des plans inclinés, ou les espaces parcourus E & $\bar{E}$,
Les hauteurs de ces plans H & $\bar{H}$,
Les tems des mouvements T & $\bar{T}$,
Les masses des corps M & $\bar{m}$,
Leurs pesanteurs relatives F & $\bar{f}$,
Leurs vitesses finales V & $\bar{v}$.

Cela posé, 1.^o la formule (A) a lieu ici, sans aucune simplification.

2.^o Les forces accélératrices, que nous avons nommées P & $\bar{P}$ (IV) , sont ici F & $\bar{f}$. De plus, en nommant p & $\bar{p}$ les pesanteurs absolues de nos corps, on a, par l'article précédent, $F = \frac{p}{H} E$.

3.^o Substituons pour P & $\bar{P}$ ces valeurs dans les formules (B) , (C) , (D) , nous aurons $pHTMv = \frac{1}{2} pHEE$; $pHTTm = \frac{1}{2} pHEE$; $pHmv = \frac{1}{2} pHEE$. Or on a (XII) , $p : \bar{p} :: M : \bar{m}$, ou bien $pm = \bar{p}\bar{m}$; donc, en divisant ces trois formules par les quantités égales pm & $\bar{p}\bar{m}$, on aura (L) $HTv = HEV$; (M) $HTT = HE$; (N) $Hv = hVV$.

Les formules (A) , (L) , (M) , (N) représentent de la manière la plus générale toutes les propriétés relatives des mouvements de deux corps qui glissent sur deux plans inclinés. Nous nous contenterons d'en faire une application.

Trouver le rapport des tems employés à parcourir les cordes d'un cercle vertical, menées des extrémités d'un diamètre vertical?

Soit BR le diamètre vertical du cercle proposé (Méch. fig. 8), & soient BD , BK deux cordes quelconques menées de l'extrémité B de ce diamètre; DQ , KP les ordonnées correspondantes; il est clair qu'on peut regarder BD & BK comme deux plans inclinés, dont BQ & BP sont les hauteurs. Or, par la propriété du cercle, on a $BD : BK :: BQ : BP$, c'est-à-dire, $EE : ee :: H : h$; donc $Eh = eEh$.

Divisant les deux membres de la formule (M) par ces quantités égales, on aura $TT = t$, $T = t$. Ainsi, les tems employés à parcourir les cordes BD , BK sont égaux entr'eux.

On trouveroit de même que le tems employé à parcourir la corde quelconque NR , menée de l'extrémité inférieure du diamètre BR , est égal au tems employé à parcourir toute autre corde BD ou BK . Ainsi, on doit conclure que toutes les cordes d'un cercle vertical, tirées des extrémités d'un diamètre vertical, sont parcourues en tems égaux. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le diamètre vertical est compté lui-même au nombre des cordes qui partent de ses extrémités. (L. B.)

Voyez la Théorie générale des mouvements variés, au mot MOUVEMENT.

ACCIDENTEL, adj. (Perspective.) On nomme

point *accidental*, en perspective, le point de la ligne horizontale, ou se rencontrent les projections de deux lignes, qui sont parallèles l'une à l'autre, dans l'objet qu'on veut mettre en perspective, & qui ne sont pas perpendiculaires au tableau. On appelle ce point *accidental*, pour le distinguer du point principal, qui est le point où tombe la perpendiculaire menée de l'œil au tableau, & où se rencontrent les projections de toutes les lignes perpendiculaires au tableau. Voyez *LIGNE HORIZONTALE*. (O.)

ACCOUPLER. On dit au trierac *accoupler ses dames*: c'est proprement les disposer deux à deux sur une fêche. Voyez *DAMES*.

ACCROISSEMENT, *C. m.* (*Algèbre*.) On appelle *accroissement* l'augmentation qu'une quantité variable, dans un calcul, est supposée recevoir par rapport à d'autres quantités constantes ou variables: augmentation qui peut être finie ou infiniment petite. Voyez *DIFFÉRENCE*.

ACHARNAR, (*Astron.*) nom arabe de la belle étoile de première grandeur, qui est à l'extrémité de l'éridan, que les astronomes désignent par la lettre α . On l'appelle aussi *acharnabar*, *acharnarim*, *char*; un grec *τοξότης οὐρανος*, (*Almag. p. 196.*) la dernière du fleuve. (*D. L.*)

ACHLUSCHEMALI, nom de la constellation appelée *couenne boréale*.

ACHROMATIQUE, *terme d'Optique*; c'est le nom que j'ai cru devoir donner dans mon *Astronomie*, à des lunettes de nouvelle invention, destinées à corriger les aberrations & les couleurs, par le moyen de plusieurs substances différentes. Je fais dériver cet adjectif du mot grec *αχρωμα*, couleur, précédé d'un α privatif. La première trace de cette idée ingénieuse, se trouve dans un Mémoire du célèbre M. Euler. (*Acad. de Berlin, 1747, tom. III.*) « Voici ce qu'il en disoit en 1747: Il est reconnu parmi les astronomes, que les verres objectifs dont on se sert ordinairement dans les lunettes, ont ce défaut, qu'ils produisent une infinité de foyers, selon les différents degrés de réfrangibilité des rayons. Les rayons rouges souffrent la plus petite réfraction en passant par le verre, forment leurs foyers à une plus grande distance du verre, que les rayons violets dont la réfraction est la plus grande; de-là vient que, si la lumière, qui passe par le verre objectif, n'est composée de plusieurs sortes de rayons, ce n'est plus dans un point que les rayons rompus se rassemblent, comme on le suppose communément, dans l'Optique. Mais le foyer sera étendu sur un espace qui sera d'autant plus considérable que le foyer sera plus éloigné du verre objectif. » Newton a déjà soupçonné que des objectifs, composés de deux verres dont l'espace intermédiaire seroit rempli d'eau, pourroient servir à perfectionner les lunettes, par rapport à l'aberration des rayons qu'ils souffrent à cause de la figure sphérique des verres. Mais il ne paroit pas

qu'il eût l'idée que, par ce même moyen, il seroit possible de retrécir l'espace par lequel les foyers de divers rayons se trouvent dispersés. Or il m'a paru d'abord très-probable qu'une certaine combinaison de différents corps transparents, pourroit être capable de remédier à cet inconvénient, & je suis persuadé que, dans nos yeux, les différentes humeurs s'y trouvent arrangées, en sorte qu'il n'en résulte aucune diffusion du foyer. C'est, à mon avis, un sujet tout nouveau d'admirer la structure de l'œil; car, s'il n'avoit été question que de représenter les images des objets, un seul corps transparent y auroit été suffisant, pourvu qu'il eût eu la figure convenable; mais, pour rendre cet organe accompli, il falloit employer plusieurs différents corps transparents, leur donner la juste figure, & les joindre selon les règles de la plus sublime Géométrie, pour que la diverse réfrangibilité des rayons ne troublât point les représentations. C'est ainsi que la considération de ce qui se passe dans nos yeux, conduisoit M. Euler à chercher un moyen d'imiter la nature, & lui faisoit espérer d'y parvenir par des combinaisons de fluides entre deux verres.

En conséquence, M. Euler chercha les dimensions des objectifs formés de verre & d'eau, de manière à pouvoir imiter la combinaison qui se fait naturellement dans l'œil; mais toutes les ressources de la plus profonde géométrie ne pouvoient compenser ce qui manquoit alors à nos connaissances, par rapport à l'effet des différentes substances pour la dispersion des rayons colorés. Les lunettes qui furent exécutées à Paris sur ce principe, ne réussirent qu'imparfaitement.

Dès que le Mémoire de M. Euler parut, feu Jean Dollond le père, célèbre opticien de Londres, (mort en 1761), voulut en tirer parti; mais il crut reconnoître que cette théorie ne s'accordoit point avec celle de Newton, ni avec les expériences, & cela suffisoit en Angleterre pour arrêter le progrès de ces recherches. On disputa quelque temps sur cette matière; mais, en 1755, M. Klingenshierna fit remettre à Dollond un écrit qui le força de douter de l'expérience de Newton, qu'il avoit long-temps opposée à M. Euler. Dans cet écrit, qui fut communiqué, en 1761, à M. Clairaut par M. Ferner, collègue de M. Klingenshierna, l'expérience de Newton n'est attaquée que par la métaphysique & la géométrie; mais c'est en suivant une route qui montre, au premier coup-d'œil, la légitimité du doute que l'auteur devoit. (*Mém. de l'Acad. 1757, p. 524.*)

La proposition expérimentale de Newton, que l'on trouve dans son *Optique*, p. 145 de l'édition française, en 4.^e, est énoncée ainsi: « Toutes les fois que les rayons de lumière traversent deux milieux de densité différente, de manière que la réfraction de l'un détruise celle de l'autre, & que par conséquent les rayons émergents soient parallèles aux incidents, la lumière sort toujours
» blanche. »

« blanche. » Cette proposition, que l'on soutenoit en Angleterre, n'est point vraie exactement & dans tous les cas.

Dollond voulant reconnoître la vérité ou la fausseté de cette proposition, en fit l'épreuve de la manière que Newton indique lui-même. Dans un prisme d'eau renfermé entre deux plaques de verre, le tranchant tourné en bas, il plaça un prisme de verre, dont le tranchant étoit en haut; & comme il avoit disposé les plaques de verre de manière que leur inclinaison pût être changée à volonté, il parvint facilement à leur en donner une, telle que les objets, regardés au travers de ce double prisme, paroissent à même hauteur que lorsqu'on les regarde à la vue simple; ce qui apprenoit que les deux réfractions s'étoient mutuellement détruites; alors les objets se trouvoient teints des couleurs de l'iris, comme on fait que le sont tous les objets qu'on regarde au travers des prismes. Dollond fit ensuite mouvoir de nouveau les plaques du prisme d'eau, jusqu'à ce qu'il leur trouvât une inclinaison telle que les objets regardés au travers des deux prismes, paroissent sans iris, & alors leur hauteur apparente n'étoit plus la vraie; ce qui montrait que les réfractions ne s'étoient point redressées mutuellement, quoique les différences de réfrangibilité des rayons colorés, se fussent corrigées les unes par les autres.

Dollond sachant qu'il y avoit deux sortes de verres bien plus propres l'un que l'autre à la netteté des images, conjectura que cette différence de qualité venoit de celle de leurs vertus réfringentes ou dispersives, relativement aux rayons colorés. Il pensa que tel verre pourroit rendre la différence de réfrangibilité du rouge au violet, beaucoup plus sensible que tel autre, & causer, par ce moyen, des iris beaucoup plus étendues, quoique la réfraction moyenne ne fût pas fort différente; il en conçut l'expérience de réussir mieux dans son objet, en combinant des lentilles de verres de différentes qualités, qu'en employant du verre & de l'eau, parce que l'eau & le verre, relativement à leurs réfractions moyennes, ne produisoient pas des différences assez sensibles dans les réfrangibilités des couleurs. Un verre très-blanc & fort transparent, appelé communément *flintglass*, en France *crystal d'Angleterre*, est celui qui, suivant Dollond, donne les iris les plus remarquables, & par conséquent celui dans lequel la réfraction du rouge diffère le plus de celle du violet. Un verre véritable, connu en Angleterre sous le nom *crown-glass*, & qui ressemble beaucoup, en qualité, à notre verre commun, est au contraire celui qui donne la moindre différence dans la réfrangibilité: ce sont les deux matières dont Dollond imagina de se servir en 1758, après avoir mesuré leurs qualités réfringentes; ce qu'il fit d'une manière analogue à celle qu'il avoit employée pour le verre & l'eau. Il trouva que le rapport des différences dispersives étoit celui de trois à deux, en sorte

Mathématiques, Tome I, 1.^{re} Partie.

que le spectre coloré, qui, avec un prisme de *crown-glass*, auroit deux pouces de longueur, en a trois avec un prisme de *flintglass* ou de *crystal d'Angleterre*. (*Mém. Acad. 1756, pag. 386. Philosophical Transactions 1758, p. 240.*)

Les premières lunettes qui furent exécutées par Dollond, eurent un très-grand succès. Les géomètres s'exercèrent bientôt à cliquer les courbures les plus propres à corriger les aberrations de réfrangibilité, & en même temps de sphéricité: on peut voir sur la théorie de ces lunettes *achromatiques*, M. Clairaut; (*Mém. Acad. 1756, pag. 380; 1757, pag. 324; 1762, pag. 578.*) M. Euler, dans les trois volumes de *Optique*, *Mém. Acad. 1765, p. 555; Mém. de Berlin, tome XXII, p. 119; M. d'Alembert, Opuscules math. d'abord dans le tome III, publié en 1764, & ensuite dans les tomes IV & suivants, jusqu'en 1789, & dans les Mémoires de l'Académie pour 1764; M. Klingenshierna, dans une pièce qui a remporté le prix de l'Académie de Pétersbourg en 1762; M. Rochon, dans ses *Opuscules* publiés en 1768, & ses *Mémoires* publiés en 1783, in-8; le père Boscovich, dans les cinq *Disserations latines* qu'il a publiées à Vienne en 1767, in-4, & dans l'ouvrage intitulé *Mémoire sur la Catoptrique*, 1781; le père Pézenas, dans la traduction de l'*Optique* de Smith, Avignon, 1767; M. Duval le Roi, dans celle qu'il donna la même année à Brest. Nous nous contenterons de rapporter ici les dimensions de deux lunettes excellentes, d'environ quarante-trois pouces de foyer, faites par le fils de Dollond vers 1765, & qui surpassent tout ce qu'on avoit fait dans ce genre; elles sont très-supérieures aux télescopes de même longueur, parce que de tels télescopes ne porteroient pas une plus grande ouverture, n'augmenteroient pas davantage l'objet, & auroient d'ailleurs moins de champ & beaucoup moins de clarté.*

L'objectif est composé de trois verres, dont un est de *flintglass*, concave des deux côtés, placé entre deux lentilles bi-convexes, de verre commun. Les six rayons des courbures, à commencer par celui de la surface extérieure, sont, dans une de ces lunettes, de 115, 450, 215, 215, 320 & 320 lignes. Dans la seconde lunette, les six rayons sont de 315, 400, 238, 290, 316, 316 lignes: cette dernière a 43 pouces 5 lignes de foyer, & 4 pouces 4 lignes d'ouverture. Ces lunettes grossissent depuis cent jusqu'à deux cents fois, suivant les différents équipages qu'on y applique, & surpassent par conséquent les anciennes lunettes de vingt-cinq à trente pieds. Ces lunettes deviendroient encore meilleures, lorsqu'on y emploiera trois espèces différentes de verres, au lieu de deux, qui, à la rigueur, ne réunissent que deux sortes de rayons. (le père Boscovich, *Disseration II, pag. 101.*) Voyez LUNETTES. (*M. de LA LAMBE.*)

ACHRONIQUE. (*Astronomie.*) Voyez ACHRONIQUE.

ACLASTÉ, adj. (*Optique.*) Leibnitz donne

ce nom (Voyez *Lévi. Op. Tome III, page 203.*) aux figures qui ont les propriétés requises pour rompre les rayons de lumière, & qui cependant les laissent passer sans aucune réfraction.

ACOUSTIQUE, f. f. est la doctrine ou la théorie des sons. *V. SON.*

L'*Acoustique* est proprement la partie théorique de la Musique : c'est elle qui donne les raisons plus ou moins satisfaisantes du plaisir que nous fait l'harmonie, qui détermine les affections ou propriétés des cordes vibrantes, &c. Voyez *SON, HARMONIE, CORDES.*

L'*Acoustique* est la même science qu'on a autrement appelée *Phonique*. Voyez *PHONIQUE.*

On appelle *instruments acoustiques*, les instruments par lesquels ceux qui ont l'ouïe dure, s'émouvent à ce défaut. Voyez *CORNET, PORTE-VOIX.*

Le Docteur Hook prétend qu'il n'est pas impossible d'entendre à la distance d'une stade, le plus petit bruit qu'une personne puisse faire en parlant, & qu'il fait un moyen d'entendre quelqu'un à travers une muraille de pierre, épaisse de trois pieds. Voyez *ECHO, CABINETS SECRETS & PORTE-VOIX.*

ACQUIT, f. m. (terme de jeu) au billard ; c'est le coup que celui qui a le devant, donne à jouer sur sa bille, à celui qui est le dernier.

ACRE, mesure de superficie. Ce mot est commun à plusieurs Langues ; en Arabe, c'est *Acar*, en Grec, *ακρον* ; en Celte & en Teuton, *Acker* ; en Saxon, *Acer* ; en Latin, *Ager*. Il signifioit originairement une terre labourable ; Saumaise le fait venir d'*Acra*, qui a été dit pour *Akenas*, qui signifioit, chez les Anciens, une mesure de dix pieds ; mais ce mot se prend aujourd'hui pour une mesure de terre, différente selon les différents pays. En Normandie, l'*Acre* est de 160 perches carrées.

L'*Acre* d'Angleterre contient 43560 pieds anglois carrés, qui valent 1135 toises carrées de superficie, mesure de Paris ; l'arpent de Paris est de 900 toises carrées, & celui des Eaux & Forêts est de 1544 dans toute la France, suivant l'ordonnance des Eaux & Forêts. Voici une table de subdivision de l'*Acre* d'Angleterre, en mesures angloises.

Pouces. Inches.	Pieds. Feet.	Yards.	Paces.	Poles.	Rood.	Acre.
144						
1296	9					
3600	25	1				
39204	272	30	10,89			
1568160	10890	1210	435,6	40		
6272640	43560	4840	1741,6	160	4	

Ainsi, l'*Acre* contient 4 roods, le rood 40 poles, & 1210 yards ou brasses, chacune de trois pieds. Le pied d'Angleterre, suivant les dernières vérifications, que M. Maskeline, astronome royal d'An-

gleterre, en a faites sur les toises que je lui avois envoyées, est de 11 pouces & lignes, & 1154 dix millièmes de lignes, du pied de Paris, pris sur la toise de l'Académie, qui sert actuellement de règle dans le royaume. (*DE LA LANDE.*)

ACRONYQUE, adj. m. (*Astronomie.*) se dit du lever d'une étoile au-dessus de l'horizon ou de son coucher, lorsque le soleil se couche. Voyez *LEVER & COUCHER.*

La plupart écrivent *achronique*, faisant venir ce mot de *α* privatif & *χρονος*, temps, en quoi ils se trompent ; car c'est un mot francisé du Grec *ακρονυκτικος*, composé de *ακρον*, extrémité, & *νυκτις*, nuit : *ideo ακρονυχτικον* quod circa *ακρον νυκτος* ; aussi quelques auteurs écrivent-ils même *acronyctal* au lieu d'*acronychus* ; & cette façon de l'écrire est en effet très-conforme à l'étymologie, mais contraire à l'usage.

Lever ou coucher *acronyque* est opposé à lever ou coucher *cosmique* qui a lieu quand le soleil se lève ; l'un est le lever ou le coucher du matin, l'autre le lever ou le coucher du soir. *V. LEVER.*

ACTION, f. f. (*mécanique*) : mot dont on se sert quelquefois pour désigner l'effort que fait un corps ou une puissance contre un autre corps ou une autre puissance, quelquefois l'effet même qui résulte de cet effort.

C'est pour nous conformer au langage commun des mécaniciens & des physiciens, que nous donnons cette double définition. Car si on nous demande ce qu'on doit entendre par *action*, en n'attachant à ce terme que des idées claires, nous répondrons que c'est le mouvement qu'un corps produit réellement, ou qu'il tend à produire dans un autre, c'est-à-dire, qu'il y produiroit, si rien ne l'empêchoit. Voyez *MOUVEMENT.*

En effet, toute puissance n'est autre chose qu'un corps qui est actuellement en mouvement, ou qui tend à se mouvoir ; c'est-à-dire, qui se mouvrait si rien ne l'en empêchoit. Voyez *PUISSANCE*. Or dans un corps, ou actuellement mu, ou qui tend à se mouvoir, nous ne voyons clairement que le mouvement qu'il a ou qu'il auroit s'il n'y avoit point d'obstacle ; donc l'*action* d'un corps ne se manifeste à nous que par ce mouvement : donc nous ne devons pas attacher une autre idée au mot d'*action*, que celle d'un mouvement actuel ou de simple tendance ; & c'est embrouiller cette idée, que d'y joindre celle de je ne sais quel être métaphysique, qu'on imagine résider dans le corps, & dont personne ne sauroit avoir de notion claire & distincte. C'est à ce même mal-entendu qu'on doit la fautive question des forces vives, qui, selon les apparences, n'auroit jamais été un objet de dispute, si on avoit bien voulu observer que la seule notion précise & distincte, qu'on puisse donner au mot de *force*, se réduit à son effet ; c'est-à-dire, au mouvement qu'elle produit, ou tend à produire. Voyez *FORCE*.

Quantité d'*action*, est le nom que donne M. de Maupertuis, dans les Mémoires de l'Académie

des Sciences de Paris, 1744, & dans ceux de l'Académie de Berlin, 1746, au produit de la masse d'un corps, par l'espace qu'il parcourt, & par sa vitesse. M. de Maupertuis a découvert cette loi générale, que dans les changemens qui se font dans l'état d'un corps, la quantité d'action nécessaire pour produire ce changement, est la moindre qu'il est possible. Il a appliqué heureusement ce principe à la recherche des loix de la réfraction, des loix du choc, des loix de l'équilibre, &c. ; il s'est même élevé à des conséquences plus sublimes sur l'existence d'un premier être. Les deux Ouvrages de M. de Maupertuis que nous venons de citer, méritent toute l'attention des Philosophes ; & nous les exhortons à cette lecture : ils y verront que l'Auteur a su allier la métaphysique des causes finales (Voyez CAUSES FINALES) avec les vérités fondamentales de la Mécanique ; faire dépendre d'une même loi le choc des corps élastiques, & celui des corps durs, qui jusqu'ici avoient eu des loix séparées, & réduire à un même principe les loix du mouvement, & celles de l'équilibre.

Le premier Mémoire où M. de Maupertuis a donné l'idée de son principe, est du 15 Avril 1744 ; & à la fin de la même année, M. le Professeur Euler publia son excellent Livre : *Methodus inveniendi lineas curvas maximi vel minimi proprietate gaudentes*. Dans le supplément qui y est joint, cet illustre Géomètre démontre que dans les trajectoires que des corps décrivent par des forces centrales, la vitesse multipliée par l'élément de la courbe, fait toujours un *minimum*. Ce Théorème est une belle application du principe de la moindre action, au mouvement des planètes.

Par le Mémoire du 15 Avril 1744, que nous venons de citer, on voit que les réflexions de M. de Maupertuis, sur les loix de la réfraction, l'ont conduit au Théorème dont il s'agit. On fait le principe que M. de Fermat, & après lui, M. Leibnitz, ont employé pour expliquer les loix de la réfraction. Ces grands Géomètres ont prétendu qu'un corpuscule de lumière, qui va d'un point à un autre, en traversant deux milieux différens, dans chacun desquels il a une vitesse différente, doit y aller dans le tems le plus court qu'il est possible ; & d'après ce principe, ils ont démontré géométriquement, que ce corpuscule ne doit pas aller d'un point à l'autre en ligne droite, mais qu'étant arrivé sur la surface qui sépare les deux milieux, il doit changer de direction, de manière que le sinus de son incidence, soit au sinus de la réfraction, comme sa vitesse dans le premier milieu, est à sa vitesse dans le second ; d'où ils ont déduit la loi si connue du rapport constant des sinus. Voyez SINUS, RÉFRACTION, &c.

Cette explication, quoique fort ingénieuse, est sujette à une grande difficulté, c'est qu'il faudroit que le corpuscule s'approchât de la perpendiculaire, dans les milieux où sa vitesse est moindre, & qui par conséquent lui résistent davantage ; ce qui paroît contraire à toutes les explications mécaniques qu'on

a données jusqu'à présent de la réfraction des corps, & en particulier de la réfraction de la lumière.

L'explication, entre autres, qu'a imaginée M. Newton, la plus satisfaisante de toutes celles qui ont été données jusqu'ici, rend parfaitement raison du rapport constant des sinus, en attribuant la réfraction des rayons, à la force attractive des milieux ; d'où il s'ensuit que les milieux plus denses, dont l'attraction est plus forte, doivent approcher le rayon de la perpendiculaire, ce qui est en effet confirmé par l'expérience. Or l'attraction du milieu ne sauroit approcher le rayon de la perpendiculaire, sans augmenter sa vitesse, comme on peut le démontrer aisément : ainsi, suivant M. Newton, la réfraction doit se faire en s'approchant de la perpendiculaire, lorsque la vitesse augmente ; ce qui est contraire à la loi de MM. Fermat & Leibnitz. M. de Maupertuis a cherché à concilier l'explication de M. Newton, avec les principes métaphysiques : au lieu de supposer avec MM. de Fermat & Leibnitz, qu'un corpuscule de lumière va d'un point à un autre dans le plus court tems possible, il suppose qu'un corpuscule de lumière va d'un point à un autre, de manière que la quantité d'action soit la moindre qu'il soit possible. Cette quantité d'action, dit-il, est la vraie dépense que la nature ménage : par ce principe philosophique, il trouve que non seulement les sinus sont en raison constante, mais qu'ils sont en raison inverse des vitesses, (ce qui s'accorde avec l'explication de M. Newton), & non pas en raison directe, comme le prétendent MM. de Fermat & Leibnitz.

Il est singulier que tant de philosophes, qui ont écrit sur la réfraction, n'aient pas imaginé une manière si simple de concilier la Métaphysique avec la Mécanique ; il ne falloit, pour cela, que faire un assez léger changement au calcul fondé sur le principe de M. de Fermat. En effet, suivant ce principe, le tems, c'est-à-dire, l'espace divisé par la vitesse, doit être un *minimum* : de sorte que, si l'on appelle E l'espace parcouru dans le premier milieu avec la vitesse V , & e l'espace parcouru dans le second milieu avec la vitesse v , on aura $\frac{E}{V} + \frac{e}{v} =$ à un *minimum*, c'est-à-dire, $\frac{dE}{dV} + \frac{de}{dv} = 0$. Or il est facile de voir que les sinus d'incidence & de réfraction sont entr'eux comme DE à $-de$; d'où il s'ensuit que ces sinus sont en raison directe des vitesses V, v ; & c'est ce que prétend M. Fermat. Mais, pour que ces sinus fussent en raison inverse des vitesses, il n'y auroit qu'à supposer $VdE + vde = 0$, ce qui donne $E \times V + e \times v =$ à un *minimum* ; & c'est le principe de M. de Maupertuis. Voyez MINIMUM.

On peut voir dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, que nous avons déjà cités, toutes les autres applications qu'il a faites de ce même principe, qu'on doit regarder comme un des plus généraux de la Mécanique.

Quelque partie qu'on prenne sur la métaphysique qui lui sert de base, ainsi que sur la notion que M. de Maupertuis a donnée de la quantité d'action, il n'en sera pas moins vrai que le produit de l'espace par la vitesse, est un minimum dans les loix les plus générales de la nature. Cette vérité géométrique, due à M. de Maupertuis, subsistera toujours, & on pourra, si l'on veut, ne prendre le mot de *quantité d'action*, que pour une manière abrégée, d'exprimer le produit de l'espace par la vitesse (O).

ACUTANGLE, adj. Un triangle acutangle est celui dont les trois angles sont aigus. On appelle aussi cette espèce de triangle, *Triangle oxigène*. Voyez TRIANGLE.

ACUTANGULAIRE. *Section acutangulaire d'un cône*, est la section d'un cône, par un plan qui fait un angle avec l'axe du cône.

Les premiers Géomètres qui considérèrent les sections coniques, ne firent attention qu'au cône droit, tel que le cône défini par Euclide. (*Def. 18. livr. XI.*) & ils s'attachèrent uniquement aux sections formées par un plan perpendiculaire à un des côtés du cône. Il est manifeste qu'une pareille section est une ellipse, si le cône est acutangle; une parabole, s'il est rectangle; & une hyperbole, s'il est obtusangle, parce que, dans le premier cas, le plan coupant rencontre le côté opposé du cône; dans le second cas, le plan est parallèle au côté opposé; & dans le troisième cas, le plan rencontre le côté opposé par le sommet au cône coupé. Aussi Archimède ne parle que de la section du cône acutangle, de celle du cône rectangle, & de celle du cône obtusangle. Les noms d'*ellipse*, de *parabole* & d'*hyperbole* le trouvent pour la première fois dans Apollonius, qui fut probablement le premier à considérer le cône scalène & les sections obtusangles. Voyez Wallis *Oper. tom. I, page 293. (J. D. C.)*

AEROMETRIE. Voyez AEROMÉTRIE.

A D D

ADDITION, f. f. (*Arithmétique*). opération par laquelle on trouve un nombre égal à plusieurs autres pris ensemble. Le nombre trouvé s'appelle *somme* des nombres ajoutés.

Tout nombre qui n'est exprimé que par un seul chiffre, s'ajoute à un autre nombre quelconque, par les premiers principes de la numération. Par exemple, si, au nombre 15, on veut ajouter le nombre 8, on observera que chacune des unités de 8 étant jointe successivement au nombre 15, il en résulte le nombre 23. De même, s'il faut ajouter 7 au nombre 349, on verra que le nombre 349 étant augmenté de 7 unités, donne le nombre 356. On apprendra en très-peu de tems à ajouter tout d'un coup, & avec le seul secours de la mémoire, chacun des nombres simples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec un autre nombre exprimé par tant de chiffres qu'on voudra. Cette première connaissance est la base de l'*addition* pour toutes sortes de nombres, comme on le va voir.

A D D

PROBLÈME I. *Ajouter ensemble plusieurs nombres incomplexes (Voyez ce mot) exprimés chacun par tant de chiffres qu'on voudra?*

Ecrivez tous ces nombres les uns sous les autres, en observant de placer dans la même colonne verticale, les unités du même ordre, c'est-à-dire, les unités simples sous les unités simples, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, &c. Les nombres étant ainsi disposés, tirez au-dessous une barre horizontale; ajoutez ensemble successivement tous les chiffres d'une même colonne verticale, en commençant par la colonne qui contient les unités du plus bas ordre, & passant successivement aux autres colonnes de la gauche. Si la somme des nombres d'une même colonne peut s'exprimer par un seul chiffre, vous le placerez dans cette colonne au-dessous de la barre; si la somme est exprimée par plus d'un chiffre, vous placerez celui de la droite dans la colonne proposée, comme étant du même ordre qu'elle, & vous retiendrez les autres pour les joindre avec la somme des nombres de la colonne voisine à gauche. Mêmes opérations successivement pour toutes les colonnes. Il est clair que le nombre total écrit au-dessous de la barre, & résultant de toutes les opérations qu'on vient d'indiquer, est la somme demandée, puisqu'il est l'assemblage des unités, des dizaines, des centaines, &c., qui composent les nombres qu'on devoit ajouter.

EXEMPLE I. *Ajouter ensemble les nombres 5049; 7898; 459?*

Ces nombres étant écrits comme on le voit ici :	5049
premièrement, j'ajoute ensemble les unités, en disant 9 & 8 font 17, & 9 font 26; j'écris le chiffre 6 sous la colonne des unités, & je retiens le chiffre 2, qui exprime des dizaines, pour l'ajouter avec la colonne des dizaines. Passant à cette colonne, je dis 2 de retenus & 4 font 6, & 9 font 15, & 5 font 20; j'écris 0 sous la colonne des dizaines, & je retiens 2 centaines pour les joindre à la troisième colonne. A cette colonne, je dis 2 de retenus, & 0 font toujours 2, & 8 font 10, & 4 font 14; j'écris 4 sous la colonne des centaines, & je retiens 1 mille pour la colonne des mille. Je continue & je dis, 1 de retenus & 5 font 6, & 7 font 13, que j'écris, en mettant le chiffre 3 sous les mille, & le chiffre 1 au rang des dizaines de mille. Les opérations sont ainsi finies, & on a 13466 pour la somme des trois nombres qu'il falloit ajouter ensemble.	7898
	459
	13466

EXEMPLE II. *Ajouter les nombres 458; 98475; 24; 94002?*

J'écris les quatre nombres qu'il faut ajouter ensemble, comme on le voit ici :	458
puis j'ajoute ensemble les chiffres qui composent chaque colonne, en commençant par celle des unités, & passant successivement aux dizaines, aux centaines, aux mille, &c. Ces additions particulières se font	98475
	24
	94002
	192959

comme dans l'exemple précédent ; & on trouve que la somme des quatre nombres en question est 19299.

Tous ces nombres peuvent être ou de simples nombres abstraits (Voyez ABSTRAIT), ou des nombres concrets (Voyez CONCRET), comme des livres, ou des toises, &c.

Remarque. Lorsque les nombres, qu'il faut ajouter ensemble, contiennent des parties décimales (Voyez NUMÉRATION), on écrit les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes, &c. Puis l'addition se fait en commençant par la colonne des parties décimales du plus bas ordre, & passant successivement aux colonnes supérieures, jusqu'à ce qu'on les ait toutes puées. Il peut se trouver dans les ordres supérieurs, des unités simples, des dizaines, des centaines, &c.

EXEMPLE I. Ajouter les nombres 478 ; 489,745 ; 8,03 ; 0,029

Ayant disposé ces nombres, comme on le voit ici, on les additionnera à l'ordinaire, en commençant par la colonne des millièmes, qui sont les unités du plus bas ordre, & venant ensuite aux autres colonnes à gauche. On trouvera pour somme, 975,804.

Comme on ne change point (Voyez NUMÉRATION) la valeur d'un nombre, en écrivant à sa droite, après la virgule, tant de zéros qu'on voudra, on auroit pu donner le même nombre de places décimales aux nombres proposés, en les écrivant sous la forme qu'on voit ici. Et on auroit toujours trouvé la même somme. Par ce moyen, les unités du plus bas ordre se trouvent de la même espèce, ce qui est plus clair & marque mieux la distinction des places.

EXEMPLE II. Ajouter ensemble les nombres 45,0484 ; 9462 ; 425,079 ; 4,7926 ; J'écris ces nombres, comme on le voit ici, & je trouve pour somme, 9936,9200. On peut supprimer, dans ce nombre, les deux zéros de la fin, sans en changer la valeur (Voyez NUMÉRATION) ; ce qui donne 9936,92 pour notre somme.

PROBLÈME II. Ajouter ensemble plusieurs nombres complexes ? (Voyez COMPLEXE).

L'addition de ces sortes se fait comme celle des nombres incomplexes. On écrit tous les nombres proposés les uns sous les autres, de manière que ceux de même espèce soient dans une même colonne, & on commence par ajouter les nombres de la plus basse espèce. On retient autant d'unités qu'ils en peuvent fournir, pour les porter avec celles de l'espèce immédiatement supérieure. Le résultat de toutes ces additions forme la somme totale.

EXEMPLE I. Additionner ensemble les trois

nombres complexes qu'on voit ici, & qui sont composés de livres, sols & deniers ?

Je commence par ajouter ensemble les deniers ; & 345^{li} 8^{ss} 9^{de} 542 12 11 comme les dizaines de deniers 2453 10 6 niens ne font pas des unités particulières, & qu'il faut 3341^{li} 12^{ss} 2^{de} 12 deniers pour faire 100 sols, on ajoutera à la fois les dizaines de deniers avec les unités, pour ne former du tout qu'une même somme. Ainsi, je dirai 9 deniers & 11 deniers font 20 deniers, & 6 deniers font 16 deniers. Dans ce 26 deniers, il y a 2 sols & 2 deniers. J'écris les deux deniers sous la colonne des deniers, & je retiens 2 sols pour les ajouter avec les sols.

Passant à l'addition des sols, & observant que 2 dizaines de sols font une livre, j'additionnerai successivement les unités & les dizaines de sols. Je dirai donc 1^{er} de retenus de la colonne des deniers, & 8^{ss} font 10^{ss}, & 1^{er} font 12^{ss} ; j'écris 2^{ss} sous les unités de sols, & je retiens 1 dizaine de sols pour la joindre aux dizaines de sols. Je pourrais, & je dis, 1 dizaine de sols de retenue, & 1 dizaine, font 2 dizaines, & 1 sont trois dizaines, qui donnent 1 dizaine de sols & 1^{er}. J'écris la dizaine de sols, & je retiens 1^{er} pour la joindre à la somme des livres.

Cette somme se trouve comme nous l'avons vu pour les nombres incomplexes.

Ainsi, la somme totale des trois nombres proposés est 3341^{li} 12^{ss} 2^{de}.

Remarque. Il est clair que, dans les nombres de ce genre, qu'on propose d'ajouter ensemble, il ne peut pas entrer au rang des sols plus de 19 sols, ni au rang des deniers plus de 11 deniers ; autrement, il en résulteroit des livres & des sols, qui seroient censés faire partie des livres & des sols, & qu'il faudroit y rapporter. De même, s'il étoit question d'ajouter ensemble des nombres composés de jours, d'heures, & de minutes, on ne pourroit pas mettre plus de 23 heures au rang des heures, ni plus de 59 minutes au rang des minutes. Ainsi des autres espèces de nombres complexes.

EXEMPLE III. Ajouter ensemble les trois nombres suivants, qui sont composés de toises, pieds, & pouces ?

La somme des pouces est 345^{to} 9^{pi} 8^{po} 29, qui donnent 9^{po} 98 3 11 & 2 pieds. J'écris, les 9 1249 4 10 pouces, & je retiens les 2^{es} pieds pour les joindre aux 1694^{to} 2^{pi} 9^{po} pieds.

La somme des pieds, en y comprenant les 2 dont on vient de parler, est 14, qui donnent 2 pieds & 2 toises ; j'écris les 2 pieds, & je retiens les deux toises.

Ces deux toises, jointes à la somme de toutes les autres toises, forment la somme 1694 toises.

Ainsi, la somme totale des trois nombres qu'il s'agissoit d'ajouter, est $1694-2^{\circ} 5^{\text{me}} (L. B.)$.

ADDITION (Algèbre) : opération par laquelle on ajoute ensemble plusieurs quantités algébriques. (Voyez QUANTITÉ).

Les quantités qu'on propose d'ajouter ensemble, peuvent être positives ou négatives (Voyez ces mots). On distingue les unes des autres, en écrivant au-devant des premières le signe + qui signifie plus; & au-devant des secondes le signe - qui veut dire moins. Sur quoi il faut observer que, lorsqu'une quantité n'est précédée d'aucun signe, elle est censée être précédée du signe +, & par conséquent du genre des quantités positives.

Cela posé, ajouter ensemble plusieurs quantités, c'est les joindre, les prendre à-la-fois avec les signes qu'elles ont. Ainsi, ajouter ensemble plusieurs biens, c'est former un bien plus grand; ajouter ensemble plusieurs dettes, c'est former une dette plus grande; ajouter un bien avec une dette, c'est former un résultat qui est l'excès du bien sur la dette, ou de la dette sur le bien, selon que le bien est plus grand que la dette, ou que la dette est plus grande que le bien.

Il est clair par-là qu'en Algèbre, ajouter ne signifie pas toujours augmenter. Quand j'ajoute un bien avec un bien, j'augmente le bien; de même quand j'ajoute une dette avec une dette, j'augmente la dette. Mais quand je joins un bien avec une dette, je diminue réellement l'une ou l'autre quantité.

PROBLÈME I. Ajouter ensemble plusieurs monomies. (Voyez MONOME.)

Écrivez tous ces monomies les uns à la suite des autres, avec les signes + & - qu'ils ont. Si dans le résultat, la somme des quantités positives l'emporte sur la somme des quantités négatives, c'est une marque qu'il y a plus de biens que de dettes; au contraire, il y aurait plus de dettes que de biens, si la somme des quantités négatives l'emportait sur la somme des quantités positives. Par exemple, qu'il s'agisse d'ajouter ensemble les quatre monomies a , $+b$, $-c$, $+d$. On écrira $a + b - c + d$, ou bien $a + b - c + d$, en sous-entendant le signe + qui commence la phrase.

PROBLÈME II. Ajouter des monomies avec des polynomes, ou des polynomes avec des polynomes. (Voyez POLYNOME.)

Il est clair qu'un tout étant égal à la somme de toutes ses parties prises ensemble, on aura la somme demandée, en joignant ensemble tous les termes des grandeurs qu'il faut ajouter, & en les affectant des signes qu'ils ont.

EXEMPLE I. Ajouter ensemble les trois polynomes :

$$\begin{aligned} a + b - c, \\ g - h - k, \\ m + n - p? \end{aligned}$$

$$\text{Somme } a + b - c + g - h - k + m + n - p.$$

*** EXEMPLE II. Ajouter ensemble les quatre polynomes :**

$$\begin{aligned} a + b + c - d, \\ b - f + g + a, \\ c - e - b + g, \\ h + c + n - d? \end{aligned}$$

$$\text{Somme } a + b + c - d + b - f + g + a + c - e - b + g + h + c + n - d.$$

Remarque. Lorsque, dans la somme, il se trouve des termes semblables, c'est-à-dire, des termes qui contiennent la même lettre, s'ils n'ont qu'une dimension; ou les mêmes lettres écrites le même nombre de fois, s'ils ont plus d'une dimension: alors au lieu d'écrire plusieurs fois le même terme, on ne l'écrit qu'une seule fois, mais on met au-devant un chiffre qui marque combien de fois ce terme doit être répété. Cela s'appelle faire la réduction. Ainsi, dans l'exemple précédent, au lieu de $a + a$, j'écris $2a$; au lieu de $b + b - b$, j'écris simplement $+b$, parce que l'un des biens $+b$, est détruit par la dette $-b$; & que par conséquent le résultat du tout $+b + b - b$ est simplement $+b$; au lieu de $+c + c + c$, j'écris $+3c$; au lieu de $-d - d$, j'écris $-2d$; enfin, au lieu de $+g + g$, j'écris $+2g$. Par toutes ces réductions, notre somme devient $2a + b + 3c - 2d - f + 2g + e + h + n$.

Le chiffre qu'on place ainsi au-devant d'une quantité, pour marquer combien de fois elle doit être répétée positivement ou négativement, s'appelle coefficient.

Lorsqu'une quantité n'a point de coefficient, elle est censée avoir l'unité pour coefficient. Ainsi a est la même chose que $1a$; a & b est la même chose que $1a$ & $1b$. Voici encore deux exemples d'additions de polynomes, avec les réductions.

EXEMPLE I. Ajouter ensemble les polynomes :

$$\begin{aligned} 3a - 2b + 4c - 8d, \\ -8a + 7b - 5c + 4d, \\ 3a - 4b + 6h? \end{aligned}$$

$$\text{Somme } -2a + b - c - 4d + 6h.$$

EXEMPLE II. Ajouter ensemble les polynomes :

$$\begin{aligned} 6aa - 5bc + 3k\sqrt{de}, \\ -7aa + 3bc - 2k\sqrt{de}, \\ 2mn - f\sqrt{mnp} + ff - gh? \end{aligned}$$

$$\text{Somme } aa - 2bc + k\sqrt{de} + 2mn - f\sqrt{mnp} + ff - gh. (L. B.)$$

ADDITIONNEL, adj. (Tuyaux additionnels.) C'est ainsi que s'appelle, dans mon Hydrodynamique, des tuyaux cylindriques de 2 à 3 pouces de longueur, que j'adapte à un réservoir qui a de minces parois, afin que l'eau suive la direction de ces cylindres, & soit à guelée-bée, par l'orifice ex-

rieur. En effet, l'expérience m'a appris qu'en supposant ces orifices égaux, & les charges d'eau égales, il n'est pas indifférent que l'eau sorte par un orifice percé dans une mince paroi, (j'appelle ici ces sortes d'orifices, *orifices simples*, pour abrégé), ou par un tuyau additionnel; car l'eau, au sortir de l'orifice simple, éprouve une contraction de la première espèce (Voyez CONTRACTION), qui diminue dans le rapport de 8 à 5, ou de 16 à 10, le produit que l'orifice devoit donner suivant la théorie, au lieu que l'eau, au sortir d'un tuyau additionnel, éprouve une contraction de la seconde espèce, qui diminue seulement, dans le rapport de 16 à 13, le produit théorique; de sorte que pour des orifices égaux, & des charges d'eau égales, le produit par un orifice simple, est au produit par un tuyau additionnel, comme 10 est à 13, du moins à peu de chose près. Voyez mon *Hydrodynamique*, tome II, page 47 & suiv. (L. B.).

ADIGEGE ou ADEGIGE, (*astron.*) Nom que les Arabes donnent à la constellation du cygne, & qui signifie rose odoriférante.

ADJACENT, adj. (*Géom.*) ce qui est immédiatement à côté d'un autre. On dit qu'un angle est adjacent à un autre angle, quand l'un est immédiatement contigu à l'autre; de sorte que les deux angles ont un côté commun. On se sert même plus particulièrement de ce mot, lorsque les deux angles ont non-seulement un côté commun, mais encore lorsque les deux autres côtés forment une même ligne droite. Voyez ANGLE & CÔTÉ.

Ce mot est composé de *ad*, à, & *jacere*, être situé.

ADOUBLER, v. a. (*terme de Jeu.*) se dit au jeu de tréfiler, aux dames, aux échecs, pour faire connaître qu'on ne touche une pièce que pour l'arranger en sa place, & non pas pour la jouer.

ÆGOCÉROS ou ÆGOCERUS, (*astron.*) nom que quelques Auteurs donnent à la constellation du capricorne, & qui vient du mot Grec *αἴς* chèvre; il y en a qui donnent ce nom à la constellation du bélier, mais il appartient au capricorne, comme on le voit dans Lucain, l. IX, vers 537 & l. X, vers 213.

..... Varii mutator circulus anni

Ægoceron, cæcurnique tenet.....

C'est-à-dire, le zodiaque qui s'étend depuis le tropique du capricorne, jusqu'à celui du cancer. Voyez CAPRICORNE. Les Poètes disent que Pan mis par les Dieux au rang des astres, se métamorphosa lui-même en chèvre, ce qui le fit surnommer Ægoceros. (D. L.)

ÆQUATEUR. Voyez ÉQUATEUR.

ÆRIENNE, (*PERSPECTIVE*) Optique. Illusion d'optique qui change l'apparence des couleurs, des jours & des ombres dans les objets, suivant les différents degrés de leur éloignement. Voici comment le servat Algarotti, grand connoisseur, parlant des objets vus dans la chambre obscure. (*Saggio sopra la Pittura*, nel tom. II. delle sue

opere, page 133 & 134, édit. de Lissabon 1764.)

« Le tableau que nous offre la chambre obscure, » différencie à merveille les figures qui sont plus » près ou plus loin du spectateur. Non-seulement » la grandeur des objets y diminue à mesure qu'ils » s'éloignent de l'œil, mais aussi leurs couleurs & » leur lumière s'affaiblissent, & leurs parties se » confondent. Plus l'éloignement est considérable, » moins les objets sont colorés, moins on distingue » leurs contours; & le jour étant plus faible on » plus éloigné, les ombres sont moins fortes. Au » contraire, lorsque les objets sont plus près de » l'œil, & plus grands, les contours sont plus pré- » cis, les ombres plus vives, & les couleurs plus » éclatantes. C'est en cela que consiste la perspective » qu'on nomme *ærienne*. » La perspective linéaire » consiste dans le changement du contour. Voyez PERSPECTIVE. (J. D. C.).

AFFECTÉ. Equation affectée, en Algèbre, est une équation dans laquelle la quantité inconnue monte à deux ou plusieurs degrés différents. Telle est, par exemple, l'équation $x^2 - px^2 + qx = a^2 b$, dans laquelle il y a trois différentes puissances de x ; savoir x^2 , x^3 , & x^4 ou x . Voyez EQUATION.

Affecté se dit aussi quelquefois en Algèbre, en parlant des quantités qui ont des coefficients; par exemple, dans la quantité $2a$, a est affecté au coefficient 2. V. COEFFICIENT.

On dit aussi qu'une quantité algébrique est affectée du signe + ou du signe -, ou d'un signe radical; pour dire qu'elle a le signe + ou le signe -, ou qu'elle renferme un signe radical. Voyez RADICAL, &c. (O.).

AFFECTION, terme qu'on employoit autrefois en Géométrie, pour désigner une propriété de quelque courbe. Cette courbe a telle affection, est la même chose que cette courbe a telle propriété. Voyez COURBE. (O.).

AFFIRMATIF, IVE, adj. Il y a en Algèbre des quantités affirmatives ou positives. Ces deux mots reviennent au même. Voyez QUANTITÉ & POSITIVE.

Le signe ou le caractère affirmatif est + (O.).

AGE de la Lune, (*en Astron.*) se dit du nombre de jours écoulés depuis la nouvelle Lune. Ainsi, trouver l'âge de la Lune, c'est trouver le nombre de jours écoulés depuis la nouvelle Lune. Voyez LUNE (O.).

AGENT, f. m. (*Méch.*) Puissance ou force qui produit ou tend à produire du mouvement.

AGIR, se dit en Méchanique & en Physique, pour produire tel ou tel effet. On dit aussi qu'un corps agit sur un autre, lorsqu'il le pousse, ou tend à le pousser.

AGLE, (*Astron.*) constellation boréale. *Aquila*, *Jovis nutrix*, *Jovis Armiger*, *rapax*, *Ganymedis*, *servat Antinous*, *Promethei*, *Aquila*, *Vultur volans*, *tortor*, *Promethei*. Les poètes disent que l'aigle apportoit du nectar à Jupiter, lorsqu'il étoit caché

dans une ancre de Crète, son pere voulant le faire périr : l'aigle contribua à sa victoire contre les géans, en lui apportant des armes ; il contribua à les plai sirs , en enlevant Ganymede, pour le servir à table. C'est pourquoi l'aigle étoit consacré à Jupiter ; il fut placé dans le ciel. D'autres prétendent que c'est l'aigle engendré par Typhon, qui dévorait le cœur de Prométhée, & qui fut tué par Hercule. M. Dupuis croit que l'aigle fut placé dans le ciel, comme le symbole de la plus grande élévation du soleil, & qu'il marquait le solstice d'est par son coucher héliaque, dans le premier établissement des constellations. Voyez *mon Mémoire* dans le IV. volume de mon *Astronomie*.

La constellation de l'aigle réunie avec celle d'Antinous, renferme 71 étoiles dans le Catalogue britannique ; & dans ce nombre est une belle étoile qui approche de la première grandeur, & dont on verra la position au mot *ÉTOILE*.

AIGU, adj. (Géom.) On appelle *angle aigu*, celui qui est plus petit qu'un angle droit. Voyez *ANGLE*.

AIGUILLE, (*Hydrodynamique*.) est une pièce de bois arrondie, assez menue, & longue de six pieds, retenue en tête par la brisé, & portant par le pied sur le feuil d'un perruis. Cette pièce sert, en la fermant, à faire hausser l'eau. (R.)

AILE, f. f. (*Hydr.*) On appelle ailes ou *ailerons* des planches rectangulaires, qu'on place à des distances égales, sur la circonférence d'une roue hydraulique, pour recevoir le choc de l'eau. C'est par cette raison, qu'on appelle ces sortes de roues, *roues à ailes*. Voyez *ROUES*.

On appelle aussi *ailes*, dans les machines à vent, les chassis garnis de toile, qui reçoivent l'impulsion du vent, & qui par-là font marcher le moulin.

AILES, terme de *rivière*, sont deux planches formant arrondissement, de trois pouces d'épaisseur, que l'on met au bout des semelles d'un bateau foncer, en avant & en arrière. Voyez *FONCER*.

AIR, f. m. (*Hydr.*) assemblage de molécules, très-subtiles, élastiques, & parfaitement mobiles, qui forment cette masse fluide & invisible, qu'on appelle *atmosphère*, dans laquelle nous vivons, nous nous mouvons, que nous inspirons & expirons alternativement.

Il ne s'agit point ici d'examiner la nature physique de l'air, ni l'analogie & les différences qu'il a avec les fluides que l'on appelle du nom générique de *gaz*, du mot hollandais *Chaos*, qui signifie *esprit*. Nous renvoyons tous ces objets au *Dictionnaire de Physique*. Ici nous ne considérons que les propriétés *mécaniques* de l'air, ou les effets qui résultent de sa fluidité, de sa pesanteur, de son élasticité, de sa mobilité, &c.

I. L'air est fluide. En effet, il cède sans peine au toucher, au mouvement des corps qui le traversent ; il transmet avec facilité & promptitude, les sons, les odeurs, & en général, toutes les émanations qui s'échappent des corps : il le met lui-même avec une

grande vitesse, aussi-tôt qu'il trouve un espace dans lequel il puisse le répandre ; en un mot, il a tous les caractères de la fluidité.

II. L'air est un fluide pesant. Car la pesanteur est une force universelle, répandue dans la nature, & il n'y a point de corps qui ne lui soit soumis. Cependant, les anciens, loin de soupçonner que l'air est un fluide pesant, le regardoient comme un corps léger, c'est-à-dire, comme un corps qui, par sa nature, tend à s'élever. Galilée est le premier qui ait connu la pesanteur de l'air ; son disciple Torricelli la démontra en 1643, par une expérience que nos Baromètres ordinaires nous mettent sans cesse sous les yeux.

Tout le monde sait que le Baromètre est un tuyau de verre, fermé hermétiquement par en-haut, ouvert par en bas, dans lequel une colonne de mercure demeure suspendue à une certaine hauteur au-dessus du mercure contenu dans une cuvette, où l'extrémité inférieure du tube est plongée. La cause qui soutient le mercure du tube au dessus du mercure de la cuvette, est la pression de l'air extérieur sur la surface de la cuvette, pression qui n'a pas lieu sur la colonne de mercure, puisque le bout supérieur du tube étant fermé, ne permet pas à l'air d'y entrer. Car, si l'on ouvre ce bout, la colonne de mercure tombe aussi-tôt, & se répand dans la cuvette.

Il faut faire à ce sujet deux remarques : 1.^o la hauteur du mercure dans le tube du Baromètre est différente, & plus ou moins grande, selon que les lieux sont moins ou plus élevés par rapport à un même niveau, tel, par exemple, que celui de la mer. La première expérience de ce genre, est celle que Pascal fit exécuter sur la montagne du Puy de Dôme, voisine de Clermont en Auvergne. Du pied au sommet de cette montagne, qui est élevée d'environ 500 toises au dessus de Clermont, le mercure baissa dans le tube de trois pouces une ligne & demie ; 2.^o dans un même lieu, la hauteur du mercure dans le tube n'est pas constante : elle varie à raison des changemens qui arrivent dans le poids où le ressort de l'atmosphère, par la pluie, par les vents, &c. L'explication de ces phénomènes n'appartient pas à notre sujet.

III. COROLLAIRE I. Il est facile de trouver, du moins pour un instant donné, le poids de toute la masse d'air qui environne le globe terrestre. Car soient R le rayon du globe terrestre, r la hauteur donnée du filet de mercure, auquel la pression de l'atmosphère fait équilibre ; n le rapport de la circonférence au diamètre, & la pesanteur spécifique du mercure. On cherchera les solides de deux sphères, dont l'une a pour rayon R + r, l'autre R ; & on retranchera le second solide du premier, ce qui donnera $\frac{4\pi(R+r)^3}{3} - \frac{4\pi R^3}{3}$ ou

$4\pi(R^2r + Rr^2 + \frac{r^3}{3})$ pour reste. On multipliera ce reste par ω , & observant que les termes, qui contiennent r^2 & r^3 , peuvent être négligés

En craindre d'erreur sensible, on aura $\frac{1}{2} \pi R^2$ pour l'expression générale & très-approchée du poids demandé.

Par exemple, soient $\pi = 28$ poncez, le poids d'un pied cube de mercure ≈ 960 livres. Supposons de plus, suivant les observations, que chaque degré d'un grand cercle de la terre, est de 57000 toises. On trouvera, en effectuant tous les calculs indiqués par la formule précédente, que le poids total de l'atmosphère, est de 110288548770909091 livres environ.

IV. COROLLAIRE II. Deux colonnes, l'une de mercure, l'autre d'eau, qui se font mutuellement équilibre, ont des hauteurs réciproquement proportionnelles à leurs pesanteurs spécifiques. V. PRESSION; de sorte que si la colonne de mercure a 28 poncez de hauteur, celle d'eau doit avoir environ 32 poncez de hauteur. Or la pression de l'atmosphère contrebalance la première de ces deux colonnes, comme nous venons de le voir; donc elle contrebalancera aussi la seconde. Ainsi, dans le vuide, la pression de l'atmosphère doit soutenir une colonne d'eau d'environ 32 poncez de hauteur.

V. COROLLAIRE III. Soit ABHO (Hyd. fig. 1) un syphon recourbé & composé de deux branches d'inégale longueur; qu'on plonge la plus courte BA dans la liqueur CN d'un tonneau CD; & qu'on ôte l'air contenu dans l'intérieur du syphon, en le suçant par le bout O: alors la liqueur du tonneau montera dans le syphon, & sortira par le bout O, pourvu que ce bout soit au dessous de la surface MN de la liqueur du tonneau.

Ce phénomène est le même que celui du Baromètre. En effet, imaginons que le bout O du syphon est plongé dans un vase EF, qui contient de la liqueur. On voit que chacune des parties AB, OH du syphon, peut être regardée comme un tube particulier, pareil à celui de Toricelli. Ainsi, en représentant la pression de l'atmosphère, par KX, le poids de la colonne fluide AB par KV, celui de la colonne HO, par KZ, il est clair que VX exprime la force qui soulève le fluide dans le tuyau AB, & que ZX exprime la force qui tend à soulever le fluide dans le tuyau OH. Or, comme ces deux dernières forces sont contraires, la plus faible est détruite; & ZV est la force restante, qui produit l'écoulement dans le sens ABHO.

On voit par-là, 1.^o que si $KV = KZ$, il ne peut pas y avoir d'écoulement; 2.^o que si le poids de la plus courte branche, est plus grand que celui de l'atmosphère, il n'y aura pas d'écoulement, parce qu'alors la pression de l'atmosphère n'a pas la force suffisante pour soulever la liqueur jusqu'en B. Ainsi, par exemple, si la liqueur est de l'eau, il faut que la hauteur de la plus courte branche AB soit de moins de 32 poncez; pour le mercure, AB doit être moins de 28 poncez, &c.

VI. L'air est un fluide élastique. Qu'on prenne une vessie, & qu'on la gonfle, en y introduisant de l'air; on aura un ballon qui se comprime lorsqu'on le presse, & qui se dilate, lorsqu'on cesse de le presser. Donc, &c.

qu'on le presse, & qui se dilate, lorsqu'on cesse de le presser. Donc, &c.

VII. La force élastique de l'air comprimé, est égale à celle qui produit la compression. La fontaine de Héron en fournit la preuve. Cette machine (Hyd. fig. 2) qu'on fait ordinairement avec du fer-blanc, est composée d'une caisse ABCD, fermée de tous côtés, pleine d'eau jusqu'en EF, un peu au dessous de AB; d'une autre caisse GHKI, aussi fermée de tous côtés, égale à la première, & pleine d'air; d'un tuyau OT, soudé exactement avec les plaines AB, DC, GH, lequel communique au dehors par le bout O, & avec la caisse inférieure par le bout T qui est très-près du fond IK; d'un tuyau XY, soudé aux deux caisses, & dont le bout supérieur X est près du fond AB; d'un tuyau PQ, dont le bout inférieur P est proche le fond DC, & le bout supérieur Q, soudé avec le fond AB, est garni d'un ajutage. Cela posé, sermez l'ajutage Q avec le doigt, & versez un peu d'eau par le bout O du tuyau OT: elle descendra jusqu'en IK, & montera, par exemple, en VS. Alors il n'y aura plus aucune communication de l'air extérieur avec celui qui reste dans les deux caisses. Continuez à verser de l'eau; l'air contenu dans les espaces GHSV, ABFE, XY se condensera peu-à-peu, jusqu'à ce que la force élastique soit en équilibre avec la pression de l'eau versée par OT. Si la surface de l'eau dans la caisse GHKI est MN, l'air dont on vient de parler, pressera perpendiculairement chaque partie de la surface qui l'environne, avec une force égale au poids d'une colonne d'eau, qui auroit pour base la partie pressée, & OL pour hauteur. Ainsi, la surface EF de l'eau contenue dans la caisse supérieure, est poussée de haut en bas par ce même air, & tend à s'élever par le tuyau PQ; de sorte que si l'on ôte le doigt de dessus l'ajutage, il sortira un jet d'eau qui s'élèvera à la hauteur RZ égale à OL. On voit donc que le ressort de l'air produit le même jet que produiroit le poids de l'eau, par lequel il a été comprimé.

On peut remarquer qu'en faisant rentrer par O, l'eau qui tombe du jet, cette eau passe dans la caisse inférieure, & que par conséquent le jet durera jusqu'à ce que toute l'eau comprimée depuis le point P jusqu'en EF, soit sortie en jaillissant.

VIII. L'air se comprime lui-même par son propre poids. Car l'air étant un fluide pesant, il s'en conçoit l'atmosphère partagée en une infinité de tranches, ou plutôt de couches perpendiculaires à la direction de la pesanteur; il est évident que les couches inférieures seront chargées du poids des supérieures; d'où résultera nécessairement une compression qui sera plus grande, toutes choses d'ailleurs égales, à mesure que la couche comprimée sera placée plus bas dans l'atmosphère. Je dis toutes choses d'ailleurs égales, car il y a d'autres causes, comme le froid & le chaud, qui concourent à comprimer & à dilater l'air. La densité de ce fluide est extrêmement variable; elle est environ huit ou neuf cent fois

moins que celle de l'eau ordinaire. Le rapport moyen de ces densités, dans nos climats, peut s'exprimer sensiblement par la fraction $\frac{1}{172}$.

IX. COROLLAIRE. De-là & de l'article VII, il suit que si l'air, après s'être comprimé lui-même par son propre poids, vient à agir par son seul ressort, il produira le même effet qu'il produiroit par son poids; cela est confirmé par l'expérience que voici.

Prenez une bouteille de verre *ABCD* (Fig. 2) de figure cylindrique; versez-y du mercure *AEFD*; faites-y entrer un petit tuyau de verre *K* de 19 ou 20 pouces de hauteur, ouvert par les deux bouts, & dont celui d'en bas trépasse de quelques lignes dans le mercure; scellez ce tuyau exactement au cou de la bouteille, de manière que l'air contenu dans l'espace *EBCF* n'ait aucune communication avec l'air extérieur; mettez ensuite cette bouteille & son tuyau sous le récipient *LIHM* de la machine pneumatique, pompez, autant qu'il sera possible, l'air contenu dans ce récipient: alors le mercure s'abaîssera en *NO*, & il s'éleva dans le tuyau au dessus de *NO*, à-peu-près à la même hauteur qu'il se soutient dans le Baromètre, dans l'endroit où l'on fait l'expérience. La raison en est évidente; car avant que de commencer à faire le vuide dans la machine pneumatique, l'air contenu dans l'espace *EBCF*, est dans le même état que l'air extérieur; lorsqu'ensuite on vient à faire le vuide sous le récipient, le même air *EBCF* déploie son ressort, force, en conséquence le mercure à s'abaîsser en *NO*, & à monter dans le tuyau vuide; & cette ascension est à-peu-près égale à celle qui est produite dans le Baromètre, par le poids de l'air. Je dis à-peu-près, parce qu'il n'est jamais possible de vuider parfaitement le récipient de la machine pneumatique.

X. Si l'on comprime une même masse ou quantité d'air, & qu'on la réduise à occuper différents espaces ou volumes, ces volumes seront entre eux, en raison inverse des forces comprimantes. Cette proposition se prouve par l'expérience suivante, qui est très connue des Physiciens, & que M. Mariotte a fait le premier. Soit *ABC* (Fig. 4), un tuyau de verre recourbé, fermé hermétiquement par le bout *C*, & ouvert par le bout *A*. Les deux branches *DA*, *EC* sont verticales; mais la branche *DE* de jonction, est horizontale. On donne ordinairement trois ou quatre lignes de diamètre intérieur à ce tuyau. La petite tranche *EC* doit être parfaitement cylindrique, pour pouvoir comparer exactement entr'eux les différents volumes de la masse d'air qu'on y condense. Nous supposons qu'elle ait 12 pouces de hauteur; l'autre *DA* est beaucoup plus haute. Versez légèrement dans le tube un peu de mercure pour remplir la branche horizontale, & faites en sorte que les deux surfaces *DV*, *IE* de ce fluide, dans les deux branches verticales, soient de niveau, afin que l'air enfermé dans l'espace *EC*, soit dans le même état que l'air extérieur; car il est évident que si le ressort de l'air intérieur *EC*, étoit plus ou

moins tendu que celui de l'air extérieur, les surfaces *IE*, *DV* seroient inégalement pressées, & que par conséquent elles ne pourroient pas être de niveau. Continuez ensuite à verser du mercure dans la branche *DA*, & vous verrez qu'à mesure qu'il s'éleva en *H*, la surface *EI* s'éleva en *F*. En supposant que la pression de l'atmosphère soit équivalente au poids d'une colonne de mercure, de 28 pouces de hauteur, vous trouverez que si, ayant mené l'horizontale *FG*, la hauteur *GH* = 14 pouces, la hauteur *FC* de l'espace occupé par l'air sera = 8 pouces; & *GH* = 28 pouces, *FC* sera = 6 pouces, &c. Or il suit de-là, que les différents volumes de l'air enfermé d'abord dans *EC*, suivent la raison inverse des poids comprimants; car au premier instant où cet air ne supporte que la pression de l'atmosphère, il peut être regardé comme chargé du poids d'une colonne de mercure, haute de 28 pouces; lorsqu'on met ensuite dans la branche *DA* du mercure, à la hauteur de 14 pouces au dessus de la ligne de niveau *FG*, la pression que souffre notre masse d'air, est égale au poids d'une colonne de mercure, qui a 28 pouces + 14 pouces, ou 42 pouces de hauteur; lorsque la hauteur du mercure dans la branche *DA*, au dessus de *FG* = 28 pouces, la pression de la même masse d'air est égale au poids d'une colonne de mercure, qui a 28 pouces + 14 pouces + 14 pouces, ou en tout 56 pouces de hauteur, &c. D'où l'on voit que les poids comprimants étant représentés par les nombres 28, 42, 56, les volumes de la masse d'air sont exprimés par les nombres 12, 8, 6. Or, on a ces différentes proportions, 12 : 8 :: 42 : 28; 12 : 6 :: 56 : 28; 8 : 6 :: 56 : 42. Donc les volumes suivent la raison renversée des poids comprimants.

On fera des raisonnemens analogues pour des hauteurs de mercure qui suiviroient tout autre rapport dans les deux branches du tube; & ces raisonnemens, fondés sur l'expérience, aboutiront à la même conclusion finale.

Toutes ces expériences doivent être faites, de manière que l'air enfermé en *FC*, ait la même température que l'air extérieur, & que par conséquent son volume ne varie qu'à raison des poids comprimants. Sans cette précaution, le chaud & le froid n'agissant pas de même sur les deux airs, changeroient les résultats, & il seroit difficile de séparer, par une méthode sûre & non hypothétique, leurs effets avec ceux des poids comprimants.

XI. COROLLAIRE I. Puisque la force élastique de l'air est égale à la force qui le comprime (VII), il s'ensuit que les différents forces élastiques d'une même masse d'air, à qui l'on fait occuper différents volumes, sont en raison inverse de ces volumes.

XII. COROLLAIRE II. Sous même masse, les densités sont en raison inverse des volumes (V. Densité). Donc les densités d'une même masse d'air, comprimée par différents poids, sont directement proportionnelles à ces poids, ou (VII) aux forces élastiques qu'elle a dans ces différents états.

XIII. COROLLAIRE III. Les densités des différens points d'une colonne verticale de l'atmosphère, forment, à température égale, une progression géométrique, décroissante à l'infini, cette suite étant supposée commencer à un même niveau, par exemple, à celui de la mer, & se continuer suivant la hauteur de l'atmosphère; car si l'on imagine que la colonne dont il s'agit, est composée d'une infinité de tranches horizontales de même masse, la densité de chacune de ces tranches est proportionnelle au poids dont elle est chargée, c'est-à-dire, à la somme faite de son propre poids, & de la somme des poids des tranches supérieures, ou à la somme faite de la densité due à son propre poids, & de la somme des densités des tranches supérieures. Or, si l'on a une progression géométrique, $a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8, a^9, a^{10}, \&c.$ décroissante à l'infini, & que l'on nomme s la somme entière de ses termes, & la somme depuis b inclusivement, & la somme depuis c inclusivement, &c.; on aura ces proportions (Voyez PROGRESSION) $a : a^2 :: s - a : s - a^2$; $a^2 : a^3 :: s - a^2 : s - a^3$; $a^3 : a^4 :: s - a^3 : s - a^4$; $a^4 : a^5 :: s - a^4 : s - a^5$; $a^5 : a^6 :: s - a^5 : s - a^6$; $a^6 : a^7 :: s - a^6 : s - a^7$; $a^7 : a^8 :: s - a^7 : s - a^8$; $a^8 : a^9 :: s - a^8 : s - a^9$; $a^9 : a^{10} :: s - a^9 : s - a^{10}$; &c. Ainsi, les densités de nos tranches suivent entr'elles la même loi que les termes d'une progression géométrique, décroissante à l'infini, & forment par conséquent une telle progression.

XIV. Remarque. Toutes les expériences qu'on a faites sur la compressibilité de l'air, prouvent qu'une même masse de ce fluide se comprime suivant la proportion des poids dont elle est chargée; mais on doit observer que ces expériences ont pour objet des condensations moyennes; car il parait que dans les cas extrêmes, la règle ne saurait être exacte. En effet, imaginons d'abord que la compression augmente à l'infini: il faudroit que la condensation augmentât de même, & qu'enfin l'air n'occupât plus qu'un espace infiniment petit. Or, quelque figure qu'on attribue aux molécules aériennes; il est clair que lorsque leurs ressorts ont été comprimés jusqu'à ce que toutes leurs parties se touchent, l'impenétrabilité mutuelle de ces parties ne permet plus de compression. Ajoutez que l'air peut être mêlé de parties dures, dénuées de ressort, ou douées d'un ressort très-imparfait. Si au contraire on suppose que la compression diminue à l'infini, on ne peut pas supposer de même que l'air se dilate à l'infini; car le ressort parait ou imparfait des molécules aériennes, ne peut avoir qu'une extension déterminée, & il est impossible de concevoir qu'une masse finie vienne à occuper un espace infini. Il n'est donc pas vrai en rigueur que les condensations de l'air suivent généralement le rapport des poids comprimants. Mais comme les forces comprimantes que nous pouvons employer dans nos expériences, ne passent jamais certaines limites, la proposition de l'article X peut alors être regardée comme vraie sans restriction.

XV. Scholie. Les principes précédens servent encore à expliquer l'ascension de l'eau dans les pompes. Voyez POMPES. Nous allons déduire ici des mêmes principes une théorie du mouvement

de l'air, laquelle est nécessaire & suffisante pour l'explication d'un grand nombre de phénomènes physiques: On trouvera au mot SON, la théorie des ébranlemens de l'air, qui produisent le son.

XVI. Soit $ABCD$ (fig. 1) un cylindre fermé de tous côtés, contenant un air homogène & également dense dans toute son étendue. Cet air est dans un état de compression, & si-tôt qu'on lui donne quelque issue, ou qu'on lui facilite le moyen de s'étendre ou de se dilater, il se dilate en effet, & sa force élastique diminue. Dans chaque état de compression, la force élastique est toujours égale à la force qui a produit cette compression (X). Ainsi, par exemple, si l'air $ABCD$ est par-ci à celui que nous respirons, & que par conséquent il ait été comprimé, ou par la pression même de l'atmosphère, ou par une force équivalente, il soutiendra par son ressort le poids d'une colonne d'eau de 32 pieds de hauteur; c'est-à-dire, qu'en regardant le fond supérieur AD du cylindre, comme un couvercle librement mobile le long des parois, & imaginant que ce couvercle est chargé dans toute sa surface, d'une colonne d'eau de 32 pieds de hauteur, il y aura équilibre entre la force élastique de l'air, & le poids de la colonne d'eau; & le couvercle AD ne pourra ni monter, ni descendre. Je suppose que la chaleur de l'air $ABCD$ demeure toujours la même; car si elle venoit à augmenter ou à diminuer, la force élastique augmenteroit ou diminueroit. Parcillement je supposerai dans la suite, que le degré de chaleur est le même pour tous les airs dont je chercherai à mesurer & à comparer les forces élastiques.

XVII. L'expérience fait voir (X & XI), que si une même masse d'air, qui conserve toujours le même degré de température, est réduite à occuper successivement différens volumes; les forces qui la compriment, & par conséquent aussi les différentes forces élastiques, suivent la raison inverse des volumes, ou la raison directe des densités. Or, restreuve une même masse d'air à occuper différens volumes, c'est la même chose que faire entrer dans un même volume différentes quantités d'air, dont les densités soient les mêmes respectivement que celles de la masse proposée dans ses différens états. Concluons donc de cette expérience, que si différentes masses d'air occupent successivement un même volume, elles ont des forces élastiques qui leur sont proportionnelles; ou, ce qui revient au même, qui sont proportionnelles à leurs densités, puisque la densité n'est autre chose que la quantité de matière comprise sous un même volume donné.

XVIII. PROBLÈME I. Déterminer la vitesse avec laquelle l'air sort à chaque instant du vase $AECD$, par le petit orifice C , en supposant qu'il s'échappe dans le vuide, ou qu'il n'éprouve aucune résistance à sa sortie?

Soyent, pour le premier instant du mouvement, P le poids auquel la force élastique de l'air peut faire équilibre, Q la densité de ce fluide; V la

vitesse; & nommons q la densité qu'il a au bout d'un certain tems t , u sa vitesse à la fin de ce même tems. De plus, nommons M & m les masses d'air qui sortent en tems égaux dans les deux cas. On voit, par l'article précédent, que la force élastique de l'air, après le tems t , sera $\frac{P}{Q}$; & comme les forces motrices sont proportionnelles aux quantités de mouvement qu'elles produisent dans le même tems, on aura $P : \frac{P}{Q} :: MV : mu$. Mais les masses M & m sont comme les produits de leurs volumes par leurs densités, & leurs volumes sont comme les produits de l'orifice par les vitesses. Ainsi, l'orifice étant le même dans les deux cas, on aura $M : m :: QV : qu$. Donc $P : \frac{P}{Q} :: QVV : quu$. D'où l'on tire $u = V$. Ainsi, l'air sort continuellement avec la même vitesse, qui est la vitesse initiale V .

XIX. COROLLAIRE. Supposons qu'au premier instant l'air contenu dans le vase soit de l'air naturel, ou que le poids P soit égal au poids d'une colonne d'eau, de 32 pieds de hauteur. Comme l'air est environ 850 fois moins dense que l'eau, il est évident que l'écoulement de l'air par l'orifice C , est le même que si cet air étoit poussé par la pression d'une colonne d'air, de pareille densité uniforme, & de 850 fois 32 pieds de hauteur, ou de 27200 pieds de hauteur. Ainsi, la vitesse V est due à cette chute. Or un corps grav, qui tombe de 15 pieds de hauteur, acquiert une vitesse capable de lui faire parcourir uniformément 30 pieds en une seconde. Par conséquent on aura la vitesse V , pour une seconde, en faisant cette proportion, $\sqrt{15} : \sqrt{27200} :: 30 \text{ pieds} : V = 1277 \text{ pieds}$. L'air doit donc parcourir, en vertu de son ressort dans l'état ordinaire de l'atmosphère, environ 1277 pieds en 1 seconde, dans le vuide.

XX. PROBLÈME II. Déterminer en général, dans l'hypothèse du problème précédent, le tems t que l'air emploie à passer de la densité Q à la densité q ?

Soient H la hauteur due à la vitesse constante V de l'air au passage C ; & la hauteur donnée qu'un corps grave parcourt en tombant pendant le tems donné t ; C l'aire de l'orifice; A le volume du cylindre $ABCD$. Il sortira, pendant l'instant dt , un petit volume d'air, exprimé par $\frac{2Cdt\sqrt{VgH}}{g}$ (Voyez ÉCOULEMENT). Or la masse étant comme le produit du volume par la densité (V MASSE, VOLUME, DENSITÉ), il s'ensuit qu'il sort, pendant l'instant dt , une petite masse d'air exprimée par $\frac{2Cgdt\sqrt{VgH}}{g}$; mais, d'un autre côté, il est évident que, durant le tems t , il est sorti du cylindre une masse exprimée par $AQ - Ag$. On aura donc $\frac{2Cgdt\sqrt{VgH}}{g} = d(AQ - Ag) = -Adg$;

ce qui donne $dt = \frac{A}{2C\sqrt{VgH}} \times -\frac{dg}{g}$, dont l'intégrale est (en faisant $t = 0$, lorsque $g = Q$), $t = \frac{A}{2C\sqrt{VgH}} \times L \frac{Q}{q}$. (Voyez INTÉGRALE).

On voit, par cette expression du tems, que le vase ne se videroit entièrement qu'au bout d'un tems infini; mais il ne faut pas oublier ici que, suivant la remarque de l'article XIV, l'hypothèse sur laquelle cette formule est fondée, celle d'être exacte, lorsque la densité q devient très-petite.

XXI. PROBLÈME III. L'air ayant été condensé dans le vase $ABCD$, on demande la vitesse avec laquelle il sortira par le petit orifice C , en supposant qu'il se répande dans un air environnant plus rare que lui, & d'une étendue infinie telle qu'on peut toujours l'attribuer à l'atmosphère par rapport au vase $ABCD$?

Nommons D la densité de l'air extérieur; F la force élastique; Q la densité initiale de l'air intérieur, ou de l'air contenu dans le vase, & par conséquent $\frac{QF}{D}$ la force élastique initiale; q la densité de l'air intérieur, après un certain tems t , & par conséquent $\frac{qF}{D}$ la force élastique correspondante; M la petite masse initiale d'air qui sort par l'orifice; V la vitesse; m la petite masse d'air qui sort après le tems t ; & u la vitesse. L'air extérieur opposant constamment la résistance F à la sortie de l'air intérieur, il est évident que la force expulsive initiale de l'air intérieur est $\frac{QF}{D} - F$, ou $\frac{(Q-D)F}{D}$, & que la force expulsive, après le tems t , est $\frac{(q-D)F}{D}$. Or les forces expulsives sont comme les quantités de mouvement qu'elles produisent dans le même tems; ainsi, on a $\frac{(Q-D)F}{D} : \frac{(q-D)F}{D} :: MV : mv$. Mais les masses M & m sont comme les produits de leurs densités par leurs volumes, & ces volumes sont comme les produits de l'orifice par les vitesses; donc $\frac{(Q-D)F}{D} : \frac{(q-D)F}{D} :: QV : qv$; ce qui donne $u = V \sqrt{\frac{Q(q-D)}{q(Q-D)}}$.

On voit qu'on aura $u = 0$, ou que l'air cessera de couler, lorsqu'on aura $q = D$. Je n'ai pas besoin de faire observer que, si on avoit $D = Q$, il n'y auroit point du tout de mouvement, puisqu'alors la force expulsive initiale $\frac{(Q-D)F}{D}$ étant nulle, la vitesse initiale V seroit aussi nulle.

XXII. COROLLAIRE. Supposons, par exemple, $Q = 10D$, $q = 9D$; & que la pression de l'atmosphère, ou la force élastique F , soit équivalente au poids d'une colonne d'eau de 32 pieds de hauteur. La force expulsive initiale $\frac{(Q-D)F}{D}$ de l'air équivaudra au poids d'une colonne d'eau

de 9×32 pieds, ou de 288 pieds de hauteur : & comme l'air, que cette force fait sortir par l'orifice, est 85 fois moins dense que l'eau, il s'ensuit que l'écoulement initial est le même que si l'air étoit alors chassé par la pression d'une colonne d'air, partout de même densité que lui, & de 85 fois 288 pieds, ou de 24480 pieds de hauteur ; & que par conséquent la vitesse V est due à cette hauteur. Donc la vitesse V , pour une seconde, sera de 30 pieds $\times \frac{\sqrt{24480}}{\sqrt{15}}$, & la vitesse u , aussi pour une seconde, sera de 30 pieds $\times \frac{\sqrt{24480}}{\sqrt{15}} \times \frac{\sqrt{f_0}}{\sqrt{f_1}}$. Ainsi, on aura, à-peu-près, $V = 1212$ pieds, $u = 1204$ pieds.

On peut le faire par-la une idée de la vitesse avec laquelle une balle est chassée de ces fusils qu'on appelle *arquebuses à vent*, & dont la description se trouve dans tous les Livres de Physique.

XXIII. PROBLÈME IV. Trouver le tems t que l'air emploie à passer de la densité Q à la densité q , dans l'hypothèse du problème précédent ?

En représentant par H la hauteur due à la vitesse initiale V , & considérant (Voyez ACCELERÉ) que les hauteurs dues aux vitesses V & u sont comme les quarrés de ces vitesses : on verra que la hauteur due à la vitesse u sera $\frac{1}{2} \times \frac{Q(q-D)}{q(Q-D)}$. Ainsi, la petite masse d'air qui sort pendant l'instant

dt , est $\frac{1}{2} \frac{C q dt}{q(Q-D)} \sqrt{\frac{2AHQ(q-D)}{q(Q-D)}}$. Mais cette masse a pour autre expression $d(AQ - Aq)$. Par conséquent on aura $dt = \frac{6A\sqrt{(Q-D)}}{2C\sqrt{AHQ}} \times \frac{-dq}{\sqrt{(q-D)}}$, dont l'intégrale est (en faisant toujours $t=0$,

lorsque $q=Q$), $t = \frac{6A}{2C} \sqrt{\frac{(Q-D)}{AHQ}} \times L. \left(\frac{Q - \frac{1}{2}D + \sqrt{(Q-D)(Q-D)}}{\frac{1}{2}D + \sqrt{(Q-D)(Q-D)}} \right)$.

Nous avons vu que l'air cesse de couler, lorsque $q=D$. Faisant donc $q=D$, on aura, pour le tems que dure l'écoulement, $t = \frac{6A}{2C} \sqrt{\frac{(Q-D)}{AHQ}} \times L. \left(\frac{Q - \frac{1}{2}D + \sqrt{(Q-D)(Q-D)}}{\frac{1}{2}D + \sqrt{(Q-D)(Q-D)}} \right)$.

XXIV. PROBLÈME V. Le vase ABCD étant supposé contenir un air plus rare que celui de l'atmosphère, on demande la vitesse avec laquelle ce dernier entrera dans le vase, & par le petit orifice C ?

En nommant D la densité constante de l'air extérieur ; F la force élastique ; Q la densité initiale de l'air contenu dans le cylindre, & par conséquent $\frac{QF}{D}$ la force élastique initiale ; q la densité de cet air, après le tems t ; & par conséquent $\frac{qF}{D}$ la force élastique après ce même tems ; V la vitesse initiale avec laquelle l'air extérieur entre dans le

cylindre ; u sa vitesse après le tems t : on voit que la force impulsive initiale de l'air, dans le cylindre, est $F - \frac{QF}{D}$ ou $(\frac{D-Q}{D})F$,

& qu'après le tems t la force impulsive est $(\frac{D-q}{D})F$.

On aura donc, $\frac{(D-Q)F}{D} : \frac{(D-q)F}{D} ::$

$D V^2 : D u^2$; & par conséquent $u = V \times \sqrt{\frac{D-q}{D-Q}}$.

Si, au premier instant, le cylindre étoit vuide, on auroit $Q=0$; & alors $u = V \times \sqrt{\frac{D}{D-Q}}$.

On voit, dans l'un & l'autre cas, que l'air cesse d'entrer dans le cylindre, lorsque $q=D$, ou lorsque la densité de l'air est la même en dedans qu'en dehors.

XXV. PROBLÈME VI. Trouver l'équation entre le tems t & la densité q , dans l'hypothèse générale du problème précédent ?

Soit H la hauteur due à la vitesse V , & gardons les autres dénominations. La petite masse d'air qui entre dans le cylindre ABCD, pendant l'instant dt , est exprimée par $2C \cdot D dt \cdot \sqrt{\frac{2AH(D-q)}{D-Q}}$; &, comme elle a pour seconde

valeur $d(Aq)$, on aura $dt = \frac{6A}{2C\sqrt{AH(D-Q)}} \times \frac{dq}{\sqrt{(D-q)}}$, dont l'intégrale est (en faisant $t=0$,

lorsque $q=D$) $t = \frac{6A\sqrt{(D-Q)}}{2C\sqrt{AH}} \times [V(D-Q) - V(D-q)]$.

XXVI. PROBLÈME VII. Les deux cylindres ABCD, FCHG (fig. 6), fermés de tous côtés, & contenant des airs différemment condensés : on demande la vitesse avec laquelle l'air passera d'un cylindre dans l'autre ; par le petit orifice C ?

Il est d'abord évident que l'air le plus dense cessera dans le plus rare. Supposons que cet écoulement se fasse du vase ABCD dans le vase FCHG. Nommons D la densité de l'air de l'atmosphère ; F la force élastique ; Q la densité initiale de l'air ABCD, & par conséquent $\frac{QF}{D}$ la force élastique initiale ; q la densité après le tems t ; & par conséquent $\frac{qF}{D}$ la force élastique après ce même tems ; R la densité initiale de l'air FCHG, & par conséquent $\frac{RF}{D}$ la force élastique initiale ; r la densité

après le tems t , & par conséquent $\frac{rF}{D}$ la force élastique après ce même tems ; V la vitesse initiale de l'air ABCD ; u sa vitesse après le tems t . Il est clair que la force expulsive de l'air ABCD est $\frac{QF}{D} - \frac{qF}{D}$, au premier instant ; & $\frac{qF}{D} - \frac{rF}{D}$,

après le tems t . Ainsi, on aura $\frac{OF - RF}{D}$;

$$\frac{qF - rF}{D} :: QVV : quu; \text{ ce qui donne } u = V \times \sqrt{\frac{Q(q-r)}{q(Q-r)}}.$$

L'écoulement cessera, quand on aura $r = q$.

Comme la masse totale d'air, contenue dans les deux cylindres, demeure constamment la même; si l'on nomme A la capacité ou le volume du cylindre $ABCD$, B celui du cylindre $FC HG$; on aura cette seconde équation $A \cdot Q + B \cdot R = A \cdot q + B \cdot r$, parce que les masses sont comme les produits des volumes par les densités. Cette équation donne $r = \frac{A(Q - q) + B \cdot R}{B}$. Substituant cette

valeur de r dans la valeur de u , on aura $u = V \times \sqrt{\frac{Q[B(q - R) - A(Q - q)]}{Bq(Q - R)}}$: équation qui donne la vitesse u correspondante à chaque densité q .

XXVII. PROBLÈME VIII. Trouver l'équation entre le tems t & la densité q , dans l'hypothèse du problème précédent?

Supposons, pour abréger un peu le calcul, $AQ + BR = f$, $AQ + BQ = K$, $BQ - BR = m$: on trouvera, en raisonnant toujours de même,

$$2Cq \, dt \sqrt{\frac{dH(Kq - fQ)}{mQ}} = d(AQ - Aq) = -Adq; \text{ ou bien } dt = \frac{A\sqrt{m}}{2C\sqrt{dH}K} \times$$

$$\sqrt{\left(\frac{q^2 - \frac{fQ}{K}}{q^2 - \frac{fQ}{K}}\right)}, \text{ dont l'intégrale est (en}$$

$$\text{faisant } t=0, \text{ lorsque } q=Q), t = \frac{A\sqrt{m}}{2C\sqrt{dH}K} \times$$

$$L. \left\{ \frac{Q - \frac{fQ}{K}}{q - \frac{fQ}{K}} + V \left(\frac{Q^2 - \frac{fQ}{K}}{q^2 - \frac{fQ}{K}} \right) \right\}.$$

Nous ne nous arrêtons pas à développer en détail toutes les conséquences qui résultent de ces formules : le lecteur y suppléera facilement. (L. B.).

AIRE, f. f. (Géométrie) : surface d'une figure rectiligne, curviligne, ou mixtiligne, c'est-à-dire, l'espace que cette figure renferme. Voyez SURFACE, FIGURE, &c.

Si une aire, par exemple un champ, a la figure d'un carré, dont le côté soit de 40 pieds, cette aire aura 1600 pieds carrés, ou contiendra 1600 petits carrés, dont le côté sera d'un pied. Voyez QUARRÉ, MESURE.

Ainsi, trouver l'aire ou la surface d'un triangle, d'un carré, d'un parallélogramme, d'un rectangle, d'un trapèze, d'un rhombe, d'un polygone, d'un cercle, ou d'un autre figure, c'est trouver combien cette aire contient de pieds, de pouces & de lignes carrés. Quant à la manière de faire cette réduction

d'une surface en surfaces partielles carrées. Voyez TRIANGLE.

Pour mesurer un champ, un jardin, un lieu entouré de murs, fermé de haies, ou terminé par des lignes, il faut prendre les angles qui se trouvent dans le contour de ce lieu, les porter sur le papier, & réduire ainsi l'aire comprise entre ces angles & leurs côtés en arpens, &c., en suivant les méthodes prescrites pour la mesure des figures planes en général. Voyez FAIRE ou LEVER UN PLAN.

Si du centre du soleil, on conçoit une ligne tirée au centre d'une planète, cette ligne engendrera autour du soleil des arcs elliptiques proportionnelles au tems. Telle est la loi que suivent les planètes dans leur mouvement autour du soleil; ainsi le soleil étant supposé en S , & une planète en A , (Pl. Astronom. figure 86) si cette planète parvient en B , dans un tems quelconque donné; le rayon vecteur AS aura formé dans ce mouvement l'aire ASB : soit ensuite la même planète parvenue en P , & soit pris le point F , tel que l'aire PSF , soit égale à l'aire ASB ; il est certain par la proposition précédente, qu'elle aura parcouru les arcs PF & AB , dans des tems égaux. Voyez PLANÈTE & ELLIPSE.

Le célèbre Newton a démontré que tout corps qui dans son mouvement autour d'un autre, suit la loi dont nous venons de parler, c'est-à-dire que tout corps qui décrit autour d'un autre corps, des aires proportionnelles au tems, gravite ou tend vers ce corps. Voyez GRAVITATION & PHILOSOPHIE NEWTONNIENNE (O).

AIRE de pont; c'est le dessus d'un pont sur lequel on marche, pavé ou non pavé.

AIRE d'un bassin; c'est un massif d'environ un pied d'épaisseur, fait de chaux & de ciment avec des cailloux, ou un corroi de glaïse pavé par-dessus, ce qui fait le fond du bassin. Cette aire le conserve long-tems, pourvu que la superficie de l'eau s'écoule aisément; quand le tuyau de décharge est trop menu, l'eau superflue régorgeant sur les bords, délaye le terrain sur lequel est assis le bassin, & le fait périr (K).

AIRES proportionnelles au tems, (Astron.) c'est une des loix de Kepler, qui ont lieu dans les mouvements des planètes, & que ce grand homme découvrit en même tems que la figure elliptique de leurs orbites; elle consiste en ce que le rayon mené du centre du soleil, au centre de la planète qui tourne autour de lui, parcourt des secteurs égaux, en tems égaux : si la planète est deux fois plus éloignée du soleil, elle va deux fois plus lentement; en sorte que le triangle ou le secteur parcouru, étant deux fois plus étroit, quoique deux fois plus long, la surface est toujours la même.

Kepler démontre d'abord à la page 166 de sa *nouvelle Physique céleste*, que le mouvement des planètes dans les apsidés, est proportionnel à leur distance au soleil, même dans l'hypothèse de Ptolémée; c'est-à-dire, qu'en prenant un arc de l'excentrique, vers l'aphélie, & un autre

arc de même longueur vers le perihélie, la planète est plus long-tems dans l'arc aphélie, à proportion que la distance aphélie est plus grande. Soit *E* (*Astron. fig. 1.*) le point autour duquel le mouvement est supposé uniforme; *S* le centre du soleil à même distance du centre *C* que le point *E*, ayant tiré deux lignes *MEO*, *NEP*, l'arc *MN*, & l'arc *OP* fort parcourus dans le même temps, suivant cette hypothèse, puisque les angles en *E* sont égaux. Si du point *S* on tire les lignes *SO*, *SP*, & les lignes *SN*, *SM*, elles formeront des sécateurs égaux *OSP*, *NSM*: en effet, à cause des triangles semblables *NEM*, *OEP*, on a cette proportion $MN : OP :: ER : EQ$; donc $MN \cdot EQ = OP \cdot ER$ égal au sécateur *OSP*: donc dans l'hypothèse même d'un cercle excentrique, si l'on prend deux arcs *MN* & *OP* décrits par une planète dans des temps égaux, on aura au point *S* des aires égales.

Lorsque Kepler passe à la considération des orbites elliptiques, il transporte à l'ellipse cette propriété qu'il n'avoit prouvée que pour le cercle excentrique, & cela sans employer de nouvelles démonstrations. Il n'avoit d'abord considéré que le cas de l'aphélie & du perihélie; mais la règle se trouva vérifiée d'ailleurs par un accord général entre les observations & les calculs.

Ce fut Newton qui, dans son fameux livre des principes, fit voir que cette loi étoit une suite nécessaire du mouvement des planètes autour du soleil & de la force centrale, dirigée constamment vers le soleil.

Considérons une planète tournant autour du soleil *S* fig. 2. en un point quelconque *Q* de son orbite, venant de parcourir l'instant d'auparavant une très-petite portion *PQ* de cette orbite, que l'on suppose une très-petite ligne droite; la planète parvenue de *P* en *Q* & le rayon de son orbite ayant passé de *SP* en *SQ*, a décrit l'aire *SPQ* en une minute de temps; je dis que dans la minute suivante, il décrira une aire *SQR*, égale à l'aire *SPQ*, ou un triangle égal en surface à *SPQ*, en sorte que l'aire décrite par le rayon, sera égale en tems égal. En effet, si la planète livrée à elle-même, eût continué à se mouvoir de *Q* en *F*, en vertu de la loi générale du mouvement, elle auroit décrit une aire *QSF* égale à l'aire *P SQ*, parce que ces deux triangles sont égaux, ayant des bases égales *PQ* & *QF*, & pour hauteur commune la perpendiculaire abaissée du point *S* sur la direction *FQP* prolongée au dehors; mais à cause de la force centrale, qui attire la planète vers le soleil, avec une force exprimée par *QG*, elle décrira la diagonale *QR* d'un parallélogramme *PQGR*, & ce sera une aire *QSR* (à la place de l'aire *QSF*) qui sera décrite par la planète: or les triangles *QSR*, *QSF* sont encore égaux, parce qu'ils ont la même base *QS*, & sont compris entre les mêmes parallèles *FR* & *QS*; donc l'aire *QSR* est aussi égale

à l'aire *P SQ*: ainsi il est démontré que la petite aire décrite dans la première minute est égale à la petite aire décrite dans la minute suivante; procédant ensuite de minute en minute dans toute la durée de la révolution, on démontreroit avec la même facilité, que la même planète décrira continuellement la même aire dans le même tems, à quelque distance du soleil qu'elle parvienne, tant qu'il ne surviendra pas une force étrangère, qui puisse troubler l'égalité entre *QF* & *PQ*; c'est-à-dire, entre la ligne qu'une planète viroit de parcourir, & celle qu'elle tend à parcourir dans la minute suivante.

Ainsi la loi des aires proportionnelles aux tems, est prouvée non-seulement par l'observation, c'est-à-dire, par l'accord général des calculs fondés sur cette loi avec les observations, mais encore par la nature même des deux forces qui animent les planètes. Voyez LOIX DE KEPLER. PLANETES. (*M. DE LA LAMBE.*)

AIROMETRIE, f. f. Science des propriétés de l'air. Voyez AIR.

En termes de Paumier; c'est une planche maçonnée dans le mur à l'extrémité d'un tripot ou jeu de paume, qu'on appelle *quart*. L'ais est placé précisément dans l'angle du jeu de paume, qui touche à la galerie, & dans la partie du tripot, où est placé le serveur. Les triports ou jeux de paume qu'on appelle des *dedans*, n'ont point d'ais. Quand la balle va frapper de volée dans l'ais, ce qui se connoît par le son de la planche, le joueur, qui l'a poussée, gagne un quinze. Voyez JEU DE PAUME.

AISSIEU, (*Astron.*) Voyez AXE.

AISSIEU, (*Méch.*) Voyez ESSIEU.

AIXOLENIA, (*Astron.*): c'est un des noms de la constellation de la chèvre.

AJUTAGE ou AJUTOIR, f. m. (*Hyd.*): orifice par lequel un fluide sort d'un réservoir ou d'un vase quelconque. On donne ordinairement ce nom à des tronçons de cylindre ou de cônes, de cuivre, de fer-blanc, de plomb, qu'on adapte à un réservoir, ou à la bouche d'un tuyau de conduite, pour procurer l'écoulement d'un fluide, ou pour former un jet d'eau. La quantité d'eau que donne un *ajutage*, est proportionnelle au produit de sa surface, par la vitesse qu'elle a de la hauteur de l'eau au dessus de cet *ajutage*. On peut prendre pour cette hauteur, la distance du centre de gravité de la surface de l'*ajutage* au plan horizontal, qui rase la surface du fluide dans le réservoir, parce qu'ordinairement le diamètre de l'*ajutage* est très-petit en comparaison de la hauteur proposée; autrement il faudroit déterminer la quantité d'eau écoulée, par la méthode qu'on expliquera au mot ECOULEMENT.

Voyez au mot JET D'EAU la meilleure forme des *ajutages*, pour produire la plus grande élévation de l'eau. (*L. B.*)

ALAMAC, ALAMAK ou AMAK, (*Astron.*)

nom que les Arabes ont donné à une étoile de la seconde grandeur, qui est dans le pied austral d'Andromède; elle est appelée dans les cartes célestes de Bayer & de Flamsteed, ainsi que dans nos catalogues d'étoiles. (*M. DE LA LANDE.*)

ALBEGALA, (*Astr.*): c'est un des noms de la lyre.

ALBIREO, (*Astr.*): c'est un des noms de l'étoile α du cygne.

ALCYONE, (*Astr.*): c'est le nom d'une des pléiades, la plus brillante de toutes, marquée dans nos catalogues.

ALDEBARAN, (*Astr.*): nom que les Auteurs Arabes ont donné, & que nous donnons encore à l'étoile de la première grandeur, qui est dans les hyades, appelée aussi *œil du taureau*; le nom Arabe signifie étoile principale ou dominante: on l'appelle en Grec, *Antares* & *Antares*, en Latin, *Antares*, ou *Antares*, *subarsa*; en Arabe, *abeneira*, *Atin*, *Eltair*; mais son nom le plus ordinaire, est *Aldebaran*. On croit que c'est le Tachet des Indiens, le génie qui présidoit à l'équinoxe du printemps. Voyez M. Bailly, *Histoire de l'Astronomie*; on voit facilement la reconnaître, en la voyant dans le méridien, à neuf heures du soir, le 8 Janvier à 57° de hauteur à Paris: nous verrons à l'article CONSTELLATION, d'autres manières de reconnaître cette étoile, de même que toutes celles qui sont un peu remarquables. *Aldebaran* est souvent éclipsée par la lune, & ces éclipses sont fort utiles pour trouver ses longitudes des lieux; elle est sujette à de petites irrégularités, qui annoncent un déplacement réel. Voy. ÉTOILE. (*D. L.*)

ALÈSE, adj. (*Hydraul.*): se dit des parois ou côtés d'un tuyau qui sont bien limés, c'est-à-dire, dont on a abattu tout le rude (*K*).

ALFONSINES. Voyez ALPHONSINES.

ALGEBAR ou ALGEBARO, nom Arabe de la constellation d'Orion.

ALGÈBRE, s. f. *Science du calcul des grandeurs considérées généralement.* On a choisi, pour représenter les grandeurs ou les quantités, les lettres de l'alphabet, comme étant d'un usage plus facile & plus commode qu'aucune autre sorte de signes.

Ménage dérive ce mot de l'Arabe *Aljabar*, qui signifie le rétablissement d'une chose rompue; supposant fausement que la principale partie de l'Algèbre consiste dans la considération des nombres rompus. Quelques-uns pensent contre M. d'Herbelot, que l'Algèbre prend son nom de Geber, philosophe Chémite & Mathématicien célèbre, que les Arabes appellent *Giabert*, & que l'on croit avoir été l'inventeur de cette science; d'autres prétendent que ce nom vient de *gefr*, espèce de parchemin, fait de la peau d'un chameau, sur lequel Ali & Giasur Saadek écrivirent en caractères mystiques la destinée du Mahométisme, & les grands événements qui devoient arriver jusqu'à la fin du monde; d'autres le dérivent du mot *geber*, dont avec la particule *al* on

a formé le mot *Algèbre*, qui est purement arabe, & signifie proprement la réduction des nombres rompus en nombres entiers; étymologie qui ne vaut gueres mieux que celle de Ménage. Au reste, il faut observer que les Arabes ne le servent jamais du mot *Algèbre* seul, pour exprimer ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot; mais ils y ajoutent toujours le mot *macabalah*, qui signifie opposition & comparaison; ainsi *Algebra-Macabalah* est ce que nous appelons proprement Algèbre.

Quelques Auteurs définissent l'Algèbre, l'art de résoudre les problèmes mathématiques; mais c'est-là l'idée de l'Analyse ou de l'art analytique plutôt que de l'Algèbre. Voyez ANALYSE.

En effet l'Algèbre a proprement deux parties: 1.^o la méthode de calculer les grandeurs, en les représentant par les lettres de l'alphabet; 2.^o la manière de se servir de ce calcul pour la solution des problèmes. Comme cette dernière partie est la plus étendue & la principale, on lui donne souvent le nom d'Algèbre tout court, & c'est principalement dans ce sens que nous l'envisagerons dans la suite de cet article.

Les Arabes l'appellent *Part de restitution & de comparaison*, ou *Part de résolution & d'équation*. Les anciens Auteurs Italiens lui donnent le nom de *regula rei & censui*, c'est-à-dire, la règle de la racine & du cens; chez eux, la racine s'appelle *rei*; & le carré, *censui*. Voyez RACINE, QUARRÉ. D'autres la nomment *Arithmétique spéciale*, *Arithmétique universelle*, &c.

L'Algèbre est proprement la méthode de calculer les quantités indéterminées; c'est une sorte d'Arithmétique, par le moyen de laquelle on calcule les quantités inconnues, comme si elles étoient connues. Dans les calculs algébriques, on regarde la grandeur cherchée, nombre, ligne, ou toute autre quantité, comme si elle étoit donnée; & par le moyen d'une ou de plusieurs quantités données, on marche de conséquence en conséquence, jusqu'à ce que la quantité que l'on a supposée d'abord inconnue, ou au moins quelque-une de ses puissances, devienne égale à quelques quantités connues; ce qui fait connaître cette quantité elle-même. Voyez QUANTITÉ & ARITHMÉTIQUE.

On peut distinguer deux espèces d'Algèbre; la *numérale* & la *littérale*.

L'Algèbre *numérale* ou *vulgaire*, est celle des anciens Algèbristes, qui n'avoit lieu que dans la résolution des questions arithmétiques. La quantité cherchée y est représentée par quelque lettre ou caractère; mais toutes les quantités données sont exprimées en nombre. Voyez NOMBRE.

L'Algèbre *littérale* ou *spectreuse*, ou la *nouvelle Algèbre*, est celle où les quantités données ou connues, de même que les inconnues, sont exprimées ou représentées généralement par les lettres de l'alphabet. Voyez SPECTREUSE.

Elle soulage la mémoire & l'imagination, en diminuant beaucoup les efforts qu'elles seroient obligées

obligées de faire, pour retenir les différentes choses nécessaires à la découverte de la vérité sur laquelle on travaille, & que l'on veut conserver précieusement à l'esprit: c'est pourquoi quelques Auteurs appellent cette science *Géométrie métaphysique*.

L'*Algebre* spécieuse n'est pas bornée comme la *numérique*, à une certaine espèce de problèmes: mais elle sert universellement à la recherche ou à l'invention des théorèmes, comme à la résolution & à la démonstration de toutes sortes de problèmes, tant arithmétiques que géométriques. Voyez *THÉORÈME*, &c.

Les lettres dont on fait usage en *Algebre*, représentent chacune séparément des lignes ou des nombres, selon que le problème est arithmétique ou géométrique; & mises ensemble, elles représentent des produits, des plans, des solides & des puissances plus élevées, si les lettres sont en plus grand nombre: par exemple, en *Géométrie*, s'il y a deux lettres, comme *a*, & *b*, elles représentent un rectangle dont deux côtés sont exprimés, l'un par la lettre *a*, & l'autre par *b*; de sorte qu'en se multipliant réciproquement, elles produisent le plan *a b*: si la même lettre est répétée deux fois, comme *a a*, elle signifie un carré: trois lettres *a b c*, représentent un solide ou un parallélépipède rectangle, dont les trois dimensions sont exprimées par les trois lettres *a*, *b*, & *c*; la longueur par *a*, la largeur par *b*, la profondeur ou l'épaisseur par *c*; en sorte que par leur multiplication mutuelle, elles produisent le solide *a b c*.

Comme dans les quarrés, cubes, 4.^{es} puissances, &c. la multiplication des dimensions ou degrés est exprimée par la multiplication des lettres, & que le nombre de ces lettres peut croître jusqu'à devenir trop incommode, on se contente d'écrire la racine une seule fois, & de marquer à la droite l'exposant de la puissance, c'est-à-dire le nombre des lettres dont est composée la puissance ou le degré qu'il s'agit d'exprimer, comme *a²*, *a³*, *a⁴*, &c.: cette dernière expression *a⁴* veut dire la même chose que *a* élevé à la cinquième puissance; & ainsi du reste. Voyez *PUISSANCE*, *RACINE*, *EXPOSANT*, &c.

Quant aux symboles, caractères, &c. dont on fait usage en *Algebre*, avec leur application, &c. Voyez les *articles*, *CARACTÈRE*, *QUANTITÉ*, &c.

Pour la méthode de faire les différentes opérations de l'*Algebre*, voyez *ADDITION*, *SOUSTRACTION*, *MULTIPLICATION*, &c.

Quant à l'origine de cet art, nous n'avons rien de fort clair là-dessus: on en attribue ordinairement l'invention à Diophante, Auteur grec, qui en écrivit treize livres, quoiqu'il n'en reste que six. Xylander les publia pour la première fois en 1575; & depuis ils ont été commentés & perfectionnés par Gaspard Bachet, sieur de Méziriac, de l'Académie Française, & ensuite par M. de Fermat.

Néanmoins il semble que l'*Algebre* n'a pas été totalement inconnue aux anciens Mathématiciens, qui existoient bien avant le siècle de Diophante: on en voit les traces en plusieurs endroits de leurs

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

ouvrages; quoiqu'ils paroissent avoir en le dessein d'en faire un mystère. On en aperçoit quelque chose dans Euclide, ou au moins dans Theon, qui a travaillé sur l'Euclide. Ce Commentateur prétend que Platon avoit commencé le premier à enseigner cette science. Il y en a encore d'autres exemples dans Pappus, & beaucoup plus dans Archimède & Apollonius.

Mais la vérité est que l'analyse dont ces Auteurs ont fait usage, est plutôt géométrique qu'algébrique; comme cela paroît par les exemples que l'on trouve dans leurs ouvrages; en sorte que l'on peut dire que Diophante est le premier & le seul Auteur parmi les Grecs, qui ait traité de l'*Algebre*. On croit que cet art a été fort cultivé par les Arabes: on dir même que les Arabes l'avoient reçu des Perses, & les Perses des Indiens. On ajoute que les Arabes l'apportèrent en Espagne; d'où, suivant l'opinion de quelques-uns, il passa en Angleterre avant que Diophante y fût connu.

Luc Paciolo, ou Lucas à Burgo, Cordelier, est le premier dans l'Europe, qui ait écrit sur ce sujet: son livre, écrit en Italien, fut imprimé à Venise en 1494. Il étoit, dit-on, disciple d'un Léonard de Pise, & de quelques autres dont il avoit appris cette méthode: mais nous n'avons aucun de leurs écrits. Selon Paciolo, l'*Algebre* vient originellement des Arabes: il ne fait aucune mention de Diophante; ce qui seroit croire que cet Auteur n'étoit pas encore connu en Europe. Son *Algebre* ne va pas plus loin que les équations simples & quarrées; encore son travail sur ces dernières observations est-il fort imparfait, comme on peut le voir par le détail que donne sur ce sujet M. l'Abbé du Gua, dans un excellent Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des Sciences de Paris 1741. P. QUARRÉE ou QUADRATIQUE, EQUATIONS, RACINE, &c.

Après Paciolo parut Stifelius, Auteur qui n'est pas sans mérite: mais il ne fit aucun progrès remarquable à l'*Algebre*. Vint ensuite Scipion Ferro, Tartaglia, Cardan & quelques autres, qui poussèrent cet art jusqu'à la résolution de quelques équations cubiques: Bombelli les suivit. On peut voir dans la dissertation de M. l'Abbé du Gua que nous venons de citer, l'histoire très-curieuse & très-exacte des progrès plus ou moins grands que chacun de ces Auteurs fit dans la science dont nous parlons: tout ce que nous allons dire dans la suite de cet article sur l'histoire de l'*Algebre*, est tiré de cette dissertation. Elle est trop honorable à notre nation, pour n'en pas insérer ici la plus grande partie.

« Tel étoit l'état de l'*Algebre* & de l'Analyse, lorsque la France vit naître dans son sein François Viète, ce grand Géomètre, qui lui fit seul autant d'honneur que nous les Auteurs dont nous venons de faire mention, en avoient fait ensemble à l'Italie.

« Ce que nous pourrions dire ici à son éloge, seroit certainement au-dessous de ce qu'en ont dit déjà depuis long-temps les Auteurs les plus illustres,

E

11 même parmi les Anglois, dans la bouche desquels
11 ces louanges doivent être moins suspectes de par-
11 tialité, que dans celle d'un compatriote. *Voyez* ce
11 qu'en dit M. Halley, *Trans. philos. n.º 190. art. 2.*
11 an. 1687.

11 Ce témoignage, quelque avantageux qu'il soit
11 pour Viète, est à peine égal à celui qu'Harriot,
11 autre Algébriste Anglois, rend au même Auteur
11 dans la préface du livre qui porte pour titre, *Artis*
11 *analyticae praxis*.

11 Les éloges qu'il lui donne, sont d'autant plus
11 remarquables, qu'on les lit à la tête de ce même
11 ouvrage d'Harriot, où Wallis a prétendu apper-
11 cevoir les découvertes les plus importantes qui
11 se soient faites dans l'analyse, quoiqu'il lui eût
11 été facile de les trouver presque toutes dans Viète,
11 à qui elles appartiennent en effet pour la plupart,
11 comme on le va voir.

11 On peut en outre en compter sept de ce
11 genre.

11 La première, c'est d'avoir introduit dans les
11 calculs les lettres de l'alphabet, pour désigner
11 même les quantités connues. Wallis convient de
11 cet article, & il l'explique au chap. xiv. de son
11 traité d'*Algèbre*, l'utilité de cette pratique.

11 La seconde, c'est d'avoir imaginé presque toutes
11 les transformations des équations, aussi bien que
11 les différents usages qu'on en peut faire, pour
11 rendre plus simples les équations proposées. On
11 peut consulter la-dessus son traité de *recognitione*
11 *Æquationum*, à la page 91 & suivantes, édition
11 de 1645, aussi bien que le commencement du
11 traité de *emendatione Æquationum*, page 127 &
11 suivantes.

11 La troisième, c'est la méthode qu'il a donnée,
11 pour reconnaître, par la comparaison de deux
11 équations, qui ne différoient que par les signes,
11 quel rapport il y a entre chacun des coefficients
11 qui leur sont communs, & les racines de l'une
11 & de l'autre. Il appelle cette méthode *syncretis*,
11 & il l'explique dans le traité de *recognitione*, page
11 104 & suivantes.

11 La quatrième, c'est l'usage qu'il fait des décou-
11 vertes précédentes, pour résoudre généralement
11 les équations du quatrième degré, & même celles
11 du troisième. *Voyez* le traité de *emendatione*,
11 pages 140 & 147.

11 La cinquième, c'est la formation des équations
11 composées par leurs racines simples, lorsqu'elles
11 sont toutes positives, ou la détermination de
11 toutes les parties de chacun des coefficients de
11 ces équations, ce qui termine le livre de *emenda-*
11 *tionem*, page 158.

11 La sixième & la plus considérable, c'est la ré-
11 solution numérique des équations, à l'imitation
11 des extractions de racines numériques, matière
11 qui fait le seul objet d'un livre tout entier.

11 Enfin on peut prendre pour une septième dé-

11 couverte, ce que Viète a enseigné de la méthode
11 pour construire géométriquement les équations,
11 & qu'on trouve expliquées pages 229 & suiv.

11 Quoiqu'un si grand nombre d'inventions pro-
11 pres à Viète dans la seule Analyse, l'aient fait
11 regarder, avec raison, comme le père de cette
11 Science, nous sommes néanmoins obligés d'a-
11 vouer qu'il ne s'étoit attaché à reconnaître com-
11 bien il pouvoit y avoir dans les équations de
11 racines de chaque espèce, qu'autant que cette
11 recherche enroit dans le dessein qu'il s'étoit pro-
11 posé, d'assigner en nombre les valeurs ou exacles,
11 ou approchées de ces racines. Il ne considéra
11 donc point les racines réelles négatives, non
11 plus que les racines impossibles, que Bombelli
11 a voit introduites dans le calcul; & ce ne fut que
11 par des voies indirectes, qu'il vint à bout de
11 déterminer, lorsqu'il en eut besoin, le nombre
11 des racines réelles positives. L'illustre M. Halley
11 lui fait même avec fondement, quelques reproches
11 sur les règles qu'il donne pour cela.

11 Ce que Viète avoit omis de faire au sujet du
11 nombre des racines, Harriot qui vint bientôt
11 après, le tenta inutilement dans son *Artis ana-*
11 *lyticae praxis*. L'idée que l'on doit se former de
11 cet ouvrage, est précisément celle qu'en donne sa
11 préface; car pour celle qu'on pourroit en prendre
11 par la lecture du traité d'*Algèbre* de Wallis, elle
11 ne seroit point du tout juste. Non-seulement ce
11 livre ne comprend point, comme Wallis vouloit
11 l'insinuer, tout ce qui avoit été découvert de plus
11 intéressant dans l'analyse, lorsque Wallis a écrit;
11 on peut même dire qu'il mérite à peine d'être
11 regardé comme un ouvrage d'invention. Les abrégés
11 qu'Harriot a imaginés dans l'*Algèbre*, se
11 réduisent à marquer les produits de différentes
11 lettres, en écrivant ces lettres immédiatement les
11 unes après les autres: (car nous ne nous arrê-
11 tons point à observer avec Wallis, qu'il a em-
11 ployé dans les calculs les lettres minuscules au
11 lieu des majuscules). Il n'a point simplifié les
11 expressions où une même lettre se trouvoit plu-
11 sieurs fois, c'est-à-dire les expressions des puis-
11 sances, en écrivant l'exposant à côté. On verra
11 bientôt que c'est à Descartes qu'on doit cet abrégé,
11 ainsi que les premiers éléments du calcul des puis-
11 sances; découverte qui en a été la suite naturelle,
11 & qui a été depuis d'un si grand usage.

11 Quant à l'analyse, le seul pas qu'Harriot pa-
11 roisse proprement y avoir fait, c'est d'avoir em-
11 ployé dans la formation des équations du 3.^e &
11 du 4.^e degré, les racines négatives, & même des
11 produits de deux racines impossibles; ce que n'a-
11 voit point fait Viète dans son dernier chapitre
11 de *emendatione*: encore trouve-t-on ici même fautes;
11 c'est que l'Auteur forme les équations du 4.^e de-
11 gré, dont les quatre racines doivent être toutes à-la-
11 fois impossibles, par le produit de $b + a\sqrt{-1}$,
11 & $df + a\sqrt{-1}$, ce qui n'est pas assez général,
11 les quatre racines ne devant pas être toutes à-la-fois

supposées des imaginaires pures, mais tout au plus deux imaginaires pures, & deux mixtes imaginaires.

M. l'Abbé du Gua fait encore à Harriot plusieurs autres reproches qu'on peut lire dans son mémoire.

Il n'est presque aucune Science qui n'ait dû au grand Descartes quelque degré de perfection ; mais l'Algèbre & l'Analyse lui sont encore plus redevables que tous les autres. Vraisemblablement il n'avoit point lu ce que Viète avoit découvert dans ces deux sciences, & il les poussa beaucoup plus loin. Non-seulement il marque, ainsi que Harriot, le produit de deux lettres, en les écrivant à la suite l'une de l'autre ; il ajoute à cela l'expression du produit de deux polynômes, en se servant du signe de la multiplication, & en tirant une ligne sur chacun de ces polynômes en particulier, ce qui soulage beaucoup l'imagination. C'est lui qui a introduit dans l'Algèbre les exposans, ce qui a donné les principes élémentaires de leurs calculs : c'est lui qui a imaginé le premier des racines aux équations, dans les cas mêmes où ces racines sont impossibles ; de façon que les imaginaires & les réelles remplissent le nombre des dimensions de la proposée ; c'est lui qui a donné le premier des moyens de trouver les limites des racines des équations, qu'on ne peut résoudre exactement : enfin il a beaucoup ajouté aux affections géométriques de l'Algèbre que Viète nous a laissées, en déterminant ce que c'est que les lignes négatives ; c'est-à-dire celles qui répondent aux racines des équations qu'il nomme fausses ; & en enseignant à multiplier & à diviser les lignes les unes par les autres. V. le commencement de sa Géométrie. Il forme, comme Harriot, les équations par la multiplication de leurs racines simples, & ses découvertes dans l'Analyse pure se réduisent principalement à deux. La première, d'avoir enseigné combien il se trouve de racines positives ou négatives dans les équations qui n'ont point de racines imaginaires. Voyez RACINE. La seconde, c'est l'emploi qu'il fait de deux équations du second degré à coefficients indéterminés, pour former par leur multiplication, une équation qui puisse être comparée terme à terme avec une proposée quelconque du quatrième degré, afin que ces comparaisons différentes fournissent la détermination de toutes les déterminées qu'il avoit prises d'abord, & que la proposée se trouve ainsi décomposée en deux équations du second degré, faciles à résoudre par les méthodes qu'on avoit déjà pour cet effet. Voyez sa Géométrie, page 89, Édit. d'Amst. An. 1649. Cet usage des indéterminés, est si adroit & si élégant, qu'il a fait regarder Descartes comme l'inventeur de la méthode des indéterminés ; car c'est cette méthode qu'on a depuis appelée : & qu'on nomme encore aujourd'hui proprement l'Analyse de Descartes ; quoiqu'il faille avouer que Ferri, Tartaglia, Bombelli, Viète sur-tout, & après lui Harriot, en eussent eu connoissance.

Pour l'Analyse mixte, c'est-à-dire l'application de l'Analyse à la Géométrie, elle appartient presque entièrement à Descartes, puisque c'est à lui qu'on doit incontestablement les deux découvertes qui en sont comme la base. Je parle de la détermination de la nature des courbes par les équations à deux variables, (page 26), & de la construction générale des équations du 3.^e & du 4.^e degré, (page 35). On peut y ajouter l'idée de déterminer la nature des courbes à double courbure par deux équations variables, (page 74) ; la méthode des tangentes, qui est comme le premier pas qui se soit fait vers les infiniment petits, (page 46) ; la détermination des courbes propres à réfléchir sur la réfraction, en un seul point, les rayons de lumière ; enfin l'application de l'Analyse & de la Géométrie à la Physique, dont on n'avoit point vu jusqu'alors d'aussi grand exemple. Si on réunit toutes ces différentes productions, quelle idée ne se formera-t-on pas du grand homme de qui elles nous viennent ! & que sera-ce en comparaison de tout cela que le peu qui restera à Harriot, lorsque des découvertes que Wallis lui avoit attribuées sans fondement dans le chapitre 53 de son *Algèbre historique & pratique*, on aura ôté, comme on le doit, ce qui appartient à Viète ou à Descartes, suivant l'énumération que nous en avons faite ?

Outre la détermination du nombre des racines vraies ou fausses, c'est-à-dire, positives ou négatives, dans les équations de tous les degrés qui n'ont point de racines imaginaires, Descartes a mieux déterminé qu'on n'avoit fait jusqu'alors, le nombre & l'espèce des racines des équations quelconques du 3.^e & du 4.^e degré, soit au moyen des remarques qu'il a faites sur les formules algébriques, soit en employant à cet usage différentes observations sur les constructions géométriques.

Ce dernier ouvrage qu'il avoit néanmoins laissé imparfait, a été perfectionné depuis peu à-peu par différents Auteurs, Debaune, par exemple ; jusqu'à ce que l'illustre M. Halley y ait mis, pour ainsi dire la dernière main, dans un beau mémoire inséré dans les *Transactions philosophiques*, n.^o 190. art. 2. an. 1687, & qui porte le titre suivant : *De numero radicum in equationibus solis ac biquadraticis, sive tertius ac quartus potestatis, eorumque limitibus, tractatulus*.

Quoique Newton fût né dans un temps où l'Analyse paroît déjà presque parfaite, cependant un si grand génie ne pouvoit manquer de trouver à y ajouter encore. Il a donné en effet successivement dans son *Arithmétique universelle*, 1.^o une règle très-élégante & très-belle pour connaître les cas où les équations peuvent avoir des diviseurs rationnels, & pour déterminer dans ces cas, quels polynômes peuvent être ces diviseurs ; 2.^o une autre règle pour reconnaître dans un grand nombre d'occasions, combien il doit se trouver de racines

imaginaires dans une équation quelconque : une troisième, pour déterminer, d'une manière nouvelle, les limites des équations ; enfin une quatrième qui est peu connue, mais qui n'en est pas moins belle, pour découvrir en quel cas les équations des degrés pairs peuvent se résoudre en d'autres degrés inférieurs, dont les coefficients ne contiennent que de simples radicaux du premier degré.

À cela il faut joindre l'application des fractions au calcul des exposans ; l'expression en suites infinies des puissances entières ou fractionnaires ; positives ou négatives d'un binôme quelconque ; l'excellente règle connue sous le nom de Règle du parallélogramme, & au moyen de laquelle Newton assigne en suites infinies, toutes les racines d'une équation quelconque ; enfin la belle méthode que cet Auteur a donnée pour interpoler les séries, & qu'il appelle *methodus differentialis*.

Quant à l'application de l'Analyse à la Géométrie, Newton a fait voir combien il y étoit versé, non-seulement par les solutions élégantes de divers problèmes qu'on trouve ou dans son Arithmétique universelle, ou dans ses principes de la Philosophie naturelle ; mais principalement par son excellent traité des *Lignes du troisième ordre*. Voyez COURBE.

Voilà tout ce que nous dirons sur le progrès de l'Algèbre : les élémens de cet art furent conquis & publiés par Kersley en 1671 ; l'Arithmétique spécifique, & la nature des équations y sont amplement expliquées & éclaircies par un grand nombre d'exemples différens : on y trouve toute la substance de Diophante. On y a ajouté plusieurs choses qui regardent la composition & la résolution mathématique, tirée de Ghetaldus. La même chose a été exécutée depuis par Preflet en 1694, & par Ozanam en 1703. Mais ces Auteurs ne parlent point, ou ne parlent que fort brièvement de l'application de l'Algèbre à la Géométrie. Guinée y a suppléé dans un traité écrit en français, qu'il a composé expressément sur ce sujet, & qui a été publié en 1705 : aussi bien que le Marquis de l'Hôpital, dans son traité *analytique des sections coniques*, 1707. Il existe une multitude d'ouvrages où l'on peut s'instruire de l'Algèbre. Tels sont le traité de la *Grandeur*, du P. Lamy ; l'*Analyse démontrée*, du P. Regnaud ; la *Science du calcul*, du même Auteur ; les élémens d'*Algèbre*, de Saunderson, de Maclaurin, de Clairaut ; & dans ces derniers tems, l'*Algèbre* de M. l'abbé Boffet ; celle de M. Bezout ; celle de M. l'abbé de la Caille, augmentée par M. l'abbé Marie, &c.

On a appliqué aussi l'Algèbre à la considération & au calcul des infinis ; ce qui a donné naissance à une nouvelle branche fort étendue du calcul algébrique ; c'est ce que l'on appelle la *doctrine des fluxions*, ou le *calcul différentiel*. Voyez FLUXIONS & DIFFÉRENTIEL. On peut voir à l'article ANA-

LYSE, les principaux Auteurs qui ont écrit sur ce sujet.

Je me suis contenté dans cet article, de donner l'idée générale de l'Algèbre, telle à-peu-près qu'on la donne communément ; & j'y ai joint, d'après M. l'abbé du Gua, l'histoire de ses progrès. Les savans trouveront à l'article ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE, des réflexions plus profondes sur cette Science ; & à l'article APPLICATION, des observations sur l'application de l'Algèbre à la Géométrie (O).

ALGÈBREQUE, adj. ce qui appartient à l'Algèbre. Voyez ALGÈBRE.

Ainsi l'on dit caractères ou symboles algébriques, courbes algébriques, solutions algébriques. Voyez CARACTÈRE, &c.

Courbe algébrique, c'est une courbe dans laquelle le rapport des abscisses aux ordonnées ; peut être déterminé par une équation algébrique. V. COURBE.

On les appelle aussi lignes ou courbes géométriques. Voyez GÉOMÉTRIQUE.

Les courbes algébriques sont opposées aux courbes mécaniques ou transcendentes. Voyez MÉCANIQUE & TRANSCENDANTE (O).

ALGÈBRISTE, s. m. se dit d'une personne versée dans l'Algèbre. Voyez ALGÈBRE (O).

ALGEDI, nom de étoile ; du Capricorne. ALGENIB, ou ALGENIB, (*Alb.*) ; c'est le nom d'une étoile de la seconde grandeur, située dans la constellation de Pégase, & que les astronomes marquent par la lettre γ ; d'autres donnent ce nom à la ceinture de Persée.

ALGOL ou tête de Méduse, étoile fixe de la seconde grandeur, dans la constellation de Persée. Voyez PERSÉE.

On avoit remarqué, dans le dernier siècle, que cette étoile changeoit de grandeur & de lumière ; mais, en 1783, M. Goodricke, gentilhomme d'York, a reconnu que cette étoile, qui est ordinairement de seconde grandeur, n'est plus que de la 4^e pendant quelques heures ; & cela tous les trois jours ; la période de ces variations est de 69 heures ; elle emploie trois heures & demie à diminuer, & autant à reconvenir sa lumière. Le 3 mai 1783, à 9 heures du soir, elle étoit la plus foible, & tous les 23 jours cette phase doit revenir vers la même heure ; ce sera donc à minuit, le 1^{er} février 1784, le 24, &c. Cette étoile ne reste à Paris, sous l'horizon, que pendant une heure & 27 minutes. On peut expliquer ces variations par la figure aplatie de cette étoile, comme Maupertuis, par quelque grande tache à la surface, comme Riccioli, ou par l'interposition de quelque grande planète qui tourneroit autour de cette belle étoile : c'est l'opinion de M. Goodricke. (DE LA LUMIÈRE).

ALGOMEIZA, nom de l'étoile Procyon.

ALGORAB, nom de l'étoile γ du Corbeau.

ALGORITHME, s. m. terme Arabe, employé par quelques auteurs, & singulièrement par les

Espagnols, pour signifier la pratique de l'Algèbre. Voyez ALGÈBRE.

Il se prend aussi quelquefois pour l'Arithmétique par chiffres. Voyez ARITHMÉTIQUE.

L'algorithme, selon la force du mot, signifie proprement l'art de supputer avec justesse & facilité; il comprend les règles de l'Arithmétique vulgaire. Ainsi, l'on dit l'algorithme des entiers, l'algorithme des fractions, l'algorithme des nombres sourds, &c.

Le même mot se prend, en général, pour désigner la méthode & la notation de toute espèce de calcul. En ce sens, on dit l'algorithme du calcul intégral, l'algorithme du calcul exponentiel, l'algorithme du calcul des flux, &c.

ALHABOR, nom de l'étoile Sirius.

ALHAIOTH, nom Arabe de la belle étoile de la Chèvre.

ALHATOD, autre nom de la belle étoile de la Chèvre.

ALIATH, (*Asp.*) c'est le nom que les Arabes donnoient à la première étoile de la queue de la grande ourse, que nous marquons par la lettre grecque α ; elle est aussi appelée quelquefois *Ris Alloth*, *Alldith*, *Mirach*, *Milar*, ou *Mizar*, suivant Bayer, dans son *Uranometrie*. (*M. de LA LANDE*).

ALIDADE ou ALHIDADE, règle qui se met sur le centre d'un quart de cercle, & qui porte une lunette pour mesurer les angles. Voyez MURAL. (*D. L.*).

ALIDADE, (*f. f. (Géom.)*). On l'appelle ainsi l'index ou la règle mobile, qui, partant du centre d'un instrument astronomique ou géométrique, peut en parcourir tout le limbe pour montrer les degrés qui marquent les angles, avec lesquels on détermine les distances, les hauteurs, &c. Ce mot vient de l'arabe, où il a la même signification. En grec & en latin, on l'appelle souvent *sinus*, *dioptra*, & encore *linea fiduciar*, ligne de foi.

Cette pièce porte deux pinnules élevées perpendiculairement à chaque extrémité. Voy. PINNULE, DEMI-CERCLE, &c.

ALIEMINI, nom de la belle étoile du Grand-chien. V. SIRIUS.

ALIQUEANTE, adj. f. (*Arith.*), du mot latin *aliquantus*. Les parties aliquantes d'un nombre, on, en général, d'un tout, sont celles qui ne sont pas contenues un certain nombre de fois, juste, dans ce tout. Par exemple, 3 est une partie aliquante de 12, parce que 3 est contenu plus de deux fois, & moins de trois fois, dans 12.

ALIQUEOTE, adj. f. (*Arith.*), du mot latin *aliquotus*. Partie aliquote d'un tout, partie qui est contenue un certain nombre de fois juste dans ce tout. Par exemple, 3 est une partie aliquote de 12, parce que 3 est contenu juste quatre fois dans 12.

ALKAMELUS, nom de l'étoile Arcturus.

ALLIAGE, f. m. (*Arith.*). On appelle, en général, *alliage* un mélange que l'on fait d'un

certain nombre de choses de différentes valeurs, pour former un tout d'un même nombre de parties, égales entr'elles, & d'une valeur moyenne. La règle d'alliage, en Arithmétique, sert à trouver, ou cette valeur moyenne de l'une des parties du mélange, quand on connoît la valeur & le nombre des choses dont il est composé; ou le nombre des parties des choses qui doivent être alliées, quand on connoît la valeur de chacune de ces parties, & celle du mélange. Le premier de ces problèmes est déterminé dans tous les cas; le second est susceptible de plusieurs solutions, lorsqu'il entre plus de deux espèces de choses dans le mélange, comme on le verra ci-dessous.

QUESTION I. Trouver la valeur de l'unité du mélange, lorsque l'on connoît le nombre & la valeur des choses dont il doit être composé?

Multipliez le nombre des choses de chaque espèce, par la valeur de l'unité de chaque chose; additionnez ensemble tous ces produits, & divisez la somme par le nombre total des choses alliées, le quotient vous donnera la valeur de l'unité du mélange. Par exemple, si on propose de mêler ensemble 300 bouteilles de vin, à 15 sols la bouteille; 200 bouteilles à 20 sols; & 140 bouteilles à 15 sols, & de trouver la valeur d'une bouteille du mélange, il faudra multiplier 15 sols par 300, & le produit 7500 sols sera la valeur de toutes les bouteilles de la première espèce; de même, en multipliant 20 sols par 200, le produit 4000 sols sera la valeur de toutes les bouteilles de la seconde espèce; & en multipliant 15 sols par 140, le produit 2100 sols sera la valeur de toutes les bouteilles de la troisième espèce. Donc, si l'on ajoute ensemble ces trois produits, la somme 13750 sols est le prix de toutes les bouteilles, ou du mélange qui en résulte. Donc, en divisant cette somme par 640, nombre total des bouteilles, le quotient 21 sols $\frac{7}{8}$ sera évidemment le prix de la bouteille du mélange.

QUESTION II. Deux quantités de différentes valeurs étant données, déterminer ce qu'il faut prendre de chacune pour former une quantité moyenne dont la valeur est donnée?

Je prends, pour exemple, le problème de la couronne de Hieron, Roi de Syracuse. Ce Prince, soupçonnant que sa couronne n'étoit pas d'or pur, & qu'elle étoit formée d'un mélange d'or & d'argent, proposa à Archimède de déterminer les quantités de ces deux matières, qui pouvoient entrer dans le mélange. Archimède, instruit par les lois de l'hydrostatique (voyez ce mot), que les corps d'un même volume (voyez ce mot), étant plongés dans l'eau, y perdent des parties égales de leurs poids, parvint à former une masse d'or pur, une masse d'argent pur, qui ont chacune le même volume que la couronne; & pesant ensuite hors de l'eau la masse d'or, la masse d'argent, & la couronne, il jugea, par la comparaison des poids, si la couronne est d'or pur, ou d'ar-

gent pur, ou enfin un mélange d'or & d'argent. Supposons ce dernier cas. Supposons de plus que les poids de la masse d'or, de celle d'argent, & de la couronne, soient entr'eux en nombres ronds, comme les nombres 19, 10, 15. La question se réduit donc à former, avec les parties de deux corps égaux en volume, qui pèsent 19 & 10, un troisième corps, de même volume, qui pèse 15. Pour y parvenir, imaginons que les trois volumes égaux de nos trois corps sont partagés chacun en un même nombre de parties égales. Cela posé, l'excès du poids 19, sur le poids 15, étant 4, tandis que l'excès du poids 15, sur le poids 10, est 5, il est clair que, si l'on mettoit, dans le mélange, pareil nombre de parties du volume d'or & du volume d'argent, les premières y produiroient une augmentation de poids, exprimée par 4, tandis que les secondes y produiroient une diminution de poids, exprimée par 5. Or, pour que l'augmentation & la diminution se compensent mutuellement, on doit prendre sur les volumes composants plus ou moins de parties, selon que ces parties sont moins ou plus pesantes. Donc, si vous prenez en tout 9 parties sur les deux volumes composants, vous en devez prendre 4 sur celui d'argent, & 5 sur celui d'or. Donc, en représentant chacun de nos trois volumes égaux par 1, ou par la fraction $\frac{1}{3}$, le volume $\frac{1}{3}$ du mélange, ou de la couronne, sera composé des $\frac{4}{3}$ du volume d'argent, & des $\frac{5}{3}$ du volume d'or.

En raisonnant de la même manière, dans tous les cas pareils, on formera cette règle générale pour résoudre ces sortes de problèmes. Faites deux fractions qui aient pour dénominateur commun l'excès de la plus haute valeur sur la plus petite & dont la première ait pour numérateur l'excès de la plus haute valeur sur la moyenne, & l'autre, pour numérateur, l'excès de la valeur moyenne sur la plus petite. La première fraction sera la partie qu'il faut prendre de la plus petite quantité; & la seconde, la partie qu'il faut prendre de la plus grande quantité.

Cette règle peut se démontrer ainsi, en général, par le calcul algèbre. Soient A & B les poids des deux corps composants; M le poids du corps mixte; G le volume commun aux trois corps; x & y les parties qu'il faut prendre des volumes des corps composants, pour former le corps mixte. Il est clair d'abord qu'on aura $x + y = G$. D'un autre côté, le poids de x sera $\frac{Ax}{G}$, comme étant le quatrième d'une proportion (Voyez PROPORTION), dont les trois premiers sont G , x , A ; & par une raison semblable, le poids de y sera $\frac{By}{G}$. Or la somme des deux poids $\frac{Ax}{G} + \frac{By}{G}$ doit être M . Ainsi, on aura $\frac{Ax + By}{G} = M$. Mettons dans cette équation, pour y , la valeur $G - x$, que donne la première, nous aurons

$Ax + BG - Bx = GM$; ce qui donne $x = G \times \left(\frac{M - B}{A - B} \right)$; & (à cause de $y = G - x$), $y = G \times \left(\frac{A - M}{A - B} \right)$. On voit que ces valeurs de x & y sont celles que prescrit la règle proposée.

Remarque. Si, dans ces sortes de question, le mélange devoit être composé de plus de deux pièces de choses, il y auroit plusieurs manières de prendre ces choses pour former le mélange. Ainsi, dans le problème de la couronne du Roi Hieron, si l'on ne savoit pas, on l'on ne supposoit pas que la couronne ne contient que de l'or & de l'argent; & si, outre ces deux métaux, elle contenoit, par exemple, du cuivre, alors les pesanteurs du l'or, de l'argent & du cuivre étant à-peu-près comme les nombres 19, 10, 8, il est clair qu'on pourroit former successivement avec l'argent & le cuivre, une infinité de corps mixtes, chacun de même volume que chacune des trois matières proposées, & combiner ensuite chacun de ces mixtes avec l'or, pour former, des trois métaux, un mixte qui pèse 15 livres. On pourroit aussi former d'abord, de plusieurs manières, un mixte d'or & d'argent, pourvu que ce mixte pèsât plus de 15 livres, puis le combiner avec le cuivre.

Dans ces sortes de cas, où le problème admet plusieurs solutions, il est indéterminé. Sur quoi, Voyez PROBLÈME (L.B.).

ALLONGÉ, adj. se dit généralement, en Géométrie, de ce qui est plus long que large. C'est en ce sens qu'on dit, un *exagone*, un *éptagone*, un *octogone*, &c. *allongé*, un *ovale fort allongé*.

Sphéroïde allongé, se dit d'un sphéroïde dont l'axe seroit plus grand que le diamètre du cercle perpendiculaire à cet axe, & également éloigné de ses extrémités.

Ainsi, on peut donner le nom de *sphéroïde allongé* à un sphéroïde qui est formé par la révolution d'une demi-ellipse autour de son grand axe. Voyez SPHÉROÏDE. Si le sphéroïde est formé par la révolution d'une demi-ellipse autour de son petit axe, ou, en général, si son axe est plus petit que le diamètre du cercle dont le plan est perpendiculaire au milieu de cet axe, il s'appelle alors *sphéroïde aplati*. Cette dernière figure est à-peu-près celle de la terre que nous habitons, & peut-être de toutes les planètes, dans la plupart desquelles on observe que l'axe est plus petit que le diamètre de l'équateur. Voyez TERRE. Le mot *allongé* s'emploie aussi quelquefois en parlant des cycloïdes & des épicycloïdes, dont la base est plus grande que la circonférence du cercle générateur. Voyez CYCLOÏDE & EPICYCLOÏDE (O).

ALLUCHON, f. m. (Méch.) : on appelle *alluchon* les dents d'une roue, lorsque ces dents ne forment pas corps avec elle, & sont chacune d'une pièce particulière appliquée ou fixée solidement à

le tonne; ce qui a lieu dans les grandes machines, comme, par exemple, dans les roues de moulins. Voyez *DRIVE* & *ROUE*.

ALMAGESTE, nom du plus ancien livre d'Astronomie qui nous soit resté, & qui fut composé par Ptolémée, vers l'an 140; son nom vient de *Almagest*, qui signifie très-grand. Ce livre est intitulé en grec, *Μεγάλη Στοιχια*, grande composition; il fut traduit du grec en arabe, vers l'an 827, par l'ordre du calife Almamoni, qui régnoit à Bagdad. L'Empereur Frédéric II le fit traduire en latin vers l'an 1230. Il fut imprimé, pour la première fois, à Venise en 1515, mais le texte grec ne fut imprimé qu'en 1538, à Bâle. Georges de Trebizonde fit une traduction latine de l'*Almageste*, qui fut imprimée à Venise en 1537, à Bâle en 1541 & en 1551. Ce livre contient un Recueil précieux d'anciennes observations; ce sont les seules qui nous soient parvenues; mais toutes les conclusions que l'auteur en avoit tirées sont défectueuses, & ont été rectifiées par les modernes, comme on le peut voir sur-tout dans les *Elémens* d'Astronomie publiés par M. Cassini, en 1740, & dans les *Mémoires* que j'ai donnés sur la Théorie de Mercure dans le volume de l'Académie des Sciences, pour 1766. Riccioli a donné aussi un grand ouvrage d'Astronomie intitulé, *Almagestum novum*, en 2 volumes *in-folio*, à Bologne, 1651, qui est une collection immense & précieuse de toute l'Astronomie historique & théorique, & dont les astronomes font un usage continué, ainsi que de l'*Almageste* de Ptolémée. (D. L.)

ALMANACH, L. m. (*Astron.*) calendrier ou table, où sont marqués les jours de fêtes de l'année, le cours de la Lune pour chaque mois, &c. Voyez *CALENDRIER*, *ANNÉE*, *JOUR*, *MOIS*, *LUNE*, &c.

Les grammairiens ne sont point d'accord sur l'origine de ce mot; les uns le font venir de la particule arabe *al*, & de *manah*, compie; d'autres, du nombre *al*, lequel est Scilicet, le dérivé de cette même préposition *al*, & du mot grec *μηνος*, le cours des mois. Goliut n'est pas de ce sentiment: voici quel est le sien. C'est, dit-il, l'usage, dans tout l'Orient, que les sujets fassent des présents à leurs princes au commencement de l'année; & or le présent que font les astronomes, sont des *éphémérides* pour l'année commençante; & c'est de-là que ces *éphémérides* ont été nommées *almanah*, qui signifie *étrennes* ou *présens* de la nouvelle année. Voyez *EPHÉMÉRIDE*. Enfin Verslégan écrit *alman-ah*, & le fait venir du saxon. Nos ancêtres, dit-il, traçoient le cours des lunes pour toute l'année, sur un bâton ou morceau de bois quarré, qu'ils appelloient *al managht*, par contraction, pour *al-moon-aheld*, qui signifie en vieil anglais ou en vieux saxon, contenant toutes les lunes.

Nos *almanachs* modernes répondent à ce que les anciens Romains appelloient *fastes*.

Le lecteur peut s'instruire de ce qu'il faut faire pour construire un *almanach*, à l'article *CALENDRIER*.

Le roi de France Henri III, par une ordonnance de l'an 1579, défendit « à tous faiseurs » d'*almanachs* d'avoir la témérité de faire des prédictions sur les affaires civiles ou de l'état, ou des particuliers, soit en termes exprès, ou en termes couverts. » Voyez *ASTROLOGIE*. Notre siècle est trop éclairé pour qu'une pareille défense soit nécessaire; & quoique nous voyons encore plusieurs *almanachs* remplis de ces sortes de prédictions, à peine le plus bas peuple y ajoute-t-il quelque foi.

La plupart de nos *almanachs* d'aujourd'hui contiennent non-seulement les jours & les fêtes de l'année, mais encore un très-grand nombre d'autres choses.

Un des plus connus en France, est l'*Almanach Royal*, vol. in-8°. Dans son origine, qui remonte à l'année 1679, cet *almanach* ou calendrier, avec quelques prédictions, ajoutées aux phases de la lune, renfermoit seulement le départ des courtiers, le journal des fêtes du Palais, un extrait des principales foires du royaume, & les villes où l'on bat monnaie. Les premières lettres de privilège sont datées du 16 mars 1679; il a subsisté à-peu-près dans la même forme jusqu'en 1697. Louis XIV ayant eu la curiosité de le voir cette année, Laurent d'Houry eut l'honneur de le lui présenter, & peu de tems après, il obtint un renouvellement de privilège, sous le titre d'*Almanach Royal*, le 29 janvier 1699. Le but de l'auteur, dès cet instant, fut d'y ajouter peu-à-peu les naissances des Princes & les noms de toutes les personnes importantes dans le Clergé, l'Épée, la Robe, & la Finance; ce qu'il a exécuté en très-grande partie jusqu'à sa mort, arrivée en 1725. Depuis ce tems, cet ouvrage a été continué, tant par la veuve d'Houry que par Le Breton, petit-fils d'Houry. Cet *almanach* a aujourd'hui 683 pages; les calculs en sont tirés de mes *Ephémérides*.

L'*Almanach* de Paris, qui sert de base à tous les autres pour les calculs du calendrier, est la *connaissance des tems*, que l'Académie des Sciences publie chaque année depuis 1679; ce fut M. Picard, célèbre astronome du dernier siècle, qui en fut le premier auteur; elle a été continuée successivement par M. Lefebvre, M. Lelièvre, M. Godin, M. Maraldi, ensuite par moi, actuellement par M. Jeanurat; elle s'imprime chaque année à l'Imprimerie Royale à Paris. Mais le plus utile de tous les *almanachs* de ce genre, est celui qu'on a publié en Angleterre sous le nom de *Nautical Almanac*. Voyez *EPHÉMÉRIDE*.

Depuis 1750 ou environ, l'usage des *almanachs* s'est prodigieusement multiplié; en France, on a vu sur-tout avec plaisir l'*almanach* des Beaux Arts, aujourd'hui la France Littéraire, celui des Spectacles, celui des Curiosités de Paris, l'*almanach*

de Gotha, rempli de faits intéressans pour la Physique & l'Histoire; il y a des *almanachs* Géographiques, Militaires, des *almanachs* Chantans, &c. Toutes les connoissances utiles & les choses d'agrément ont été mises en *almanachs*, & je crois que cet usage a contribué à répandre le goût de la littérature. (D. L.)

ALMERZAMONNAGIED, nom de l'étoile qui est à l'équale orientale d'Orion.

ALMICANTARATS ou ALMUCANTARATHS. (*Astron.*) : ce sont de petits cercles parallèles à l'horizon; c'est-à-dire, dont tous les points sont à la même hauteur au dessus de l'horizon: on les appelle aussi cercles de hauteur, parallèles de hauteur. Quand un autre a, par exemple, vingt degrés de hauteur, tous les points qui sont à cette même hauteur, en faisant le tour du Ciel, parallèlement à l'horizon, forment l'*Almicantaratus* de l'astre dont il s'agit; ce mot est yemi, par corruption, du Grec & de l'Arabe; car du mot Grec, *μικρος*, centre. Les Arabes ont fait Mokenter, suivant la manière de former les participes, & au pluriel Mokenterat, ce qui désigne des cercles dont les centres sont sur une même ligne verticale. (*Coffard, History of Astronomy. 1767, page 108*)

Les passages de deux étoiles connues par un même *Almicantaratus*, peuvent faire connoître l'heure qu'il est: si l'on a ces passages par deux *Almicantarats*, on peut trouver la hauteur du pôle, & la déclinaison de deux étoiles. F. C. Mayer a résolu ce problème dans les mémoires de Pétersbourg, & Maupertuis, dans son *Astronomie nautique*, de même que plusieurs autres questions de cette espèce, mais qui ne sont d'aucun usage dans l'astronomie. (D. L.)

ALMUCANTARAT. Voyez ALMICANTARAT.

ALMUCEDIE ou ALMUREDIN, nom de l'étoile à l'aile précédente de la vierge.

ALPHERAZ, nom Arabe de la belle étoile à l'aile de Pégase, marquée & qu'on appelle aussi *Mikab*.

ALPHETA, terme d'Astronomie: c'est le nom d'une étoile fixe de la couronne septentrionale, qu'on appelle autrement *lucida coronæ* ou *luisante de la couronne*. Voyez l'article COURONNE (O).

ALPHONSINES. (*Astron.*) : on appelle *Tables Alphonsines*, des tables astronomiques, rédigées sous les ordres d'Alphonse X, Roi de Castille, surnommé le Sage; il fut le premier qui voulut corriger les tables de Ptolémée: dès l'année 1240, & du vivant même de son père, il avoit attiré à Tolède les Astronomes les plus habiles de son temps, Chrétiens, Maures ou Juifs, dont les travaux procurèrent enfin les *Tables Alphonsines*, l'an 1252, la première année de son règne. On prétend qu'il employa sur-tout Isaac Hazan, (Riccioli *Almag. T. 1. page 444*); mais c'étoit un bien grande entreprise, & les connoissances de ce temps-là étoient insuffisantes; cependant ces tables ont été long-temps employées comme les meilleures que l'on eut, & la durée de l'année n'y est que de 365 trop forte.

Alphonse mourut en 1284; ses tables furent imprimées, pour la première fois, en 1483; à Venise, par Radulph, qui excellait dans l'imprimerie vers ce temps-là: cette édition comprend 24 feuillets; elle est extrêmement rare; il y a d'autres éditions de 1492; 1512; 1545, &c. (Weidler, *Hist. Astron. page 280*). (*Ann. de la Langue*.)

ALARAMECH ou ARAMECH, nom de la belle étoile du bouvier *Arcturus*.

ALRUCCABAH, nom de l'étoile polaire.

ALTAIR, ATAIR, ou ALCAIR, nom de la belle étoile de l'aigle.

ALTERNATION, s. f. se dit quelquefois pour exprimer le changement d'ordre qu'on peut donner à plusieurs choses ou à plusieurs personnes, en les plaçant successivement les unes après les autres, ou les unes après les autres. Ainsi trois lettres a, b, c, peuvent subir une *alternation* en six façons différentes; a b c, a c b, b a c, b c a, c a b, c b a.

L'*alternation* est une des différentes espèces de combinaisons. Voyez COMBINAISON. En voici la règle: pour trouver toutes les *alternations* possibles d'un nombre de choses donné, par exemple, de cinq choses, (comme de cinq lettres, de cinq personnes, &c.) prenez tous les nombres depuis l'unité jusqu'à cinq, & multipliez-les successivement les uns par les autres, 1 par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5; le produit 120 sera le nombre d'*alternations* cherché.

La raison de cette pratique est bien simple. Prenons, par exemple, deux lettres a & b, il est évident qu'il n'y a que deux *alternations* possibles, a b; b a; prenons une troisième lettre c, il est évident que cette troisième lettre peut être disposée de trois manières différentes dans chacune des deux *alternations* précédentes; savoir, ou à la tête, ou au milieu, ou à la fin. Voilà donc pour trois lettres deux fois trois *alternations* ou six. Prenons une quatrième lettre, elle pourra de même occuper quatre places différentes dans chacune des six *alternations* de trois lettres, ce qui fait six fois 4 ou 24; de même cinq lettres feront 24 fois 5 ou 120, & ainsi de suite (O).

ALTERNE, adj. (*Géom.*). Lorsque deux droites parallèles AB, EF, (*géom. fig. 9*) sont coupées par une droite quelconque KL, cette seconde forme, avec les parallèles, des angles intérieurs & extérieurs, que l'on appelle *alternes*, quand on les prend, en sens contraire, deux à deux au dedans des parallèles, ou deux à deux, au dehors des parallèles. Ainsi les deux angles BDH, EHD se nomment *alternes internes*; de même les deux angles ADH, FHD sont *alternes internes*. Les deux angles ADL, FHK sont *alternes externes*; & de même les deux angles BDL, FHK sont *alternes externes*. Voyez PARALLÈLE.

Si l'on a une proportion géométrique quelconque, A : B :: C' : D, & qu'on fasse changer de place aux deux termes moyens, on aura la proportion A : C :: B : D,

A : C :: B : D, qu'on appelle *proportion alternée*, relativement à la première. Voyez *PROPORTION*.

ALTIMETRIE, *s. f.* (*Géom.*) : art de mesurer les hauteurs accessibles ou inaccessibles; c'est une partie de la Géométrie pratique, ou de la Trigonométrie.

AMASSER, *v. act.* en *Hydraulique*. Pour amasser des eaux, il faut examiner si la source est découverte & peu profonde, si elle n'est point apparente, ou si elle est enfoncée dans les terres : on agira différemment suivant ces trois cas.

Lorsque la source est découverte, vous creusez seulement pour l'amasser, un trou carré, dont vous tirez les terres doucement, que vous soutiendrez par des pierres sèches. Dans l'endroit de l'écoulement, vous creusez une rigole dans les terres, ou une pierre bâtie de blocailles ou pierres sèches, que vous couvrez de terre, à mesure que vous marchez. Si la source n'est pas apparente, on fera plusieurs puits éloignés de trente à quarante pas, & joints par des tranchées, qui ramasseront toutes les eaux. Dans le cas où la source est enfoncée plus avant dans la terre, vous creuserez jusqu'à l'eau un passage, en forme de voûte par-dessous les terres, que vous retiendrez avec des planches & des étréfilons. Lorsque vous aurez construit plusieurs de ces voûtes & des pierres de communication, vous les conduirez dans une grande tranchée de recherche, dont les berges seront coupées en talus des deux côtés, en pratiquant des rameaux à droite & à gauche, en forme de pattes d'oie, pour ramasser le plus d'eau que vous pourrez. Toutes ces pierres, tranchées & rameaux se rendront par une pente douce, dans une seule & grande pierre, qui portera l'eau dans le regard de prise, ou dans le réservoir.

On pratique depuis ce regard de 50 toises en 50 toises, des puits ou puits maçonnés, pour examiner si l'eau y coule, & en connaître la quantité. On marque le chemin de l'eau par des bornes, afin d'empêcher les plantations d'arbres dont les racines perçoient les tranchées, & seroient perdre les eaux (K).

AMBEZAS, *sc. dit au trièze* de deux as qu'on amène en jouant les dés. Voyez *AS*, *RALE* & *TRICRAC*.

AMBIGÈNE, *adj.* (*Géom.*) : c'est le nom qu'on donne à une espèce d'*hyperbole*, qui a une de ses branches infinies inscrite, l'autre circonscrite à son asymptote. Telle est (*PL. analy. fig. 38*) la courbe *BCED*, dont une branche *CB* est inscrite à l'asymptote *AC*, c'est-à-dire, tombe au-dedans; & l'autre branche *CE D*, est circonscrite à l'asymptote *AF*, c'est-à-dire, tombe au-dehors de cette asymptote. Newton parolt être le premier qui se soit servi de ce terme, pour désigner certaines courbes hyperboliques du troisième ordre. (O).

AMBYLGONE, *adj.* (*Géom.*) : on appelle triangle *ambylgone*, ou plus ordinairement triangle *Mathématiques*. Tome I, 1.^{re} Partie

obtusangle, un triangle qui a un angle obtus. Voyez *TRIANGLE* & *ANGLE*.

AMIALES, (*Arith.*) : on entend par nombres *amiables*, ceux qui sont réciproquement égaux à la somme totale des parties aliquotes l'un de l'autre : tels sont les nombres 284 & 220; car les parties aliquotes du premier sont 1, 2, 4, 71, 142, dont la somme est 220; & les parties aliquotes du second sont 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, dont la somme est 284. Voyez *NOMBRE* (O).

AMIS & ENNEMIS, *terme d'Astrologie*, par lequel on exprimait autrefois la correspondance des arcs qui indiquoient du bonheur ou du malheur : les signes amis, par exemple, étoient ceux qui employoient le même tems à s'élever dans le mouvement diurne de la sphère; mais ceux qui sont dans la partie d'été, commandent à ceux qui sont dans la partie d'hiver; ceux qui sont éloignés de 30 degrés ou de 150 sont ennemis. Voyez le livre de *Judeus*, attribué à Ptolémée. (*D. L.*)

AMPHISCIENS, *terme d'Astronomie* ou de *Géographie*, par lequel on exprime les peuples qui voyent leurs ombres à midi, quelquefois vers un des poles, & quelquefois vers l'autre. Lucain observe avec raison, que dans la Zone tempérée boréale, on a toujours l'ombre à droite ou au nord, en regardant le couchant; au lieu qu'on a dans certains tems les ombres vers le midi, c'est-à-dire à gauche, en regardant le couchant, dès qu'on est dans la Zone Torride.

Ignorant vobis, Arabes, venisse in orbem;

Umbras mirati nemorum non ivera stris.

Pharf. III. 247.

Il nous apprend aussi qu'à Syene, ville d'Egypte, située sous le Tropique, l'ombre du soleil disparaît-foit à midi le jour du solstice, & ne s'étendoit ni à droite, ni à gauche.

Umbras nusquam sedente Syene. I. 587.

Les diverses situations des ombres à midi, ont produit une subdivision géographique des habitants de la terre en *Hétérosciens*, *Périsiciens*, *Amphisciens* ou *Asticiens*. Les *Hétérosciens* sont ceux dont les ombres méridiennes sont toujours tournées du côté du même pole; tels sont les habitants des Zones tempérées : ainsi, dans nos régions, l'ombre verticale se dirige toujours à midi vers le nord, parce qu'elle est toujours opposée au soleil qui est du côté du midi. Les *Périsiciens* sont ceux dont les ombres tournent en 24 heures, vers tous les points de l'horizon : ce sont les habitants des Zones froides, pour qui le soleil ne se couche pas pendant un certain tems de l'année; lorsqu'il est du côté du midi, les ombres vont vers le nord; & lorsqu'il est du côté du nord, au-dessous du pole; il rejette l'ombre vers le midi. Les *Amphisciens* sont ceux dont les ombres méridiennes sont tantôt au nord, & tantôt au sud; tels sont les habitants de la Zone Torride; mais afin que cette définition comprit aussi ceux qui habitent sous les Tropiques même, Varinius y substitue dans sa Géographie, le mot *Alciens*; cela veut dire ceux

pour qui l'ombre devient totalement nulle à un ou deux jours de l'année, le soleil étant alors au Zenit. On divisa les Afciens en deux parties: les *Aficiens-Amphiciens*, pour qui l'ombre s'étend quelquefois vers le nord, & quelquefois vers le midi, & dispa- roit deux fois l'année; les *Aficiens-Hiérosciciens*, dont les ombres sont toujours du même côté, & dispa- roissent seulement une fois, c'est-à-dire le jour où le soleil arrive dans le Tropique, sous lequel ces peuples sont situés; ces différents mots sont formés de *oria*, *umbra*, avec les prépositions relatives à chaque signification, comme *hys*, *ex utroque parte*. (D. L.)

AMPHORA, (*Astron.*): ce nom qui est latin, se donne quelquefois à la constellation du Versaïu. Voyez VERSEAU (O).

AMPLIFICATION, en optique, signifie l'aug- mentation du diamètre d'un objet vu dans un télé- scope, ou dans une lunette. L'amplification linéaire dans une lunette astronomique simple à deux verres, est égale au nombre de fois que le foyer de l'objectif contient le foyer de l'oculaire; par exemple, un objectif de six pieds de foyer, combiné avec un oculaire de 2 pouces, grossira la largeur d'un objet 36 fois, parce que 2 pouces sont contenus 36 fois dans 6 pieds.

Les lunettes dont les Astronomes se servent ac- tuellement plus souvent, grossissent 100 ou 150 fois au plus. Short avoit fait un télescope de 12 pieds qu'il prétendoit grossir 1000 fois; mais personne n'étoit parvenu au point de les faire grossir 6000 fois, comme M. Herschel, qui donne ce résultat dans ses transactions philosophiques de 1781; l'usage d'un pareil télescope est infiniment difficile: un autre n'emploie que trois secondes de tems à tra- verser le champ de télescope; & il faut une adresse singulière, pour pouvoir le servir d'une semblable machine.

Pour mesurer le grossissement d'une lunette or- dinaire, on regarde un objet des deux yeux à-la fois, ayant un œil au télescope, tandis que l'autre œil voit l'objet directement & simplement: alors les images qu'apperoivent les deux yeux, sont diffé- rentes; & comme on les voit l'une à côté de l'autre, il est aisé de voir combien la petite image est com- me celle de la grande. On rend cette opération plus facile, en traçant des lignes sur un objet éloigné, pour examiner combien l'un des intervalles vu dans le télescope, couvre d'intervalles vus à l'œil nud.

L'amplification se dit aussi de l'augmentation que les corps lumineux paroissent avoir, quand ils sont comparés à des corps obscurs; ainsi la lune, deux ou trois jours avant ou après sa conjonction, se voit à la vérité toute entière, mais la partie qui est éclairée par le soleil, paroît excéder & s'élever de la resse de la circonférence, qui n'est éclairée que par la réflexion de la lumière de la terre. Voyez LUMIÈRE CENDRÉE.

Les Astronomes font souvent que le soleil, même sans les meilleures lunettes, est sujet à une espèce

d'amplification de quelques secondes, ou environné d'une couronne d'aberration, qui augmente son vé- ritable disque: il m'a paru que cette quantité devoit être de 6 ou 7 secondes sur le diamètre du soleil, vu dans une lunette de 18 pieds, à en juger par les passages de Vénus sur le soleil, où cet effet doit disparaître. (M. DE LA LANDE).

AMPLITUDE, (*Astron.*): c'est l'arc de l'hor- izon, compté depuis le vrai point d'orient ou d'occident, jusqu'à celui où un astre paroît se lever ou se coucher: les navigateurs s'en servent pour trouver la déclinaison de l'aiguille aimantée, ou la variation du compas. Pour cet effet, on a publié long-tems dans le livre de la connaissance des tems, des tables où l'amplitude est marquée pour chaque degré de la terre, & pour les différents degrés de la déclinaison que les astres peuvent avoir: on y voit, par exemple, qu'à 50° de latitude géographique, un astre qui auroit 6° de déclinaison septentrionale, se leveroit à 10° d'amplitude; si le navigateur, au même instant, voit l'aiguille de sa boussole à 80° du soleil levant, il sera sûr qu'elle est véritablement dirigée vers le nord, ou qu'elle n'a point de va- riation ou de déclinaison; mais si l'aiguille n'est qu'à 70° degrés du soleil levant, c'est une preuve qu'elle est à 80° du vrai point d'orient, au lieu d'être à 90 degrés, comme le vrai point du nord; c'est-à-dire qu'elle varie de dix degrés à l'orient: l'ampli- tude magnétique est alors de 20 degrés du point de l'est, marqué par la boussole. Voyez AMPLITUDE dans le dictionnaire de marine.

Les navigateurs cherchent quelquefois l'amplitude par une simple opération géographique; mais les Astronomes qui veulent tenir compte de la réfrac- tion, se servent du triangle *PZS*: (*Astr. fig. 40.*) dans lequel on connoît trois côtés; savoir, *PZ*, qui est le complément de la latitude, *PS* qui est la somme ou la différence de 90 degrés, & de la déclinaison vraie de l'astre au moment donné; *ZS* qui est de 90 degrés & 33' à cause de la réfracti- on moins la parallaxe du soleil; & l'on cherche l'angle *Z* ou *PZS* de ce même triangle. La différence entre cet angle *Z* & 90 degrés, sera l'amplitude cherchée.

L'amplitude diffère de l'azimut, premièrement, parce que l'azimut se compte depuis le point du midi; c'est le supplément de l'angle *PZS*, qui est compté depuis le nord: ainsi l'azimut d'un astre qui se lève, est la somme ou la différence de 90 degrés & de l'amplitude. Secondement, le mot d'amplitude s'applique seulement à l'astre qui est dans l'horizon, au lieu que l'azimut se dit également d'un astre qui est élevé, & qu'on rapporte à l'horizon par le moyen d'un arc de cercle vertical, passant par le zénith de l'observateur, & par l'astre dont il s'agit. (M. DE LA LANDE).

AMPLITUDE, f. f. (*Géom.*): on appelle am- plitude d'un arc de parabole, la ligne horizontale, comprise entre le point d'où l'on suppose qu'un arc ou portion de parabole commence, & le point

où cette portion se termine. Ce terme est principalement en usage dans le jet des bombes; & l'amplitude de la parabole s'appelle alors *amplitude du jet*. Voyez PARABOLE & PROJECTILE.

AN, voyez ANNÉE. On dit l'an de grace, pour dire l'année de Jésus-Christ ou de l'Ere vulgaire; l'an de Rome, &c.; mais le mot d'année est plus usité.

Jour de l'an. Chez les Romains, le premier & le dernier jour de l'an étoient consacrés à Janus; & c'est par cette raison qu'on le précédoit avec deux villages.

C'est de ce peuple que vient la cérémonie de souhaiter la bonne année; cérémonie qui paroît très-ancienne. Non-seulement les Romains se rendoient des visites, & se faisoient réciproquement des complimens avant la fin du premier jour: mais ils se précédoient aussi des étrennes, *strenæ*, & offroient aux Dieux des vœux pour la conservation les uns des autres. Lucien en parle comme d'une coutume très-ancienne, même de son tems, & il en rapporte l'origine à Numa.

Ovide fait allusion à la même cérémonie au commencement de ses *fastes*.

Postera lux oritur, linguæ animique favet;

Nunc dicenda bono sunt bona verba die.

Et Plinè dit plus explicitement, L. XXVIII. c.v. *primum anni incipientis diem laus precationibus invicem fasibus ornatur.*

ANABIBAZON, f. m. terme d'Astronomie; c'est le nom qu'on donne à la queue du dragon, ou au nœud méridional de la lune; c'est-à-dire, à l'endroit où elle coupe l'écliptique, pour passer de la latitude septentrionale à la méridionale. C'est le nœud descendant opposé au nœud ascendant de la lune. Voyez NŒUD.

ANACAMPTIQUE, adj. m. (Acoustique), signifie la même chose que *réflectif*, & se dit singulièrement des échos, qu'on dit être des sons réfléchis. Voyez RÉFLEXION, ÉCHO, SON.

Et par analogie, quelques-uns appellent aussi *anacamptique*, la science qui a pour objet les rayons réfléchis, & qu'on appelle autrement *catoptrique*. Voyez CATOPTRIQUE & PHONIQUE.

ANACLASTIQUE, f. m. (Opt.), est la partie de l'optique qui a pour objet les réfractions; c'est la même chose que ce qu'on appelle autrement *dioptrique*. Car le mot d'*anaclastique* s'emploie rarement. Voyez DIOPTRIQUE.

Ce mot se prend aussi adjectivement: *point anaclastique*, est le point où un rayon de lumière se rompt; c'est-à-dire, le point où il rencontre la surface rompanse. Voyez RÉFRACTION. Ce mot est formé des mots Grecs, *ana*, de, & *κλάω*, *frango*, je romps.

Courbes anaclastiques, est le nom que M. de Mairan a donné aux courbes apparentes que forme le fond d'un vase plein d'eau, pour un œil placé dans l'air, ou le plafond d'une chambre, pour un œil placé dans un bassin plein d'eau, au milieu de

cette chambre; ou la voûte du Ciel, vue par réflexion, à travers l'atmosphère. M. de Mairan détermine ces courbes d'après un principe d'optique adopté par plusieurs Auteurs, & rejeté par d'autres; mais qu'on peut ne prendre, dans son mémoire, que pour un principe purement géométrique, auquel cas ses recherches conserveront tout le mérite qu'elles ont à cet égard. Barrow à la fin de son *Optique*, détermine ces mêmes courbes par un autre principe. Voyez ce que c'est que le principe de M. de Mairan, & celui de Barrow, à l'article APPARENT. *Mem. ac. 1740. (O).*

ANALEMMATIQUE, voyez CADRAN.

ANALEMME, (Astron.): L'analemme est un planisphère ou une projection orthographique de la sphère sur le plan du méridien, l'œil étant supposé à une distance infinie, & dans le point orienté ou occidental de l'horizon, comme dans la figure 23, où l'équateur & l'horizon sont représentés par des lignes droites; si cette projection est faite sur l'éculture des solstices, l'écliptique y sera aussi une ligne droite: c'est ainsi que l'analemme est exprimé dans Ozanam, Bion, &c. V. PLANISPHERE, PROJECTION. *Analemme* vient du verbe grec *αναλαμβάνω*, qui signifie *lever*, parce qu'il sert à trouver quelle est la hauteur du soleil, à une heure quelconque, par une opération graphique. L'analemme donne aussi le tems du lever & du coucher du soleil, pour un jour & pour une latitude quelconque, & l'heure du jour quand on connoît la hauteur. En effet, soit *P* le pôle, fig. astron. 186, *QV* l'équateur, *QH* un arc égal à la déclinaison du soleil *HG* le rayon du parallèle diurne du soleil *HDE*; *IA* égal au sinus de la hauteur du soleil; la perpendiculaire *AD* marquera sur le point *D* du parallèle, un arc *DH* égal à l'angle horaire du soleil, ou sa distance au méridien; & cette distance étant convertie en tems, fera connoître l'heure qu'il est. Voyez PROJECTION, ASTROLABE.

L'instrument appelé *Trigone des figures*, s'appelle aussi quelquefois *analemme*. Voyez TRIGONE DES SIONES, CADRAN.

ANALYSE, f. f. est proprement la méthode de résoudre les problèmes mathématiques, en les réduisant à des équations. Voyez PROBLÈME & EQUATION.

L'analyse, pour résoudre tous les problèmes, emploie le secours de l'algèbre, ou le calcul des grandeurs en général: aussi ces deux mots, *analyse*, *algèbre*, sont souvent regardés comme synonymes.

L'analyse est l'instrument ou le moyen général par lequel on a fait depuis près de deux siècles, dans les Mathématiques, de si belles découvertes. Elle fournit les exemples les plus parfaits de la manière dont on doit employer l'art du raisonnement, donne à l'esprit une merveilleuse promptitude pour découvrir des choses inconnues, un moyen d'un petit nombre de données & en employant des signes abrégés & faciles pour exprimer

les idées, elle présente à l'entassement des choses, qui autrement sembleroient être hors de la sphère. Par ce moyen, les démonstrations géométriques peuvent être singulièrement abrégées : une longue suite d'argument, ou l'esprit ne pourroit, sans le dernier effort d'attention, découvrir la liaison des idées, est convertie en des signes sensibles, & les diverses opérations qui y sont requises, sont effectuées par la combinaison de ces signes. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, par ce moyen de cet art, un grand nombre de vérités sont souvent exprimées par une seule ligne; au lieu que, si on suivoit la manière ordinaire d'expliquer & de démontrer, ces vérités rempliroient des volumes entiers. Ainsi, par la seule étude d'une ligne de calcul, on peut apprendre en peu de tems les sciences entières, qui autrement pourroient à peine être apprises en plusieurs années. Voy. MATHÉMATIQUE, THÉORÈME, ALGÈBRE, &c.

L'analyse est divisée, par rapport à son objet, en analyse des quantités finies, & en analyse des quantités infinies.

Analyse des quantités finies, est ce que nous appelons autrement Arithmétique spécifique ou Algèbre. Voyez ALGÈBRE.

Analyse des quantités infinies ou des infinis, appelée aussi la nouvelle Analyse, est celle qui calcule les rapports des quantités qu'on prend pour infinies, ou infiniment petites. Une de ses principales branches est la méthode des fluxions ou le calcul différentiel. V. FLUXION, INFINIMENT PETIT, & DIFFÉRENTIEL.

Le grand avantage des mathématiciens modernes sur les anciens, vient principalement de l'usage qu'ils font de l'analyse.

Les anciens auteurs d'analyse sont nommés par Pappus, dans la préface de son septième livre des Collections Mathématiques; savoir, Euclide, en ses *Data & Porismata*; Apollonius, de *Sectione Rationis*, & dans ses *Coniques*; Aristæus, de *Locis solidis*; & Eratosthenes, de *Medius proportionalibus*. Mais les anciens auteurs d'Analyse étoient très-différents des modernes. Voyez ARITHMÉTIQUE.

L'algèbre appartient principalement à ceux-ci; on en peut voir l'histoire, avec ses divers auteurs, sous l'article ALGÈBRE.

Les principaux auteurs sur l'Analyse des infinis, sont Wallis, dans son *Arithmetique des infinis*; Newton, dans son *Analysis per quantitatum series, fluxiones & differentias*, & dans son excellent traité, qui a pour titre, de *Quadratura curvarum*: Leibnitz, *ad. eruditor.* an. 1684. le marquis de l'Hôpital, en son *Analyse des infiniment petits*, 1696. Carré, en sa méthode pour la mesure des surfaces, la dimension des solides, &c. par l'application du calcul intégral, 1700. G. Manfredi, dans son ouvrage de *constructione equationum differentialium primi gradus*, 1707. Nic. Mercator, dans sa *Logarithmotechnia*, 1668. Cheyne, dans sa *Methodus fluxionum inversa*, 1703. Craig, *Methodus figura-*

rum lineis rectis & curvis comprehensarum, quadraturas determinandi, 1685, & de *quadraturis figurarum curvilinearum & locis*, &c. 1693. Dav. Gregory, dans son *Exercitatio geometrica, de dimensione figurarum*, 1684, & Nicuvenius, dans ses *Considerationes circa analysios ad quantitates infinitas parvas applicatas, principia*, 1695.

L'Analyse démontrée du P. Reynard de l'Oratoire, imprimée, pour la première fois, à Paris en 1708, en 2 volumes in-4. est un livre auquel ceux qui veulent étudier cette science, ne peuvent se dispenser d'avoir recours. Quoiqu'il s'y soit glissé quelques erreurs, c'est cependant jusqu'à présent un des ouvrages les plus complets que nous ayons sur l'Analyse. Il seroit à souhaiter que quelque habile Géomètre nous donnât sur cette manière un traité encore plus exact & plus étendu à certains égards, & moins étendu à d'autres, que celui du P. Reynard. On pourroit abrégér le premier volume, qui contient, sur la théorie, des équations beaucoup de choses assez inutiles, & augmenter ce qui concerne le calcul intégral, en se servant pour cela des différents ouvrages qui en ont été publiés, & des morceaux répandus dans les mémoires des Académies des Sciences de Paris, de Berlin, de Londres & de Pétersbourg, dans les actes de Leipzig, dans les ouvrages de MM. Bernoulli, Euler, Maclaurin, &c. Voyez CALCUL INTÉGRAL.

Cet article analyse est destiné au commun des lecteurs, & c'est pour cela que nous l'avons fait assez court : on trouvera à l'article ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE, un détail plus approfondi; & à l'article APPLICATION, on traitera de celle de l'Analyse à la Géométrie. L'article ALGÈBRE contient l'histoire de l'Analyse (O).

ANALYSE, (*Mathématiques*). Le judicieux & profond écrivain, qui a composé l'article ANALYSE qui précède, s'est borné au sens que les modernes donnent à ce mot; & dans ce sens, il a traité ce sujet d'une manière digne de lui dans l'article cité, & dans les autres auxquels il renvoie. Cependant je ne crois pas inutile de dire quelque chose de la méthode des anciens.

L'analyse, dit Pappus dans la préface du septième livre de ses *Collections mathématiques*, est la méthode de parvenir, par des conséquences nécessaires depuis ce qu'on cherche, & qu'on regarde comme déjà trouvé, à une conclusion qui fournisse la réponse à la question proposée, c'est-à-dire, à une proposition connue, & mise au nombre des principes.

Le but de l'analyse est ou de découvrir la vérité, ou de trouver le moyen d'exécuter ce qu'on s'est proposé. Considérée sous le premier point de vue, l'analyse s'appelle théorique; elle suppose certaine la proposition douteuse, & en tire des conséquences jusqu'à ce qu'elle parvienne à une conclusion manifestement vraie ou manifestement fautive. Dans

Le premier cas, la proposition prise pour vraie, l'est réellement, & dans le second cas, elle est fautive. Sous la seconde face, l'analyse se nomme *problématique*; elle regarde comme fait ce qu'on doit faire, & tire de cette supposition des conséquences jusqu'à ce qu'elle parvienne à une conclusion évidemment possible & exécutable, ou certainement impossible; dans le premier cas, le problème est possible; dans le second, il est impossible; toujours il est résolu, comme il est manifeste.

Je me suis servi du mot *exécutable* pour rendre le sens des Grecs, parce que les anciens distinguent, pour ce qui concerne les problèmes, ce que nous savons & pouvons exécuter de ce qui est possible en soi, mais que nous ne pouvons pas déterminer. Ainsi, la trisection de l'angle est possible en elle-même; elle est possible géométriquement, c'est-à-dire, par la ligne droite & le cercle; la quadrature indéfinie du cercle est possible en elle-même; mais nous ne la connoissons pas. Les anciens ne regardoient pas comme pleinement & géométriquement résolu un problème qui étoit amené à la trisection de l'angle ou à la quadrature du cercle.

J'ai dit que la quadrature indéfinie du cercle est possible; j'ai voulu dire que l'impossibilité de trouver un espace terminé par des droites, & égal à la surface d'un segment de cercle quelconque, n'est pas démontrée. Au reste, je fais qu'il est démontré qu'on ne peut pas exprimer par nombres la vraie raison du diamètre à la circonférence. Ainsi, je regarde comme impossible la quadrature arithmétique du cercle, mais je crois très-possible la quadrature géométrique; nous en avons un exemple dans les *Lunules* d'Hippocrate. Revenons.

Les anciens n'avoient rien qui ressembloit à notre calcul: ils pratiquoient leur analyse à force de tête. Pour en diminuer la difficulté, ils avoient composé des livres qui contenoient la solution détaillée de quelques problèmes généraux, auxquels ils réduisoient de ramener les autres. La note de ces livres se trouve dans la première partie du présent article. Ainsi, l'on regardoit comme résolu un problème qui étoit réduit à celui de faire passer un cercle par deux points donnés, en sorte qu'il touchât une droite donnée de position, parce que ce dernier problème étoit résolu dans le traité de *Tadiobus* d'Apollonius.

Il ne nous reste des écrits analytiques des anciens, que les *Data* d'Euclide, & le traité de *sections rationnelles* d'Apollonius. Nous devons ce dernier à l'étonnante patience & à la merveilleuse sagacité du célèbre Edmond Halley, qui le traduisit de l'Arabe qu'il ignoroit. Fcù M. Simon, professeur à Edinbourg, a fort bien révisé ces lieux plus d'Apollonius. Quelques autres traités ont été rétablis par d'autres auteurs, qui tous se sont servis de l'algèbre, & ont fourni une tâche qui, de cette manière, n'étoit pas fort difficile. « Mais, dit

« Halley, autre chose est résoudre en quelque façon un problème, ce qu'ordinairement on peut exécuter de plusieurs manières différentes; autre chose est le résoudre par la méthode la plus élégante, en faisant usage de l'analyse la plus courante & la plus claire, & de la symbolique ou construction la plus convenable & la plus facile. » C'est ce que les anciens ont fait, &c. (*Vener perpendum fci, aliud esse problema aliquatenus resolutum dare, quod modis variis praterquam fieri potest, aliud methodo elegantissimè idipsum efficere, analysi brevissimè & simul perspicuè, synthesi concinè & minimè operari. Hoc veteres præstasse, argumens est Apollonii liber, quem in præfationibus tibi misimus. Halley, præf. ad Apoll. de sed. rat. circa finem*).

Si nous en croyons cet homme illustre, qui certainement possédoit les calculs des modernes, la méthode des anciens dispuie à l'algèbre l'avantage de la facilité, & l'emporte de beaucoup sur elle par l'évidence & l'élégance de ses démonstrations (*methodus hæc cum algebra speciosa facilitate contendit, evidentia vero & demonstrationum elegantia eam longe superare videtur. Halley, loc. cit. p. 4*). Je ne vais pas si loin. A mon avis, les découvertes étonnantes que les modernes ont faites dans la physique & dans les mathématiques, sont uniquement dues à leurs calculs. Pour s'élever au-dessus des connoissances ordinaires, les anciens devoient péniblement enfler leur raisonnement sur raisonnement, comme les géans enflèrent montagne sur montagne pour escalader les cieux. Les modernes, comme Dédale, se font fait des ailes, avec lesquelles ils montent aisément aux plus sublimes régions auxquelles puisse s'élever l'entendement humain. Ceux qui ont perfectionné les calculs, & qui les perfectionnent journellement avec tant de peine & avec tant de sagacité, méritent toute notre admiration & toute notre reconnaissance.

Les calculs ont deux avantages sur la méthode des anciens. Ils soulagent infiniment l'attention par les symboles qu'ils emploient; & ils ne demandent que la connoissance d'un petit nombre de théorèmes pour résoudre les problèmes les plus difficiles. Ils sont pour les sciences, ce que les métaux sont pour le commerce; il représentent sans embarras, & procurent sans peine les vraies richesses. Il me semble cependant qu'on tireroit encore plus de parti des calculs, si l'on faisoit plus d'usage de quelques théorèmes que les anciens nous ont laissés. Tels sont sur-tout, à mon avis, ceux qui sont contenus dans le livre des *Data* d'Euclide. Il ne reste que quatre-vingt & quinze théorèmes, (Pappus, dans sa préface, n'en compte que quarante-vingt-dix). De ces théorèmes, au moins quarante sont connus au moindre géomètre. Il suffiroit de charger la mémoire de quarante ou quarante-cinq propositions de plus. Pour en voir l'utilité, considérons rapidement la nature de ces *Data*. Je tâcherai de me mettre à la portée de ceux même qui ne sont pas géomètres.

Quand on commande, par exemple, une table à un menuisier, ce n'est pas assez de dire qu'on veut une table; il faut fixer la manière, la figure, les dimensions. Quand on propose un problème à un géomètre, il faut déterminer certaines choses. Il ne suffit pas de dire qu'on veut un triangle; il faut déterminer ou la longueur de chaque côté de ce triangle, ou celle de deux côtés, & la grandeur de l'angle que ces deux côtés forment, ou la longueur d'un côté, & la grandeur des deux angles qui sont sur ce côté, &c.

Dans cet exemple, les côtés & les angles, en général toutes les choses qui sont déterminées par celui qui propose le problème, s'appellent des *données* ou des *data*, d'un mot latin que les géomètres François ont adopté. Je les appellerai des *données par convention*. Car chaque chose qui est donnée de cette manière, est nécessairement accompagnée d'autres données, qu'on ne découvre qu'avec quelque attention; par exemple, les trois côtés d'un triangle étant donnés de longueur, les angles, la surface du triangle, la perpendiculaire tirée du sommet d'un angle sur le côté opposé, &c. sont aussi donnés. C'est ainsi qu'avant prescrit au menuisier la sorte de bois & les dimensions de ma table, je lui ai aussi prescrit le poids. J'appelle *données en conséquence* les données de la seconde sorte, pour les distinguer de celle de la première.

Euclide réduisit, sous certains chefs, tout ce qui peut être donné par convention en Géométrie, & fit voir les *données en conséquence*, qui nécessairement accompagnent chaque *donnée par convention*. C'est ce que contient son livre des *Data*. Les propositions qu'on y trouve servent d'abord à faire voir quelles conditions d'un problème sont superflues, parce qu'elles sont nécessairement renfermées dans les autres. En second lieu, les mêmes propositions sont utiles à résoudre plusieurs problèmes géométriques sans peine & sans calcul, & à simplifier le calcul nécessaire à la solution de nombre d'autres.

Cet article n'est fait que pour les commençans; c'est pourquoi je donnerai un exemple simple & facile de la seconde utilité des *Data* d'Euclide, en résolvant, par une seule proposition de ce livre, les problèmes 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. de l'*Aritmétique universelle* de Newton. Quand je la commentai, je ne vis pas cette solution. Je n'avois pas assez présents à l'esprit les *data* que je n'avois pas que fort tard. Mon exemple doit engager les jeunes gens, qui se destinent aux mathématiques, à étudier ce livre de bonne heure, & à se le rendre familier.

La proposition dont je fais usage, est la 67 de ce traité. L'auteur la démontre en quatre manières différentes. Voici la troisième avec un léger changement, nécessaire pour faciliter la construction des problèmes. La proposition d'Euclide est :

Si un triangle a un angle donné, l'excès du carré de la somme des deux côtés qui forment l'angle donné,

sur le carré de la base, est au triangle en raison donnée.

Dans le triangle ABC (Géom. fig. 106, 107, 108), soit donné l'angle ABC ; prolongez le côté AB , que pour épargner la multiplicité des cas & des figures, je suppose le plus grand des deux côtés qui forment l'angle donné; & prenez BD égale à BC ; donc la droite AD est égale aux deux CB , BA ensemble. Du point C tirez sur la droite AD la perpendiculaire CE .

Avant d'embrasser la démonstration, je remarquerai :

1.^o Que, pour cette proposition, j'ai fait trois figures : la première pour l'angle B aigu; la seconde pour l'angle B obtus; la troisième pour le même angle droit, afin de démontrer tous les cas de cette proposition importante.

2.^o Que, comme cette proposition se démontre par la comparaison des rectangles & des carrés, je me fers des signes algébriques. Dans ces cas, le raisonnement des anciens ne diffère du calcul des modernes, qu'en ce que le second s'exprime d'une manière beaucoup plus courte que le premier. Les principales opérations de l'algèbre font démontrées dans le second livre d'*Euclide*; & tout ce qu'on prouve par ce second livre, est prouvé algébriquement, aussi bien quand on se sert des mots, que quand on se sert des signes.

Démonstration.

On fait que $AD^2 = AB^2 + 2AB \times BD + BD^2 = AB^2 + 2AB \times BC + BC^2$, parce que l'on a fait BD égale à BC . On fait aussi que $AB^2 + BC^2 = CA^2 \pm 2AB \times BE$ (où il faut prendre le signe $+$ pour la fig. 106, dans laquelle l'angle ABC est aigu; & le signe $-$ pour la fig. 107, dans laquelle l'angle ABC est obtus); donc $AD^2 = CA^2 + 2AB (DB \pm BE)$, ou bien, $DA^2 - AC^2 = 2AB \times ED$, mais $2AB \times ED = 2AB \times EC = DE^2$; EC & $2AB \times EC$ est égal à quatre fois la surface du triangle ABC ; donc l'excès du carré de la somme des deux côtés d'un triangle sur le carré du troisième côté ($DA^2 - AC^2 = (AB + BC)^2 - AC^2$) est à la surface du triangle ABC , comme DE à la quatrième partie de EC .

Cette raison est donnée lorsque l'angle ABC est donné, parce que, dans ce cas, l'angle ADC , qui en est la moitié, est aussi donné; c'est pourquoi le triangle rectangle CED est donné d'épée, & la raison de DE à EC est donnée. C. Q. F. D.

J'ajoute qu'aussi l'excès du carré de la base sur le carré de la différence des côtés qui forment l'angle donné, est au triangle en raison donnée.

Prenez la partie BF égale au côté BC , & joignez la CF ; donc AF est la différence des

côtés AB , BC . D'abord $\overline{AF}^2 + 2AB \times BF = \overline{AB}^2 + \overline{BF}^2 = \overline{AF}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2 \pm 2AB \times BE$; donc $\overline{CA} - \overline{AF} = 2AB(FB - BE) = 2AB \times EF$; mais $2AB \times EF : 2AB \times EC = EF : EC$, & l'angle BFC , moitié de l'angle donné CBD , est donné; donc le triangle FEC , rectangle en E , est donné d'espèce; & la raison de FE à EC est donnée, aussi-bien que celle de FE , au quart de EC ; & la dernière est la même que celle de l'excès du carré de la base du triangle sur le carré de la différence des deux côtés qui forment l'angle donné, de $(CA)^2 - (AB - BC)^2$ à la surface du triangle; donc cette raison est donnée.

Cette démonstration s'applique sans peine à la fig. 108.

En termes trigonométriques, la première raison est celle de la cotangente de la moitié de l'angle donné au quart du rayon, & la seconde est celle de la tangente de la moitié de l'angle donné au quart du rayon. Parce que, si CE représente le rayon, ED représente la cotangente de l'angle CDE , moitié de l'angle donné CBA ; mais FE représente la cotangente de l'angle ECF , moitié de CBD , supplément de l'angle donné.

Observez que l'angle DCF est droit, puisque les angles CDF , DFC ensemble font un droit, étant la moitié des angles ABC , CBD qui ensemble valent deux droits. On bien parce que le demi-cercle décrit du centre B & de l'intervalle BD , passe par les points C & F , puisque les droites BD , BC , BF sont égales; donc $DE : EC = CE : EF$.

Nous avons vu que le premier excès est au quadruple de la surface du triangle, comme DE à EC ; que le second excès est au quadruple de la même surface, comme FE à EC ; & que DE est à EC comme CE à EF . Il en résulte que le quadruple de la surface d'un triangle est moyen proportionnel entre l'excès du carré de la somme de deux côtés sur le carré du troisième côté, & l'excès du carré du troisième côté sur le carré de la différence des deux autres côtés. Nous montrerons dans la suite que ce corollaire renferme une proposition trigonométrique importante, que les modernes démontrent d'une manière fort embarrassée.

De cette proposition résulte aussi que, si la raison de l'excès du carré de la somme de deux côtés d'un triangle sur le carré du troisième côté au triangle, ou celle de l'excès du carré du troisième côté sur le carré de la différence de deux côtés au même triangle est donnée, l'angle EDC , ou ECF , & par conséquent l'angle ABC est donné.

C'est par cette proposition qu'on résout sans peine les problèmes de *Newton* rendus généraux. Ils se réduisent à décrire un triangle, étant donnés :

1.^o Un angle, le périmètre, & la perpendiculaire

tirée de l'angle donné sur le côté opposé. C'est le probl. IV de l'*Aritmétique universelle*.

2.^o Un angle, le côté opposé à l'angle donné, & la somme des deux côtés qui forment l'angle donné & de la perpendiculaire tirée de l'angle donné sur le côté opposé & donné. C'est le problème V.

3.^o Un angle, la somme des côtés qui le forment, & la perpendiculaire tirée de l'angle donné sur le côté opposé. C'est le probl. VI.

4.^o Un angle, la somme des côtés qui le forment, & la somme de la base & de la perpendiculaire tirée de l'angle donné sur le côté opposé. C'est le probl. VII.

5.^o Un angle, la surface & le périmètre. C'est le problème VIII.

6.^o La base, la perpendiculaire élevée sur la base, & la somme des deux côtés. C'est le probl. IX.

7.^o Un angle, la somme des côtés qui le forment & le côté opposé. C'est le probl. X.

1.^o Soit donc $AB + BC + CA = a$; $CE = b$; $AB = x$; donc $BC + CA = a - x$, (suivant *Newton*); $(BC + CA)^2 = a^2 - 2ax + x^2$; $(BC + CA)^2 - \overline{AB}^2 = a^2 - 2ax$; & $AB \times BC = bx$.

Mais, par la proposition précédente, la raison de $a^2 - 2ax$ à $2bx$ est donnée. Soit donc $a^2 - 2ax : 2bx = c$; b ; donc $a^2 - 2ax = 2cx$; $a^2 = 2cx + 2ax$; & $\frac{a^2}{2c + 2a} = x$.

2.^o Soit $AC + CB + CF = a$; $AB = b$; $CE = x$; par conséquent $AC + CB = a - x$, comme dans *Newton*. Mais $(AC + CB)^2 = a^2 - 2ax + x^2$; $(AC + CB)^2 - \overline{AB}^2 = a^2 - 2ax + x^2 - b^2$; $AB \times CE = bx$; & par la proposition précédente, $a^2 - 2ax + x^2 - b^2 : 2bx = c$; b ; donc $a^2 - 2ax + x^2 - 2b^2 = 2cx$; & $a^2 - b^2 = 2ax + 2cx - x^2$.

Ces deux conclusions s'accordent avec celles de *Newton*, qui fait droit l'angle donné. Car, dans ce cas, la tangente de la moitié de l'angle droit est $= b$ dans ces deux problèmes.

3.^o Soit $AC + CB = a$; $CE = b$; $AB = x$, comme *Newton* dans la seconde solution. Ici $(AC + CB)^2 = a^2$; $(AC + CB)^2 - \overline{AB}^2 = a^2 - x^2$; $AB \times CE = bx$; & $a^2 - x^2 : 2bx = c$; b ; par conséquent $a^2 - x^2 = 2cx$, comme *Newton*.

4.^o Soit $AC + CB = a$; $AB + CE = b$; $AB = y$. Donc $(AC + CB)^2 - \overline{AB}^2 = a^2 - y^2$; $CE = b - y$; $CE \times AB = b - y$. Mais $a^2 - y^2 : 2by - 2y^2 = c$; b ; donc $a^2 - y^2 = 2cy - \frac{y^3}{b}$.

Cette équation, quand l'angle est droit, & par conséquent $c = b$, devient $a^2 = 2by - y^3$, équation

que Newton auroit trouvé, si, au lieu d'exterminer y , il avoit exterminé x .

5.^e Soit A l'angle donné, & $AB + CB + CA = a$; $AB \times CE = 2b^2$; $BC = y$; donc $BA + AC = a - y$; $(BA + AC)^2 = a^2 - 2ay + y^2$; $(BA + AC)^2 - BC^2 = a^2 - 2ay$; & $a^2 - 2ay = 4b^2 = e^2$; b ; donc $a^2 - 2ay = 4b^2$.

6.^e Soit $CE = a$; $AB = 2b$; $BC + CA = 2c$; $BC - CA = 2d$; donc $(BC + CA)^2 - AB^2 = 4c^2 - 4b^2$. La surface du triangle $= \frac{AB \times CE}{2} = ab$;

$\frac{AB}{2} - (BC - CA)^2 = 4b^2 - 4d^2$. Mais par le théorème, $4c^2 - 4b^2 = 4ab = 4ab^2 - 4d^2$; donc $\frac{4b^2}{4d^2} = b^2 - d^2$; & $d^2 = b^2 - \frac{a^2 b^2}{4d^2}$, comme Newton.

7.^e Enfin soit C l'angle donné; $AC + CB = 2b$; $AB = a$; $CE = y$; $(AC + CB)^2 - AB^2 = 4b^2 - a^2$; $AB \times CE = a^2$; mais $4b^2 - a^2 = 2ay = f^2$; a ; donc $4b^2 - a^2 = 2fy$.

Si, dans ce dernier problème, on avoit, comme Newton, cherché la différence des côtés, on auroit trouvé la même équation que l'auteur. Car soit B l'angle donné; CE la perpendiculaire sur AB ; $BD = BC$; & $CA = a$; $AB + BC = 2b$; $AB - BC = 2c$. Il est clair que $(AB + BC)^2 - CA^2 = 4b^2 - a^2$; & $CA^2 - (AB - BC)^2 = a^2 - 4c^2$.

Or $4b^2 - a^2$ est à quatre fois la surface du triangle en raison donnée de DE à $E C$. Soit $DE : EC = m : n$; donc quatre fois la surface du triangle est à $a^2 - 4c^2$ comme m à n ; donc $4b^2 - a^2 = \frac{m}{n} (a^2 - 4c^2)$.

$a^2 - 4c^2 = m^2 n$; & $\frac{4b^2 - a^2}{m^2} = a^2 - 4c^2$; par conséquent $x^2 = \frac{a^2 (m^2 + n^2) - 4b^2 n^2}{4m^2}$.

Newton a fait $CB : BE = d^2 : e^2$; & il a trouvé $e^2 = \frac{a^2 (d^2 - e^2)}{2d + 2e}$.

Cette équation & la précédente sont les mêmes. Car, suivant notre auteur, $CB : BE = d^2 : e^2$; donc $\frac{CB}{BE} = \frac{d^2}{e^2}$; & $\frac{CB}{BE} = \frac{d^2}{e^2} (CE)^2$; $\frac{BE}{BE} = d^2 - e^2$; e^2 , & aussi $CB + BE (DE) : EB = d + e : e$; & $\frac{BE}{EB} = \frac{d^2}{e^2} = \frac{d^2}{e^2} (d + e)^2$; donc ex æquo, $CE : ED = d^2 - e^2 : (d + e)^2 = d - e : d + e$.

Nous avons fait $CE : ED = n^2 : m$, c'est-à-dire, $\frac{CE}{ED} = \frac{n^2}{m}$; m^2 ; c'est pourquoi $d = e$; $d + e = n^2$; m^2 ; & *componendo*, $2d : d + e = n^2 + m^2 : \frac{m^2}{2}$; ou $\frac{d - e}{d + e} = \frac{n^2}{m^2}$; & $\frac{2d}{d + e} = \frac{m^2 + n^2}{m^2}$.

Donc $\frac{a^2 (m^2 + n^2)}{4m^2} = \frac{a^2 d}{2d + 2e}$; & $\frac{a^2 n^2}{m^2} = \frac{2b^2 (d - e)}{d + e} = \frac{2b^2 (d - e)}{2d + 2e}$, qui est précisément l'équation de Newton.

J'ai un peu étendu ces solutions en faveur des commençans, à qui cet article est destiné. Cependant je ne m'arrêterai pas à résoudre les mêmes problèmes, en supposant données les différences au lieu des sommes, &c. Je finirai en montrant, comme je l'ai promis, que le théorème fondamental de cet article renferme celui qu'on donne pour trouver la surface d'un triangle par les côtés; voici la règle. Prenez la moitié du périmètre du triangle, ce sera la première quantité. De cette moitié de périmètre, ôtez successivement les trois côtés du triangle, vous aurez trois autres quantités qui, avec la première, feront quatre quantités; tirez la racine quarrée du produit de ces quatre quantités, vous aurez la surface du triangle. Nous avons montré que quatre fois la surface d'un triangle est moyennement proportionnelle entre l'excès du quarré de la somme de deux côtés sur le quarré de la base; & entre l'excès du quarré de la base sur le quarré de la différence des côtés. Mais, par la cinquième proposition du II^e livre d'Euclide, la différence de deux quarrés est égale à un rectangle, dont un côté est la somme, & l'autre est la différence des côtés des quarrés; donc les deux côtés du premier excès sont l'un, le périmètre du triangle, & l'autre l'excès de la somme des deux côtés sur la base; & les deux côtés de l'autre sont l'un la somme de la base & de la différence des deux côtés, & l'autre l'excès de la base sur la même différence, & prenant le quart des rectangles, ou la moitié de chacun des quatre facteurs, &c. (J. D. C.)

ANALYSTE, f. m. en *Mathématique*, se dit d'une personne versée dans l'analyse mathématique. Voyez ANALYSE.

ANALYTIQUE, adj. (*Math.*), qui appartient à l'analyse, ou qui est de la nature de l'analyse, ou qui se fait par la voie de l'analyse. V. ANALYSE. Ainsi l'on dit *équation analytique*, *démonstration analytique*, *recherches analytiques*, *table analytique*, *calcul analytique*, &c. Voyez MÉTHODE.

La méthode analytique est opposée à la synthétique. Dans la Philosophie naturelle, aussi bien que dans les Mathématiques, il faut commencer à applanir les difficultés par la méthode analytique, avant que d'en venir à la méthode synthétique. Or cette analyse consiste à faire des expériences & des observations, à en tirer des conséquences générales par la voie de l'induction, & ne point admettre d'objections contre ces conséquences, que celles qui naissent des expériences ou d'autres vérités constantes. Et quand même les raisonnemens qu'on fait sur les expériences par la voie de l'induction, ne seroient pas des démonstrations des conséquences générales qu'on a tirées, c'est du moins la meilleure méthode de raisonner sur ces sortes d'objets; le raisonnement

raisonnement sera d'autant plus fort, que l'induction sera plus générale. S'il ne se présente point de phénomènes, qui fournissent d'exception, on peut tirer la conséquence générale. Par cette voie *analytique*, on peut procéder des substances composées à leurs éléments, des mouvements aux forces qui les produisent, & en général des effets à leurs causes, & des causes particulières à de plus générales, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à celle qui est la plus grande de toutes. Voilà ce que c'est que la méthode *analytique*, dit M. Newton.

La méthode synthétique consiste à prendre comme principes, les causes déjà connues & constatées; à les faire servir à l'explication des phénomènes qui en proviennent, & à justifier cette explication par des preuves. Voyez *SYNTHÈSE*.

Méthode *analytique*, en *Géométrie*, est la méthode de résoudre les problèmes, & de démontrer les théorèmes de *Géométrie*, en y employant l'analyse ou l'algèbre. Voyez *ALGÈBRE*, *ANALYSE* & *APPLICATION*.

Cette méthode est opposée à la méthode appelée *synthétique*, qui démontre les théorèmes, & résout les problèmes, en se servant des lignes mêmes qui composent les figures, sans représenter ces lignes par des noms algébriques. La méthode synthétique étoit celle des anciens; l'analytique est due aux modernes. Voyez les articles cités ci-dessus; voyez aussi *SYNTHÈSE* (O).

ANAMORPHOSE, f. f. en *perspective* & en *peinture*, se dit d'une projection monstrueuse, ou d'une représentation défigurée de quelque image, qui est faite sur un plan ou sur une surface courbe, & qui néanmoins, à un certain point de vue, paroît régulière & faire avec de justes proportions. Voyez *PROJECTION*.

Pour faire une *anamorphose*, ou une projection monstrueuse sur un plan, tracez le carré *ABCD*, (pl. de *perspective*, fig. 19, n.° 1.) d'une grandeur à volonté, & subdivisez-le en arêtes ou en petits carrés. Dans ce carré on cette espèce de réseau que l'on appelle *prototype craticulaire*, tracez au naturel l'image dont l'apparence doit être monstrueuse: tirez ensuite la ligne *ab*, (fig. 19, n.° 2.) égale à *AB*, & divisez-la dans le même nombre de parties égales que le côté du prototype *AD*: au point du milieu *E*, elevez la perpendiculaire *EV*, & menez *VS* perpendiculaire à *EV*, en faisant la ligne *EV* d'autant plus longue, & la ligne *VS* d'autant plus courte, que vous avez dessein d'avoir une image plus difforme. De chaque point de division, tirez au point *V* des lignes droites, & joignez les points *b*, *S*, par la ligne droite *b*, *S*. Par les points *c*, *e*, *f*, *g*, &c., tirez des lignes droites parallèles à *ab*: alors *a b c d* sera l'espace où l'on doit tracer la projection monstrueuse; & c'est ce que l'on appelle l'*édype craticulaire*.

Enfin dans chaque arête ou petit trapèze de l'espace *a b c d*, décrivez ce que vous voyez tracé dans l'arête correspondante du carré *ABCD*;

Mathématiques, Tome I, 1.^{re} Partie.

par ce moyen vous aurez une image difforme, qui paroîtra néanmoins dans les justes proportions, si l'œil est placé de manière qu'il en soit éloigné de la longueur *EV*, & élevé au dessus, à la hauteur de *VS*.

Le spectacle sera beaucoup plus agréable, si l'image défigurée ne représente pas un pur chaos, mais quelque autre apparence: ainsi, l'on a vu une rivière avec des soldats, des chariots, &c., marchant sur l'une de ses rives, représentée avec un tel artifice, que quand elle étoit regardée au point *S*, il sembloit que ce fût le visage d'un saïze; mais on ne peut donner facilement des règles pour cette partie, qui dépend principalement de l'industrie & de l'adresse de l'artiste.

On peut aussi faire mécaniquement une *anamorphose* de la manière suivante: on percera de part en part le prototype à coups d'aiguille, dans son contour & dans plusieurs autres points; ensuite on l'exposera à la lumière d'une bougie ou d'une lampe, & on marquera bien exactement les endroits où tombent sur un plan, ou sur une surface courbe, les rayons qui passent à travers ces petits trous; car ils donneront les points correspondans de l'image difforme, par le moyen desquels on peut achever la déformation.

Faire une *anamorphose* sur la surface convexe d'un cône. Il paroît assez par le problème précédent, qu'il ne s'agit que de faire un *édype craticulaire* sur la surface d'un cône qui paroisse égal au prototype craticulaire, l'œil étant placé à une distance convenable, au dessus du sommet du cône.

C'est pourquoi, soit la base *ABCD* du cône, (fig. 20.) divisée par des diamètres en un nombre quelconque de parties égales; ou, ce qui revient au même, soit divisée la circonférence de cette base, en tel nombre qu'on voudra de parties égales, & soient tirées par les points de division des lignes droites au centre. Soit aussi divisé un rayon en quelques parties égales; par chaque point de division, décrivez des cercles concentriques; par ce moyen vous aurez tracé le prototype craticulaire *A*. Avec le double du diamètre *AB*, comme rayon, décrivez le quart de cercle *EG* (fig. 21.), afin que l'arc *EG* soit égal à la circonférence entière, & pliez ce quart de cercle, de manière qu'il forme la surface d'un cône, dont la base soit le cercle *ABCD*; divisez l'arc *EG* dans le même nombre de parties égales que le prototype craticulaire est divisé, & tirez des rayons de chacun des points de division; prolongez *GF* en *I*, jusqu'à ce que *FI = FG*: du centre *I*, & du rayon *IF*, décrivez le quart de cercle *FKH*, & du point *I* au point *D*, tirez la droite *IE*; divisez l'arc *KF* dans le même nombre de parties égales que le rayon du prototype craticulaire & du centre *I* par chaque point de division, tirez des rayons qui rencontrent *EF* aux points 1, 2, 3, &c.; enfin du centre *F*, & des rayons *F1*, *F2*, *F3*; décrivez des arcs concentriques: de cette manière

G.

vous aurez l'elype craticulaire, dont les aréoles paroltront égales entr'elles.

Ainsi, en transportant dans les aréoles de l'elype craticulaire, ce qui est décliné dans chaque aréole du prototype craticulaire, vous aurez une image monstrueuse, qui paroîtra néanmoins dans les justes proportions, si l'œil est élevé au dessus du sommet du cône, d'une quantité égale à la distance de ce sommet à la base.

Si l'on tire dans le prototype craticulaire, les cordes des quarts de cercle, & dans l'elype craticulaire, les cordes de chacun de ses quarts, toutes choses d'ailleurs restant les mêmes, on aura l'elype craticulaire dans une pyramide quadrangulaire.

Il sera donc aisé de dessiner une image monstrueuse sur toute pyramide, dont la base est un polygone régulier quelconque.

Comme l'illusion est plus parfaite, quand on ne peut pas juger, par les objets contigus, de la distance des parties de l'image monstrueuse, il est mieux de ne regarder ces sortes d'images, que par un petit trou.

On voit à Paris, dans le cloître des Minimes de la Place Royale, deux *anamorphoses* tracées sur deux des côtes du cloître; l'une représente la Magdelène, l'autre, S. Jean écrivant son évangile. Elles sont telles, que quand on les regarde directement, on ne voit qu'une espèce de paysage, & quand on les regarde d'un certain point de vue, elles représentent des figures humaines très-distinctes. Ces deux figures font l'ouvrage du P. Nicéron, Minime, qui a fait sur ce même sujet un traité latin, intitulé: *Thaumaturgus opticus*, Optique miraculeuse, dans lequel il traite de plusieurs phénomènes curieux d'optique, & donne fort au long les méthodes de tracer ces sortes d'*anamorphoses* sur des surfaces quelconques. Le P. Emmanuel Maignan, Minime, a aussi traité cette même matière, dans un ouvrage latin, intitulé: *Perspectiva horaria*, imprimé à Rome en 1648. Voyez la proposition 77 de la *catoptrique horaire* de ce dernier ouvrage, page 438.

Comme les miroirs cylindriques, coniques & pyramidaux, ont la propriété de rendre difformes les objets qu'on leur expose, & que par conséquent ils peuvent faire paroître naturels des objets difformes; on donne aussi dans l'optique, des moyens de tracer sur le papier des objets difformes, qui étant vus par ces sortes de miroirs, paroissent de leur figure naturelle.

Par exemple, si on veut tracer une image difforme, qui paroisse de la figure naturelle, étant vue dans un miroir cylindrique; on commencera, (fig. 14, *persp.*) par décrire un cercle HBC , égal à la base du cylindre; ensuite supposant que O soit le point où tombe la perpendiculaire menée de l'œil; on tirera les tangentes OC & OB , on joindra les points d'atouchement C & B par la droite CB ; on divisera cette ligne CB en tant de parties égales qu'on voudra, & par les points de division, on tirera des lignes au point O ; on

supposera que les rayons OH , OI se réfléchissent en F & en G , crûite (fig. 15, *persp.*) sur une droite indéfinie MQ , on élèvera la perpendiculaire MP égale à la hauteur de l'œil; on fera MQ égale à OH de la fig. 14, & au point Q , on élèvera la perpendiculaire QR égale à CB , & divisée en autant de parties que CB ; par les points de division, on tirera des lignes au point P , qui étant prolongées jusqu'à la ligne MN , donneront les points I , III , &c. & les distances QI , $QIII$, QI , &c. qu'il faudra transporter dans la fig. 14 de I en I , de III en III , de II en II , &c. de cette manière, les points F , G de la fig. 14, répondront au point N ou IV de la fig. 15. Par ces points FG , & par le point K , tel que $KH = IG$, on tracera un arc de cercle jusqu'en S & en T , c'est-à-dire, jusqu'à la rencontre des tangentes, OS , OT , & on fera de même pour les points III , II , &c. ensuite on dessinera une figure quelconque dans un quarté dont les côtes soient égaux à CB ou QR , & soient divisées en autant de parties qu'on a divisé ces lignes, en sorte que le quarté dont il s'agit, soit partagé lui-même en autant de petits quartés. On dessinera après cela dans la figure $SFGT$, une image difforme, dont les parties soient situées dans les parties de cette figure correspondante aux parties du quarté. Cette image étant approchée d'un miroir cylindrique, dont HBC soit la base, & l'œil étant élevé au dessus du point O , à une hauteur égale à MP , on verra dans le miroir cylindrique, la figure naturelle qui avoit été tracée dans le petit quarté.

On a aussi des méthodes assez semblables à la précédente, pour tracer des images difformes, qui soient rétablies dans leur figure naturelle, par des miroirs coniques ou pyramidaux. On peut voir une idée de ces méthodes dans la *Catoptrique* de M. Wolf. Nous nous bornerons ici à ce qui regarde nos miroirs cylindriques, comme étant les plus communs. On trouve dans les actes de Lépisc de 1712, la description d'une machine *anamorphique* de M. Jacques Léopold, par le moyen de laquelle on peut décrire mécaniquement & assez exactement des images difformes qui soient rétablies dans leur état naturel par des miroirs cylindriques ou coniques.

On fait aussi dans la dioptrique des *anamorphoses*. Elles consistent en des figures difformes, qui sont tracées sur un papier, & qui paroissent dans leur état naturel, lorsqu'on les regarde à travers un verre polyèdre, c'est-à-dire, à plusieurs faces. Et voici de quelle manière elles se font.

Sur une table horizontale $ABCD$, on élève à angles droits (fig. 11, *Persp.*) une planche $AFFE$ droite; on pratique dans chacune de ces deux planches ou tables, deux couillies, telles que l'appui BHC puisse se mouvoir entre les couillies de la table horizontale, & qu'on puisse faire couler un papier entre les couillies de la planche verticale; on adapte à l'appui BHC un tuyau IK , qui

en I d'un verre polyèdre, plan convexe, composé de 24 plans triangulaires, disposés à-peu-près suivant la courbure d'une parabole. Le tuyau est percé en K d'un petit trou, qui doit être un peu au-delà du foyer du verre; on éloigne l'appui BHC de la planche verticale, & on l'en éloigne d'autant plus que l'image déformée doit être plus grande.

On met au-devant du trou K une lampe; on marque avec du crayon les aréoles ou points lumineux que la lumière forme sur la planche ADEF; & pour ne point se tromper en les marquant, il faut avoir soin de regarder par le trou si en effet ces aréoles ne forment qu'une seule image.

On tracera ensuite dans chacune de ces aréoles des parties d'un objet, qui, étant vue par le trou K, ne paraîtront former qu'un seul tout; & on aura soin de regarder par le trou K, en faisant cette opération, pour voir si toutes ces parties forment en effet une seule image. A l'égard des espaces intermédiaires, on les remplira de tout ce qu'on voudra; & pour rendre le phénomène plus curieux, on aura soin même d'y tracer des choses toutes différentes de celles qu'on doit voir par le trou; alors regardant par le trou K, on ne verra qu'une image distincte, fort différente de celle qui paroîtroit sur le papier à la vue simple.

On voit à Paris, dans la bibliothèque des Minimes de la place Royale, deux *anamorphoses* de cette espèce, elles sont l'ouvrage du P. Nicéron, dont nous avons déjà parlé; & on trouve aussi, dans le tome IV des *Mémoires de l'Académie Impériale de Pétersbourg*, la description d'une *anamorphose* semblable, faite par M. Lutmán, membre de cette Académie, en l'honneur de Pierre II, empereur de Russie: cet auteur expose la méthode qu'il a suivie pour cela, & fait des remarques utiles sur cette matière. Voyez, sur cet article, la CATOPTRIQUE & la DIOPTRIQUE de M. Wolff, déjà citées (O).

ANCIENNE GÉOMÉTRIE peut s'entendre de deux manières; ou de la Géométrie des anciens, jusqu'à Descartes, dans laquelle on ne faisoit aucun usage du calcul analytique; ou de la Géométrie depuis Descartes jusqu'à l'invention des calculs différentiel & intégral. Voyez ALGÈBRE DIFFÉRENTIEL, INTÉGRAL, &c. Voyez aussi GÉOMÉTRIE (O).

ANDROÏDE, f. m. (*Méchan.*), automate ayant figure humaine, & qui, par le moyen de certains ressorts, &c. bien disposés, agit & fait d'autres fonctions extérieurement semblables à celles de l'homme. Voyez AUTOMATE. Ce mot est composé du grec *άνδρ*, génitif *άνδρ*, homme, & de *ειδής*, forme.

Albert le Grand avoit, dit-on, fait un *androïde*. Nous en avons vu un à Paris en 1738, dans le *Fêteur automate* de M. Vaucanson, de l'Académie Royale des Sciences.

L'auteur publia cette année 1738, un Mémoire

approuvé avec éloge par la même Académie: il y fait la description de son *Fêteur*; que tout Paris a été voir en foule. Nous insérerons ici la plus grande partie de ce Mémoire, qui nous a paru digne d'être conservé.

La figure est de cinq pieds & demi de hauteur environ, assise sur un bout de rocher, placée sur un piédestal carré, de quatre pieds & demi de haut sur trois pieds & demi de large.

A la face antérieure du piédestal (le panneau étant ouvert), on voit à la droite un mouvement, qui, à la faveur de plusieurs roues, fait tourner en-dessous un axe d'acier de deux pieds six pouces de long, condé en six endroits d'une longueur par égale distance, mais en sens différens. A chaque coudé sont attachés des cordons qui aboutissent à l'extrémité des panneaux supérieurs de six soufflets de deux pieds & demi de long sur six pouces de large, rangés dans le fond du piédestal, où leur panneau inférieur est attaché à demeure; de sorte que, l'axe tournant, les six soufflets se haussent & s'abaissent successivement les uns après les autres.

A la face postérieure, au-dessus de chaque soufflet, est une double poulie, dont les diamètres sont inégaux; savoir, l'un de trois pouces, & l'autre d'un pouce & demi; & cela pour donner plus de levée aux soufflets, parce que les cordons, qui y sont attachés, vont se rouler sur le plus grand diamètre de la poulie, & ceux qui sont attachés à l'axe qui les tire, se roulent sur le petit.

Sur le grand diamètre de trois de ces poulies du côté droit, se roulent aussi trois cordons, qui, par le moyen de plusieurs petites poulies, aboutissent aux panneaux supérieurs de trois soufflets placés sur le haut du bâti, à la face antérieure & supérieure.

La tension qui se fait à chaque cordon, lorsqu'il commence à tirer le panneau du soufflet où il est attaché, fait mouvoir un levier placé au-dessus, entre l'axe & les doubles poulies, dans la région moyenne & inférieure du bâti. Ce levier, par différens renvois, aboutit à la soupape, qui se trouve au-dessous du panneau inférieur de chaque soufflet, & la soutient levée, afin que l'air y entre sans aucune résistance, tandis que le panneau supérieur, en s'élevant, en augmente la capacité. Par ce moyen, outre la force que l'on gagne, on évite le bruit que fait ordinairement cette soupape, causé par le tremblement que l'air occasionne en entrant dans le soufflet; ainsi, les neuf soufflets sont mus sans secousse, sans bruit, & avec peu de force.

Ces neuf soufflets communiquent leur vent dans trois tuyaux différens & séparés. Chaque t. y reçoit celui de trois soufflets; les trois q. i. sont dans le bas du bâti à droite par la face antérieure, communiquent leur vent à un tuyau qui régné en devant sur le montant du bâti du même côté, & ces trois-là sont chargés d'un poids de quatre livres,

les trois qui sont à gauche dans le même rang, donnent leur vent dans un semblable tuyau, qui règne pareillement sur le montant du bâti du même côté, & ne sont chargés chacun que d'un poids de deux livres: les trois qui sont sur la partie supérieure du bâti, donnent aussi leur vent à un tuyau qui règne horizontalement sous eux & en devant; ceux-ci ne sont chargés que du poids de leur simple panneau.

Ces tuyaux, par différens coudes, aboutissent à trois petits réservoirs placés dans la poitrine de la figure. Là, par leur réunion, ils en forment un seul, qui, montant par le gosier, vient par son élargissement former dans la bouche une cavité, terminée par deux espèces de petites lèvres qui posent sur le trou de la flûte; ces lèvres donnent plus ou moins d'ouverture, & ont un mouvement particulier pour s'avancer & se reculer. En dedans de cette cavité, est une petite languette mobile, qui, par son jeu, peut ouvrir & fermer au vent le passage que lui laissent les lèvres de la figure.

Voilà par quel moyen le vent a été conduit jusqu'à la flûte. Voici ceux qui ont servi à le modifier.

A la face antérieure du bâti à gauche, est un autre mouvement qui, à la faveur de son rouage, fait tourner un cylindre de deux pieds & demi de long sur soixante-quatre pouces de circonférence. Ce cylindre est divisé en quinze parties égales d'un pouce & demi de distance. A la face postérieure & supérieure du bâti, est un clavier traînant sur ce cylindre, composé de quinze leviers très-mobles, dont les extrémités du côté du dedans sont armées d'un petit bec d'acier, qui répond à chaque division du cylindre. A l'autre extrémité de ces leviers, sont attachés des fils & chaînes d'acier, qui répondent aux différens réservoirs de vent, aux doigts, aux lèvres & à la langue de la figure. Ceux qui répondent aux différens réservoirs de vent, sont au nombre de trois, & leurs chaînes montent perpendiculairement derrière le dos de la figure jusque dans la poitrine, où ils sont placés, & aboutissent à une soupape particulière à chaque réservoir: cette soupape étant ouverte, laisse passer le vent dans le tuyau de communication qui monte, comme on l'a déjà dit, par le gosier dans la bouche. Les leviers qui répondent aux doigts sont au nombre de sept, & leurs chaînes montent aussi perpendiculairement jusqu'aux épaules, & là se couident pour s'insérer dans l'avant-bras jusqu'au coude, où elles se plient encore pour aller le long du bras jusqu'au poignet; elles y sont terminées chacune par une charnière qui se joint à un tenon que forme le bout du levier contenu dans la main, imitant l'os que les anatomistes appellent l'os du métacarpe, & qui, comme lui, forme une charnière avec l'os de la première phalange, de façon que, la chaîne étant tirée, le doigt puisse se lever. Quatre de ces chaînes s'insèrent dans le bras droit, pour faire mouvoir les quatre doigts de cette main,

& trois dans le bras gauche: pour trois doigts, n'y ayant que trois trous qui répondent à cette main. Chaque bout de doigt est garni de peau, pour imiter la mollesse du doigt naturel, afin de pouvoir boucher le trou exactement. Les leviers du clavier qui répondent au mouvement de la bouche, sont au nombre de quatre: les fils d'acier qui y sont attachés forment des renvois, pour passer dans le milieu du rocher en dedans; & là ils tiennent à des chaînes qui montent perpendiculairement & parallèlement à l'épine du dos dans le corps de la figure; & qui, passant par le cou, viennent dans la bouche s'attacher aux parties, qui sont faire quatre différens mouvemens aux lèvres intérieures: l'un fait ouvrir ces lèvres pour donner une plus grande issue au vent; l'autre la diminue en les rapprochant; le troisième les fait retirer en arrière, & le quatrième les fait avancer sur le bord du trou.

Il ne reste plus sur le clavier qu'un levier, où est pareillement attachée une chaîne qui monte ainsi que les autres, & vient aboutir à la languette qui se trouve dans la cavité de la bouche derrière les lèvres, pour en boucher le trou, comme on l'a dit ci-dessus.

Ces quinze leviers répondent aux quinze divisions du cylindre par les bouts où ils sont attachés les becs d'acier, & à un pouce & demi de distance les uns des autres. Le cylindre venant à tourner, les lames de cuivre placées sur les lignes divisées, rencontrent les becs d'acier, & les font monter les plus ou moins longs-tems, suivant que les lames sont plus ou moins longues; & comme l'extrémité de tous ces becs forme entr'eux une ligne droite, parallèle à l'axe du cylindre, coupant à angle droit toutes les lignes de division, toutes les fois qu'on placera à chaque ligne une lame, & que toutes leurs extrémités formeront entr'elles une ligne également droite, & parallèle à celle que forment les becs des leviers, chaque extrémité de lame (le cylindre retournant) touchera & soulèvera dans le même instant chaque bout de levier; & l'autre extrémité des lames formant également une ligne droite, chacune laissera échapper son levier dans le même tems. On conçoit aisément par-là comment tous les leviers peuvent agir & concourir tous à-la-fois, à une même opération, s'il est nécessaire. Quand il n'est besoin de faire agir que quelques leviers, on ne place des lames qu'aux divisions où répondent ceux qu'on veut faire mouvoir; on en détermine même le tems, en les plaçant plus ou moins éloignées de la ligne que forment les becs: on fait cesser aussi leur action plutôt ou plus tard, en les retirant plus ou moins longues.

L'extrémité de l'axe du cylindre du côté droit, est terminée par une vis sans fin à simples filets, distans entr'eux d'une ligne & demie, & au nombre de douze, ce qui comprend en tout l'espace d'un

poince & demi de longueur, égal à celui des divisions du cylindre.

Au-dessus de cette vis, est une pièce de cuivre immobile, solidement attachée au bâti, à laquelle tient un pivot d'acier d'une ligne environ de diamètre, qui tombe dans une canelure de la vis, & lui sert d'écrin, de façon que le cylindre est obligé, en tournant, de suivre la même direction que les filets de la vis, contenus par le pivot d'acier, qui est fixe. Ainsi, chaque point du cylindre décrira continuellement en tournant une ligne spirale, & sera par conséquent un mouvement progressif du droit à gauche.

C'est par ce moyen que chaque division du cylindre, déterminée d'abord sous chaque bout de levier, changera de point à chaque tour qu'il fera, puisqu'il s'en éloignera d'une ligne & demi, qui est la distance qu'ont les filets de la vis entre eux.

Les bouts des leviers attachés au clavier restent donc immobiles, & les points du cylindre auxquels ils répondent d'abord, s'éloignant à chaque instant de la perpendiculaire, en formant une ligne spirale, qui, par le mouvement progressif du cylindre, est toujours dirigée au même point, c'est-à-dire, à chaque bout de levier, il s'ensuit que chaque bout de levier trouve à chaque instant des points nouveaux sur les lames du cylindre, qui ne se répètent jamais, puisqu'elles forment entre elles des lignes spirales qui forment double tour sur le cylindre, avant que le premier point de division vienne sous un autre levier, que celui sous lequel il a été déterminé en premier lieu.

C'est dans cet espace d'un ponce & demi qu'on place toutes les lames, qui forment elles-mêmes les lignes spirales, pour faire agir le levier sous qui elles doivent toujours passer pendant les douze tours que fait le cylindre. A mesure qu'une ligne change pour son levier, toutes les autres changent pour le leur; ainsi, chaque levier a douze lignes de lames, de 64 ponce de diamètre, qui passent sous lui, & qui sont entre elles une ligne de 768 ponce de long. C'est sur cette ligne que sont placées toutes les lames suffisantes pour l'action du levier durant tout le jeu.

Il ne reste plus qu'à faire voir comment tous ces différents mouvements ont servi à produire l'effet qu'on s'est proposé dans cet automate, en les comparant avec ceux d'une personne vivante.

Est-il question de lui faire tirer du son de sa flûte, & de former le premier ton, qui est le *ré* d'en bas? On commence d'abord à disposer l'embouchure; pour cet effet, on place sur le cylindre une lame dessous le levier qui répond aux parties de la bouche, servant à augmenter l'ouverture que font les lèvres. Secondement, on place une lame sous le levier, qui sert à faire reculer ces mêmes lèvres. Troisièmement, on place une lame sous le levier, qui ouvre la soupape du réservoir du vent qui vient des petits soufflets qui ne sont point

chargés. On place, en dernier lieu, une lame sous le levier, qui fait mouvoir la languette pour donner le coup de langue, de façon que, ces lames venant à toucher dans le même temps les quatre leviers qui servent à produire les suddites opérations, la flûte sonnera le *ré* d'en bas.

Par l'action du levier qui sert à augmenter l'ouverture des lèvres, on imite l'action de l'homme vivant, qui est obligé de l'augmenter dans les tons bas. Par le levier, qui sert à faire reculer les lèvres, on imite l'action de l'homme, qui les éloigne du trou de la flûte, en la tournant en dehors. Par le levier qui donne le vent provenant des soufflets qui ne sont chargés que de leur simple panneau, on imite le vent foible que l'homme donne alors, vent qui n'est pareillement poussé hors de son réservoir, que par une légère compression des muscles de la poitrine. Par le levier qui sert à faire mouvoir la languette, en débouchant le trou que forment les lèvres pour laisser passer le vent, on imite le mouvement que fait aussi la langue de l'homme, en se retirant du trou pour donner passage au vent, & par ce moyen lui faire articuler une telle note. Il résultera donc de ces quatre opérations différentes, qu'en donnant un vent foible, & le faisant passer par une issue large dans toute la grandeur du trou de la flûte, son retour produira des vibrations lentes, qui seront obligées de se continuer dans toutes les particules du corps de la flûte, puisque tous les trous se trouveront bouchés, & par conséquent la flûte donnera un ton bas; c'est ce qui se trouve confirmé par l'expérience.

Vcut-on lui faire donner le ton au-dessus, savoir, le *mi*? aux quatre premières opérations pour le *ré*, on en ajoute une cinquième; on place la lame sous le levier, qui fait lever le troisième doigt de la main droite, pour déboucher le troisième trou de flûte, & on fait approcher tant-soit-peu les lèvres du trou de la flûte, en baissant un peu la lame du cylindre qui envoie le levier élevé pour la première note, savoir, le *ré*; ainsi, donnant plutôt aux vibrations une issue en débouchant le premier trou du bout, la flûte doit sonner un ton au-dessus; ce qui est aussi confirmé par l'expérience.

Toutes ces opérations se continuent à-peu-près les mêmes dans les tons de la première octave, où le même vent suffit pour les former tous; c'est la différence ouverture des trous, par la levée des doigts, qui les caractérise: on est seulement obligé de placer sur le cylindre des lames sous les leviers, qui doivent lever les doigts pour former tel ou tel ton.

Pour avoir les tons de la seconde octave, il faut changer l'embouchure de situation, c'est-à-dire, placer une lame dessous le levier, qui contribue à faire avancer les lèvres au-delà du diamètre du trou de la flûte, & imiter par-là l'action de l'homme vivant, qui, en pareil cas, tourne la flûte un peu

en-dedans. Secondement, il faut placer une lame sous le levier, qui, en faisant rapprocher les deux lèvres, diminue leur ouverture : opération que fait pareillement l'homme quand il serre les lèvres pour donner une moindre issue au vent. Troisièmement, il faut placer une lame sous le levier qui fait ouvrir la soupape du réservoir, qui contient le vent provenant des soufflets chargés du poids de deux livres : vent qui se trouve poussé avec plus de force, & semblable à celui que l'homme vivant pousse par une plus forte compression des muscles pectoraux. De plus, on place des lames sous les lèvres nécessaires, pour faire lever les doigts qu'il faut. Il s'ensuivra de toutes ces différentes opérations, qu'un vent envoyé avec plus de force, & passant par une issue plus petite, redoublera de vitesse & produira par conséquent les vibrations doubles ; & ce sera l'odeur.

A mesure qu'on monte dans les tons supérieurs de cette seconde octave, il faut de plus en plus serrer les lèvres, pour que le vent, dans un même tems, augmente de vitesse.

Dans les tons de la troisième octave, les mêmes leviers, qui vont à la bouche, agissent comme dans ceux de la seconde, avec cette différence que les lames sont un peu plus élevées, ce qui fait que les lèvres vont tout-à-fait sur le bord du trou de la flûte, & que le trou qu'elles ferment devient extrêmement petit. On ajoute seulement une lame sous le levier qui fait ouvrir la soupape, pour donner le vent qui vient des soufflets les plus chargés, savoir, du poids de quatre livres ; par conséquent le vent poussé avec une plus forte compression, & trouvant une issue encore plus petite, augmentera de vitesse en raison triple : on aura donc la triple odeur.

Il se trouve des tons dans toutes ces différentes octaves plus difficiles à rendre les uns que les autres ; on est pour lors obligé de les ajuster, en plaçant les lèvres sur une plus grande ou plus petite corde du trou de la flûte, en donnant un vent plus ou moins fort, ce que fait l'homme dans les mêmes tons où il est obligé de ménager son vent, & de tourner la flûte plus ou moins en-dedans ou en-dehors.

On conçoit facilement que toutes les lames placées sur le cylindre, sont plus ou moins longues, suivant le tems que doit avoir chaque note, & suivant la différente situation où doivent se trouver les doigts pour les former ; ce qu'on ne détaillera point ici, pour ne point donner à cet article trop d'étendue. On fera remarquer seulement, dans les enlacements de son, il a fallu, pendant le tems de la même note, substituer imperceptiblement un vent foible à un vent fort, & à un plus fort un plus foible, & varier conjointement les mouvements des lèvres, c'est-à-dire, les mettre dans leur situation propre pour chaque vent.

Lorsqu'il a fallu faire le doux, c'est-à-dire, à dire, jeter un écho, on a été obligé de faire avancer

les lèvres sur le bord du trou de la flûte ; & envoyer un vent suffisant pour former un tel son, mais dont le retour, par une issue aussi petite qu'est celle de son entrée dans la flûte, ne peut frapper qu'une petite quantité d'air extérieur ; ce qui produit, comme on l'a dit ci-dessus, ce qu'on appelle *écho*.

Les différents airs de lenteur & de mouvement ont été mesurés sur le cylindre, par le moyen d'un levier, dont une extrémité, armée d'une pointe, pouvoit, lorsqu'on frappoit dessus, marquer ce même cylindre. A l'autre bras du levier, étoit un ressort qui faisoit promptement relever la poignée. On laissoit le mouvement qui faisoit tourner le cylindre avec une vitesse déterminée pour tous les airs ; dans le même tems, une personne jouoit sur la flûte l'air qu'on vouloit mesurer ; un autre battoit la mesure sur le bord du levier, qui pointoit le cylindre, & la distance qui se trouvoit entre les points étoit la vraie mesure des airs qu'on vouloit noter ; on subdivisoit ensuite les intervalles en autant de parties que la mesure avoit de tems, (*O*).

* Combien de finesse dans tout ce détail ! Que de délicatesse dans toutes les parties de ce mécanisme ! Si cet article, au lieu d'être l'exposition d'une machine exécutée, étoit le projet d'une machine à faire, combien de gens ne le traiteroient-ils pas de chimère ? Quant à moi, il me semble qu'il faut avoir bien de la pénétration & un grand fonds de mécanique, pour concevoir la possibilité du mouvement des lèvres de l'automate, de la ponction du cylindre, & d'une infinité d'autres particularités de cette description. Si quelqu'un nous propose donc jamais une machine moins compliquée, telle que seroit celle d'un larmomètre, ou d'un cylindre divisé par des lignes droites & des cercles dont les intervalles marqueraient les mesures, & percé sur ces intervalles de petits trous, dans lesquels on pourroit insérer des poignes mobiles, qui, s'appliquant à discrétion sur telles touches d'un clavier que l'on voudroit, exécuteroit telle pièce de Musique qu'on désireroit à une ou plusieurs parties ; alors gardons-nous bien d'accuser cette machine d'être impossible, & celui qui la propose d'ignorer la Musique ; nous risquerions de nous tromper lourdement sur l'un & sur l'autre cas. (*M. DIDROT*).

ANDROMEDE, (*Astr.*) constellation boréale, située au nord des poissons, du belier, on l'appelle quelquefois en latin, *Persea*, *mulier catenata*, *virgo devota* : les Arabes peignent à sa place un phoca, ou veau marin, enchaîné avec l'un des poissons. On rapporte cette constellation à l'histoire d'Andromède, que son père Céphée fut obligé de sacrifier à un monstre marin, pour garantir son royaume de la peste, & qui fut délivrée par Persée. Cette constellation contient 63 étoiles dans le grand catalogue Britannique ; voici les plus remarquables : à la tête d'Andromède ; cette étoile est commune

unifi à la constellation de Pegase, elle est appelée *umbilicus Pegasi*. La seconde est l'étoile β à la ceinture d'*Andromède*, appelée *mirach* ou *mirax*; la troisième γ est sur le pied austral d'*Andromède*; elle s'appelle *alamack*, quelquefois *alkamet*. Le coucher d'*Andromède*, lorsque le soleil est dans le signe du Belier, a donné lieu au 9^e travail d'Hercule, contre les Amazones (*Astr.* IV, 490).

ANELAR ou ANHELAR, nom de l'étoile α des Gémeaux, tête de Castor. (*M. de LA LANDE*).

ANÉMOMÈTRE, f. m. (*Hyd.*) : machine qui sert à estimer la force du vent. Voyez VENT. Il y a des anémomètres de différentes façons.

On trouve dans les *Transactions philosophiques* la description d'un anémomètre, qui consiste en une plaque mobile sur le limbe gradué d'un quart de cercle. Le vent est supposé souffler perpendiculairement contre cette plaque mobile, & la force est indiquée par le nombre de degrés qu'il lui fait parcourir.

M. Wolf donne dans son *cours de Mathématiques* la construction d'un autre anémomètre, qui se meut par le moyen des ailes *A, B, C, D*, (*Pneumat.* fig. 17). Ces ailes sont assez ressemblantes à celles d'un moulin à vent. En tournant, elles font mouvoir le rayon *KM*, de sorte que le corps *L*, placé dans une rainure qu'on a pratiquée dans ce rayon, s'éloigne de plus en plus du centre du mouvement, & conséquemment agit à chaque instant sur ce rayon, & par son moyen sur l'axe auquel il est attaché, avec une force qui va toujours en croissant; car le bas du levier, auquel ce corps est appliqué, s'allonge jusqu'à ce que le mouvement des ailes soit arrêté; alors le poids fait équilibre avec la force du vent; & cette force est marquée par une aiguille *MN*, fixée sur l'axe, & faisant un angle droit avec le rayon *KM*, laquelle tourne, par son extrémité *N*, sur un quart de cercle divisé en parties égales. La force est d'autant plus grande ou plus petite, que l'aiguille marque un plus grand ou un plus petit nombre de ces parties égales, soit en descendant, soit en montant. Cette machine ne parait pas fort exacte.

M. d'Onsenbray a donné la description d'un anémomètre de son invention, qu'il prétend marquer de lui-même sur un papier, non-seulement les vents différents qui ont soufflé vingt-quatre heures, avec les heures auxquelles ils ont commencé & cessé de régner, mais encore les forces ou vitesses de ces vents. Voyez *Mémoires de l'Académie des Sciences*, ann. 1734, p. 169. Voyez un plan long détail à l'article VENT (*O*).

ANÉMOSCOPE, f. m. (*Hyd.*) : machine qui sert à prédire les changements du vent.

On a prétendu que des hygroscopes faits des boyaux d'un chat, &c. se trouvoient en effet très-bons anémoscopes pour annoncer d'avance les variations du vent; mais ce fait mériterait d'être vérifié. Voyez HYGROSCOPE.

L'anémoscope en usage parmi les anciens, parait, suivant la description qu'en donne *Vitrue*, avoir plus servi à montrer de quel côté venoit le vent, qu'à faire prévoir d'où il viendrait.

Otto de Guericke donne le nom d'anémoscope à une machine de son invention, pour indiquer d'avance les changements de tems. Voyez TEMS.

C'étoit un petit homme de bois, qui s'élevait & retomboit dans un tube de verre, selon que l'atmosphère étoit plus ou moins pesante.

M. Lonsiers a montré que cet anémoscope n'étoit qu'une application du Baromètre ordinaire. Voyez BAROMÈTRE. Voyez aussi *Merc. Gal.* 1693. *Ad. Erud.* 1684, page 26. (*O*).

ANES, f. m. pl. (*Astr.*) sont deux étoiles de la constellation du cancer ou de l'écrevisse, marquées par les lettres γ & δ dans les catalogues, & qui sont de quatrième & cinquième grandeur; on voit entre ces deux étoiles un amas appelé l'étable (*praesepe*), & que l'on nomme plus communément la nébuleuse du cancer. Ces deux anes représentent, suivant les poètes, ceux qui, dans la guerre de Jupiter contre les géans, contribuèrent à sa victoire, ou par leurs cris, ou parce qu'ils servirent à Vulcain & aux autres qui venoient au secours de Jupiter. Quoi qu'il en soit, ce nom est ancien, car il se trouve dans l'*Almageste* de Ptolémée. (*M. de LA LANDE*).

ANGLE, f. m. (*Géom.*) : On appelle angle l'ouverture formée par deux lignes qui se rencontrent; tel est (*Géom.* fig. 2, 3, 4) l'angle *BAC*, formé par les deux lignes *BA, CA*, qui se rencontrent au point *A*.

On désigne ordinairement un angle par la simple lettre placée à sa pointe ou sommet *A*, ou par trois lettres, & alors celle du milieu répond au sommet.

Un angle est appelé rectiligne, lorsque ses côtés ou jambes *BA, CA* sont des lignes droites (*fig. 2*); curviligne, lorsque ses jambes sont des lignes courbes (*fig. 3*); mixtiligne, lorsqu'une jambe est droite, & l'autre courbe (*fig. 4*).

On doit bien prendre garde qu'un angle n'est pas l'espace compris entre les côtés, mais uniquement l'inclinaison que ces côtés ont, l'un par rapport à l'autre, à leur intersection *A*. Ainsi, la grandeur d'un angle ne dépend point de la longueur de ses côtés; en sorte que, si, par exemple, on prolonge les côtés *AB, AC* de l'angle rectiligne *BAC* (*fig. 2*), vers *D* & *E*, ces côtés, quoique devenus plus longs, conserveront toujours, l'un à l'égard de l'autre, la même situation ou inclinaison, ou formeront toujours le même angle. Il en est de même pour les angles curvilignes ou mixtilignes; car, par exemple, l'angle curviligne *BAC* (*fig. 3*), est la même chose que l'angle rectiligne *MAN*, formé par les deux droites *MA, NA*, qui touchent les courbes *BA, CA*, au sommet *A*, & qui ont par conséquent les mêmes directions que ces courbes à leur origine

A; il demeure donc toujours constant, quelles que soient les longueurs de ses côtés BA , CA . On voit en même temps par-là que la mesure des angles curvilignes ou mixtilignes se réduit à celle des angles rectilignes, puisque la question, dans tous les cas, est de mesurer l'angle que forment deux lignes droites, qui se rencontrent en un point A .

Deux plans, ou, en général, deux surfaces qui se rencontrent, forment un angle qui se réduit pareillement à un angle rectiligne. Voyez PLAN.

On appelle, dans un sens un peu impropre, angle solide l'espace formé autour d'un point par plusieurs plans qui passent tous par ce point.

Tout angle rectiligne MCN (fig. 5), peut être mesuré par l'arc de cercle MN , décrit du sommet C , pour centre, avec un rayon arbitraire, entre ses côtés CM , CN .

En effet, nous pouvons concevoir que l'angle MCN est produit par la rotation du côté CN , qui tourne autour du point C , tandis que le côté CM demeure immobile. Supposons donc qu'au premier instant le côté CN étoit couché sur le côté CM , & que le point N étoit confondu avec le point M : on voit qu'à mesure que le point N chemine, & décrit l'arc MN , il se forme successivement autant de petits angles MCm , mCn , &c. qu'il y a de parties élémentaires Mm , mn , &c. dans l'arc MN . Or la somme de tous ces petits angles, n'est autre chose que l'angle proposé MCN ; donc ce même angle est proportionnel au nombre de parties de l'arc MN , ou peut être mesuré par cet arc.

Nous avons pris à volonté le rayon CM , parce qu'il y a dans l'arc MN le même nombre de parties, relativement à la circonférence entière pour ce rayon, qu'il y en auroit dans l'arc $M'N'$, décrit avec le rayon CM' , relativement à la circonférence entière pour ce rayon. Ainsi, les angles égaux ont pour mesures des arcs égaux en nombre de parties des circonférences auxquelles ces arcs appartiennent. Si les rayons sont égaux, non-seulement les arcs seroient égaux en nombre de parties des circonférences, mais ces parties elles-mêmes seroient égales en longueur.

Il y a, en général trois sortes d'angles, l'angle droit, l'angle aigu & l'angle obtus.

L'angle droit est celui qui est formé par deux lignes perpendiculaires entr'elles (Voyez PERPENDICULAIRE). Ainsi, lorsqu'une droite DE (fig. 6) tombe sur une autre AB , sans pencher d'aucun côté, les angles ACD , BCD , ACE , BCE sont droits. Il est évident que tous les angles droits sont égaux entr'eux, & que tout angle droit a pour mesure un quart de circonférence.

L'angle aigu est moindre que l'angle droit, & au contraire l'angle obtus est plus grand que l'angle droit. Dans la figure 7, BCO est un angle aigu, & ACO est un angle obtus. L'arc qui mesure l'angle aigu est moindre qu'un quart de circonfé-

rence, & l'arc qui mesure l'angle obtus est plus grand qu'un quart de circonférence.

Les deux angles BCO , OCA , formés d'un même côté de la droite AB , s'appellent angles de suite. Ils valent ensemble deux angles droits, puisque leur somme est évidemment égale à celle des deux angles droits BCD , DCA . On les appelle suppléments l'un de l'autre.

On voit pareillement que la somme d'un nombre quelconques d'angles BCO , OCF , FCH , HCA , formés d'un même côté de la droite AB , (fig. 8), vaut deux angles droits; & que la somme d'un nombre quelconque d'angles BCO , OCF , FCH , HCA , ACR , RCK , KCB , formés autour du point C , vaut quatre angles droits.

Deux angles BCO , OCD (fig. 7), qui, pris ensemble, valent un angle droit, s'appellent compléments l'un de l'autre.

Deux angles BCD , ACQ (fig. 10), formés par deux droites BA , DQ , qui se rencontrent en C (& qu'on appelle angles opposés par le sommet), sont égaux entr'eux, puisque le premier joint à l'angle DCA , vaut deux angles droits, & que le second joint au même angle DCA , vaut aussi deux angles droits.

Le sommet d'un angle peut être placé ailleurs qu'au centre d'un cercle; & on a souvent besoin de mesurer l'angle par des arcs de la circonférence de ce cercle. C'est à quoi on parviendra par les moyens des propositions suivantes.

Un angle qui a son sommet à la circonférence d'un cercle, & qui est formé par deux cordes, a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés.

En effet, nous venons de voir qu'un angle, qui a son sommet au centre du cercle, a pour mesure l'arc compris entre ses côtés; il sera donc démontré qu'un angle, qui a son sommet à la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés, si l'on démontre que cet arc est la moitié de celui que comprendroient les côtés de l'angle, s'il avoit son sommet au centre. Or il peut arriver trois cas: ou l'un des côtés de l'angle, proposé BAD (fig. 11, 12, 13), passe par le centre C (fig. 11); ou le centre est placé au-dehors de l'angle (fig. 12); ou le centre est placé hors de l'angle (fig. 13).

1.^{er} CAS. (fig. 11). Menez le diamètre MN parallèle à la corde AB : les deux angles BAD , NCD sont égaux (Voyez PARALLÈLE); donc l'arc ND , qui est la mesure de l'angle NCD , dont le sommet est au centre C du cercle, est aussi la mesure de l'angle BAD . Or l'arc ND est la moitié de l'arc DB , ou, ce qui revient au même, l'arc $ND = \frac{1}{2} \text{arc } DB$; car les deux angles NCD , MCA , opposés par le sommet, étant égaux, les arcs ND , MA , qui en sont les mesures, sont égaux; mais l'arc $MA = \text{arc } NB$, puisque, si l'on mène le diamètre KH perpendiculaire aux deux parallèles AB , MN , & que l'on

On conçoit que le demi-cercle $KAMH$ tournant autour de KH , vienne s'appliquer sur le demi-cercle $KBNH$, le point A tombera sur le point B , le point M sur le point N , & l'arc AM sur l'arc BN ; donc l'arc $BN =$ l'arc ND .

11.^e & 111.^e Cas (fig. 12 & 13). Menez par le sommet A de l'angle proposé BAD , le diamètre AO : chacun des deux angles BAO , DAO a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés (cas 1); & par conséquent l'angle BAD , qui est la somme ou la différence de ces deux angles, a pour mesure la moitié de l'arc BO , plus ou moins la moitié de l'arc DO , c'est-à-dire, la moitié de l'arc BD .

Il suit de-là qu'un angle est droit, lorsqu'ayant son sommet à la circonférence, il s'appuie sur un diamètre, ou qu'il comprend entre ses côtés une demi-circonférence; & qu'il est aigu ou obtus, selon que l'arc compris est moins ou plus grand qu'une demi-circonférence.

Un angle BAF (fig. 14), formé par une corde AB & par une droite AF , extérieure au cercle, a pour mesure la moitié de l'arc AEB , sous-entendu par la corde AB , plus la moitié de l'arc AGD , sous-entendu par la corde AD , prolongement de FA .

Car la somme des deux angles de suite BAD , BAF , étant égale à la somme de deux angles droits, a pour mesure la demi-circonférence. Or l'angle BAD , formé par les deux cordes AB , AD , a pour mesure la moitié de l'arc BOD . Donc l'angle BAF a pour mesure la moitié de la partie restante $BEAGD$, ou la moitié de l'arc BEA , plus la moitié de l'arc AGD .

Un angle BAD (fig. 15), qui a son sommet en un point quelconque, au-dedans du cercle, a pour mesure la moitié de l'arc BOD , compris entre ses côtés, plus la moitié de l'arc BOd compris entre les prolongements Ab , Ad de ses côtés.

Menez, par le point b , la corde bf parallèle à dD , l'angle BAD sera égal à l'angle Bbf (Voy. PARALLÈLE); & par conséquent ces deux angles auront la même mesure. Or l'angle Bbf a pour mesure la moitié de l'arc Bof , ou, ce qui revient au même, la moitié de l'arc BOD , plus la moitié de l'arc Df . Et comme les arcs Df , db sont égaux, à cause des cordes parallèles bf , dD , nous pouvons dire que l'angle Bbf a pour mesure la moitié de l'arc BOD , plus la moitié de l'arc boD . Donc aussi l'angle BAD a la même mesure.

Un angle BAD (fig. 16), qui a son sommet hors du cercle, a pour mesure la moitié de l'arc concave BD , compris entre ses côtés, moins la moitié de l'arc convexe HK , compris aussi entre ses côtés.

Menez, par le point K , la corde KQ parallèle à AB , les deux angles BAD , QKD sont égaux, & par conséquent ils auront la même mesure. Or l'angle QKD a pour mesure la moitié de l'arc

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie,

QD , ou, ce qui revient au même, la moitié de l'arc BD , moins la moitié de l'arc BQ . Et comme l'arc $BQ =$ l'arc HK , à cause des parallèles AB , KQ , il s'ensuit que la mesure de l'angle QKD est la moitié de l'arc BD , moins la moitié de l'arc HK . Donc l'angle BAD a cette même mesure.

Si on veut faire un angle qui soit égal à un angle donné ACB (fig. 17), ou qui en soit multiplié un certain nombre de fois.

1.^o Du sommet C , avec le rayon arbitraire CA , on décrira l'arc AMB , & on tirera la corde AB ; du point c pour centre (fig. 18), avec le rayon $cC = CA$, on décrira l'arc amb ; du point a pour centre, avec un rayon $a b$ égal à la corde AB , on décrira un arc de cercle qui coupe l'arc amb au point b ; on tirera la droite cb ; & par - là l'angle $a c b =$ l'angle proposé ACB .

2.^o On fera de même chacun des angles $b c d$, $d c e$ égal à l'angle ACB . D'où l'on voit que l'angle $a c d$ sera double de l'angle ACB ; que l'angle $a c e$ en sera triple, ainsi de suite.

Si on veut partager un angle ACB (fig. 19) en deux parties égales: du point C , pour centre, avec un rayon arbitraire CA , on décrira l'arc AMB ; ensuite des points A & B , pour centres, on décrira, avec un même rayon, deux arcs de cercle qui se coupent au point x ; on mènera la droite Cx , & par-là l'angle proposé ACB sera partagé en deux angles égaux ACx , xCB , parce que la droite Cx est perpendiculaire sur le milieu de la corde AB , & partage l'arc AMB en deux parties égales. (V. PERPENDICULAIRE).

En opérant de la même manière, on peut partager chacun des angles ACx , xCB , en deux parties égales; de même chacun des angles résultants peut être partagé en deux parties égales; chacun de ceux-ci en deux parties égales, ainsi de suite. D'où l'on voit que l'angle primitif ACB peut être partagé successivement en un nombre de parties égales, exprimé par les termes de cette progression géométrique $\frac{1}{2}$: 2: 4: 8: 16: 32: 64: &c.

Pour couper un angle en trois parties égales, voyez le mot TRISECTION (L. B.).

L'art de prendre la valeur des angles est une opération d'un grand usage & d'une grande étendue dans l'arpentage, la Navigation, la Géographie, l'Astronomie, &c. Voyez HAUTEUR, ARPENTAGE.

Les instrumens qui servent principalement à cette opération, sont les quarts de cercle, les théodolites ou planchettes rondes, les graphomètres, &c. Voyez CERCLE D'ARPENTEUR, PLANCHETTE, GRAPHOMETRE, &c.

Les angles dont il faut déterminer la mesure ou la quantité, sont sur le papier ou sur le terrain. 1.^o Quand ils sont sur le papier, il n'y a qu'à appliquer le centre d'un rapporteur sur le sommet de l'angle O (Table d'Arpent. fig. 29), de manière que le rayon OB soit couché sur l'un des côtés

H

de cet angle; alors le degré que conpera l'autre côté *OP* sur l'arc du rapporteur, donnera la quantité de l'angle proposé. Voyez RAPPORTEUR. On peut aussi déterminer la grandeur d'un angle par le moyen de la ligne des cordes. Voyez CORDE & COMPAS DE PROPORTION.

2.° Quand il s'agit de prendre des angles sur le terrain, il faut placer un graphomètre ou un demi-cercle (fig. 16), de telle sorte que le rayon *CG* de l'instrument réponde bien exactement à l'un des côtés de l'angle, & que le centre *C* soit verticalement au-dessus du sommet; on parvient à la première de ces opérations, en observant, par les pinnules *F, G*, quelque objet remarquable, placé à l'extrémité ou sur l'un des points du côté de l'angle; & à la seconde, en laissant tomber un plomb du centre de l'instrument. Ensuite on fait aller & venir l'alidade jusqu'à ce que l'on aperçoive, par ses pinnules, quelque marque placée sur l'un des points de l'autre côté de l'angle; & alors le degré que l'alidade coupe sur le limbe de l'instrument, fait connoître la quantité de l'angle que l'on se proposoit de mesurer. V. DEMI-CERCLE.

L'on peut voir aux articles CERCLE D'ARPEUTEUR, PLANCHETTE, BOUSSOLE, &c. comment l'on prend des angles avec ces instruments.

Que l'on consulte aussi les articles LEVER UN PLAN & RAPPORTER, pour savoir la manière de tracer un angle sur le papier quand sa grandeur est donnée. Voyez aux mots SPHÉRIQUE, EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR, ALTERNES, &c. ce qu'on entend par un angle sphérique, un angle extérieur, un angle intérieur, des angles alternes, &c.

ANGLE (*Astr.*), se dit dans plusieurs circonstances différentes. Les angles ou les arcs dont ils sont la mesure, se prennent les uns pour les autres, & l'angle sous lequel nous voyons la distance de deux astres, est la même chose que l'arc qui les sépare.

ANGLE d'elongation, est la différence vue de la terre entre la longitude d'une planète & celle du soleil.

ANGLE horaire, est un angle sphérique formé au pôle du monde, où l'arc de l'équateur, compris entre le méridien & le cercle horaire ou cercle de déclinaison qui passe par un astre; c'est la distance au méridien; elle marque l'heure qu'il est quand il s'agit du soleil; & c'est la mesure directe du temps vrai, ainsi, lorsque le soleil est à 15° du méridien, il est toujours une heure, si c'est à l'occident, ou 11^h du matin, si c'est à l'orient, dans le triangle *PZS* (fig. 40), dans lequel *P* représente le pôle, *Z* le zénith, & *S* le soleil ou un autre quelconque; l'angle au pôle, ou l'angle horaire *P* sert à trouver la distance au zénith *ZS*, &c. par conséquent la hauteur de l'astre. Voyez ANGLE horaire, dans le Dictionnaire de Marine, où M. Blondeau explique la manière de le calculer, par le moyen de la hauteur observée en mer.

ANGLE azimutal. Voyez AZIMUT.

ANGLE d'azimut (*Astr.*); dans le calcul des

éclipses de soleil, est quelquefois l'angle formé au centre du soleil par le vertical & par la ligne qui joint les centres du soleil & de la lune; cet angle dépend en effet de la différence d'azimut entre les deux astres, & s'évanouit avec elle.

ANGLE de commutation, c'est la différence entre la longitude d'une planète vue du soleil, & la longitude de la terre vue du même point, l'une & l'autre comptées sur l'écliptique, en partant de l'astre qui a le moins de mouvement pour aller à celui qui en a le plus. Copernic appelloit commutation ce qu'on appelle aujourd'hui *parallaxe annuelle* ou *parallaxe du grand orbe*, c'est-à-dire, la différence entre la longitude vue du soleil & la longitude vue de la terre, comptée dans l'écliptique.

ANGLE de conjonction, dans le calcul des éclipses, est l'angle formé par le cercle de latitude & l'arc qui joint les centres du soleil & de la lune; cet angle dépend en effet de la distance à la conjonction, & il est nul dans la conjonction même, la ligne des centres coïncidant avec le cercle de latitude.

ANGLE parallélique, dans l'usage de l'astronomie, se dit de l'angle formé par le vertical & par un cercle ou de déclinaison ou de latitude; ainsi, l'on en distingue de deux sortes: l'angle parallélique du cercle de latitude sert à trouver les parallaxes de longitude & de latitude, & par conséquent à calculer les éclipses; cette méthode est celle que j'ai adoptée de préférence, comme la plus exacte & la plus courte, & que j'ai expliquée fort au long dans le 3^e livre de mon *Astronomie*.

ANGLE de position, dans l'Astronomie moderne; est l'angle formé au centre du soleil ou d'une étoile par le cercle de déclinaison & le cercle de latitude; cet angle dépend en effet de la position de l'astre, par rapport aux pôles de l'écliptique & de l'équateur. La manière de le calculer pour le soleil, consiste à dire: le rayon est à la tangente de l'obliquité de l'écliptique 23° 28', comme le cosinus de la longitude du soleil est à la tangente de l'angle de position. Pour les étoiles, il faut dire: le cosinus de la latitude de l'étoile est au cosinus de l'ascension droite, comme le sinus de l'obliquité de l'écliptique est au sinus de l'angle de position. J'ai donné, dans la *Connaissance des mouvements célestes* pour 1766, une table générale de l'angle de position, & dans le *IV^e livre* de mon *Astronomie*, une table particulière pour 157 étoiles principales, avec le changement pour dix ans.

ANGLE oriental, en Astrologie, se dit de l'horoscope.

ANGLE d'occident, est la septième maison.

ANGLES du ciel ou maisons angulaires, en Astrologie, sont les maisons 1, 4, 7, 10.

ANGLE au soleil, se disoit autrefois de l'anomalie vraie.

ANGLE de la terre, en Astrologie, est la quatrième maison, dans le plus bas du ciel.

ANOLE horaire, dans la Gnomonique, se dit quelquefois de l'angle formé au centre du cadran par une ligne horaire avec la méridienne. (*M. de LA LAMBE*).

ANGUINEE, adj. f. terme de Géométrie; c'est le nom que M. Newton donne dans son énumération des lignes du troisième ordre, aux hyperboles de cet ordre, qui, ayant des points d'inflexion, coupent leur asymptote, & s'étendent vers des côtés opposés. Voyez ASYMPTOTE, INFLEXION. Telle est la courbe *DHCAFC* (fig. 40. *Anal.* n.° 2), qui coupe son asymptote *DA* en *A*, & qui, ayant en *H* & en *I* des points d'inflexion, s'étend vers des côtés opposés; savoir, à la gauche de *AD* en en-haut, & à la droite de *AB* en en-bas.

Cette courbe s'appelle *anguinée* du mot *anguis*, serpent, parce qu'elle parait serpenter autour de son asymptote. Voyez SERPENTEMENT.

ANGULAIRE, adj. m. (*Géom.*) se dit de tout ce qui a des angles, ou ce qui a rapport aux angles. Voyez ANGLE.

La distance fait disparaître les angles des polygones; l'œil apercevait le corps de l'objet, lorsqu'il n'apparaît plus les inégalités que les angles faisoient sur sa surface, on croit que cette surface est unie, & le corps de l'objet paraît rond. Voyez VISION.

Mouvement angulaire. C'est le mouvement d'un corps qui décrit un angle, ou qui se meut circulairement autour d'un point. Ainsi, les planètes ont un mouvement angulaire autour du soleil. Le mouvement angulaire d'un corps est d'autant plus grand, que ce corps décrit, dans un tems donné, un plus grand angle. Deux points mobiles *A*, *F* (*Méch.* fig. 3), dont l'un décrit l'arc *AB*, & l'autre l'arc *FG*, dans le même tems, ont le même mouvement angulaire, quoique le mouvement réel du point *A* soit beaucoup plus grand que le mouvement réel du point *F*; car l'espace *AB* est beaucoup plus grand que *FG*.

Le mouvement angulaire se dit aussi d'une espèce de mouvement composé d'un mouvement rectiligne, & d'un mouvement circulaire, &c.

Tel est le mouvement d'une roue de carrosse, ou d'une autre voiture. Voyez ROUE d'ARISTOTE (*O*).

A N N

ANNEAU de saturne (*Astron.*); c'est une bande circulaire large & mince, qui environne, à une certaine distance, le globe de saturne, & qui paraît être située dans le plan de son équateur. Elle accompagne saturne dans sa révolution, & reste toujours parallèle à elle-même. Ce cercle, vu obliquement, paraît sous une forme ovale ou elliptique (fig. 160 *Astron.*) & disparaît totalement, quand il ne nous présente que son égalité.

L'anneau de saturne est une des choses les plus singulières qu'on ait découvertes par le moyen des lunettes d'approche. Galilée écrivoit, en 1612, qu'il avoit vu saturne composé de trois parties, *saturnum triformem*; mais, comme cela paroît fort extraordinaire, & qu'il ne vit ensuite d'une forme tout-à-fait ronde, il ne suivit point cette recherche. Cassendi, en 1645, disoit que saturne lui paroît composé de deux globes de même blancheur que saturne lui-même, Hérelius, dans sa *Sclénographie*, publiée en 1647, disoit formellement qu'il ne comprenoit rien à ces deux braves de saturne. En 1656, dans la Dissertation de *saturni facie*, il distinguoit six phases différentes de saturne; il l'appelloit *monospharicum*, *trisphearicum*, *sphærico-cuspidatum*, *sphærico-angustum*, *elliptico-angustum diminutum*, *elliptico-angustum plenum*. Mais la seconde & même la troisième phase étoient des illusions optiques provenant du défaut de ses lunettes. Personne avant Huygens ne comprit & n'expliqua la cause de ces apparences de saturne. Les uns crurent que c'étoit la figure particulière de la planète, vue plus ou moins obliquement; les autres deux gros satellites (*Veidler historia Astronomica*, p. 300). Mais depuis l'explication de Huygens, dans son *Systema saturnium*, 1659, il n'y a plus eu aucun doute. L'anneau est concentrique à saturne, également éloigné de sa surface dans tous ses points; il est soutenu par sa pesanteur naturelle & simulante de toutes les parties, tout ainsi qu'un pont, qui seroit assez vaste pour environner toute la terre, & se soutenir sans piliers. La partie de l'anneau qui est la plus voisine de saturne, est un peu plus lumineuse que les parties éloignées. Domin. Cassini observa que la largeur de l'anneau étoit divisée, en deux parties égales, par un trait obscur dont la courbure étoit la même que celle de l'anneau; mais Short, avec son grand télescope de douze pieds, m'assura, en 1763, qu'il y avoit distingué plusieurs lignes noires concentriques à la circonférence de l'anneau, & qui donnent lieu de croire qu'il y a comme plusieurs couches ou plusieurs anneaux placés dans un même plan; mais Hadley n'en voyoit qu'un avec son télescope de 4 1/2 pieds de foyer (*Phil. trans.* n.° 378, abrégé *VI*, 222). Les lignes noires, représentées dans la figure 160, mais qui s'apperoissent difficilement dans le ciel, distinguent les couches de l'anneau; elles se rapprochent & se confondent vers le milieu, en *C* & en *E*, parce que l'anneau y est trop étroit, à raison de l'obliquité de l'œil. Il y a aussi une bande obscure que l'on voit sur le disque de saturne, qui paraît être l'ombre de l'anneau. On voit encore quelquefois le bord de l'ombre de saturne, projeté sur la partie de l'anneau qui est au-delà de saturne.

Le diamètre de l'anneau est à celui du globe de saturne comme 7 est à 3 suivant les mesures de Pound; le vide *AF* qui est entre le globe & l'an-

H ij

neau, est à-peu-près égal à la largeur AB de l'anneau, ainsi la largeur de la couronne est n'importe du diamètre de saturne. Le rayon de saturne dans ses moyennes distances, étant de 9', le diamètre intérieur de l'anneau sera de 15' & le diamètre extérieur 21', le vide étant de 6', & la largeur de la couronne également de 6'. À l'égard de la grandeur absolue, le diamètre de saturne étant de 28601 lieues, celui de l'anneau est de 66737 lieues. Voyez la table, à l'article planète, ainsi la largeur est de 9534 lieues.

L'anneau de saturne paroît être comme l'équateur de cette planète, incliné sur son orbite de 30° & toujours parallèle à lui-même pendant la révolution de saturne. Ce parallélisme produit ses diverses apparences dans la durée d'une révolution, comme celui de l'axe de la terre produit la diversité des saisons. L'anneau disparaît quelquefois, comme on l'a observé en 1665, 1671, 1714, 1760 & 1773, & comme on l'observera encore en 1789, 1803, 1819, 1831, 1848, 1862, 1878 & 1891. Il y a trois causes qui peuvent occasionner cette phase ronde.

Lorsque saturne est dans le 20.^e degré de la vierge ou des poissons, le plan de son anneau qui est constamment dirigé vers ces points de l'écliptique, (considérée dans la région des étoiles à une distance infinie), le trouve en même-temps dirigé vers le soleil; il ne reçoit de lumière que sur son épaisseur, qui n'est pas assez considérable pour être aperçue de si loin; saturne alors paroît rond & sans anneau. Huygens le vit ainsi en 1655; (*système saturnium*). M. Maraldi observa sur-tout avec grand soin cette phase ronde, depuis le 13 octobre 1714, jusqu'au 20 février 1715. (*Mém. Acad. 1715, pag. 123, 2716, pag. 172*). Enfin nous l'avons observé depuis le 5 octobre 1773, jusqu'au 11 janvier 1774, & depuis le 3 avril jusqu'au premier juillet: il suffit que le soleil soit élevé sur le plan de l'anneau d'un angle de trois minutes, pour qu'il paroisse éclairé; aussi cet anneau ne disparaît faute de lumière que pendant trois ou quatre jours avant le passage de saturne par les nœuds de l'anneau. (*Mém. 1774, pag. 91*).

Voici à-peu-près les tems où saturne se trouvant à 5° 20' ou 11° 20', l'anneau doit être dirigé vers le soleil, suivant les calculs de M. Heinius. Le 21 décembre 1671, 6 juin 1701, 31 janvier 1715, 20 novembre 1730, 15 juillet 1744, 5 mai 1760, 30 décembre 1773, 20 octobre 1789, 17 juin 1803, 6 avril 1819, &c.; mais au lieu du 30 décembre 1773, j'ai trouvé par observation le 11 janvier 1774. Voyez les circonstances des autres disparitions jusqu'en 1891 dans l'ouvrage de M. du Séjour, intitulé: *essai sur les phénomènes relatifs aux disparitions périodiques de l'anneau de saturne*, 1776, in-8°, pag. 124—180.

Le lieu du nœud de l'anneau sur l'orbite de saturne, étoit à 5° 20' 30" vers le milieu du dernier siècle, suivant Huygens, de même que le

nœud des quatre premiers satellites de saturne. Par les observations de 1685, le nœud de l'anneau parut à 5° 19' 55", compté sur l'orbite de saturne. M. Callini dans les éléments d'Astronomie, le place à 5° 12"; M. Maraldi à 5° 19' 48", par les observations de 1715; cette position fut observée & discutée avec le plus grand soin; enfin j'ai trouvé pour 1774, 5° 20' 38" ou 5° 17' 5", sur l'écliptique, ce qui ne diffère de M. Maraldi qu'à raison de la précession des équinoxes en 59 ans. Ainsi, le nœud de l'anneau paroît être sensiblement immobile.

On auroit pu croire cependant que les attractions du soleil, de jupiter & des satellites de saturne sur un équateur aussi mince, devoient causer un déplacement pareil à celui que la terre éprouve & qui fait la précession des équinoxes; c'est ce qui me détermina en 1773 à rappeler l'attention des astronomes sur ce phénomène par des avertissemens réitérés dans les papiers publics. Ces avis n'ont point été inutiles, ces observations furent faites en divers endroits, & elles réussirent très-bien. Je me transportai moi-même à Béziers au mois d'octobre 1773, pour observer sous le plus beau ciel de la France, la première disparition; & j'en ai rendu compte, ainsi que de toutes les autres observations qui nous sont parvenues dans les *Mémoires* de 1774.

M. Meffier a publié aussi beaucoup d'observations dans les *Mémoires de Berlin* pour 1776.

L'anneau disparaît lorsque son plan passe par notre œil, étant dirigé vers la terre; nous ne voyons alors que son épaisseur, qui est trop petite pour qu'on puisse l'apercevoir.

Heinius dans sa dissertation, publiée à Leipzig en 1745, croyoit qu'il falloit que la terre fût élevée au moins d'un demi-degré sur le plan de l'anneau, pour qu'on pût l'apercevoir avec une honnêteté de 15 pieds, ce qui faisoit dans certains cas plus de huit jours avant ou après le passage; mais par les observations de 1774, j'ai reconnu que l'anneau ne disparaît que le jour même où la terre passe par le plan de l'anneau. (*Mém. de l'Ac. 1774, pag. 91*). Le mouvement de la terre fait que ce passage est plus rapide que celui du soleil par le plan de l'anneau, & qu'il est plus aisé d'observer la disparition qui vient du passage de la terre, que celle qui vient du passage du soleil; d'ailleurs on peut avoir pour celui de la terre deux phases correspondantes qui rendent la détermination plus exacte; voilà pourquoi j'expliquerai bientôt la manière de trouver le nœud de l'anneau par les dernières observations. M. du Séjour croit que l'anneau n'a disparu que lorsque la terre avoit déjà une petite dépression d'une ou deux minutes. (*p. 269*)

Il y a une troisième cause qui peut faire disparaître pour nous l'anneau de saturne; elle a lieu lorsque son plan passe entre nous & le soleil; car alors sa surface éclairée n'est point tournée vers nous: tant que saturne est entre 11° 20' & 5° 20' de longitude, le soleil éclairé la surface mor-

dionale de l'anneau ; si la terre est alors élevée sur la surface septentrionale, elle ne peut voir la lumière de l'anneau, & ce sera un des tems de la phase ronde ; ainsi, l'on peut voir disparaître les anses deux fois dans la même année, & les voir reparaître deux fois, comme on l'a véritablement observé (*Mém. Acad. 1716, 1774*).

Ces disparitions étant bien observées, font connoître les positions du nœud de l'anneau. Soit *LMA* (*Planches d'Astronomie, Figure 163*), le globe de Saturne, sur lequel on imagine trois cercles pour représenter l'écliptique, l'orbite de Saturne, & le cercle de l'anneau. La ligne *NM* représente l'orbite que le soleil paroît décrire en trente ans autour de Saturne ; cet orbite est exactement dans le même plan, & décrite avec les mêmes vitesses que l'orbite de Saturne vue du soleil. Le cercle *ATOSL* représente la trace du plan de l'anneau sur la surface de Saturne ; enfin, le cercle *NOI* représente un plan qui passe par le centre de Saturne, parallèlement à l'écliptique ou au plan de l'orbite terrestre : ce plan *NOI* prolongé dans l'immensité de la sphère céleste, passe sur les mêmes étoiles & marque dans le ciel la même trace & les mêmes points que le plan de l'orbite terrestre également prolongé. L'arc *NOI* appartient donc à un plan que l'on conçoit parallèle au plan de l'écliptique, faisant en *N* un angle de $2^{\circ} 30' 20''$ qui est l'inclinaison de l'orbite de Saturne, à $3^{\circ} 21' 31''$ de longitude pour 1750. Supposons le nœud *S* de l'anneau & de l'orbite de Saturne, à $5^{\circ} 20' 8''$ pour l'année 1744, avec Heinsius, & le nœud *N* de Saturne à $3^{\circ} 21' 55''$, la distance *SN* sera de $58' 13''$; l'on connoît l'angle *N* & l'angle *S*, inclinaison de l'anneau sur l'orbite de Saturne, que les observations donnent de 30° , on pourra résoudre le triangle *NSO*. L'on trouvera *NO* = $54^{\circ} 41' 30''$ ce qui, ajouté à la longitude du nœud *N*, donnera pour la longitude du nœud *O*, $5^{\circ} 17' 36' 30''$; c'est ce que M. Maraldi & Heinsius appellent la longitude du nœud de l'anneau sur l'écliptique. Mais quoique le cercle *NOI* représente l'écliptique, il ne faut pas imaginer que la terre ou le soleil décrive ce cercle réellement, c'est seulement un cercle parallèle dont les pôles étant prolongés dans l'immensité de la sphère étoilée, répondent aux mêmes points que les pôles de l'écliptique, ou de l'orbite de la terre. Mais cela n'empêche pas que cette écliptique ne serve à calculer les observations. Par exemple, la terre étant supposée en *T*, avec une latitude *TE* vue de Saturne, égale à celle de Saturne vue de la terre, le point *E* étant éloigné de six signes de la longitude géocentrique de Saturne réduite à l'écliptique, telle qu'on l'observe de la terre, l'arc *TE* & l'angle *TOE* nous seront trouver *OE*, & par conséquent la longitude du nœud *O* sur l'écliptique. Dans la disparition de l'anneau, observée au mois d'octobre 1714, le lieu de Saturne dans l'écliptique, opposé au point *E*, étoit de $5^{\circ} 19' 15''$

vu de la terre, suivant M. Maraldi. La latitude septentrionale *E* de la terre, égale à celle de Saturne, étoit $1^{\circ} 51'$; & l'angle *O* de $31^{\circ} 20'$, d'où l'on conclut le côté *EO* = $3^{\circ} 3'$ & la longitude du nœud *O* sur l'écliptique $5^{\circ} 16' 12''$; je l'ai trouvé en 1774 $5^{\circ} 17' 5''$. Ces déterminations donnent ainsi un moyen de trouver le nœud *S* de l'anneau sur l'orbite de Saturne ; car dans le triangle *SON*, supposant l'angle *S* & l'angle *N* connus, de même que la distance *ON* du nœud *N* de l'orbite au nœud *O* de l'anneau sur l'écliptique, on trouve *SN* qui, ajouté à la longitude du nœud *N* de l'orbite de Saturne, donne celle du nœud *S* de l'anneau sur l'orbite de Saturne, que j'ai trouvée en 1774, $5^{\circ} 20' 38''$. M. du Séjour dans un mémoire analytique lu à l'Académie en 1773 sur cette matière, faisoit voir que dans un espace de 59 ans, il y avoit quatre disparitions de l'anneau, deux consécutives qui sont doubles, mais dont il peut arriver qu'une soit invisible, & les deux autres qui sont simples, c'est-à-dire, où l'anneau ne disparoit qu'une fois, mais il a beaucoup plus approfondi cette matière dans l'ouvrage que j'ai cité, & il fait voir (*p. 186*), que cette période ne fait pas une règle constante. En 1714 & en 1773, on a observé des phénomènes correspondans & semblables, presque dans les mêmes jours du mois. Le 13 octobre 1714 & le 5 octobre 1773, la terre approchant du plan de l'anneau, on cessa de le distinguer. Le 10 février 1715 & le 11 Janvier 1774, le soleil ayant passé au nord de l'anneau, on recommença de le voir. Le 23 mars 1715 & le 3 avril 1774, la terre revenant vers le plan de l'anneau, il disparut pour la seconde fois. Le 12 Juillet 1715 & le premier Juillet 1774, la terre dépassa de nouveau le plan de l'anneau & on le revit pour la seconde fois. (*Mém. Acad. 1715, 1716, 1774*). En 1789, il y aura aussi deux disparitions & deux réapparitions, les 5 mai, 24 août, 16 octobre, & 30 Janvier 1790, (*M. du Séjour, p. 164*), en 1832 & 1833, l'on observera presque la même chose. (*pag. 171*).

Les différences des lunettes, & les inégalités de l'atmosphère en divers climats, mettent quelques jours d'incertitude dans ces sortes d'observations, mais avec les lunettes achromatiques, dont la plupart des astronomes se servent actuellement, & qui sont à-peu-près égales, on a été d'accord à un ou deux jours près dans les observations de 1774 ; il n'y a que la disparition du mois d'octobre 1773 sur laquelle on a différé de quelques jours, parce que le tems étoit peu serein & Saturne fort près de l'horizon. Dès le 5 octobre presque tous les astronomes l'avoient perdu de vue, quoique ce ne doit être que le 9 suivant le calcul déduit des autres phases.

Dans la détermination du nœud de l'anneau, l'on suppose connue son inclinaison, parce qu'une petite incertitude sur l'inclinaison n'empêcheroit pas qu'on ne déterminât fort bien le lieu du nœud. Passons actuellement à la recherche de cette inclinaison.

Lorsque saturne est le plus éloigné du nord de l'anneau, & que la terre est la plus élevée au-dessus du plan de l'anneau, il nous paroît sous la forme d'une ellipse, dont le petit axe est la moitié du grand, du moins en réduisant les observations au centre du soleil; ainsi, en supposant l'anneau absolument circulaire, il faut que son inclination soit de 30° sur le plan de l'orbite de saturne, pour paroître sous cette forme; par-là il est aisé de calculer quelle doit être l'inclination de cet anneau sur le plan de l'écliptique; car dans le triangle $NO S$ on connoît l'angle N , la distance NS des nœuds, & l'angle S de 30° ; on aura facilement l'angle O qui est de $31^\circ 20'$; mais nous n'observons jamais l'anneau d'une si grande ouverture, à cause de la latitude de saturne.

Il est aisé de déduire de ces principes la figure de l'anneau pour un tems donné, car elle ne dépend que de l'élevation de la terre sur le plan de cet anneau. Soit B le lieu de la terre opposé à la longitude géocentrique de saturne, BF la latitude de la terre vue de saturne, égale à la latitude de saturne vue de la terre, mais de dénomination contraire, OF la différence entre la longitude de la terre vue de saturne, & celle du nœud de l'anneau sur l'écliptique; dans le triangle FBO , l'on cherchera BO , & l'angle O , la somme ou la différence de BOF & de l'angle SOF , inclination de l'anneau sur l'écliptique, $31^\circ 20'$, donnera l'angle SOB ou GOB ; dans le triangle BOG , l'on connoît l'hypothénuse OB , & l'angle BOS , l'on cherchera BG qui est la latitude de la terre, par rapport à l'anneau, vue de saturne, ou l'élevation de la terre au-dessus de l'anneau.

Par le moyen de l'élevation de notre œil sur le plan de l'anneau, on trouve la figure de l'anneau, ou le rapport des axes de son ellipse apparente pour un tems quelconque; car le grand axe est toujours au petit, comme le rayon est au sinus de l'élevation ou de l'obliquité de l'œil.

L'élevation du soleil au-dessus du plan de l'anneau est plus aisé à calculer. Supposons le soleil en C sur l'orbite qu'il paroît décrire autour de saturne, l'arc CD perpendiculaire sur l'anneau LSA , CD est la latitude du soleil, par rapport à l'anneau qui se trouve par le simple triangle $CS D$ dans lequel on connoît la distance héliocentrique CS de saturne au nœud S de l'anneau, mesurée sur l'orbite de saturne $MCSN$, & l'angle S 30° , cet arc CD est l'inclination du rayon solaire sur le plan de l'anneau, ou l'élevation du soleil, par rapport à ce plan. De-là on pourroit conclure les tems où l'angle de cette inclination est assez petit, pour que le soleil ne puisse plus éclairer sensiblement une des surfaces de l'anneau, & de nous le rendre visible. On peut aussi par les mêmes principes réduire les observations qu'on en fait sur la terre à celles qui auroient lieu pour un observateur situé dans le soleil.

J'ai dit que l'anneau est comme un plan ou un corps très-mince; en effet, dès qu'il est dirigé vers nous, & que son plan passe par notre œil, nous ne

distinguons rien; nous le perdons de vue, parce qu'il n'y a pour lors que son épaisseur qui se présente à nous, & elle est trop petite pour être distinguée; il est vrai qu'alors on voit l'ombre de l'anneau sur le disque de saturne, parce que le soleil l'éclaire obliquement & qu'il y a par conséquent une ombre plus large que celle de l'épaisseur de l'anneau. Quand l'anneau est dirigé vers le soleil & que son épaisseur seule est éclairée, il disparoît également; ce qui prouve que cette épaisseur est fort petite, c'est-à-dire, insensible pour nous; car elle pourroit être encore assez grande, sans que nous pussions la distinguer, le diamètre réel de l'anneau étant de 66737 lieues, & un quart de seconde étant insensible sur une planète aussi peu éclairée.

L'anneau est si mince que les anses disparoissent, le jour même que la terre est dans le plan de l'anneau, & reparoissent dès que la terre a dépassé le plan. M. Maraldi s'en étoit assuré en 1715; & j'ai trouvé le même résultat par la disparition du 3 avril 1774 & la réapparition du premier Juillet. En effet, le 3 avril la latitude géocentrique de saturne, ou celle de la terre ET , étoit de $2^\circ 27' 5''$; si l'on divise la tangente de cet arc par celle de l'inclination de l'anneau sur l'écliptique, ou de l'angle $EO T$ $31^\circ 20'$ l'on a le sinus de la distance EO de la terre au nœud, sur l'écliptique; $= 4^\circ 1' 20''$ & cette distance retranchée du lieu de la terre ou de saturne, en E , $11^\circ 21' 7'' 38''$ donne le lieu du nœud O sur l'écliptique $11^\circ 17' 6'' 18''$.

Dans la réapparition du premier juillet, la latitude $2^\circ 12' 23''$ donne pour la distance au nœud $3^\circ 37' 16''$ & comme la longitude de saturne étoit $11^\circ 20' 41'' 41''$ le lieu du nœud se trouve $11^\circ 17' 4' 25''$. La différence $1^\circ 53''$ entre ces deux résultats ne dépend que de quelques heures de différence dans les observations; ainsi, il est évident que c'est le jour même du passage de la terre dans le plan de l'anneau que nous le voyons disparoître ou reparoître. Le segment AB , fig. 160, de $88^\circ 50'$ qui est entièrement illuminé, & dont la corde entière a $29^\circ 4'$, paroît 12 heures après le passage de la terre dans le plan de l'anneau comme si l'on avoit 36 lieues; ainsi, l'épaisseur de l'anneau peut n'être que de cette quantité, ou seulement de 18 lieues si l'on voit les anses détachées douze heures avant que nous soyons dans le plan de l'anneau. (Mém. 1774, pag. 93).

L'anneau de saturne paroît n'être pas exactement plan, car Maraldi observa qu'une des anses disparoissoit avant l'autre, & Heilmus assure que le 29 novembre 1743, l'anse orientale étoit plus courte que l'autre; ce qui semble annoncer qu'il y a un peu de courbure dans l'anneau.

Le 9 octobre 1714, les anses étoient de moitié plus courtes qu'à l'ordinaire; (Mém. 1715, p. 12.) la partie orientale paroît plus large que l'occidentale. Le 12 octobre saturne parut avec une seule anse du côté de l'occident, cela pourroit donner lieu de croire que depuis le 9 jusqu'au 12, la rota-

tion de saturne avoit pu faire passer de l'orient à l'occident cette partie de l'anneau qui étoit la plus visible, la moins inclinée ou la moins approchante de notre rayon visuel.

Le 6 octobre 1773, on ne voyoit à Cadix que l'anneau occidentale. Le 11 janvier 1774, M. Messier voyoit les anses détachées, & l'anneau oriental plus long. Le premier juillet, il remarqua sur l'anneau qui étoit encore extrêmement mince, des points lumineux plus gros que le fillet de lumière qui sermoit les anses. Ces observations faites sur des objets imperceptibles, ne sont ni faciles à faire, ni d'une certitude absolument satisfaisante; mais elles indiquent cependant qu'il y a un peu de courbure dans le plan de l'anneau; car s'il étoit dans un seul plan, ses parties droites & gauches disparaîtroient en même-temps, & le segment extérieur qui est d'une lumière pleine ne disparaîtroit pas le premier, comme cela arrive quelquefois.

On trouve des conjectures & des réflexions ingénieuses sur la cause & la formation de l'anneau de saturne, dans Mangetius; *Dijours sur les figures des astres*, imprimé en 1732, & en 1742.

ANNEAU SOLAIRE ou HORAIRE, est une espèce de petit cadran portatif, qui consiste en un anneau ou cercle de cuivre d'environ deux pouces de diamètre, & d'un tiers de pouce de largeur.

Dans un endroit du contour de l'anneau, il y a un trou par lequel on fait passer un rayon du soleil, qui fait une petite marque lumineuse à la circonférence concave du demi-cercle opposé; & le point par lequel tombe cette petite marque, donne l'heure du jour que l'on cherche.

Mais un instrument ainsi disposé n'est bon que dans le tems des équinoxes; pour qu'il puisse servir tout le long de l'année, il faut que le trou puisse changer de place, & que les lignes du zodiaque ou les jours du mois soient marqués sur la convexité de l'anneau; au moyen de quoi le cadran peut donner l'heure pour tel jour de l'année qu'on veut.

Pour s'en servir, il ne faut que mettre le trou sur le jour du mois ou sur le degré du zodiaque que le soleil occupe ce jour-là, ensuite suspendre le cadran à l'ordinaire vis-à-vis du soleil; le rayon qui passera par le trou, marquera l'heure sur le point opposé où il tombera.

ANNEAU ASTRONOMIQUE ou UNIVERSEL, est un instrument composé de deux ou trois cercles, qui sert à trouver l'heure du jour en quelque endroit que ce soit de la terre, au lieu que l'anneau solaire dont nous venons de parler est borné à une certaine latitude. L'anneau astronomique est représenté dans les *planches d'Astronomie*, fig. 248, dans sa construction la plus simple. C'est une espèce de cadran équinoxial portatif, & qui s'oriente à-peu-près de la façon que nous l'expliquerons en indiquant la construction du cadran équinoxial. Voyez CADRAN.

L'anneau astronomique est une imitation des

armilles d'Eratosthène, qui étoient à Alexandrie 250 ans avant J. C. & les armilles portatives ont été employées très-anciennement. Gemma-Frisson, dans son usage de l'anneau astronomique, imprimé en 1544, dit que ce n'est pas du tout son invention, mais qu'il en a rendu l'usage plus étendu.

On fait des anneaux astronomiques depuis deux pouces de diamètre jusqu'à six; il consiste en deux anneaux ou cercles minces, qui sont larges & épais à proportion de la grandeur de l'instrument. Le cercle extérieur *A* représente le méridien du lieu où l'on est; il contient deux divisions de 90° chacune, diamétralement opposées, & qui servent, l'une pour l'hémisphère boréal, l'autre pour l'hémisphère austral. L'anneau intérieur représente l'équateur, & tourne exactement en dedans du premier par le moyen de deux pivots qui sont en *E* & en *F* dans chaque cercle. Au dedans des deux cercles est une petite règle *AP*, ou lame mince, qui tourne aussi sur deux pivots avec un curseur marqué *C*, qui peut glisser le long du milieu de la règle. Dans ce curseur est un petit trou pour laisser passer les rayons du soleil.

On regarde l'axe de la règle *AP* comme l'axe du monde, & ses extrémités comme les deux pôles. On y marque d'un côté les signes du zodiaque, de l'autre les jours du mois; sur le méridien est une pièce de suspension qui peut glisser sur la circonférence, & à laquelle on attache un petit cadran *G*, qui porte une boucle *H* pour tenir l'instrument suspendu.

Usage de cet instrument. Mettez le milieu du pendant, au degré de latitude ou de hauteur du pôle du lieu où vous êtes, sur la circonférence *AMP*, par exemple, à 48° 50' pour Paris; mettez le trou du curseur au degré du signe, ou au jour du mois sur la règle *DD*; ouvrez ensuite l'instrument, de sorte que les deux anneaux tombent un angle droit l'un sur l'autre, & suspendez-le par la boucle *H*, de manière que l'axe de la règle qui représente celui de l'instrument puisse être parallèle à l'axe du monde; ensuite tournez le côté plat de la règle vers le soleil, jusqu'à ce que le rayon qui passera par le petit trou tombe exactement sur la ligne circulaire qui est tracée au milieu de la circonférence concave *DB* de l'anneau intérieur; le rayon solaire marquera l'heure qu'il est sur cette circonférence concave. En effet on éloigne l'altitude de l'équateur, par exemple, de 23°; si c'est au solstice, dans cet état le soleil passant par l'altitude sera l'équateur dès que cet équateur est bien placé, puisqu'on a fait d'avance l'angle égal à celui du rayon solaire sur le plan de l'équateur, & qu'une ligne déterminée un plan quand l'inclinaison de ce plan est donnée.

Pour diviser la règle *DD* suivant les signes ou les jours, on met dans le milieu *N* les équinoxes 21 de mars & 21 de septembre, & sur un rayon *FN* on forme des angles égaux aux déclinaisons du soleil, au commencement de chaque signe, ou au commencement chaque mois, en sorte que les por-

tions de la règle, à partir du milieu, suivent le progrès des tangentes des déclinaisons du soleil.

Il faut remarquer que l'heure de 12 ou de midi n'est point donnée par le cadran, par la raison que le cercle extérieur étant dans le plan du méridien, il empêche les rayons du soleil de tomber sur le cercle intérieur. D'ailleurs le soleil changeant peu de hauteur aux environs du midi, la situation de l'*anneau* est mal déterminée. L'*anneau*, tel que nous venons de le décrire, ne donnera point non plus l'heure quand le soleil sera dans l'équateur, parce qu'alors ses rayons seront parallèles au plan du cercle intérieur; mais on y remédie par une autre construction.

En effet, il y a encore une espèce d'*anneau astronomique*, auquel on ajoute un cercle horaire tournant autour des pôles *AP*, & portant une alidade; ainsi, au lieu de deux cercles, il en a trois; mais il faut que l'instrument soit plus grand, celui-ci marque lorsque le soleil est dans l'équateur, & il est beaucoup plus juste. On ne se sert plus guère de ces instruments, l'usage des montres ayant rendu inutiles tous ces cadrans qui ne donnent pas l'heure avec une certaine justesse, mais l'*anneau astronomique* est excellent pour porter dans les campagnes où l'on n'a point de méridiens & de cadrans solaires.

On fait des *anneaux astronomiques* de six pouces qui coûtent cent écus, voy. fig. 249, où l'on distingue facilement toutes les minutes d'heures; la hauteur du pôle de deux en deux minutes, & les minutes de la déclinaison du soleil par le moyen d'un vernier qui occupe 60° sur le cercle horaire.

L'équateur y est maintenu perpendiculairement au méridien par une rainure dans laquelle entre une pointe fixée dans le cercle horaire qui tourne autour des pôles.

La pièce de suspension est formée comme la lampe de Cardan, ain que l'instrument prenne son à-plomb dans tous les sens, & on l'arrête avec une vis sur la hauteur du pôle du lieu où l'on observe.

L'alidade, qui se meut sur le plan du cercle horaire, a un verre objectif au lieu d'un trou de pinnule, & l'image du soleil qui se peint sur la pinnule opposée, sert à prendre des hauteurs correspondantes, qu'on peut avoir facilement à 2° près, comme l'a éprouvé M. le cardinal de Luynes.

Dans les *anneaux* où il y a un cercle horaire portant l'alidade des déclinaisons, le rayon solaire ne peut enfler l'alidade que quand le cercle horaire est dirigé à la distance actuelle du soleil au méridien; ainsi, il y a deux tatonnements à faire pour avoir le rayon solaire dans l'alidade.

On le sentira mieux dans le cas le plus simple qui est celui de l'équinoxe; je suppose que le soleil est dans l'équateur, & que je veux diriger vers le soleil l'alidade qui tourne dans le plan de l'équateur de l'*anneau*, il ne suffira pas de tourner ce plan vers le soleil, il le faudra encore tourner l'ali-

dade à la hauteur du soleil, ou à la distance du méridien.

L'*anneau astronomique* en terme de marine, est un instrument fort simple dont on se sert en mer pour prendre simplement la hauteur du soleil: c'est un cercle de métal où il y a un trou éloigné de 45 degrés de la suspension, & à la partie opposée du cercle, des divisions qui marquent les hauteurs du soleil de degré en degré, lorsque le rayon solaire passant par le petit trou tombe sur les divisions opposées. (D. L.)

ANNEAU (Mesure de bois), c'est un cercle de fer qui a six piés & demi de circonférence, que l'on nomme aussi *moale*, & dont le patron prototype est à l'hôtel-de-ville. C'est sur ce patron que tous ceux dont on se sert sont étalonnés & marqués aux armes de la ville. Trois moules ou *anneaux* remplis, plus douze bûches, doivent faire la charge d'une charrette. Le tout fait ordinairement depuis cinquante-deux jusqu'à soixante-deux bûches, qui sont nommées par cette raison *bois de compte*. Toutes les bûches qui sont au-dessous de dix-sept à dix-huit pouces de grosseur, doivent être rejetées du moule & renvoyées au bois de corde; mais il y a encore tant d'inégalité entre les plus grosses, que souvent ce nombre ne se trouve pas complet. Il y en a quelques-uns de si grosses, sur-tout dans le bois qui vient de Montargis, que les quarante-sept ou quarante-huit bûches remplissent les trois *anneaux*, & sont la voie. Voyez VOIE.

Le bois qui vient par la rivière d'Anicelle, & qui en porte le nom, n'ayant que deux piés & demi de longueur, quand il s'en rencontre d'assez gros pour être de moule ou de compte, on en donne quatre *anneaux* & seize bûches pour la voie.

ANNÉE, f. f. (Astron.) est le tems que le soleil emploie à faire le tour du zodiaque pour ramener les saisons, sa véritable durée est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 48 secondes; mais le nom d'*année* a été donné à toutes sortes de périodes, servant à mesurer le tems, année solaire, année lunaire, année de Saturne, de Jupiter, &c. Voyez RÉVOLUTION & PÉRIODE.

Il paroît que les jours furent d'abord la seule manière de compter; du moins on explique d'une manière satisfaisante les 450 mille *années* dont se vantaient les babyloniens suivant Cicéron & Diodore; cela s'accorde avec les *années* dont parloit Calisthènes suivant Simplicius. Voyez M. Bailly, *hist. de l'Astron.* p. 373.

Le mois lunaire étant très-remarquable pour tous les yeux, fut la première période ou la première *année* chez presque tous les peuples du monde. Voyez Diodore, l. 1, p. 30, édition 1745; Varron, suivant Lactance, inst. l. 2, c. 13; Plin. l. viij, ch. 49; Plutarque dans la vie de Numa, p. 72, édit. 1624; Eudoxe suivant Platon dans son *Timée*, p. 31 de l'édition de 1602; Stobée Eclogae phys. p. 21, édit.

édit. de 1609; *Geminus*, p. 34, édition du P. Petz, 1630; *Suidas au mot ἡνέμω*, tom. II, p. 54, édition de Cambridge, 1605.

Dans la suite, on vit qu'il y avoit douze mois lunaires ou douze changements des phases de la lune d'un hiver à l'autre, & on forma l'année lunaire. Ces variétés du cours de la lune étant plus fréquentes & par conséquent mieux connues aux hommes que celles de toutes les autres planètes, les romains réglèrent leurs années par la lune jusques au tems de Jules César. Voy. CALENDRIER, LUNE.

Les juifs avoient aussi leur mois lunaire. Quelques rabbins disent que le mois lunaire ne commençoit pas au premier moment où la lune paroissoit, mais qu'il y avoit une loi qui obligeoit la première personne qui la verroit paroître d'en aller avertir le sanhedrin : sur quoi le président du sanhedrin prononçoit solennellement que le mois étoit commencé, & on en donnoit avis au peuple par des feux qu'on allumoit au haut des montagnes; les arabes ne comptent encore leur année que quand ils ont vu paroître la lune.

On distingua aussi les tems par saisons, & voilà pourquoi l'on trouve des années de trois mois, de quatre mois, de six mois; *Diodore*, *ibid.* *Plin.*, *ibid.* *Confortinus*, ch. 19; *S. Augustin*, de civitate Dei, l. 12, c. 10 : mais il réfute ceux qui prétendent que la division de quatre mois étoit sur-tout naturelle en Egypte, où l'inondation faisoit abandonner les terres pendant quatre mois, où il y avoit quatre mois de fécondation & quatre mois sans culture. Le P. Kircher prétend même qu'outre l'année solaire quelques provinces d'Egypte avoient des années lunaires, & que dans les années les plus reculées, quelques-uns des peuples de ces provinces prenoient une seule révolution de la lune pour une année; que d'autres trouvant cet intervalle trop court, faisoient l'année de deux mois, d'autres de trois, &c. *Ædip. Egypt.* tom. II, p. 252.

Un auteur de ces derniers tems assure que Varron a attribué à toutes les nations ce que nous venons d'attribuer aux égyptiens, & il ajoute que Laetance le relève à ce sujet.

Nous ne savons pas sur quels endroits de Varron & de Laetance cet auteur se fonde; tout ce que nous pouvons assurer, c'est que Laetance, *divin. instit.* lib. II, cap. xij. en parlant de l'opinion de Varron suppose qu'il parle seulement des égyptiens.

Au reste Saint-Augustin, *de civit. Dei*, lib. XV, cap. xiv, fait voir que les années des patriarches rapportées dans l'Ecriture, sont les mêmes que les nôtres; & qu'il n'est pas vrai, comme beaucoup de gens le se sont imaginés, que dix de ces années n'en valaient qu'une d'à-présent.

Les habitants de l'île de Taïti, découverte depuis quelques années, comptent par lunes de 29 jours, & 13 lunes font une année; ils désignent chaque mois par un nom propre, & les 13 mois par un *Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.*

nom collectif, mais dont ils ne se servent qu'en parlant des mystères de leur religion. Le jour est divisé en 12 parties, dont six pour la nuit, ce qui est une suite naturelle des 12 lunes qui se trouvent dans une année solaire; cependant ils comptent par 10 dans l'usage de la numération ordinaire. *Hydrographie de la mer du sud*, par M. de Freville, 1774, tom. 1, pag. 451.

Indépendamment de la variété des saisons qui suivoient la période du soleil, les peuples Pasteurs virent bientôt que les étoiles se levoient & se couchaient deux heures plutôt à chaque mois, & qu'au bout d'environ 12 mois, elles paroissent & disparaissent à la même heure; ils comprirent alors que le soleil tournoit en douze lunes ou en douze mois, & parcourait tout le ciel. Alors on examina les étoiles, dont il s'approchoit successivement; l'on en forma douze grandes divisions, qui formèrent les douze signes du zodiaque. Cette invention parut une découverte admirable, & on la chanta avec enthousiasme. On en fit des travaux du dieu Hercule, les voyages de Bacchus, tels qu'ils sont dans le poème des Dyonisiâques, de Nonnus, & une quantité d'autres fables, ainsi que la fait voir M. Dupuis, professeur de rhétorique en l'Université de Paris, dans le Journal des Savans de 1779, & dans un mémoire qui fait partie du quatrième volume de mon *Astronomie*. Chaque signe se partageoit en trois parties, qu'on appelloit Decans, parce qu'elles contenoient environ dix jours; les dix doigts de la main déterminèrent de toute ancienneté la division par dix, & voilà peut-être pourquoi l'on fit d'abord les années de 360 jours.

Il est constant, par le témoignage des anciens, que les années comptées en Egypte, depuis l'origine de la monarchie, n'étoient pas de 12 mois; mais que l'année fut augmentée par plusieurs rois. Voyez *Diodore de Sic.* liv. 1, pag. 22, édit. Hanov. 1604; *Plin.*, l. 7, c. 48; *Plut.* in Numa. *Confortinus*, corrigé par Saumaise, in *Solin.* *S. August.* de civ. Dei, l. 12, c. 11, & l. 15, c. 12; *Riccioli chron. ref.* p. 31.

Il y a des auteurs qui pensent que du tems de Moïse l'année n'avoit encore que 360 jours; ils se fondent sur le calcul que donne la Genèse de la durée du déluge, où il paroît que l'année dont l'hisloire fait usage, est de douze mois, chacun de 30 jours; il ne dit rien qui puisse faire supposer qu'on connût alors la nécessité d'ajouter quelques jours aux 360 que donnent douze mois de 30 jours chacun pour égaler la durée de l'année civile à la révolution du soleil. En effet, dit M. Goguet, on lit, *Gen.* ch. 7, v. 11 & 24, & ch. 8, v. 3 & 4, selon l'hébreu, que le déluge commença le 17^e jour du second mois, l'an 600 de Noé; que les eaux s'accrurent & se firent ensuite au même degré d'élevation pendant 150 jours consécutifs, jusqu'au dix-septième du septième mois. Ainsi les cinq mois de l'année valoient 150

jours : ces mois étoient donc de 30 jours chacun, & l'année entière de 360 jours.

On ajoute à cela le témoignage des auteurs, qui disent que la plupart des nations de l'antiquité, même les plus éclairées, n'ont connu pendant bien des siècles d'autre année que celle de 360 jours. Voyez la dissert. de M. Allin, insérée dans la théorie de la terre de Wiston, t. 2, p. 144, édit. de Londres, 1737.

On croit sur-tout que l'année des égyptiens étoit autrefois de 360 jours : on peut voir à ce sujet *Plutarque de l'Isle*, *Diodore de Sicile*, *Scaliger*, *Kircher*, *Goliut sur Alfragan*, *M. Goguet, origine des loix, des arts & des sciences*, tom. 1, p. 220, 230, t. 2, p. 254, in-4°.

L'enceinte de Babylone avoit 360 stades; elle avoit été bâtie en un an, un stade chaque jour. Les prêtres astronomes de Memphis étoient au nombre de 360, & chacun observoit un jour de l'année: enfin la division du cercle en 360°, en fournit une indication bien ancienne; mais ne pourroit-on pas dire que les 360 jours formoient douze mois, & que les cinq derniers jours additionnels ou épagomènes, étant hors de rang, on n'en tenoit pas compte dans certaines circonstances, quoiqu'on les connût très-bien. Ne voit-on pas que même du tems de Ptolémée, cent ans après l'ère vulgaire, on comptoit tous les mois de 30 jours, quoique l'année en eût 365? J'ai peine à concevoir qu'on ait été long-tems à se tromper. Je cinq jours sur la durée de l'année, aussi-tôt qu'on eut observé les levers héliaques des différentes étoiles, du moins les égyptiens faisoient monter jusqu'à une antiquité fautive l'origine de l'année de 365 jours; c'étoit mercure qui avoit joué aux dez avec la lune; *Plutarque*, t. 2, p. 355, édition de Paris, 1624; *Diodore*, l. 1, p. 17, édition de 1745.

Le Syncelle (p. 123, édit. de Paris, 1612), dit qu'un roi d'Égypte, nommé Aferh, avoit réglé l'année égyptienne à 365 jours, & qu'avant lui elle n'avoit eu que 360 jours; mais on ne peut savoir en quel tems vivoit Aferh.

Neuton, dans sa chronologie, prétend que l'année de 365 jours fut établie en Égypte sous le règne d'Aménophis, 884 ans avant la naissance de J. C., 72 ans après la mort de Scéfolris; que c'étoit en mémoire de cet établissement que l'on avoit placé dans le *Mémorial* un cercle d'or de 365 coupées de tour, dont chacune répondoit à un jour de l'année, & pour tous les jours étoient marqués les levers des étoiles, suivant *Diodore*, de Sicile, l. 1, p. 30.

Mais *Freret*, qui a si bien réfuté le système chronologique de Neuton, soutient que Osimandès ou Osimandias, roi de Thèbes, dont le tombeau étoit environné par le cercle dont il s'agit, étoit plus ancien que Scéfolris. (*Défense de la chronologie*, pag. 387) Il fait Scéfolris contemporain de Moïse 1590 ans avant J. C. (*Ib.* p. 247.)

M. Goguet (t. 2, p. 255), eslime qu'Osimandès vivoit vers le tems de la guerre de Troie, 1284 ans avant J. C. Il y a donc apparence qu'à cette époque on avoit déjà fait l'année de 365 jours; mais on fut ensuite bien long-tems avant de penser à y ajouter un quart de jour, & avant de reconnaître l'erreur de six heures : c'est ce que je vais discuter en faisant voir que plusieurs auteurs se sont trompés sur l'époque de cette découverte.

Le Syncelle nous dit que l'ancienne chronique égyptienne comptoit 36525 ans depuis le règne du soleil jusqu'à celui d'Alexandre. Les égyptiens attribuoient à mercure 36525 années, & il est sûr qu'ils attachoient quelques significations cachées à ce nombre. (*Freret*, p. 230) M. Dupuy pense que cela signifioit 365 & un quart, exprimés en décimales, & cela supposeroit la connoissance du quart de jour; mais on ne peut pas savoir à quelle époque remontoit la fable des 36525 ans. Le Syncelle dit que ce nombre marquoit les années de la révolution des étoiles par rapport aux équinoxes; mais, comme cet auteur étoit fort ignorant en Astronomie, il n'est pas étonnant qu'il se soit trompé sur cet article; quoi qu'il en soit, ce nombre mystérieux ne prouve pas qu'on connût le quart de jour, ou le cycle caniculaire, seulement 600 ans avant J. C.

Le cycle caniculaire de 1460 ans, ou la période Sothiaque, qui ramenoit les levers d'étoiles aux mêmes saisons de l'année, indique bien la connoissance du quart de jour; mais ce cycle ne me paroît pas avoir été connu à la haute antiquité.

M. de la Nauze, qui a donné une histoire du calendrier égyptien dans les mémoires de l'Académie royale des inscriptions & belles-lettres (tom. xiv, pag. 334), fixe cette découverte à l'année 1322, qui est celle où le lever de Sirius concouroit avec le premier jour du mois thoth, & qui fut la première année du cycle caniculaire ou de la période Sothiaque, dont les années sont employées par *Conforinus*; mais il a déjà été réfuté par M. Dupuy, de l'Académie des inscriptions, dans le tome xxix de la même Académie.

M. *Freret* (*défense de la chronologie*, p. 400), est du même avis que M. de la Nauze. Il va même plus loin; & trouvant des indices du cycle précédent qui avoit dû commencer 2782 ans avant J. C., il pense que le cycle qui avoit commencé l'an 1322 n'étoit pas le plus ancien, ni celui au commencement duquel on avoit établi l'usage de l'année vague de 365 jours. Mais de ce que *Manethon*, *Conforinus*, *Clement d'Alexandrie* se servent de ce cycle, il ne s'ensuit pas qu'on le connût déjà 1322 ans avant J. C.; & quant aux inductions que M. *Freret* tire des livres de Moïse, elles prouveroient tout au plus que l'usage de l'année de 365 jours avoit lieu au tems de Moïse, né selon lui l'an 1589. Les juifs avoient une année civile ancienne, qui commençoit en automne comme celle des égyptiens, & une année

religieuse depuis l'exode ; celle-ci commençoit à la nouvelle lune, qui précédoit l'équinoxe du printemps. Mais les équinoxes, les solstices, le lever de sirius, étoient des choses assez faciles à observer pour qu'on en ait fait des époques. Cela ne prouve pas qu'on connût déjà la durée de l'année à quelques heures près, & qu'on connût la différence de l'année vague de 365 jours & de l'année syddrale de 365 jours & un quart.

L'année vague étoit l'année religieuse qui servoit à régler les fêtes & les sacrifices. L'année civile régloit la culture des terres & le paiement des impôts. (*Vettius valens Anthol. liv. 1.*) Le commencement en étoit marqué par le lever héliaque de sothis ou sirius. (*Porphyrus de antro nymphaeum, Bainbrigis de anno caniculari, ch. 4, pag. 26, M. Freret, pag. 393.*) Mais on ignore à quelle époque la différence de ces deux années a été connue. Les auteurs, d'après lesquels on fait remonter aussi haut la découverte du cycle caniculaire, font des auteurs de deux ou trois cents ans avant Jésus-Christ, qui s'en servoient dans leurs calculs, qui ne disent point qu'on s'en fût servi à l'époque à laquelle ils remontent par le calcul. Suivant M. Dupuy dans les mémoires de l'Académie des inscriptions, tom. xix, p. 114, il est douteux que même au tems d'Hérodote, 450 ans avant J. C., on connût d'autre année que celle de 365 jours, & qu'on sût en Egypte la différence de l'année fixe à l'année vague, qui est d'environ six heures. On voit dans Hérodote, l. 1, que Solon donnoit 30 jours à chaque mois, & qu'il croyoit qu'en intercalant un mois tous les deux ans, on assignoit des limites au retour des saisons. Cependant il y avoit neuf jours & trois quart de trop dans cette méthode, connue sous le nom de Trietide. On voit aussi dans Hérodote qu'il ignoroit le quart de jour, dont l'année surpasse l'année vague. (*l. 2, p. 57, édit. Henr. St. 1570.*) Ce n'est que Geminus qui vivoit du tems de Cicéron, & Censorinus l'an 238, qui parlent du cycle caniculaire de 1461 années vagues. Les égyptiens croyoient qu'ils faisoient 1460 années, tant tropiques que syddrales, & que cette période devoit ramener le commencement de leur année civile au lever de la canicule, où ils avoient fixé le commencement de leur année tropique, suivant Censorinus; mais il y avoit une erreur de 36 ans ou de 47 pour cette grande année sothiaque; & 36 ans pour les levers des étoiles, & 47 pour les saisons. L'année tropique avoit environ 20 jours d'avance sur l'année syddrale à la fin de leur prétendue période caniculaire de 1461 années égyptiennes, civiles ou vagues; car en divisant 365 jours par 5^h 48' 48" & par 6^h 9' 10", on trouve 1506,9 & 1423,7 pour les deux périodes; c'est-à-dire, 47 ans de plus pour l'une, & 36 de moins pour l'autre; ainsi, dans le tems même où l'on faisoit usage du cycle caniculaire, on en connoissoit fort mal la durée, ce qui n'annonce pas une haute antiquité pour la découverte du quart de

jour. Geminus (p. 19), cite Eratosthène comme ayant donné raison du cycle de 1460 ans: on connoissoit donc alors le quart de jour; ainsi, c'est vers le tems de Platon, 80 ans après Hérodote, ou 370 ans avant J. C. qu'on a été certain de cette différence. M. Freret dans la défense de la chronologie, p. 247 & 400, entreprend de prouver que 2780 ans avant l'ère vulgaire, les égyptiens connoissoient déjà la période sothiaque. M. Bailly, dans son Histoire de l'Astronomie, dit aussi que Manethon donne lieu de croire que la période sothiaque romontoit à 2782 ans; & il regarde l'observation de quart de jour comme prouvant dans les observations la plus haute antiquité; mais c'est parce que Manethon, 280 ans avant J. C. s'en étoit servi pour calculer son histoire d'Egypte; c'est comme si l'on vouloit prouver que Jules César avoit reformé le calendrier il y a 6000 ans, parce que nous comptons les années de la création du monde sur le calendrier Julien. Il n'y a pour le quart de jour aucune autorité, puisque les auteurs les plus anciens & les plus instruits, comme Platon & Hérodote, n'en parlent point.

Ainsi, du tems même de Platon, on ne connoissoit ni le quart du jour, ni la période caniculaire. Avant le tems d'Hipparque, il étoit très-difficile de déterminer la durée de l'année, parce qu'on n'observoit point les équinoxes, mais seulement les solstices qui sont très-difficiles à observer exactement. Pour le prouver, je remarque 1.^o que Ptolémée ne put trouver d'équinoxes plus anciens que ceux d'Hipparque pour les comparer avec les siens. 2.^o Que Hipparque, dans un passage cité par Ptolémée, se sert d'un solstice plus ancien. 3.^o Que Ptolémée lui-même se sert d'un solstice. 4.^o Que l'usage des gnomons étoit beaucoup plus ancien que celui des armilles, parce qu'il étoit plus naturel & plus simple; or, les gnomons donnoient facilement & directement les solstices; ainsi il est évident qu'on a dû se borner long-tems à l'observation des solstices, mais ils n'étoient pas susceptibles de précision.

Voilà pourquoi l'on ignora jusqu'au tems d'Hipparque, la diminution de quelques minutes qu'il y avoit à faire au quart de jour. Il paroît donc qu'environ 300 ans avant l'ère chrétienne, on croyoit l'année de 365 jours & un quart. Meton la crut même un peu plus grande; nous ignorons sur quel fondement. Ce furent les observations faites à Alexandrie qui commencèrent à donner le goût de la précision, & Hipparque vers l'an 130 avant l'ère vulgaire, s'aperçut qu'il y avoit quelque chose à ôter du quart de jour; ainsi, la plus ancienne détermination que l'on ait de la durée de l'année est celle d'Hipparque, rapportée dans l'almageste de Ptolémée. (*Lib. 3, c. 2.*) Dans un livre fait exprès sur la grandeur de l'année, Hipparque compare un solstice observé par Ariflarque 280 ans avant l'ère vulgaire avec celui qu'il avoit observé lui-même après une intervalle de 145 ans, & il

trouva qu'il étoit arrivé douze heures plutôt que ne l'avoit exigé le quart de jour. Dans un autre livre sur les mois & les jours intercalaires, il parloit de la durée de l'année qui étoit, suivant Meton & Eusebion, de 365 $\frac{1}{4}$ jours & quelques choses de plus, & il disoit: « nous avons trouvé le même nombre qu'eux pour les mois solaires, » contenu dans 19 ans; mais nous avons trouvé que l'année antérieure de la trois-centième partie d'un jour. Suivant Meton il manque cinq jours en 300 ans; suivant Calippus c'est un jour seulement. J'ai écrit (ajoute Hipparque) sur la durée de l'année, un livre où je démontre que l'année solaire, c'est-à-dire le tems dans lequel le soleil revient au solstice ou à l'équinoxe, ne contient pas 365 jours & un quart, comme l'estiment les mathématiciens, mais qu'il s'en faut la trois-centième partie d'un jour. Ptolémée ajoute; si nous partageons un jour en 300 parties, nous trouverons 12 parties sexagésimales secondes, qui étant ôtées de 365 jours, & 15 parties premières, il restera pour la durée de l'année 365. 14. 48.

Cette même quantité réduite en heures, minutes, secondes, suivant notre manière de compter, fait 365 jours 5^h 55' 12"; ainsi, Hipparque diminua l'année de 4' 48", mais il y avoit encore 6' 24" d'erreur dans sa détermination. Cependant Ptolémée dit que c'est aussi à très-peu-près ce qu'il a trouvé par beaucoup d'observations; mais il paroît que Ptolémée se servoit des observations d'Hipparque & de ses résultats, en sorte que la détermination précédente tire toute sa valeur de l'autorité d'Hipparque. On voit que la raison pour laquelle Ptolémée admit la durée de l'année d'après Hipparque, est qu'elle étoit commensurable avec le cycle lunaire de Meton; mais, comme celui-ci étoit trop long, l'année se trouva aussi trop longue de six minutes. Ptolémée rempli de respect & d'admiration pour Hipparque, & se déchant de lui-même, comme le dit Boulliaud, (*Astron. philol.*, p. 73), ne crut pas pouvoir mieux faire que de s'en tenir aux déterminations d'Hipparque; mais pouvoit-il faire semblant de les avoir trouvées par ses propres observations; c'est un reproche qu'on lui fera dans tous les tems, comme d'avoir changé les tems des observations pour les faire accorder avec ses hypothèses.

On ne connut pendant plusieurs siècles d'autre Astronomie que celle de Ptolémée, n'ayant détermination de l'année que celle dont nous venons de parler. Mais enfin les Arabes furent à portée de reconnaître l'erreur, lorsqu'ils comparèrent leurs observations avec celles d'Hipparque; aussi dans Alhazeni, qui vivoit en 820, on ne trouve plus que 365 jours 5^h 46' 24"; & dans les tables alphonines 5^h 49' 16", ce qui approche beaucoup de ce que nous trouvons actuellement; c'est celle-ci qui fut adoptée par Copernic & par les réformateurs du calendrier sous Grégoire XIII, en 1582. (*Voyez* Clavius, *Roman calendar explicatus*, p. 63,

édit. 1612, in-folio). Mais, comme il n'y a pas une demi-minute de trop; le calendrier grégorien n'en n'est pas moins très-exact relativement aux usages de la société, c'est-à-dire propre à ramener les saisons aux mêmes jours des mois.

Dans le livre de Copernic qui parut en 1543, la durée moyenne de l'année est de 365^h 5^h 49' 16".

Tycho, dans ses pygmismes, p. 53, 365^h 5^h 48' 45".

Kepler dans ses Tables rudolphines, 365^h 5^h 48' 57".

Boulliaud, dans son Astronomie philolaïque, 365^h 5^h 49' 4".

Riccioli, dans son Almageste, tom. 1, p. 139, 365^h 5^h 48' 40". dans son Astronomie réformée, 48".

Flamsteed & Newton ont supposé la longueur de l'année 365^h 5^h 48' 57".

M. le Monnier, *infinum. Astronom.* p. 469, 365^h 5^h 48' 57".

M. Halley, dans ses Tables astronomiques, 365^h 5^h 48' 54".

M. Cassini, dans ses tables, 365^h 5^h 48' 52".

M. Mayer, (*Mém. de Göttingen*, tom. III), 365^h 5^h 48' 51".

M. de la Caille, dans ses tables (*Mém. Acad.* 1757, p. 140), 365^h 5^h 48' 49".

Enfin dans un grand Mémoire qui a remporté le prix de l'Académie de Copenhague en 1781, & qui sera imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, j'ai discuté avec le plus grand soin les neuf équinoxes observés par Hipparque, qui m'ont donné 48"; les 22 équinoxes observés par Tycho-Brahé qui m'ont donné 46"; enfin 50 observations de Flamsteed, faites en 1689, 1690 & 1691, 56 observations de Mayer, & 56 observations faites par M. Dagelet à l'école militaire en 1780, elles m'ont donné 50"; ainsi, le milieu est encore 48", ce qui prouve incontestablement que la durée de l'année solaire est réellement de 365^h 5^h 48' 48".

Ainsi, les observations d'Hipparque faites il y a près de deux mille ans, celles de Tycho-Brahé faites il y a deux cents ans, & celles du dernier siècle s'accordent également sur la durée de l'année solaire. Il n'y a que les observations de Ptolémée qui s'en écartent, mais il est prouvé qu'elles sont défectueuses ou supposées, & qu'il faut les rejeter.

Dans le tems où l'on admettoit les observations de Ptolémée, on étoit tenté de croire que la durée de l'année étoit devenue plus petite, c'est-à-dire, que la terre accéléroit son mouvement autour du soleil; M. Euler, dans ses tables du soleil, admettoit cette diminution de l'année. Cette accélération de la terre donnoit déjà lieu à une funeste conséquence pour l'humanité, en nous annonçant précieusement & le tems & la manière dont elle doit finir; en effet, si la terre accélère ainsi son mouvement, c'est une preuve certaine qu'elle éprouve une résistance de la part de l'éther ou

de la matière subtile qui remplit l'univers, ne fut-ce que celle de la lumière. L'idée la plus naturelle que l'on puisse se former de cette résistance, c'est qu'elle diminue la vitesse de projection ; or la force centripète dans une orbite donnée est comme le carré de la vitesse ; donc si la vitesse diminue, la force centrale prévaudra ; la planète se rapprochera du centre ; son orbite deviendra moindre ; elle fera donc parcourir dans un tems plus court, parce que les durées des révolutions diminuent comme les racines carrées des cubes des distances, ainsi on observera une accélération continue dans son mouvement.

Cette cause ayant commencé d'agir une fois, elle agira toujours ; la distance de la terre au soleil ne cesseroit de diminuer, parce que la vitesse éprouveroit toujours une nouvelle résistance, l'effet deviendroit même de plus en plus considérable, à mesure que la terre approcheroit du centre, parce que la densité de la lumière & la force centrale augmentent l'une & l'autre, comme le carré de la distance diminue. C'est ainsi que la terre descendroit par degrés jusqu'au soleil pour y être absorbée & détruite. Il seroit peut-être même possible de calculer le tems de ce grand événement ; aussi que l'on reconnoîtroit par les observations le retardement qu'a éprouvé la terre depuis environ deux mille ans ; & l'on verroit un jour les planètes inférieures, mercure & venus, disparaître successivement à nos yeux, se perdre dans le soleil & nous marquer le tems de notre fin ; mais j'écartai bientôt de si tristes pressages en faisant voir qu'il falloit rejeter les observations de Ptolémée, & qu'il n'y avoit aucune preuve d'accélération dans le mouvement de la terre. (*Mém. de l'Ac. 1737, p. 413*).

L'année solaire dont nous venons de voir la durée exacte par les observations astronomiques est l'année tropique ou le tems qui s'écoule entre deux équinoxes de printemps ou d'automne ; on la nomme *année tropique*, parce qu'il faut que cet intervalle de tems s'écoule pour que chaque saison se rétablisse dans le même ordre qu'auparavant : cette année est de 365 jours 5 heures 48 minutes 48 secondes.

L'année *sidérale* est l'espace de tems que le soleil met à faire sa révolution apparente autour de la terre, & à revenir à la même étoile, ou plutôt, c'est le tems que la terre met à revenir au même point du ciel. Ce tems est de 365 jours 6 heures 9 minutes 11 secondes & demi. La raison de la différence entre l'année solaire tropique & l'année sidérale, vient de ce que l'équinoxe, ou la section de l'écliptique & de l'équateur retrograde de 50 secondes & un quart par an, le soleil, après qu'il est parti d'un équinoxe, doit paroltre rencontrer ce même équinoxe l'année suivante dans un point un peu en-deça de celui où il l'a quitté ; & par conséquent le soleil n'aura pas encore achevé sa révolution entière lorsqu'il fera de retour aux mêmes points des équinoxes.

ANNÉE civile est celle que l'on compose d'un nombre de jours à-peu-près égal à celui de l'année solaire ; elle est chez nous de 365 jours, & quelquefois de 366.

L'année civile des Egyptiens étoit de 365 jours, comme nous l'avons expliqué ; c'étoit une année vague divisée en 12 mois, dont voici les noms : *thoth, phaoth, athyr, kiak, tybi, mechi, phamenoth, pharmouth, pakon, puyti, epiphi, mesori*, & cinq jours épagomènes. Ptolémée, dans son *Almageste*, compte des années égyptiennes depuis l'ère de Nabonassar, qui se rapporte au 26 février 746 avant J. C., suivant la méthode des Astronomes, ou 747, suivant la méthode des Chronologistes ; en sorte que le premier du mois thuth avançoit d'un jour tous les 4 ans, & l'année 748 de Nabonassar tombe au 23 août de l'année zéro de notre ère, ou de celle qui sépare les années avant J. C. des années après J. C.

Lorsque les Egyptiens furent subjugués par les Romains, ils recurent l'année *Julienne*, dont nous parlerons bientôt, mais avec quelqu'altération ; car ils retinrent leurs anciens noms de mois avec les cinq jours épagomènes, & ils placèrent le jour intercalé tous les quatre ans, entre le 28 & le 29 d'août.

Le commencement de leur année répondoit au 29 août de l'année *Julienne*. Leur année réformée de cette manière, s'appelloit *annus Acliacus*, à cause qu'elle avoit été instituée après la bataille d'Aclium, 32 ans avant J. C.

L'année *Ethiopique* est une année solaire qui s'accorde parfaitement avec l'Acliaque, excepté dans les noms des mois. Son commencement répond à celui de l'année Egyptienne, c'est-à-dire, suivant quelques Auteurs, au 29 d'avril de l'année *Julienne* ; mais je crois que c'est plutôt au 29 d'août.

Les mois de cette année sont, 1.^o *masaram*, 2.^o *tykympl*, 3.^o *hydar*, 4.^o *tyshas*, 5.^o *tyr*, 6.^o *jacaul*, 7.^o *maganbit*, 8.^o *mijaria*, 9.^o *garibal*, 10.^o *syne*, 11.^o *hamle*, 12.^o *hahafe*, & il y a de plus cinq jours intercalaires.

L'année *Grecque* étoit lunaire, & composée de douze mois, qui étoient d'abord tous de 30 jours, & qui furent ensuite alternativement de 30 & de 29 jours ; les mois commencent avec la première apparence de la nouvelle lune, & à chaque 3.^o, 5.^o, 8.^o, 11.^o, 14.^o, 16.^o, & 17.^o année du cycle de 19 ans, on ajoutoit un mois embolismique de trente jours, afin que les nouvelles & pleines lunes revinssent aux mêmes termes ou saisons de l'année. Voyez CYCLE LUNAIRE.

L'année *Grecque* commençoit à la première pleine lune d'après le solstice d'été. L'ordre de leurs mois étoit, 1.^o *hecatomburon*, de 29 jours ; 2.^o *metagaiton*, de 30 jours ; 3.^o *boedromion*, de 29 jours ; 4.^o *metacterion*, de 30 jours ; 5.^o *pyanepsion*, de 29 jours ; 6.^o *posideon*, de 30 jours ; 7.^o *gamelion*, de 29 jours ; 8.^o *anthestion*, de 30 jours ; 9.^o *elaphebolon*, de 29 jours ; 10.^o *manichion*, de

30 jours; 11.^e *thargelson*, de 29 jours; 12.^e *seiphorion*, de 30 jours.

Cette année étoit particulièrement nommée l'année *Attique*; & le mois intercalaire ou embolismique se plaçoit après *posideon*, ou le sixième mois, il étoit appelé *posideon 2*, ou second *posideon*.

Les Macédoniens avoient donné d'autres noms à leurs mois, ainsi que les Syro-Macédoniens, les Smyrniens, les Tyriens, les peuples de Chypre, les Phaphiens, les Bithyniens, &c.

L'ancienne année Macédonienne étoit une année lunaire, qui ne différoit de la Grecque que par le nom & l'ordre des mois. Le premier mois Macédonien répondoit au mois memachion, ou quatrième mois attique; voici l'ordre, la durée & les noms de ces mois Macédoniens: 1.^o *panemus*, de 29 jours; 2.^o *laous* de 30 jours; 3.^o *gorpiæus*, de 29 jours; 4.^o *hyperbetæus*, de 30 jours; 5.^o *dius*, de 29 jours; 6.^o *apellæus* de 30 jours; 7.^o *audynæus*, de 29 jours; 8.^o *perilus*, de 30 jours; 9.^o *dystrus*, de 29 jours; 10.^o *xanticus*, de 30 jours; 11.^o *artemius*, de 29 jours; 12.^o *dafius*, de 30 jours.

La nouvelle année Macédonienne est une année solaire, dont le commencement est fixé au premier de Janvier de l'année Julienne, avec laquelle elle s'accorde parfaitement.

L'année des Juifs étoit une année lunaire composée ordinairement de 12 mois alternativement de 30 & de 29 jours. On la faisoit répondre à l'année solaire, en ajoutant à la fin 11 & quelquefois 12 jours, ou en insérant un mois embolismique.

Voici les noms & la durée de ces mois: 1.^o *nisan* ou *abis*, 30 jours; 2.^o *jiar* ou *zius*, 29; 3.^o *siban* ou *siyan*, 30; 4.^o *thamuz* ou *tamuz*, 29; 5.^o *ab*, 30; 6.^o *elul*, 29; 7.^o *etfi* ou *ethanim*, 30; 8.^o *marthesvan* ou *bul*, 29; 9.^o *cisteu*, 30; 10.^o *thebeth*, 29; 11.^o *fabat* ou *schebeth*, 30; 12.^o *adar*, dans les années embolismiques, 30 jours; *adar* dans les années communes étoit de 29.

L'année Juive moderne est pareillement une année lunaire de 12 mois dans les années communes, & de 13 dans les années embolismiques, lesquelles sont la 3.^e, la 6.^e, 8.^e, 11.^e, 14.^e, 17.^e & 19.^e du cycle de 19 ans. Le commencement de cette année civile des Juifs est fixé à la nouvelle lune la plus voisine de l'équinoxe d'automne. En 1779, elle a commencé le 11 septembre; en 1780 le 7 septembre.

Les noms des mois & leur durée sont, 1.^o *etfi*, 30 jours; 2.^o *marthesvan*, 29; 3.^o *cisteu*, 30; 4.^o *tebeth*, 29; 5.^o *schebeth*, 30; 6.^o *adar*, 29; 7.^o *veadar*, dans les années embolismiques, 30; 8.^o *nisan*, 30; 9.^o *jiar*, 29; 10.^o *siyan*, 29; 11.^o *thamuz*, 29; 12.^o *ab*, 30; 13.^o *elul*, 29.

Selon les Juifs, l'année de la création du monde est la 959.^e de la période julienne, commençant au 7.^e d'octobre; & comme l'année de la naissance

de J. C. est la 4714.^e de la période julienne, il s'ensuit que J. C. est né l'an 3761 de l'ère des Juifs: c'est pourquoi si on ajoute 3761 à une année quelconque de l'ère chrétienne, on aura l'année Juive correspondante qui doit commencer en automne; l'en entendu qu'on regarde l'année Juive comme une année solaire; & elle peut être regardée comme telle en effet; à cause des années embolismiques, qui remettent à-peu-près de trois en trois ans le commencement de l'année Juive avec celui de l'année solaire.

L'année Sabbatique, chez les anciens Juifs, se disoit de chaque septième année. Durant cette année, les Juifs laissoient toujours reposer leurs terres.

Chaque septième année Sabbatique, c'est-à-dire chaque 49.^e année, étoit appelée l'année du *Jubilé*, & étoit célébrée avec une grande solennité.

ANNÉE des anciens Romains. Le Calendrier romain, qui est l'origine du nôtre, remonte à Romulus. Ce législateur, plus versé dans la guerre que dans les matières astronomiques, ne divisa l'année qu'en dix mois, qui étoient alternativement de trente-un & de trente jours: elle commençoit le premier de Mars; ainsi, les Romains supposoient qu'au moyen de cette distribution, l'année recommençoit toujours au printemps, s'imaginant que le soleil parcourait toutes les saisons dans l'espace de trois cents quatre jours; il s'en falloit soixante-un jours que cette année ne s'accordât avec la vraie année solaire. *Macrobe, Saturn. l. 1. : Solinus, memorab., page 1.*

Le premier mois, celui de mars, contenoit 31 jours; le second, celui d'avril, 30; 3.^e Mai, 31; 4.^e juin, 30; 5.^e quintilis ou juillet, 31; 6.^e sextilis (août), 30; 7.^e septembre, 30; 8.^e octobre, 31; 9.^e novembre, 30; 10.^e décembre, 30; le tout faisant 304 jours. Ainsi, cette année se trouvoit moindre de 50 jours que l'année lunaire réelle, & de 61 que l'année solaire.

De-là il résulteroit que le commencement de l'année de Romulus étoit vague, & ne répondoit à aucune saison fixe. Lorsqu'on appercevoit l'inconvénient d'une telle variation, l'on ajoutoit à l'année le nombre de jours nécessaires, pour que le premier mois répondît à-peu-près au même état du ciel: mais ces jours ajoutés n'étoient point partagés en mois. *Macrobe, lib. 1., cap. 12.*

Le calendrier de Romulus fut réformé par Numa. Voici de quelle manière Doon Clément, savant Bénédictin, auteur de la dernière édition de l'Art de vérifier les dates, explique cette réformation dans un manuscrit qu'il a bien voulu me confier. Numa voulant mettre l'année Romaine dans un ordre plus conforme aux révolutions des astres, prit pour modèle l'année dont se servoient la plupart des peuples de la Grèce, cependant il n'en suivit pas exactement les proportions.

Pour la distribuer en douze mois comme celle des Grecs, il ôta un jour de chacun des six mois

pairs de l'année de Romulus, & les joignant aux cinquante-un jours qu'il avoit à ajouter, il les divisa en deux nouveaux mois : janvier composé de 29 jours, & février de 28. Par cette distribution, non-seulement l'année, mais tous ses mois furent impairs, ce qu'on croyoit d'un présage heureux ; si on excepte le mois de février, qui étant destiné à des cérémonies lugubres, avoit un jour de moins, & contenoit le nombre funeste. (Censorin, c. 20 ; Macrob., liv. 1, c. 12 ; Plut. in Numa, p. 72 ; Ovid., liv. 1, Fast., v. 43.)

Le mois de janvier fut le premier mois de l'année, & ce mois a conservé la place que Numa lui assigna ; mais le mois de février destiné aux purifications, & consacré aux Dieux Manes, avoit été renvoyé par Numa à la fin des autres, & terminoit l'année.

Mais quelque conformité qu'eût cette année avec les révolutions de la lune, elle ne pouvoit suivre le cours du soleil & l'ordre des saisons. Les Grecs avoient remédié avec justesse à cet inconvénient ; & comme leur année réduite à 354 jours, étoit de onze jours six heures plus courte que la révolution tropique du soleil, & qu'à cause de la fraction de six heures, il n'étoit pas possible de faire chaque année une juste intercalation ; ils avoient établi que tous les huit ans on ajouteroit les 90 jours résultans des onze jours six heures qui manquoient à chacune de ces huit années lunaires. (Macrob., c. 12, Solin., c. 1), & leur année lunaire par les mois, devoit folaire par l'embolisme ; c'est le nom qu'ils donnoient à l'intercalation.

Numa sentit aussi la nécessité d'intercaler avec précision & avec ordre ; mais oubliant que, par préjugé pour le nombre pair, il avoit formé son année d'un jour de plus que celle des Grecs, il donna à ses intercalations le même nombre de jours que ce peuple leur avoit assigné, & elles ne différaient de l'embolisme que par l'arrangement. Il régla que l'intercalation le seroit tous les deux ans. La première année de son calendrier fut une année commune de 355 jours ; la deuxième une année intercalaire simple de 377 jours ; la troisième une année commune de 355 jours ; la quatrième une année intercalaire double de 378 jours, & ainsi successivement. Par ce moyen, l'année moyenne étoit d'un jour plus longue que l'année folaire. (Macrob., ibid. Censorin., c. 20. Plut. in Numa, p. 72.) Il suit de cette première institution de Numa que chaque année Romaine avançant d'un jour sur l'année astronomique, elle devoit enfin s'écarter de l'ordre des saisons, & faire successivement passer à l'été & à l'automne les mois affectés dans le principe au printemps & à l'hiver.

Nous venons de dire que les années Romaines étoient alternativement communes & intercalaires : l'année commune étoit composée de douze mois, & contenoit 355 jours, qui faisoient en quelque

forte la constitution fixe. L'année intercalaire simple contenoit 22 jours de plus, & l'année intercalaire double 23 jours de plus ; par conséquent elle avoit un treizième mois nommé *intercalarius* par les Latins, & *merkedonius* par Plutarque.

Enfin, l'endroit que Numa désigna pour mettre l'intercalation fut entre le 23 & le 24 de février, c'est-à-dire après la fête des *terminales* & avant le *réfuge* ; & quand on intercaloit, on ôtoit au mois de février les cinq derniers jours, & on les ajoutoit au mois intercalaire. (Varo, de L. Lat., lib. 5, p. 32. Macrob., c. 12.) C'est dans ce sens que le Jurisconsulte Celsus (in leg. 98, §. 2 de verb. signif.), dit que le mois intercalaire étoit composé de 28 jours : il les contenoit en effet quand l'intercalation étoit double.

On trouve dans Tite-Live (liv. 1, chap. 19), que Numa, dès les premiers jours de son règne, se bâta de faire ses institutions politiques & religieuses, & que la première de toutes fut la réformation du Calendrier. Plutarque (Quæst. Rom., p. 268) & Ovide (liv. 1, f. v. 160), disent que Numa, en réformant le calendrier, mit le commencement de l'année au solstice d'hiver, & comme les anciens plaçoient les points cardinaux au 8^e degré des signes, & que le soleil au tems de Numa entroit dans le capricorne du 19 au 30 décembre, en remontant suivant le calendrier julien ; il suit de-là que la 1^{re} année du calendrier de Numa doit être rapportée au 6 janvier julien de l'an 41 de Rome avant J. C. 713 ; mais elle s'en sépara bientôt, par la raison que l'année romaine moyenne avançoit d'un jour sur l'année tropique, & elle s'éloignoit toujours du solstice jusqu'au moment que ce prince l'arrêta par les nouvelles mesures dont nous allons parler.

Numa s'étant aperçu de ce vice & de la progression successive de son année sur le cours du soleil, voulut y remédier : pour cet effet, il divisa les tems en périodes de 24 années, il ordonna, (Macrob., lib. 1. Saturn., c. 13), que dans les huit dernières années de chaque période, au lieu d'intercaler 90 jours, on n'en intercaleroit que 66, & il crut par ce moyen remédier au défaut de son calendrier.

L'époque de ce changement dans l'ordre des intercalations est de l'an 76 de Rome, avant J. C. 678, 37^e du règne de Numa ; cette année auroit dû recevoir une intercalation de 23 jours, mais elle n'en eut qu'une de 22 ; & l'an 80, qui devoit également avoir une intercalation de 23 jours, n'en eut point. Ainsi il ne supprima, dans l'espace de 40 ans qu'il y eut depuis l'établissement de son calendrier jusqu'à la fin de l'an 80 de Rome, que 24 jours, au lieu qu'il auroit dû en supprimer 40, attendu que l'année romaine moyenne, comme nous l'avons déjà remarqué, avançoit d'un jour chaque année sur le cours du soleil ; par conséquent il laissa seize jours de trop, puisque l'an 81 de Rome, le 1^{er} janvier romain concourut

avec le 22 janvier julien, au lieu de concourir avec le 6 de ce mois; & cette année 81 est la première d'un cycle, mais comme on trouve en remontant que l'an 47 de Rome, avant J. C. 697, a commencé aussi le 22 janvier julien, c'est cette année 5^{te} où nous plaçons le premier cycle, & qui est le point fixe d'où partit chaque nouveau cycle, & où l'année revint à la fin de chaque révolution de 24 années.

D'après cette dernière disposition du calendrier de Numa, à commencer de l'an 57 de Rome, qui est celle où commença la première année du 1.^{er} cycle, les 2.^{es}, 6.^{es}, 10.^{es}, 14.^{es}, 18.^{es}, 20.^{es} & 22.^{es} années devoient recevoir une intercalation de 22 jours; & l'intercalation de 23 jours devoit s'ajouter à la 4.^{te}, 8.^{te}, 12.^{te} & 16.^{te} années de chaque cycle. Par cette méthode Numa parvint à remettre tous les 24 ans son année au point où elle étoit quand la période avoit commencé; & sans qu'il parût rétrécir les principes, ni renverser seulement le premier ordre, il eut l'art de le corriger.

Le calendrier étoit destiné à régler les jours de fêtes & de sacrifices, on le regarda comme faisant partie du culte, & l'on en confia la garde aux pontifes. Ils étoient chargés de le rédiger, & ils le firent servir à l'accroissement de leur pouvoir; le calendrier étoit caché avec le plus grand soin; & aucun citoyen ne sachant quel jour la religion permettoit de plaider, & même de tenir les comices, il devoit recourir, pour toutes ses affaires, aux ministres de la religion, & attendre qu'il leur plût de l'éclaircir & de régler ses démarches. Les pontifes suivirent les principes établis par Numa pour les intercalations, jusqu'au commencement de la république; mais, dans la suite, ils dérogèrent aux règles établies par ce prince, & s'arrogeant le pouvoir de supprimer ou d'ajouter l'intercalation à leur volonté: ce qu'ils firent, pour la première fois, l'an de Rome 257, avant J. C. 497; & cette manière arbitraire de placer les intercalations, est la vraie cause de la confusion qui se trouve dans l'ancien calendrier romain. Car ce désordre étoit parvenu dans les derniers tems de la république à tel point, que les mois destinés à concourir avec l'hiver, arrivoient dans l'automne, &c. ce que les pontifes auroient évité, s'ils eussent suivi exactement la dernière méthode prescrite par l'établissement des cycles, puisqu'on n'auroit eu qu'à retrancher 12 jours de l'année romaine, pour la remettre au point d'où Jules-César vouloit la faire commencer l'an 47 avant J. C. comme on le verra ci-après.

Les mois de Numa étoient, 1.^{er} janvier, 29 jours; 2.^o mars, 31; 3.^o avril, 29; 4.^o mai, 31; 5.^o juin, 29; 6.^o quintilis, 31; 7.^o sextilis, 29; 8.^o septembre, 29; 9.^o octobre, 31; 10.^o novembre, 29; 11.^o décembre, 29; & 12.^o février, 28. Cette disposition des mois ne subsista qu'environ trois siècles; l'an 304 de Rome, avant J. C. 450, les Décemvirs déplacèrent le mois

de février, qu'ils mirent immédiatement après le mois de janvier de l'année suivante 305. Ainsi, ce mois, qui, dans l'ordre établi par Numa, étoit le dernier de l'année, devint le second. Suivant Tuditanus, cité par Macrobe (*L. 1, ch. 13*), les Décemvirs, dans la deuxième année de leur magistrature, donnèrent une loi sur les intercalations; & il y a lieu de croire qu'en dérangeant le mois de février, ils furent obligés de régler, par une loi, que les intercalations, qui devoient être mises par les lois de Numa à la fin de l'année, continueroient d'être attachées à ce mois, quoiqu'il eussent été le dernier de l'année romaine. Par cette innovation, les Décemvirs, prolongeoient leur magistrature: avant été installés suivant Denis d'Halicarnasse & Tito-Live aux fêtes de Mai, le mois de février de l'année de leur installation (304) se trouvoit de droit dans l'année de leur décamvirat. Mais, employant le mois de février l'année suivante (305) plutôt qu'il n'étoit d'usage, & lui faisant quitter la dernière place qu'il occupoit dans l'année, pour le mettre à la suite du mois de janvier, ils donnoient à leur administration une année de 14 mois (compris l'intercalaire), faisant 406 jours, & se ménagoient plus de tems pour faire réussir leurs projets. Il n'y a que cet intérêt des Décemvirs qui ait pu les porter à déplacer ce mois. Cette confusion du calendrier romain ne fut levée que du tems de Jules-César; nous parlerons ci-après du calendrier julien.

L'année syrienne est une année solaire, dont le commencement est fixé au commencement du mois d'octobre de l'année julienne, & qui ne diffère d'ailleurs de l'année julienne que par le nom des mois, la durée étant la même. Les noms de ses mois sont, 1.^o *tishrin* répondant au mois d'octobre & contenant 31 jours, 2.^o le second *tishrin*, contenant ainsi que novembre 30 jours, 3.^o *canan* 31, 4.^o le second *canan* 31, 5.^o *shabat* 28, 6.^o *adar* 31, 7.^o *nisan* 30, 8.^o *achar* 31, 9.^o *haziran* 30, 10.^o *tammuz* 31, 11.^o *ab* 31, 12.^o *elul* 30.

L'année persienne est une année solaire de 365 jours, & composée de douze mois de 30 jours chacun, avec cinq jours intercalaires ajoutés à la fin. Voici le nom des mois de cette année, 1.^o *atradia-mech*, 2.^o *ardibehst-mech*, 3.^o *card-mech*, 4.^o *chirmeh*, 5.^o *ordad-mech*, 6.^o *shabarin-mech*, 7.^o *nucharmeh*, 8.^o *abermeh*, 9.^o *adarmeh*, 10.^o *dimeh*, 11.^o *behemeh*, 12.^o *affirmeh*. Cette année est appelée année *jetdegerdieu*. Cette année des perses est donc la même que l'année égyptienne ou année de Nabonassar, & elle fut employée depuis la mort de Jeздегерде, le dernier de rois de Perse, lequel fut tué par les sarrasins; l'année persienne étoit alors de 365 jours, sans qu'on se fût d'abord admise aucune intercalation; & il paroit que plus anciennement, après 120 années écoulées, le premier jour de l'an, qui avoit rétrogradé très-sensiblement, étoit remis au même lieu qu'auparavant, en ajoutant un mois de plus à l'année, qui devenoit pour lors

de 13 mois. Mais l'année dont tous les auteurs qui ont écrit en Arabe ou en Persan, ont fait usage dans leurs tables astronomiques, est semblable aux années égyptiennes, lesquelles sont toutes égales, étant de 365 jours sans intercalation. *Inf. astr. de M. le Monnier.*

Goliut, dans ses notes sur *Alfergan*, pag. 27 & suiv. est entré dans un grand détail sur la forme ancienne & nouvelle de l'année persienne, laquelle a été suivie de la plupart des auteurs orientaux. Il nous apprend que sous le sultan Gelaludaulé Melick, ou Gelaladdin, vers le milieu du onzième siècle, on entreprit de corriger la grandeur de l'année, & d'établir une nouvelle époque; il fut donc réglé que de quatre ans en quatre ans, on ajouteroit un jour à l'année commune, laquelle seroit par conséquent de 366 jours. Mais parce qu'on avoit reconnu que l'année solaire n'étoit pas exactement de 365 jours 6 heures, il fut décidé qu'alternativement (après 7 ou 8 intercalations) on intercaleroit la cinquième, & non pas la quatrième année; d'où il paroît que ces peuples connoissoient déjà fort exactement la grandeur de l'année, puisque selon cette forme, l'année persienne seroit de 365 jours 5 heures 49 minutes 31 secondes, ce qui diffère peu de l'année grégorienne, que les européens ou occidentaux n'ont employée dans leur calendrier que plus de 500 ans après les asiatiques ou orientaux.

Ainsi, le calendrier gélaléen est une correction du calendrier persan jézdegerdique. Le commencement de l'ère gélaléenne fut fixé à l'entrée du soleil dans le bélier, la 467^e année de l'hégire, & de J. C. 1075. L'année arabeque 467, commença au 27 août 1074. *Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tom. 1, pag. 17.*

L'année arabe ou turque est une année lunaire, composée de 12 mois, qui sont alternativement de 30 & de 29 jours; quelquefois aussi elle contient 13 mois. Voici les noms de ces mois. 1.^o *muharram* de 30 jours, 2.^o *saphar* 29, 3.^o *rabia* 30, 4.^o *second rabia* 29, 5.^o *jomada* 30, 6.^o *second jomada* 29, 7.^o *rayah* 30, 8.^o *shaaban* 29, 9.^o *sumadan* 30, 10.^o *shawal* 29, 11.^o *dulkandah* 30, 12.^o *dulhégga* 29, & de 30 dans les années hypéthémères ou embolismiques. On ajoute un jour intercalaire à chaque 2.^o 5.^o 7.^o 10.^o 13.^o 15.^o 18.^o 21.^o 24.^o 26.^o 29.^o année d'un cycle de 30 ans; & les années sont embolismiques ou de 355 jours; les autres communes, ou de 354 jours.

L'ère des mahométans commence au vendredî 6 juillet de l'an 622 de J. C. qui est la première année de l'hégire; d'où il s'ensuit que si d'une année quelconque de l'ère chrétienne on ôte 621, le reste sera le nombre des années de J. C. écoulées depuis le commencement de l'ère mahométane. Or l'année julienne est de 365 jours 6 heures, & les années de l'hégire, qui sont des années lunaires, sont de 354 jours 8 heures 48'; d'où il s'ensuit que chaque année de l'hégire antécède sur l'année julienne de 10 jours 21 heures 12'; & par conséquent en 33 ans, de 359 *Mécaniques, Tome 1, Les Parties.*

jours 3 heures 36', c'est-à-dire d'une année, plus 4 jours 18 heures 48': donc si on divise par 33 le nombre trouvé des années juliennes écoulées depuis l'ère mahométane; & qu'on ajoute le quotient à ce nombre d'années, on aura le nombre des années mahométanes: on n'a point d'égard au reste de la division. Ce calcul ne nous apprend pas quel jour l'année a commencé; mais ce détail seroit trop long. *Voyez Gravius Fœchæ celebræ, 1650.*

Il faut remarquer que le surplus des 4 jours 18 heures 48', doit former aussi une année au bout de plusieurs siècles, c'est-à-dire au bout d'environ 72 fois 33 ans. Mais les mahométans ne se piquent pas d'une si grande exactitude; ils ne font pas même bien d'accord entr'eux sur le commencement de l'année. Il y a dans Gravius une table des années de l'hégire rapportées à notre calendrier; il y en a une dans *l'Art de vérifier les dates*, qui fait commencer les années de l'hégire un jour plus tard. M. Cardone m'a fait voir un calendrier turc d'accord avec la première table, & suivant des lettres de M. l'onton, premier interprète du roi à Constantinople l'année 1195 de l'hégire a commencé le 28 décembre 1780, ce qui s'accorde avec la seconde table. Peut-être que la table de Gravius est dressée suivant l'usage des astronomes arabes, qui comptent depuis le coucher du soleil qui a précédé le jour civil, tandis que l'autre est dressée sur l'usage civil. Il y en a même qui font commencer l'année encore un jour plutôt, par exemple, le 26 décembre 1780. Au contraire, il y a des parties de l'Arabie où l'on ne commence l'année que quand on a vu la lune; ce qui retarde souvent de deux jours. *Voyez Niebuhr, description de l'Arabie, tom. 1, 1774, pag. 104.*

L'année lunaire est composée de douze mois lunaires: mais il y a deux espèces de mois ou de révolutions lunaires; savoir, la révolution périodique, qui est de 27 jours 7 heures 43 minutes 4 secondes; c'est à-peu-près le tems que la lune emploie à faire sa révolution autour de la terre par rapport aux points équinoxiaux: 2.^o le mois synodique, qui est le tems que cette planète emploie à retourner vers le soleil à chaque conjonction; ce tems, qui est l'intervalle de deux nouvelles lunes, est de 29 jours 12 heures 44 minutes 3 secondes. *Voyez SYNONYME, LUNE.* Ce mois synodique, marqué par les phases de la lune, est le seul dont on se serve pour mesurer les années lunaires: or comme ce mois est d'environ 29 jours & demi, on a été obligé de supposer les mois lunaires civils de 29 jours & de 30 alternativement; ainsi, le mois synodique étant de deux espèces, astronomique & civil, il a fallu distinguer aussi deux espèces d'années lunaires, l'une astronomique, l'autre civile.

L'année astronomique lunaire est composée de douze mois synodiques lunaires, & contient par conséquent 354 jours 8 heures 48 minutes 39 secondes.

L'année lunaire civile, est ou commune ou embolismique.

L'année lunaire commune est de douze mois lunaires civils, c'est-à-dire, de 354 jours.

L'année embolismique ou intercalaire est de treize mois lunaires civils, & de 384 jours.

Années juliennes, ce sont celles dont on s'est servi dans toute l'Europe depuis le tems de Jules-César. Nous avons dit que les pontifes auxquels Numa avoit confié le soin du calendrier, avoient mis un grand désordre dans la constitution de l'année: Jules-César, en qualité de souverain pontife & de dictateur voulut y remédier. Dans cette vue, il s'adressa à Sosigènes, habile astronome: celui-ci chercha le moyen de rendre la distribution du tems dans le calendrier telle, que les mêmes saisons revinssent au même jour du mois; & comme le cours annuel du soleil s'achève en 365 jours 6 heures, il fit l'année de ce même nombre de jours, & il en ajouta un tous les quatre ans. L'année de cette correction du calendrier fut une année de confusion; car on fut obligé, afin d'ôter une erreur de 67 jours, dont le commencement de l'année s'étoit écarté du solstice d'hiver, d'ajouter deux mois outre l'intercalation de 23 jours, qui se trouvoit avoir lieu cette même année dans l'ancien calendrier; de manière que cette année fut composée de quinze mois, faisant 445 jours (ou suivant d'autres 443). Cette réformation se fit l'an de Rome 707, quarante-sept ans avant J. C. Mais on ne compte ordinairement que de l'an 444; l'équinoxe arriva le 25 septembre. Voyez Scaliger & Petrus, liv. 4, ch. 1; & liv. 10, chap. 61.

Ce calendrier romain, que l'on appelle aussi calendrier julien, du nom de Jules-César, étoit donc disposé par périodes de quatre années. Les trois premières années, qu'on appelle années communes, ont 365 jours; & la quatrième, nommée *bissextile*, en a 366, à cause des six heures qui, dans l'espace de quatre ans, composent un jour. On plaça le jour entier, formé par ces quatre fractions, après le vingt-quatrième de février, qui étoit le sixième des calendes de mars.

Or comme ce jour ainsi répété étoit appelé en conséquence *bis sexto kalendas*, l'année où ce jour étoit ajouté, fut aussi appelé *bis sextus*, d'où est venu *bissextile*.

Le jour intercalaire n'est plus aujourd'hui regardé comme la répétition du 24 février, si ce n'est pour les fêtes de l'église; mais il est ajouté à la fin de ce mois, & en est le vingt-neuvième.

Les mois de l'année julienne étoient disposés ainsi: 1.^{er} janvier 31 jours, 2.^{er} février 28, 3.^{er} mars 31, 4.^{er} avril 30, 5.^{er} mai 31, 6.^{er} juin 30, 7.^{er} juillet 31, 8.^{er} août 31, 9.^{er} septembre 30, 10.^{er} octobre 31, 11.^{er} novembre 30, 12.^{er} décembre 31; & dans toutes les années *bissextiles* le mois de février avoit comme à présent 29 jours: on trouvera les mois romains plus en détail au mot CALENDRIER.

Cette alternative de mois de 30 & de 31 jours ne suffit pas pour que les 12 signes du zodiaque soient d'accord avec les douze mois; car pour que

le soleil employât un mois à parcourir chaque signe, il faudroit que les trois premiers mois & les trois derniers fussent de 30 jours; & les autres de 31; dans les années communes on en ôteroit un du mois de janvier ou de décembre, qui sont les plus voisins du périégée du soleil, ou la vitesse est la plus grande.

L'année julienne supposoit l'année astronomique de 365 jours 6 heures; & elle surpassoit par conséquent la vraie année solaire d'environ 11 minutes, ce qui a occasionné la correction grégorienne.

L'année grégorienne n'est autre que l'année julienne, corrigée par la suppression de trois *bissextiles* en quatre siècles.

La raison de cette correction, fut que l'année julienne avoit été supposée de 365 jours 6 heures, au lieu que la véritable année solaire est de 365 jours 5 heures 48' 48", ce qui produisoit une anticipation de près d'un jour tous les cent ans, ou du moins de trois quarts de jour.

Or quoique cette erreur de 11 minutes qui se trouve dans l'année julienne soit fort petite, cependant elle étoit devenue si considérable en s'accumulant depuis le tems de Jules-César, qu'elle avoit monté à 10 jours, ce qui avoit considérablement dérangé l'équinoxe. Car du tems du concile de Nicée, lorsqu'il fut question de fixer les tems auquel on doit célébrer la Pâque, l'équinoxe du printemps se trouvoit au 21 de mars. Mais cet équinoxe ayant continuellement anticipé, on s'est aperçu l'an 1582, lorsqu'on proposa de réformer le calendrier de Jules-César, que le soleil entroit déjà dans l'équateur des le 11 mars; c'est-à-dire, 10 jours plutôt que du tems du concile de Nicée. Pour remédier à cet inconvénient, qui devoit aller en suite encore plus loin, le pape Grégoire XIII. fit venir les plus habiles astronomes de son tems, & concerta avec eux la correction qu'il falloit faire, afin que l'équinoxe tombât au même jour que dans le tems du concile de Nicée; & comme il s'étoit glissé une erreur de dix jours depuis ce tems-là, on retrancha ces dix jours de l'année 1582, dans laquelle on fit cette correction; & au lieu du 5 d'octobre de cette année, on compta tout de suite le 15.

La France, l'Espagne, les pays catholiques d'Allemagne, & l'Italie, en un mot tous les pays qui font sous l'obédience de l'église, reçurent cette réforme dès son origine; mais les protestants la rejetèrent d'abord.

En l'an 1700 l'erreur des dix jours avoit augmenté encore & étoit devenue de onze; c'est ce qui déterminait les protestants d'Allemagne à accepter la réformation grégorienne & à compter sur le nouveau style, aussi-bien que les danois & les hollandais. En Angleterre même on l'a adoptée au mois de septembre 1752. Les Russes font les seuls qui aient conservé le calendrier julien, ou le vieux style, & comptent onze jours de plus. Les années 1700, 1800, 1900, sont communes; l'année 2000

fera bissextile, de même que 2400, 2800, & ainsi de suite en ajoutant toujours 4; ainsi, il n'y a que les années séculaires dont le nombre du siècle est divisible par 4 qui soient bissextiles; comme dans le cours d'un siècle il n'y a que les années divisibles par 4 qui soient bissextiles, 1784, 1788, 1792, &c.

Suivant cette règle, on supprime trois bissextiles sur quatre siècles, ou en 36 siècles 27 bissextiles; il seroit plus exact d'en supprimer 28, pour s'accorder avec la vraie durée de l'année solaire; mais la différence est infensible.

Commencement de l'année. Le jour de l'an, ou le jour auquel l'année commence, a toujours été très-différent chez les différentes nations.

Les François, sous les lois de la race mérovingienne, commençaient l'année du jour de la revue des troupes, qui étoit le premier de mars; sous les rois Carolingiens, ils commencèrent l'année le jour de Noël; & sous les Capétiens, le jour de Pâques; de sorte que le commencement de l'année varioit alors depuis le 22 mars jusqu'au 25 avril. L'année ecclésiastique en France commence au premier dimanche de l'Avent.

Quant à l'année civile, Charles IX. ordonna en 1564, qu'on la feroit commencer à l'avenir au premier de janvier.

A Rome, il y a deux manières de compter les années; l'une commence à la Nativité de Notre-Seigneur; & c'est celle que les Notaires suivent, datant à *Nativitate*; l'autre commence au 25 mars, jour de l'Incarnation, & c'est de cette façon que font datées les bulles, *anno Incarnationis*.

En 1746, l'année civile à Pise, commençoit encore au 25 mars; l'Empereur ordonna le changement par un édit, dont l'extrait est gravé sur un marbre en lettres d'or, sur la rive gauche de l'Arno. Cet usage remontoit aux Etrusques, de qui les Romains l'avoient emprunté.

L'année civile ou légale, en Angleterre, commence le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le 25 mars; quoique l'année chronologique commence le jour de la Circoncision, c'est-à-dire le premier jour de janvier, ainsi que l'année des autres nations de l'Europe. Guillaume le Conquérant ayant été couronné le premier de janvier, donna occasion aux Anglois de commencer à compter l'année de ce jour-là pour l'histoire; mais, pour certaines affaires civiles, ils ont encore retenu leur ancienne manière, qui étoit de commencer l'année le 25 mars.

Dans la partie de l'année qui est entre ces deux termes, on met ordinairement les deux dates à-la-fois, les deux derniers chiffres étant écrits l'un sur l'autre à la manière des fractions; par exemple, 172 $\frac{1}{2}$ est la date pour le tems entre le premier janvier 1725 & le 25 mars de la même année. Depuis Guillaume le Conquérant, les patentes des Rois, les chartes, &c. sont ordinairement datées de l'année du règne du Roi.

L'église d'Angleterre commence l'année au premier dimanche de l'Avent.

Les Juifs, ainsi que la plupart des autres nations de l'Orient, ont une année civile qui commence avec la nouvelle lune de Septembre, & une année ecclésiastique qui commence avec la nouvelle lune de Mars.

Les Grecs commencent l'année le premier septembre, & datent du commencement du monde. Les Mahométans commencent l'année au moment où le soleil entre dans le bélier.

Les Persans, dans le mois qui répond à notre mois de juin.

Les Chinois, à la nouvelle lune, après que le soleil est entré dans les poissons. La plupart des Indiens commencent leur année avec la première lune du mois de mars. Les Brames avec la nouvelle lune d'Avril, auquel jour ils célèbrent une fête appelée *Samvas Jaradi poudaga*, c'est-à-dire, la fête du nouvel an.

Les Mexicains, suivant d'Acosta, commençoient l'année le 23 de février; tems où la verdure commençoit à paroître. Leur année étoit composée de dix-huit mois de vingt jours chacun, & ils employoient les cinq jours qui restoient après ces dix-huit mois, aux plaisirs, sans qu'il fût permis de vaquer à aucune affaire, pas même au service des temples. Alvarez rapporte la même chose des Abyssins, qui commençoient l'année le 26 d'août, & avoient cinq jours oisifs à la fin de l'année, qui étoient nommés *pagomen*; mais cela n'est point exact; on peut voir dans Ludolf ce qui regarde les Abyssins.

Grande année; année platonique est une expression à laquelle on a attaché différentes significations. C'étoit une opinion générale qu'il y avoit une grande année qui renfermoit en elle le principe & la fin de tous les êtres, leur changement & leur renouvellement: cette idée physique, morale ou superstitieuse fut mêlée avec des idées astronomiques, & forma cette grande année appelée platonique; mais Platon ne parle qu'en général de la période inconnue qui renfermeroit les astres dans les mêmes circonstances; c'est ce qu'on doit appeler la grande année platonique. Voici ce qu'il en dit dans son Timée.

Est tamen intellectū facile, quod perfectus numerus temporis perfectum tam demum compleat annum cum octo ambitus confectus suis cussibus, quos orbit ille semper idem similiterque procedens metitur, ad idem se caput reverterent.

Cette grande année platonique a lien, suivant Cicéron, de nat. deor. l. 2. lorsque le soleil, la lune & les cinq planètes reviennent à la même situation. Quelques-uns disoient que tout ce qui arrive dans le monde recommenceroit dans le même ordre; (*Clavius in sph. c. 1.*), on croit que c'est celle dont parle Virgile, Egl. 4. v. 5 & 36.

Magnus ab integro sacrum nascitur ordo, v. 5. Atque istum ad Trojam magnus institor Achille, v. 36.

K ij

D'autres pensent que *magnus* signifie seulement illustre, & que la suite n'est qu'une manière de dire que le siècle d'or renaitroit après la paix qui venoit d'être conclue à Pouzol, 40 ans avant Jésus-Christ, entre Orlève & le fils de Pompée. Mais il seroit possible que Virgile, d'après les traditions anciennes, eût voulu dire que les événements fabuleux recommenceroient dans le même ordre, puisque ces événements, tels que le siècle d'or, les voyages des Argonautes, les travaux d'Hercule, &c., ne sont que des allégories tirées des situations des étoiles, & doivent par conséquent recommencer quand ces situations se trouvant les mêmes, produiront les mêmes phénomènes au bout de 24750 ans, ainsi que M. Dupuis l'a fait voir assez au long dans un Mémoire sur l'origine des confusions & de la fable, inséré dans le quatrième volume de mon *Astronomie*.

Mais ce mot de *grande année* a été pris en différents sens. Les uns l'ont entendu de la période de 600 ans qui ramène la lune & le soleil au même point du ciel; c'est la période lunisolaire dont M. Cassini a parlé dans son Traité de l'origine de l'Astronomie, & dans ses Règles de l'Astronomie indienne. M. de Mailain a donné une dissertation à ce sujet à la suite de ses lettres au P. Parentin; il est vrai que 7421 mois lunaires & 600 années tropiques sont presque le même intervalle, cependant les 100 années sont 28 $\frac{1}{2}$ heures de moins.

On a aussi appelé la *grande année* la période caniculaire de 1460 ans, dans laquelle les années égyptiennes revenoient avec les années solaires; nous du moins on se trompe en citant Platon à ce sujet, il ne connut jamais cette période, ni même celle de la précession des équinoxes, qui est de 25750 ans suivant mes derniers calculs. D'autres ont fait la *grande année* de neuf mille ans, de 12, de 15, de 24, de 36, de 49, de 100, de 300, de 470 mille ans, & même de 1753 mille & de 6570 000 ans. Voyez Joseph Scaliger canon. isagog. p. 212. Ricciolichronol. reform., p. 8. Hevelii prodromus, p. 86. Et M. de la Nauze, Mémoires de l'Académie des inscriptions. Tom. XXIII.

La durée de 4 320 000 ans que les Indiens donnent à la durée du monde, n'est qu'un nombre allégorique, exprimant les douze signes par douze mille, répétés 360 fois, ce qui forme la révolution de l'année; & la fable de la vache aux quatre jambes vient du taureau qui étoit le premier signe du printemps. M. DUPUIS. *Mercury* du 14 juin 1783. (M. DE LA LANDE).

ANNUËL (*Astron.*) se dit de tout ce qui revient chaque année ou qui dure une année. On appelle mouvement *annuel* de la terre, celui par lequel elle décrit son orbite autour du soleil, comme nous le prouverons au mot *Système* de Copernic.

Le mouvement *annuel* d'une planète signifie son mouvement en 365 jours, quelquefois aussi son mouvement propre ou de révolution autour du soleil.

L'*argument annuel* dans les tables de la lune, est

la distance du soleil à l'apogée de la lune, ainsi appelée, parce que l'inségalité qui en dépend est liée avec le mouvement *annuel* du soleil.

Equations annuelles de la lune, de son apogée & de son nœud; ce sont les inégalités que l'attraction du soleil produit à raison de l'excentricité de son orbite ou du changement de ses distances: l'équation *annuelle* de la lune fut indiquée par Tycho. Erabé; déterminée plus exactement par Horrocius, d'après les observations; enfin Newton reconnut quelle étoit une suite de la Théorie de l'attraction, & il conclut qu'il y avoit une équation semblable pour l'apogée & une pour le nœud, dont le soleil augmentait le mouvement, lorsqu'étant plus près de la terre, il agit sur la lune avec plus de force. L'action du soleil, en dilatant l'orbite de la lune, retarde son mouvement, & c'est ce qui produit l'équation *annuelle*. La plus grande équation *annuelle* de la lune est, dans Newton, de 11' 51" pour la lune, 20' 0" pour l'apogée & 9' 30" seulement pour le nœud dont le mouvement est plus lent que celui de l'apogée; elles sont dans les nouvelles tables de Mayer de 11' 16", 23' 12" & 8' 50". Voyez LUNE. (D. L.)

Parallaxe annuelle. Voyez PARALLAXE.

ANNUËL, f.f. (*Alg.*) se dit d'une rente qui n'est payée que pendant un certain nombre d'années; de sorte qu'au bout de ce tems, le débiteur se trouve avoir acquitté son emprunt avec les intérêts, en donnant tous les ans une même somme.

Les *annuités* sont extrêmement avantageuses au commerce dans les pays où elles sont en usage; le débiteur trouve dans cette manière d'emprunter, la facilité de s'acquitter insensiblement & sans se gêner, si le créancier a des dettes à payer avant l'échéance des *annuités*, & il s'en sert comme de l'argent en déduisant les intérêts à proportion du tems qu'il y a à attendre jusqu'à l'échéance.

Les *annuités* sont fort en usage en Angleterre, & l'état s'en sert très-avantageusement, lorsqu'il a des emprunts considérables à faire; peut-être un jour nous en servirons-nous en France. Les compans de la lotterie royale de 1744 étoient des *annuités*, dont chaque coupon perdant après le tirage de la lotterie, doit produire 65 liv. par an, pendant dix ans, au bout desquels le billet sera remboursé.

M. de Parcieux, des Académies-Royales des sciences de Paris & de Berlin, a inséré à la fin de son *essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine*, imprimé à Paris en 1746, une table fort utile par laquelle on voit la somme que l'on doit prêter pour recevoir 100 livres à la fin de chaque année, de manière qu'on soit remboursé entièrement au bout de tel nombre d'années qu'on voudra jusqu'à cent ans; c'est-à-dire, la valeur des *annuités* qui rapporteroient 100 livres pendant un certain nombre d'années. Voici une partie de cette table, qui peut être très-commode dans le calcul des *annuités*.

TABLE des sommes qu'on doit prêter pour recevoir 100 liv. à la fin de chaque année, de manière qu'on soit remboursé entièrement au bout de tel nombre d'années qu'on voudra jusqu'à cent ans.

LES INTERETS comptés sur le pied du den. 20.			Ann. Liv. S. D.		
Ann.	Liv.	S. D.	Ann.	Liv.	S. D.
1	91	4 2	51	1813	17 2
2	185	18 10	52	1841	15 6
3	273	6 4	53	1849	6 1
4	354	11 11	54	1856	9 7
5	432	19 0	55	1863	6 1
6	507	11 5	56	1869	16 4
7	578	12 9	57	1876	0 4
8	646	6 5	58	1881	18 9
9	710	15 8	59	1887	10 9
10	771	8 5	60	1891	17 10
11	820	12 9	61	1897	19 9
12	866	6 5	62	1903	16 10
13	910	7 8	63	1907	9 4
14	950	17 3	64	1913	17 4
15	1017	19 3	65	1916	1 4
16	1081	15 5	66	1920	2 3
17	1127	8 9	67	1923	17 4
18	1168	16 0	68	1927	9 9
19	1208	10 6	69	1930	19 8
20	1246	4 1	70	1934	4 6
21	1282	2 1	71	1937	7 1
22	1316	5 10	72	1940	6 9
23	1348	16 11	73	1943	3 6
24	1379	17 0	74	1945	17 7
25	1409	7 8	75	1948	9 11
26	1437	10 1	76	1950	18 1
27	1464	4 9	77	1951	4 10
28	1489	12 11	78	1953	9 4
29	1514	1 10	79	1957	11 8
30	1537	4 6	80	1959	12 0
31	1559	5 3	81	1961	10 1
32	1580	5 0	82	1963	7 0
33	1600	4 8	83	1965	1 11
34	1619	5 5	84	1966	15 1
35	1637	7 11	85	1968	6 9
36	1654	12 3	86	1969	16 10
37	1671	2 1	87	1971	5 6
38	1686	15 4	88	1973	12 10
39	1710	13 7	89	1973	12 10
40	1731	17 3	90	1975	1 7
41	1749	8 2	91	1976	7 2
42	1765	5 10	92	1977	9 8
43	1781	12 3	93	1978	11 1
44	1795	1 10	94	1979	11 5
45	1777	7 6	95	1980	10 10
46	1777	19 6	96	1986	9 4
47	1793	4 5	97	1987	6 11
48	1808	12 3	98	1988	3 8
49	1818	16 10	99	1989	19 8
50	1821	11 2	100	1994	14 10

Si l'on veut finir la méthode sur laquelle cette table est formée, la voici. Supposons qu'on emprunte une somme, que j'appelle a , & que, les intérêts étant comptés sur le pied du denier 20, ou, en général, du denier $\frac{1}{m}$, on rende chaque année une somme b , & voyons ce qui en arrivera.

En premier lieu, puisque les intérêts sont comptés sur le pied du denier $\frac{1}{m}$, il s'ensuit que celui qui a emprunté la somme a , devra, à la fin de la première année, cette somme, plus le denier $\frac{1}{m}$ a de cette somme, c'est-à-dire, qu'il devra $a + \frac{1}{m}a$ ou $a \times \left(\frac{m+1}{m}\right)$. Or, par la supposition, il rend, à la fin de la première année, la somme b ; donc, au commencement de la seconde année, il n'emprunte plus réellement que la somme $a \left(\frac{m+1}{m}\right) - b$.

A la fin de la seconde année, il devra donc $\left[a \left(\frac{m+1}{m}\right) - b\right] \times \left(\frac{m+1}{m}\right)$ ou $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^2 - b \left(\frac{m+1}{m}\right)$; & comme à la fin de cette seconde année, il rend encore b , il s'ensuit qu'au commencement de la troisième année, il n'emprunte plus que $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^2 - b \left(\frac{m+1}{m}\right) - b$.

A la fin de la troisième année, il devra donc $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^3 - b \left(\frac{m+1}{m}\right)^2 - b \left(\frac{m+1}{m}\right)$, dont il faut encore retrancher b , pour savoir ce qu'il emprunte réellement au commencement de la quatrième année.

En continuant à raisonner toujours de la même manière, on voit qu'à la fin de la n^{e} année, ou au commencement de l'année suivante, il doit réellement $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^n - b \left(\frac{m+1}{m}\right)^{n-1} - b \left(\frac{m+1}{m}\right)^{n-2} - \dots - b$.

D'où il s'ensuit que, si le paiement doit se faire en un nombre n d'années, il n'y a qu'à faire la quantité précédente égale à zéro; puis qu'au bout de ce tems, par la supposition, le débiteur se sera entièrement acquitté, & qu'ainsi la dette sera nulle, ou zéro, à la fin de la n^{e} année.

Or, dans cette dernière équation, tous les termes qui sont multipliés par b , forment une progression géométrique, dont $\left(\frac{m+1}{m}\right)^{n-1}$ est le premier terme; $\left(\frac{m+1}{m}\right)^{n-2}$ le second, & 1 le dernier. D'où il s'ensuit (voyez PROGRESSION) que la somme de cette progression est $\left(\frac{m+1}{m}\right)^{n-1} - 1$ divisé par $\left(\frac{m+1}{m}\right) - 1$, c'est-à-dire, $\left(\frac{m+1}{m}\right)^n - 1$ divisé par $\left(\frac{m+1}{m}\right) - 1$.

Ainsi, par cette équation générale, $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^n - b \left[\frac{\left(\frac{m+1}{m}\right)^n - 1}{\frac{m+1}{m} - 1}\right] = 0$, ou $a \left(\frac{m+1}{m}\right)^n = b \left[\frac{\left(\frac{m+1}{m}\right)^n - 1}{\frac{m+1}{m} - 1}\right]$, on peut trouver:

1.^o La somme a , qu'il faut prêter pour recevoir la somme b chaque année, pendant un nombre d'années n , les intérêts étant comptés sur le pied du denier $\frac{1}{m}$, c'est-à-dire, qu'on trouvera a , en supposant que b , n , $\frac{1}{m}$, soient donnés.

2.^o On trouvera de même b , en supposant que a , n , $\frac{1}{m}$, soient données.

3.^o Si a , b , n , sont données, on peut trouver $\frac{1}{m}$; mais le calcul est plus difficile, parce que, dans les deux cas précédents, l'équation n'étoit que du premier degré, au lieu que, dans celui-ci, l'équation qu'il faut résoudre, est d'un degré d'autant plus élevé que n est plus grand. V. EQUATION.

4.^o Enfin, si a , b , & $\frac{1}{m}$ sont données, on peut trouver n , par le moyen des logarithmes. Pour cela, on écrira ainsi l'équation, $b = \left(\frac{m+1}{m}\right)^n \times \left(b + a - a \left[\frac{m+1}{m}\right]\right)$; d'où l'on tire $n = \frac{\log b - \log \left\{ b + a - a \left(\frac{m+1}{m}\right) \right\}}{\log \left(\frac{m+1}{m}\right)}$ Voyez

EQUATION, INTÉRÊT.

M. de Parcieux, dans l'ouvrage que nous venons de citer, donne une table beaucoup plus étendue, & l'applique au calcul de la loterie royale de 1744.

Nous joindrons à cet article la table suivante, qui y a rapport, & qui est encore extraite de M. de Parcieux.

DISTRIBUTION d'un emprunt de 600000 livres, divisé en 12000 actions ou billets de 500 liv. chacun, pour acquiescer intérêts & capital en dix ans, en payant tous les ans la même somme ou à-peu-près, tant pour les intérêts, que pour le remboursement d'une partie des actions ou billets.

AN.	ACTIONS existantes pendant chaque année.	Intérêts dus à la fin de chaque année.	ACTIONS qu'on rembourse tous les ans.	Prix des actions qu'on rembourse tous les ans.	TOTAL de chaque année.
On compte les intérêts sur le pied du denier vingt.					
		Livres.		Livres.	
1	12000	100000	914	477000	777000
2	11048	274800	8002	101000	777150
3	10044	351800	1053	258000	777100
4	8991	324800	1104	591000	776900
5	7911	197100	1180	580000	777000
6	6723	161200	1218	609000	777200
7	5510	128910	1279	639100	777350
8	4281	101775	1343	671000	776725
9	3139	73215	1410	705000	777115
10	1479	35975	1479	759100	776475

Voici l'explication & l'usage de cette table.

Supposons qu'une compagnie de négocians, ou si l'on veut, l'État, veuille emprunter 600000 livres en 12000 actions de 500 livres chacune, dont on paie l'intérêt au denier vingt, cette compagnie rendra donc 300000 livres chaque année; savoir 25 livres pour chaque billet. Supposons outre cela que cette compagnie se propose de rembourser chaque année une partie des billets, il est évident qu'elle devra donner chaque année plus de 300000 livres. Supposons enfin qu'elle veuille donner chaque année à-peu-près la même somme, tant pour les intérêts que pour le remboursement d'une partie des billets, en sorte que tout soit remboursé au bout de dix ans; on demande combien il faudra rembourser de billets par an.

On trouve d'abord, par la première table ci-dessus, que si l'on veut rembourser 600000 livres en dix ans, en dix paiements égaux sur le pied du denier vingt, il faut 777000 livres par an; ainsi comme les intérêts de 600000 livres au bout d'un an sont 300000 livres, il s'ensuit qu'il reste 477000 livres qui servent à rembourser 954 billets. Le débiteur ne doit donc plus que 11046 billets dont les intérêts dus à la fin de la seconde année font 276150 livres, qui étant ôtées des 777000 livres que le débiteur paie à la fin de chaque année, reste 500850 livres qui suffisent presque de quoi rembourser 1002 billets; &c. Pour les rembourser exactement, il faut 777150 livres, au lieu de 777000.

Par ce moyen on peut faire l'emprunt par classes. La première sera de 954 billets remboursables à la fin de la première année, le débiteur payant 777000 livres; 1002 à la fin de la seconde, le débiteur payant 777150 livres; 1052 pour être remboursés à la fin de la troisième année, le débiteur payant 777100 livres, &c., ainsi de suite.

Cette sorte d'emprunt pourroit être commode & avantageuse en certaines occasions, tant pour le débiteur que pour le créancier. Voyez l'ouvrage cité, pag. 32 & suivantes.

M. d'Alembert ajoute les réflexions suivantes, qui tendent à éclaircir la Théorie des annuités.

Soit a une somme prêtée, n le denier auquel est prêtée cette somme, m l'annuité ou la somme constante qu'on rend chaque année, k le nombre des années au bout desquelles la dette est acquittée, il est clair,

1.^o Que la première année étant échuë & payée, la dette n'est plus que $a(1+n) - m$.

2.^o Qu'à la fin de la seconde année, la dette est $a(1+n)^2 - m(1+n) - m$.

3.^o Qu'à la fin de la troisième année, la dette est $a(1+n)^3 - m(1+n)^2 - m(1+n) - m$; & ainsi de suite.

D'où il s'ensuit qu'à la fin de la 4.^e année, la dette est $a(1+k) - m(1+k) - m(1+k) - m(1+k) - m$; ou cette quantité doit être = 0, donc $m = a(t+n)^4$ divisé par $(1+n)^4$.
..... + $a(1+n)$ divisé par la somme

d'une progression géométrique, dont 1 est le premier terme, & le nombre des termes, & $1+n$ le second terme, ce qui donne $a(1+n)^k$ divisé par $\frac{(1+n)^{k+1}-1}{n} = \frac{a n (1+n)^k}{(1+n)^{k+1}-1}$.

Le dénominateur de cette fraction est $k n + n^2 \frac{(1+n)^k-1}{n} + \frac{1}{2} \times (k \cdot k - 1 \cdot k - 2 \cdot 1) &c. &c.$ lorsque k est très-petit, $k n = \frac{k n^2}{n} + \frac{k \cdot k - 1 \cdot k - 2 \cdot 1}{2} &c.$ Donc alors la fraction précédente ou la valeur de n devient $\frac{a n (1+n)^k}{k(1+n)^k - \frac{k \cdot k - 1 \cdot k - 2 \cdot 1}{2}} = \frac{a n (1+n)^k}{k(1+n)^k - \frac{k \cdot k - 1 \cdot k - 2 \cdot 1}{2}}$ (en supposant $k=0$),

$\frac{a n}{n} = \infty$; &c. qui donne une très-fausse valeur de n , puisqu'il est évident que, lorsque $k=0$, on a $n=0$.

La solution de cette difficulté, c'est que, lorsque k est une fraction, la formule des annuités $a(1+n)^k = m(1+n)^{k-1} \dots = m$, n'est plus la même que lorsque k est un nombre entier, & devient même très-fausse.

Si on fait le paiement par demi-années, on

aura $m = \frac{a n (1+n)^{\frac{k}{2}}}{(1+n)^{\frac{k}{2}}-1}$, & si $k=2$, on aura

$m = \frac{a n (1+n)}{(1+n)-1} = a(1+n)$, qui est la somme qu'on doit payer au bout d'un an; mais on remarquera que deux fois la valeur de m , c'est-à-dire, $2 a n (1+n)^{\frac{k}{2}}$, n'est pas = (en faisant $k=1$) à la somme $a(1+n)$.

ANNULAIRE, adj. *éclipse annulaire* (Astron.). On appelle ainsi une éclipse de soleil dans laquelle la lune paroissant plus petite que le soleil, n'en couvre que le milieu, en sorte que la lumière du soleil déborde tout-autour de la lune; telle a été l'éclipse du premier avril 1764, qu'on a observée en Espagne, en France, en Angleterre, comme on le voyoit sur la grande carte de cette éclipse publiée par madame le Pautre. Le diamètre de la lune est de 29' 25" dans son apogée, & de 33' 37" dans son périée; le diamètre du soleil est de 31' 31" dans son apogée, & de 31' 36" dans son périée; d'où il est aisé de conclure qu'il doit y avoir un grand nombre d'éclipses où le diamètre de la lune ne suffira pas pour couvrir celui du soleil. Dans la table des 49 éclipses de soleil visibles à Paris, que M. du Vancel a donnée, & qui s'étend depuis 1769 jusqu'en 1900, il n'y en a aucune de totale pour Paris; mais il y en a une *annulaire*, annoncée pour le 8 octobre 1847. *Mém. présentés à l'Académie des Sciences, tome V, page 575.* Les éclipses de 1737 & 1748 ont été *annulaires* en Ecosse, & M. le Monnier s'y transporta pour observer celle de 1748, & pour pou-

voir mesurer le diamètre de la lune, lorsqu'il paroitroit en entier sur le soleil. Indépendamment des phénomènes optiques auxquels ces observations donnent lieu, & qu'on peut voir dans l'*Avertissement* de M. Delisle sur l'éclipse de 1748; cette éclipse a servi à prouver, ainsi que celle de 1764, que le diamètre de la lune ne paroît pas sensiblement plus petit lorsqu'il est sur le soleil, que lorsque la lune est pleine & lumineuse, quoique M. de la Hire le prétendit. Mais M. du Séjour, qui a fait sur les observations de 1764 une multitude immense de calculs & de recherches, en a déduit une *inflexion* de 3 à 4 secondes, qui équivaut, pour la durée d'une éclipse à une diminution de 6 ou 8 secondes dans le diamètre de la lune (*Mém. de l'Acad. 1769*). Il trouve aussi que la plus grande durée possible d'une éclipse *annulaire* est de 12' 24" (*Mém. de l'Acad. 1777*), quoique la plus grande durée d'une éclipse totale ne puisse pas aller au-delà de 7' 58", parce le diamètre apparent de la lune est plus souvent au dessous qu'au dessus de la valeur du diamètre solaire. (*M. de la Lande*).

ANNULAIRES (voûtes), (*Méch.*). Ce sont celles dont la figure imite les anneaux en tout ou en partie; telles sont les voûtes sur noyau, & dont le plan est circulaire ou elliptique. *Voyez VOÛTE*.

On doit considérer ces voûtes comme des voûtes cylindriques dont l'axe seroit courbé circulairement; les joints de lits des claveaux étant prolongés, doivent passer par l'axe, & les joints sont des portions de surfaces coniques. Les joints de tête doivent être perpendiculaires à l'axe; & en liaison entr'eux, comme doivent l'être ceux de toute bonne espèce de maçonnerie. *V. LIAISON* (*D*).

A N O

ANOMALIE (*Astron.*). C'est la distance d'une planète à son aphélie ou au sommet du grand axe de son orbite. Ce mot nous vient du mot grec *ἀνόμαλος, inaequalis*, parce que la distance d'une planète à son aphélie est en effet ce qui règle son inégalité, & ce qui sert à la calculer dans les différents points de son orbite. Pour le soleil & la lune, l'*anomalie* est la distance par rapport à l'apogée; dans les cinq planètes principales, c'est la distance à l'aphélie: on distingue trois sortes d'*anomalies*.

L'*anomalie vraie* est l'angle formé au foyer de l'ellipse par le rayon recteur, qui va du soleil à la planète, & par la ligne des aphélie ou le grand axe de l'ellipse. Soit *S* le soleil (*fig. d'Astron. 83*) *M* le lieu de la planète dans son orbite *AMP*, *A* l'aphélie, *P* le périhélie, l'*anomalie vraie* est l'angle *ASM*.

L'*anomalie excentrique* est l'angle *ACN* formé au centre *C* de l'ellipse par le grand axe & par le rayon *CN* d'un cercle circonscrit, mené à la ca-

trémité de l'ordonnée RMN , qui passe par le lieu vrai M de la planète.

L'anomalie moyenne est une distance à l'aphélie supposée uniforme & proportionnelle au tems; c'est celle qui augmente uniformément & également depuis l'aphélie jusqu'au périhélie; ainsi une planète qui emploierait six mois à aller de l'aphélie au périhélie, aurait à la fin du premier mois 30 degrés d'anomalie moyenne, 60 degrés à la fin du second mois, & ainsi des autres.

Kepler ayant trouvé que les planètes décrivoient des ellipses avec des aires proportionnelles au tems (Voyez AïRES), sentit bien que pour déterminer le vrai lieu d'une planète pour un tems donné, il falloit trouver l'anomalie vraie par le moyen de l'anomalie moyenne, c'est ce qu'on appelle *Problème de Kepler*. Lorsqu'on connoît la durée de la révolution de la planète, par exemple, celle de mercure, qui est de 86 jours; & qu'on demande le lieu de mercure au bout de deux jours, c'est-à-dire, au bout de la 43^e partie de sa révolution, on fait dès-lors que l'aire du secteur compris entre l'aphélie & le rayon vecteur, est la 43^e partie de la surface de l'ellipse; cette portion du tems on cette portion de l'ellipse est proprement l'anomalie moyenne, que l'on peut exprimer aussi en degrés, en prenant la 43^e partie de 360 degrés ou du cercle entier; car nous pouvons appeler indifféremment anomalie moyenne une portion du tems, une portion de l'ellipse, une portion de la circonférence du cercle. C'est toujours une fraction qui est donnée, quand on cherche le lieu d'une planète; mais, c'est en degrés que nous prenons les anomalies pour suivre la forme usitée dans

les tables astronomiques, où toutes les anomalies & toutes les équations s'expriment en degrés, minutes & secondes. On peut imaginer une planète qui décrive le cercle ANP dans le même tems, & le point X où elle se trouvera marquera l'anomalie moyenne AX . Ainsi l'on connoît pour un tems quelconque l'anomalie AX , ou la surface AMS d'un secteur elliptique, & il s'agit de trouver l'anomalie vraie ou l'angle de ce secteur. Kepler sentit bien la difficulté de ce problème, qui est égale dans le cercle & dans l'ellipse; il se contenta d'inviter les géomètres à en chercher la solution, sans espérer qu'on la pût trouver d'une manière directe, parce qu'elle suppose connu le rapport entre les arcs & leurs sinus, qui n'est donné que par approximation. Ce fameux problème a toujours été appelé depuis *Problème de Kepler*, parce qu'en effet il le proposa le premier, & en donna même une solution approchée dans son bel ouvrage de *Stella maris*.

On a des solutions du problème de Kepler données par Wallis & Newton, par le moyen de la cycloïde allongée; Mais elles sont inutiles dans la pratique. La Hire en a donné une dans les *Mémoires de l'Académie des sciences* en 1710. Keill, dans les *Tray. philosophiques* de 1713; M. Cal-

fini dans les *Mémoires* de 1719; Herman dans le premier volume des *Mémoires de Petersbourg*; Machin dans les *Transactions* de 1737; Simplicius dans ses *Essays on several curious and useful subjects*, Londres 1740, page 41; il y en a une solution analytique dans le XXI^e livre de mon *Astronomie*.

Mais la solution inverse, qui consiste à trouver l'anomalie moyenne par le moyen de l'anomalie vraie, étant beaucoup plus simple & pouvant suffire dans tous les cas, nous nous contenterons de la démontrer.

Dans une ellipse AMP à laquelle on a circonscrit un cercle ANP , CX étant la ligne de l'anomalie moyenne, M le vrai lieu de la planète, RMN l'ordonnée qui passe par le lieu de la planète; le secteur circulaire $ANSA$ est toujours égal au secteur circulaire ACX de l'anomalie moyenne. En effet, soit T le tems entier de la révolution entière de la planète, & le tems qu'elle a employé à aller de A en M , on aura par la règle des aires proportionnelles au tems, & est à T comme le secteur AMS est à la surface de l'ellipse; de même puisque ACX est l'anomalie moyenne, on aura & est à T , comme ACX est à la surface du cercle; donc AMS est à ACX comme la surface de l'ellipse, est à la surface du cercle. Mais par la propriété de l'ellipse AMS est à ANS , comme la surface de l'ellipse est à la surface du cercle. Nous avons donc deux proportions qui ont trois termes communs; savoir AMS , la surface de l'ellipse & la surface du cercle; le terme qui paroît différent est donc nécessairement le même; donc ACX & ANS sont égaux entr'eux.

La racine carrée de la distance périhélie, est à la racine carrée de la distance aphélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie vraie, est à la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique. En effet, c'est une propriété des triangles rectangles comme RSM , que la tangente de la moitié de l'angle RSM , est égal au côté opposé RM , divisé par la somme des deux autres côtés SR , SM ; ainsi, dans les triangles rectangles MSR & NCR , on a cette proportion: tang. $\frac{1}{2} MSR :: \frac{RN}{TS} :: \frac{SR+SM}{TS} :: \frac{CR+CN}{TS}$; si l'on met à la place du rapport RM à RN , celui de CD à CA , qui lui est égal par la propriété de l'ellipse, & à la place de $SR+SM$ la valeur $PR \cdot \frac{SA}{TS}$, tirée aussi des propriétés de l'ellipse, & enfin PR à la place de $CR+CN$, on changera la proportion en celle-ci: tang. $\frac{1}{2} MSR :: \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \frac{CD \cdot CA}{PR \cdot SA} :: \frac{CD}{SA}$; & maintenant a le demi-axe CA de l'ellipse, & e l'excentricité CS , on aura $T :: MSR :: \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \frac{CD}{SA} :: \sqrt{a^2 - e^2} :: a \pm e$;

on divisera les deux derniers termes par $\sqrt{a^2 - e^2}$, & l'on aura tang. $\frac{1}{2} MSR :: \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \sqrt{a^2 - e^2}$.

$\sqrt{a-e} : \sqrt{a+e} :: \sqrt{PS} : \sqrt{SA}$: donc la tangente de la moitié de l'anomalie vraie ASM , est à la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique ACN , comme la racine carrée de la distance périhélie PS est à celle de la distance aphélie AS . Cette proportion suffit pour trouver l'anomalie excentrique AN , au moyen de l'anomalie vraie ASM ; la suivante sera trouver l'anomalie moyenne par le moyen de l'excentrique.

1. Différence entre l'anomalie excentrique & l'anomalie moyenne est égale au produit de l'excentricité, par le sinus de l'anomalie excentrique. Et oser, puisque le secteur circulaire $ANSA$ est égal au secteur de l'anomalie moyenne ACN ; on aura le secteur NCX égal au triangle CNS . La surface du secteur circulaire NCX est égale au produit de CN par la moitié de l'arc NX ; la surface du triangle CNS est égale au produit de CN par la moitié de la hauteur ST , qui est une perpendiculaire abaissée du foyer S sur la base NC prolongée au-delà du centre C . Ainsi, les deux surfaces étant égales, & ayant un des produits CN qui est commun à toutes deux, les autres produits sont aussi égaux; donc l'arc NX est égal à la ligne droite ST ; mais dans le triangle STC , rectangle en T , l'on a $ST = CS \sin TCS$, par les règles de la Trigonométrie rectiligne; donc aussi $NX = CS \sin TCS = CS \sin ACN$; donc la différence NX entre l'anomalie excentrique AN & l'anomalie moyenne ACN est égale au produit de l'excentricité CS par le sinus de l'anomalie excentrique ACN ; $CQ.F.D.$

C'est en minutes & secondes qu'on a coutume d'exprimer toutes les anomalies des planètes; ainsi, pour trouver la différence en secondes entre l'anomalie moyenne & l'anomalie excentrique, il faut que l'excentricité soit aussi exprimée en secondes. Si cette excentricité est exprimée en parties de même espèce que la distance moyenne, on dira la distance moyenne est à l'excentricité, comme le nombre de secondes qui contient le rayon d'un cercle, 206264, 8, ou environ 57° est au nombre de secondes que l'excentricité contient.

LE RAYON VECTEUR ou la distance d'une planète au soleil est facile à calculer, lorsqu'on connoît l'anomalie vraie & l'anomalie excentrique; il suffit de faire cette proportion: le sinus de l'anomalie vraie est au sinus de l'anomalie excentrique, comme la moitié du petit axe est au rayon vecteur. Car ayant tiré la ligne NQ (fig. 83) parallèle au rayon vecteur MS , on a par les triangles semblables cette proportion $SM : QN :: RM : RN :: CD : CK$ ou CN ; donc $SM : CD :: QN : CN :: \sin QCN : \sin QCN :: \sin RCN : \sin RSM$; donc $\sin ASM : \sin NCR :: CD : SM$.

Pour donner aussi une idée de la manière de seconder directement par approximation le problème Mathématiques. Tome 1, 1^{re} Partie.

de Kepler, je choisirai la méthode de M. Cassini (*Pléiades d'Astronomie*). Dans le cercle ANB fig. 84, circonscrit à l'orbite AMB d'une planète, on a vu que l'arc AX étant pris pour anomalie moyenne, la différence NX entre l'anomalie moyenne & l'anomalie excentrique ACN est égale à la perpendiculaire ST ; si du point X on tire une ligne HY parallèle à NCT ou perpendiculaire sur ST , la petite ligne SY sera la différence entre l'arc NX & ST , & YT , qui est égal au sinus de cet arc NX . Cette différence entre l'arc & le sinus n'exécède pas une demi-seconde, lorsque l'arc NX ne va pas au-delà d'un degré & demi; on peut alors la négliger entièrement & considérer les lignes NC , XS , comme parallèles entr'elles. Dans ce cas, l'angle CXS est égal à l'angle NCX ; dans le triangle SCX , on connoît deux côtés & l'angle compris; savoir, l'excentricité SC , le rayon du cercle, c'est-à-dire XC , & l'angle compris SCX , & l'angle compris SCX , & l'angle compris SCX , on trouva donc l'angle CXS égal à NCX , qui retranché de l'anomalie moyenne ACN , donnera l'anomalie excentrique ACN , dont le supplément est NCS ; dans le triangle NCS , on connoît encore les deux côtés SC , CN , & l'angle compris NCS on trouvera donc l'angle NSP . On cherchera aussi SN pour parvenir à trouver la distance; enfin l'on dira suivant la propriété de l'ellipse, PN est à PM , ou le grand axe est au petit axe comme la tangente de ce dernier angle NSP est à la tangente de l'anomalie vraie MSP . On pourroit aussi à la place des deux dernières opérations, employer la règle que nous avons démontrée ci-dessus pour l'anomalie excentrique.

Si l'angle CXS ou l'arc NX , qui on diffère très-peu, est assez grand pour que son sinus égal à TY soit sensiblement moindre que l'arc ou que NX ; c'est-à-dire, si cet angle passe, 1° 30' on prendra la différence de l'arc au sinus en décimales du rayon CA , & M. Cassini en a fait une table; ainsi, on aura SY ; alors on cherchera aussi le côté de SX du triangle SCX ; dans le triangle YSX rectangle en Y , on connoît SY & YS en parties du rayon CA , qui est toujours pris pour l'unité, on trouvera l'angle YSX , qui retranché de SXC , donnera YXC égal à l'angle NCX , dont on aroit besoin dans le calcul précédent, pour le retrancher de l'anomalie moyenne; le reste du calcul sera le même.

La distance de la planète au soleil est aisée à trouver en même tems que l'anomalie vraie; car dans les triangles PSN , PSM , en prenant SP pour rayon, les côtés SN & SM seront comme les sécantes des angles PSN , PSM , ou ce qui revient au même, en raison inversée des cosinus, donc le cosinus de l'anomalie vraie est au cosinus de l'angle PSN comme le côté SN trouvé ci-dessus est au rayon vecteur SM .

ANOMALIE de commutation, suivant Kepler, étoit l'angle formé entre les rayons menés à une planète & à la terre, & partant du centre d'égalité ou du centre du mouvement moyen de la planète. *De stellis meritis*, page 128.

Les anciens appelloient *anomalía orbitis* la distance d'une planète au sommet de son épicycle; c'étoit dans Copernic *anomalía commutationis*, *anomalía secundæ inæqualitatis*; mais *anomalía excentricæ* étoit le mouvement du centre de l'épicycle compté depuis l'apogée de l'excentrique; & comme la lune avoit d'autres inégalités, il y avoit d'autres *anomalías* qui, suivant Kepler, s'appelloient *soluta*, *mensura temporanea*, *mensura perpetua*; c'étoient les arguments des trois grandes inégalités de la lune.

ANOMALIE égale, suivant quelques auteurs, est l'angle formé au centre de l'ellipse par le grand axe de l'orbite & la ligne menée au vrai lieu de la planète. Ozanam.

ANOMALIE complète de Forbe, suivant quelques auteurs, est pour la lune ce que nous avons appelé *anomalie vraie*.

ANOMALIE de l'obliquité du zodiaque, *anomalía des équinoxes*, dans l'ancienne Astronomie étoient les inégalités qu'on admettoit dans ces deux éléments. On les appelloit aussi *libration première*, & *libration seconde*, & *areidation*. (D. L.)

ANOMALISTIQUE, adj. (Astron.) se dit de la révolution d'une planète, par rapport à son apside, soit apogée, soit aphélie, ou du retour au même point de son ellipse. Si les orbites des planètes étoient fixes, & qu'elles répondissent toujours aux mêmes étoiles, la révolution *anomalistique* seroit égale à la révolution *sylétaire*; mais toutes les planètes ont un mouvement progressif dans leurs apsidés; ainsi, il faut plus de tems pour atteindre l'aphélie qui s'est avancé dans l'intervalle que pour revenir à la même étoile. Par exemple la révolution tropique du soleil, par rapport aux équinoxes est de 365^j 48^h 48^m l'année *sylétaire*, ou le retour aux étoiles est de 365^j 6^h 9^m 10^s $\frac{1}{2}$; enfin la révolution *anomalistique* est de 364^j 15^m 22^s, parce que l'apogée du soleil avance chaque année de 65^{''} $\frac{1}{2}$ par rapport aux équinoxes, & le soleil ne peut atteindre son apogée qu'après avoir parcouru les 65^{''} $\frac{1}{2}$ de plus que la révolution de l'année qui le ramène aux équinoxes. Pour trouver la durée d'une révolution *anomalistique*, on peut faire cette proportion, le mouvement total d'une planète, pendant un siècle, moins le mouvement de son aphélie, est à la durée d'un siècle, ou 3,155,760,000 comme 360^{''} soit à la durée de la révolution *anomalistique*. (M. DE LA LANDE).

A N S

ANSE de panier, f. f. (Géom.): c'est une courbe *AFDHB* (pl. Géom. fig. 31), composée de plusieurs arcs de cercle qui sont tous concaves d'un même côté, & qui pris ensemble, valent 180 degrés, & qui ressemblent à une demi-ellipse qui s'ap-

puye sur son grand ou sur son petit axe, selon qu'elle est surbaissée ou surmontée. Dans la pratique de l'Architecture, on substitue souvent l'*anse de panier* à l'ellipse pour former des ceintres de berceaux, parce qu'il est toujours plus facile de tracer des arcs de cercle que des arcs de l'ellipse. (Voyez ELLIPSE.)

Le nombre des arcs qui composent une *anse de panier* est toujours impair, & celui *FDH* du milieu est coupé en deux parties égales par la montée *CD*.

Ordinairement l'*anse de panier* est formée avec trois arcs de cercle; cependant si elle devoit être fort surbaissée, par exemple, si la montée *CD* devoit être moindre que le quart du diamètre *AB*, il faudroit la composer de cinq arcs de cercle, ou de sept, ou de neuf, &c; en augmentant toujours ainsi le nombre des arcs de cercle à mesure qu'elle seroit plus surbaissée. En effet, si dans ces sortes de cas on employoit seulement trois arcs de cercle, les arcs extrêmes *AF*, *BH* auroient des courbures trop différentes de l'arc du milieu, & l'*anse* seroit d'une figure désagréable.

Nous allons traiter d'abord des *anses de panier* à trois arcs, ou, comme on dit, à trois centres; puis nous parlerons des *anses de panier* à cinq centres, & ce que nous en dirons s'appliquera facilement aux cas où il y auroit un plus grand nombre de centres.

Des anses de panier à trois centres.

1. Soient (fig. 31) *AB* le diamètre d'une *anse de panier*, & *CD* perpendiculaire sur le milieu de *AB*, sa montée. Nous supposons que la courbe est surbaissée; si elle étoit surmontée, on résoudroit le problème en regardant *CD* comme le demi-diamètre, & *AC* comme la montée. Soient les arcs égaux *AF* & *BH* les arcs extrêmes, *FDH* l'arc moyen. Les centres *K* & *M* des arcs extrêmes doivent être placés sur le diamètre *AB*, afin que la courbe tombe perpendiculairement sur ce diamètre, comme l'ellipse, & le centre *E* de l'arc moyen doit être placé sur la montée *DC* prolongée, afin que la courbe soit perpendiculaire en *D* sur la montée, de même que l'ellipse coupe perpendiculairement son petit axe. De plus, le centre *E*, le centre *K*, le point *F* de raccordement des deux arcs *AF*, *FDH*, doivent être en ligne droite, ainsi que le centre *E*, le centre *M*, le point *H* de raccordement des deux arcs *BH*, *FHD*, afin que les trois arcs qui forment la courbe se touchent simplement en se raccordant, & ne se coupent point. Cela posé, nommons *AC*, *a*; *CD*, *b*; *AK*, *x*; *ED*, *y*. On aura *CK* = *a* - *x*; *EC* = *y* - *b*; *EK* = *y* - *x*. Or, par la nature de la courbe, on doit avoir *ED* = *EF* = *EH*, *KF* = *KA* = *MH* = *MB*. Donc (à cause du triangle rectangle *ECK*) on aura (*y* - *x*)² = (*a* - *x*)² + (*y* - *b*)², d'où l'on tire *2ax* + *2by* - *2xy* = *a*² + *bb*; d'égation entre les quantités données, & les deux équations *x* & *y*,

par laquelle on voit que connoissant l'un de ces rayons, on connoitra aussi l'autre, & le nombre de degrés des trois arcs AF , BH , FDH .

II. La meilleure forme de l'angle de panier est celle où la courbure des arcs AF , DFH est la moins inégale qu'il est possible. Il faut donc faire en sorte que le rapport géométrique de la différence des deux rayons y & x à l'un d'eux, c'est-à-dire, $\frac{y-x}{x}$, ou $\frac{y}{x} - 1$, soit un minimum. Or

cette condition donne $xy - ydx = 0$. Mettant, dans cette équation, à la place de y & de dy , leurs valeurs que donne l'équation $y = \frac{aa+bb-2ax}{2b-x}$, résultante de l'article précédent, on trouvera $-2a dx (b-x) - (b dx - 2x dx) \times (aa+bb-2ax) = 0$; d'où l'on tire d'abord facilement $x = \frac{aa+bb \pm (a-b)\sqrt{aa+bb}}{2a}$; puis (en mettant pour x cette valeur dans l'expression de y), $y = \frac{aa+bb \mp (a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$.

On voit qu'à cause du double signe $\pm$, les rayons x & y ont chacun deux valeurs; ce qui fait deux cas.

III. CAS. I. Ayant tiré par les points A & D (fig. 32), la droite indéfinie ADT , portés CD en CX , & faites $DT = AX$: ensuite sur le milieu Z de la droite AT , élevez la perpendiculaire indéfinie ZKF , qui déterminera, sur le diamètre AB , le centre K de l'arc extrême qui doit passer par le point A , & sur la monnée ou son prolongement, le centre E de l'arc moyen; en sorte que, si, après avoir pris $BM = AK$, vous menez les droites indéfinies KEF , MEH , & que du point E pour centre, avec le rayon ED , vous décrivez l'arc FDH , & que des points K & M pour centres, avec les rayons KF , MH , vous décrivez les arcs FPA , HNB : la courbe entière $AFPDHNB$ sera celle qui satisfait aux deux premières valeurs de x & y ; c'est-à-dire, qu'on aura AK ou $BM = \frac{aa+bb+(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2a}$, $ED = \frac{aa+bb-(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$.

Car, 1.^o par construction, $AT = \sqrt{aa+bb} + a - b$, $AZ = \sqrt{aa+bb} + a - b$; & (à cause des triangles semblables ACD , AZK), on a $AC : AD :: AZ : AK = \frac{aa+bb+(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2a}$.

2.^o Les triangles semblables ACD , ECK donnent $CD : CA :: CK : CE = \frac{aa+bb-(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$; donc $ED = \frac{aa+bb-(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$.

Il est visible que, la courbe que nous venons de tracer ne peut pas être l'angle de panier demandée, puisqu'elle ne ressemble pas à une demi-ellipse, & que les arcs dont elle est composée se raccordent au-dessous du diamètre. Mais cette courbe satisfait au problème où l'on demanderait de tracer une courbe avec trois arcs de cercle, qui passent par les points A , B , D , qui se touchent, & dont la courbure soit la moins inégale qu'il est possible, sans imposer d'ailleurs la condition que tous les arcs soient concaves d'un même côté du diamètre.

IV. CAS. II. Menez, comme ci-dessus, la droite AD (fig. 33), & faites $CX = CD$; mais, au lieu de porter AX sur le prolongement de AD , portez AX sur la droite DA même, de D en T . Sur le milieu Z de AT , élevez la perpendiculaire indéfinie ZKE , qui déterminera sur le diamètre AB le centre K de l'arc extrême AF , & sur le prolongement de la monnée le centre E de l'arc moyen FDH . Prenez $BM = AK$; & ayant tiré par les points E & M la droite indéfinie EMH , du point E pour centre, avec le rayon ED , décrivez l'arc FDH ; du point K pour centre, avec le rayon KF , décrivez l'arc FA ; & du point M pour centre, avec le rayon MH , décrivez l'arc HB : la courbe entière $AFPDHNB$ sera l'angle de panier demandée.

Car, 1.^o $AT = \sqrt{aa+bb} - (a-b)$; & (à cause des triangles semblables ACD , AZK) on a $AC : AD :: AZ : AK = \frac{aa+bb-(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2a}$.

2.^o Les triangles semblables ACD , ECK donnent $CD : AC :: CK : CE = \frac{aa+bb+(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$; donc $ED = \frac{aa+bb+(a-b)\sqrt{aa+bb}}{2b}$.

La construction géométrique de l'angle de panier que nous venons de donner, est fort simple & très-facile à exécuter dans la pratique. Mais si on vouloit déterminer par le calcul les rayons AK , ED , & les angles AKF , FEH , la chose seroit fort aisée. En effet, dans le triangle rectangle ACD , AC & CD étant donnés, l'hypothénuse AD est aussi donnée; donc AT est connue; & comme AZ est la moitié de AT , la similitude des deux triangles rectangles ACD , AZK fera connoître AK . Retranchant AK de AC , on aura la droite CK par le moyen de laquelle & des deux triangles rectangles, semblables ACK , ECK , on connoitra CE : ajoutant CD à CE , on aura ED : ainsi les rayons AK , ED seront connus. De plus, on pourra déterminer les angles AKF , FEH par les règles de la Trigonométrie (voyez ce mot), puisque dans le triangle KEM on connoît les trois côtés.

Des arcs de panner à cinq centres. 11

I. Soient (fig. 34.) AB le diamètre, & CD perpendiculaire sur le milieu de AB , la montée; supposons que l'arc de panner soit construite & composée de cinq arcs des cercles AF , FG , GDH , HI , $I B$. Il faut, 1.^o que les centres S & T des arcs extrêmes AF , $B I$, soient placés sur le diamètre AB , afin que ces arcs tombent perpendiculairement sur ce diamètre; 2.^o que le centre O de l'arc moyen GDH soit placé sur le prolongement de la montée, afin que cet arc coupe perpendiculairement la montée; 3.^o que la montée CD divise l'arc moyen GDH en deux arcs égaux DG , DH , ce qui rend égaux les arcs GF , HI , puisque les arcs AF , $B I$ ont été supposés égaux; 4.^o que les centres S , K des deux arcs consécutifs AF , FG , & leur point F de raccordement, soient placés sur une même ligne droite, afin que ces arcs, en se raccorçant, ne fassent qu'un seul arc sans se couper; 5.^o par la même raison, les centres T , L & le point I de raccordement des arcs $B I$, $I H$ doivent être placés sur une même ligne droite; 6.^o de même, les trois points O , K , G doivent être placés sur une même ligne droite; & les trois points O , L , H sur une même ligne droite.

II. Cela posé, on voit facilement que le diamètre AB & la montée CD étant donnés, on peut satisfaire aux conditions précédentes d'une infinité de manières. Le problème n'est même déterminé, en se donnant (outre le diamètre & la montée) les centres S & T des arcs extrêmes & les angles ASF , $B T I$; car les centres K & L peuvent occuper plusieurs places sur les droites données SM , TM , ce qui fait varier en même temps la position du point O . Mais si, par exemple, connoissant toujours AB , CD , AS , & l'angle ASF , on connoissoit de plus la position du point K , c'est-à-dire, la perpendiculaire KN sur AB , ou la partie ON , ou quelque autre ligne relative à celles-là (on doit entendre la même chose pour l'autre moitié de l'arc de panner): alors le problème se voit déterminé, & on trouveroit ainsi le rayon moyen OD .

III. Soient $AC = a$; $CD = b$; $AS = c$; l'angle $ASF = \theta$, pour le rayon z ; KF ou $KG = p$; l'inconnue OG ou $OD = q$. On aura d'abord $KN = KS \sin \theta = (p - c) \sin \theta$; $SN = (p - c) \cos \theta$; KZ ou $CN = a - c - (p - c) \cos \theta$; $OZ = OC - KN = q - b - (p - c) \sin \theta$; $OK = OG - KG = q - p$. Ensuite le triangle rectangle OZK donne $(OK)^2 = (KZ)^2 + (OZ)^2$, c'est-à-dire, en ren en analysant, $(q - p)^2 = (a - c - (p - c) \cos \theta)^2 + (q - b - (p - c) \sin \theta)^2$, d'où l'on tire (A) $q = \frac{2ac + pc - ab - db + c + 2(a - c)(p - c) \cos \theta - 2b(p - c) \sin \theta}{2(p - c) \sin \theta} = z$.

IV. Dans la pratique, on suppose ordinairement que les quantités a , b , c étant données,

l'angle ASF soit de 60 degrés, & que les deux angles $F K G$, $G O D$ soient chacun de 15 degrés.

Alors on a $\cos \theta = \frac{1}{2}$; $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'équation (A) a toujours lieu, & dans le cas présent, il faudra y mettre pour $\cos \theta$ & $\sin \theta$ leurs valeurs; mais les deux rayons p & q sont inconnus. Pour former entre eux une seconde équation, on observera que chacun des angles OKM , KOM étant de 15 degrés, le triangle $M K O$ est isocèle.

De plus, on a $SN = \frac{KS}{2} = \frac{p - c}{2}$; $MS = 2CS$; $KM = 2KZ = 2(a - c) - (p - c) = 2a - c - p$; $MZ = \frac{KM \sqrt{3}}{2}$.

Maintenant le triangle obtusangle $M K O$ donne $OK^2 = OM^2 + KM^2 + 2MO \times MZ$, c'est-à-dire, ici $OK^2 = KM^2 \times (2 + \sqrt{3})$, ou bien $OK = KM \cdot \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. Ainsi, en termes analytiques, on aura l'équation (B),

$q - p = (2a - c - p) \times \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. En combinant cette équation avec l'équation (A), on déterminera les deux inconnues p & q .

V. Si, connoissant les quantités a , b , c , θ , on vouloit déterminer les rayons p & q par la condition que la courbure des arcs FG , GDH sur la moins inégale qu'il est possible, il faudroit faire $\frac{d^2q}{dp^2} = 0$, ou $\frac{d^2p}{dq^2} = \text{minimum}$; ce qui donneroit $p \frac{dq}{dp} - q \frac{dp}{dq} = 0$. Ensuite on mettroit dans cette équation, pour q & p , leurs valeurs résultantes de l'équation (A); ce qui donneroit une équation d'où l'on tireroit la valeur de p . Connoissant p , l'on connoitroit q par l'équation (A). Je me contente d'indiquer ces calculs, qui n'ont de difficulté qu'un peu de longueur. (L. B.).

ANSES, f. pl. f. en *Astronomie*; ce sont les parties sensiblement éminentes de l'anneau de Saturne, qu'on apperçoit lorsque cet anneau commence à s'élever, c'est-à-dire, lorsque la partie antérieure & la partie postérieure commencent à se distinguer; à la vue elles ont la forme de deux ailes attachées à cette planète. Voyez ANNEAU. (O).

ANTARCTIQUE, adj. m. (*Astronomie*). Pole antarctique, ou pole meridional, est l'extrémité méridionale de l'axe de la terre, & l'un des points autour desquels la terre tourne. Voyez POLE, &c. Ce mot est composé de la préposition *anti*, contre, vis-à-vis, & de *arctos*, usé, ourse. Voyez l'article OURSE.

Les étoiles voisines du pole antarctique ne paroissent jamais sur notre horizon. Ainsi à Paris, dont la latitude est de 48 degrés 50 minutes, on ne voit jamais aucune des étoiles qui sont éloignées du pole antarctique de moins de 43 degrés 50 minutes; car ces étoiles demeurant toujours

au-dessous de l'horizon de Paris. Voyez ÉTOILE, HORIZON, &c.

Cercle antarctique, ou cercle polaire antarctique; c'est un des petits cercles de la sphère; il est parallèle à l'équateur, & éloigné du pôle méridional de 23 degrés 28 minutes. Voy. CERCLE.

L'épithète d'antarctique lui vient de son opposition à un autre cercle, qui est aussi parallèle à l'équateur & à la distance de 23 degrés 28 minutes du pôle septentrional. On l'appelle cercle arctique polaire. Voyez ARCTIQUE. La partie de la surface du globe terrestre, comprise entre le pôle antarctique & le cercle polaire antarctique, est appelée zone glacée méridionale. Voyez ZONE. (O)

ANTARES (Astron.); nom d'une étoile de la première grandeur, située vers le cœur du scorpion; en grec *Antares*. On la voit dans le méridien au commencement de juillet à 9^h du soir, & vers 15^h de hauteur à Paris; sa longitude, en 1750, étoit de 8^h 6' 16" 18", & sa latitude 4° 32' 12" australe. (D. L.)

ANTECANIS. V. PRÆCON.

ANTECEDENT, f. m. (Analyse); c'est le nom qu'on donne au premier des deux termes qui composent un rapport. Voyez RAPPORT. Voyez aussi CONSÉQUENT. Ainsi, en général, dans le rapport de a à b , a est l'antécédent.

ANTECEDENTIA, terme d'Astronomie. On dit en Astronomie qu'une planète se meut en antecedenia ou precedencia lorsqu'elle paroît aller vers l'occident contre l'ordre des signes, comme du taureau dans le bélier. Voyez PLANÈTE, SIGNE, &c. Au contraire, lorsqu'elle se meut du côté de l'orient, en suivant l'ordre des signes, comme du bélier dans le taureau, on dit qu'elle se meut en consequentia. (O)

ANTICHTONES (Astron.), peuples qui habitent dans les hémisphères opposés de la terre, mais à des latitudes égales; l'un a l'été tandis que l'autre a l'hiver. Ce mot vient de *anti contra*, & *χθον* terra. C'est pourquoi Macrobe appelle aussi antichtones les habitants qu'il suppose dans la lune comme étant une terre opposée à la nôtre. Ce nom a été quelquefois donné aux antipodes, quelquefois aux antécédents; mais il est peu usité, & la signification n'est pas assez déterminée. (D. L.)

ANTILOGARITHME, f. m. (Analyse); le dit quelquefois du complément du logarithme d'un sinus d'une tangente, d'une sécante: c'est-à-dire, de la différence de ce logarithme à celui du sinus total. Voyez LOGARITHME & COMPLÉMENT.

ANTINOUS, constellation boréale qu'on réunit ordinairement avec l'aigle; Ptolémée n'en fait point une constellation, il dit seulement, les étoiles informes autour de l'aigle, dans lesquelles est Antinous Proetus, auteur du cinquième siècle n'en parle pas non plus. Voyez M. Bailly, tom. 2, p. 199. Cette constellation est appelée dans les auteurs *puer Antinous* ou *Bithynicus*, *novus Egypti Deus*, *puer Troicus*, *Phrygius*, *puer Aquila*, *Jovis cy-*

hardus ou *Catamitus* (Favori) *Pincerna* ou *Posillator*, *Ganymedes*. C'étoit, selon l'opinion commune, un jeune-homme d'une très-grande beauté, né à Claudiopolis en Bithynie, qui se noya dans le Nil l'an 131 (*Spart. Dion. liv. lair*); d'autres disent qu'il sacrifia sa vie pour sauver celle d'Adrien; cet empereur pleura sa perte amèrement, & honora sa mémoire au point de lui faire élever des autels comme à une nouvelle divinité. Goltzius, dans son Trésor des antiquités, rapporte une inscription grecque trouvée à Rome dans le champ de Mars, où étoit le temple d'Iris: *Antinoos eumdem cum diis Egyptii trimum occupanti*. Ce fut à l'honneur d'Antinoos que l'empereur Adrien fit frapper des monnoies, & bâtit en Egypte une ville sous le nom d'Antinoia, qui fut ensuite appelée *Adriopolis*: il étoit également adoré en Arcadie. On peut voir au sujet du culte d'Antinoos Pausanias, Dion, Spartianus, Athanasie, Théopile, Eusebe, Athenagore, Tertulien, & le Dictionnaire de Bayle & M. Bailly, *hist. de l'Afrique* II. 19, rapproche vivement à Ptolémée d'avoir nommé Antinoos par une lâche flatterie. On a prétendu cependant que l'Antinoos célèbre étoit un des amans de Pénélope, dont Propercé fait mention.

Penelope quove neglecta, elamore mariti

Nubere lascivo cogere Antinoos. L. iv. eleg. 5.

Enfin d'autres ont cru que l'Antinoos célèbre étoit le même que Ganymede, fils de Tros, roi des troyens, qui fut enlevé par Jupiter; ce qui l'a fait surnommer *puer Troicus*; mais il y a plus d'apparence que c'est au verseau que cette dernière fable a rapport. Au reste Ptolémée nomme Antinoos, mais il n'en fait pas une constellation, & ce sont les étoiles α , β , γ , δ , de la constellation de l'aigle, qui sont représentées dans nos cartes célestes comme placées sur la figure d'Antinoos. (D. L.)

ANTIPARALLÈLES (Lignes). (Géom.). Soient deux lignes droites tirées comme on voudra dans le même plan, & que nous appellerons A & B ; soient deux autres lignes qui coupent les lignes A & B , & que nous appellerons C & D ; si l'angle de la ligne C avec la ligne A ou la ligne B est égal à l'angle de la ligne D avec la ligne B ou la ligne A , les lignes C & D sont appelées antiparallèles; elles seroient parallèles si l'angle de C avec A ou B étoit égal à l'angle de D avec A ou B .

La section d'un cone oblique, faite par un plan antiparallèle à la base, est un cercle. Voy. CONE, (O).

ANTIPODES (Astr. géogr.), lieux de la terre qui sont diamétralement opposés. Ce mot vient du grec il est composé *anti contra*, & de *πῶς*, *podus*, pied. Ceux qui sont sur des parallèles à l'équateur, également éloignés de ce cercle, les uns du côté du midi, les autres du côté du nord, qui sont le même méridien, & qui sont sous ce méridien à la distance les uns des autres de 180 degrés,

ou de la moitié de ce méridien, sont *antipodes*, c'est-à-dire, ont les pieds diamétralement opposés. Les *antipodes* ont à-peu-près le même degré de chaud & de froid; ils ont les jours & les nuits également longs, mais dans des tems opposés; il est midi pour les uns quand il est minuit pour les autres; & lorsque les uns ont les jours les plus longs, les autres ont les jours les plus courts.

Platon passe pour avoir imaginé le premier la possibilité des *antipodes*, & pour être l'inventeur de ce nom; mais les premiers philosophes qui ont considéré que la terre étoit ronde, ont dû sentir la nécessité des *antipodes*: au contraire, ceux qui ont eu la présumption de raisonner sur ce qu'ils n'entendoient pas, ont nié l'existence des *antipodes*. Par exemple, Laënce diserte fort au long pour prouver qu'il ne peut pas y avoir des *antipodes*, parce qu'ils auroient la tête en bas, *Institutionum divinorum*, l. 3, cap. 23. Il traite de folie & d'impie l'idée de la rondeur de la terre, & dit que le contraire est assez prouvé par les physiciens & par les écrivains sacrés. On a peine à concevoir une pareille ignorance dans le précepteur du fils de Constantin; & une évêque, nommé *Virgilius*, fut déposé pour avoir soutenu les *antipodes*.

On trouve encoë de tems en tems même dans la bonne compagnie, des personnes qui ne peuvent se familiariser avec l'idée de ces habitans, dont les pieds sont tournés vers les nôtres; il semble au premier abord que les uns ou les autres doivent avoir la tête en bas, c'est-à-dire, être placés dans une situation renversée & contre l'état naturel. Mais, pour rectifier les idées là-dessus, on n'a qu'à examiner pourquoi nous sommes debout sur la surface du globe, nos pieds tournés vers la terre & la tête élevée vers le ciel; pourquoi nous retombons sans cesse à cette première situation, dès qu'un effort ou un mouvement étranger nous en a détournés. Cette force avec laquelle tous les corps descendent vers la terre, soit qu'on l'appelle pesanteur, gravité ou attraction, quoique sa cause nous soit inconnue, se manifeste dans tous les points de notre globe; par-tout les corps graves tendent vers le centre de la terre, par un effort constant & inaltérable; par-tout on dit que ce qui tombe vers la terre descend, & qu'on monte en s'en éloignant. Ainsi le corps *A* (planche d'*Astr.* fig. 35), attiré par le centre *C* du globe terrestre suivant la ligne *ABC*, ou le corps *E*, attiré dans un sens contraire, suivant la ligne *EDC*, tombent & descendent tous deux vers la terre, parce que leur tendance ou leur direction naturelle est de s'approcher du centre *C*. Un habitant placé en *B* verra tomber la pluie vers lui de *A* en *B*, & celui qui est aux *antipodes* en *D*, verra venir la pluie sur la terre de *E* en *D*; ce sont à la vérité des directions différentes, mais elles sont également naturelles, parce que le centre *C* de la terre est le terme commun, le point de réunion

& de tendance de la pluie & de tous les autres corps graves.

J'ai oui des commençans demander pourquoi si le corps *A* descend de *A* en *B* l'autre ne descend pas pareillement de *D* en *E*; ils ne s'étoient pas encore accoutumés à observer que le corps *A* ne descend vers *B* que parce qu'il est forcé de se rapprocher de la terre *C*, au lieu que le corps *E* n'a plus rien du côté de *F* qui puisse le déterminer à se mouvoir, aucune force, aucune loi, aucun objet, aucune cause de mouvement; il n'a de rapport qu'avec la terre: c'est-là qu'est la proposition naturelle, la cause & le terme de son mouvement; & en allant de *E* vers *D*, il obéit à la même force, à la même cause; il se meut de la même manière, par la même raison, & il suit la même loi que le corps *A* en descendant vers *B*: ainsi, l'on peut dire que deux corps tombent l'un & l'autre, quoiqu'ils aillent en deux sens opposés; enfin c'est tomber que de se rapprocher de la terre.

Les voyageurs qui ont fait le tour du monde, & ils sont en grand nombre, ont été souvent à nos *antipodes*. Ceux de Paris sont dans la mer du sud, près de la nouvelle Zélande, dont le capitaine Cook nous a donné la description. Les *antipodes* de l'Espagne sont sur l'ile même où *M. Marion* fut tué en 1772; & dans le planisphère austral fait par *M. le duc de Croy* & *M. Robert de Vaugondy* (à Paris chez *Fortin*, 1773), on trouve marqués les *antipodes* des principaux lieux de l'Europe. (DE LA LARDE).

ANTITHÈSE, f. f. (Algèbre). Quelques auteurs appellent *antithèse* l'opération par laquelle on transpose d'un membre à l'autre d'une équation un terme de cette équation; ce qui se fait en effaçant ce terme dans le membre où il se trouve, & le plaçant dans l'autre membre avec un signe contraire à celui qu'il avoit. Ainsi, de l'équation $x + b = a$, on tire par *antithèse* $x = a - b$.

A O U

AOUT, f. m. (*Apron.*) sixième mois de l'année de *Romulus*, le huitième de celle de *Numa* & de notre année moderne. Il étoit appelé *sexilis*, à cause du rang qu'il occupoit dans l'année de *Romulus*; & ce nom lui avoit été conservé dans l'année de *Numa*. Voyez année. *Auguste* lui donna son nom, *Augustus*, qu'il conserva encoë, & d'où les Français ont fait *août* par corruption. Ce mois, & celui de juillet, dont le nom vient de *Jules César*, sont les deux seuls qui aient conservé les noms que les Empeteurs leur ont donnés: le mois d'avril s'étoit appelé pendant quelque tems *Neronius*, le mois de mai, *Claudius*, &c.

Le soleil pendant ce mois parcourt ou paroit parcourir la plus grande partie du signe du zodiaque, appelle le *taureau*; & vers le 23 de ce mois

il entre au signe de la vierge; mais, à proprement parler, c'est la terre qui parcourt réellement le signe du verseau, opposé à celui du Lion. Les mois d'août & de juillet sont ordinairement les plus chauds de l'année, quoique le soleil commence à s'éloigner de nous ainsî dès le 21 juin, parce que la terre échauffée plus long tems, conserve plus de chaleur.

Des Anglois appellent le premier jour d'août, qui est la fête de S. Pierre des liens, *Lammas-day*, comme qui diroit fête à l'agneau; cela paroit venir d'une coutume qui observoit autrefois dans la province d'York; sous ceux qui tenoient quelque terre de l'église cathédrale, étoient obligés ce jour-là d'amener dans l'église à la grand-messe un agneau vivant pour offrir.

APHÉLIE, f. m. C'est, en Astronomie, le point de l'orbite de la terre ou d'une planète, où la distance de cette planète au soleil est la plus grande qu'il est possible. Voyez ORBITE.

Aphélie est composé de *ἀπ*, longé, & de *ἥλιος*, soleil; ainsi, lorsqu'une planète est en *A*, Planch. d'Astron. fig. 85, comme la distance au soleil *S* est alors la plus grande qu'il est possible, on dit qu'elle est à son Aphélie. Voyez PLANÈTE, SOLEIL, &c.

Dans le système de Ptolémée, ou dans la supposition que le soleil se meut autour de la terre, l'Aphélie devient l'apogée. Voyez APOGÉE. L'Aphélie est le point diamétralement opposé au périhélie. Voyez PÉRIHÉLIE. Les Aphélies des planètes ne sont point en repos; car l'action mutuelle qu'elles exercent les unes sur les autres, fait que ces points de leurs orbites sont dans un mouvement continu, lequel est plus ou moins sensible. Ce mouvement se fait *in consequentia*, ou selon l'ordre des signes; & en supposant qu'il soit produit par l'action d'une planète fort éloignée, comme Jupiter ou Saturne, sur plusieurs planètes inférieures, il est selon Newton en raison sesquiquadruplée des distances de ces planètes au soleil, c'est-à-dire comme les racines carrées des cubes de ces distances. Princip. I. III, pr. 14. Suivant cette règle, l'Aphélie de mars étant supposée se mouvoir de 35' relativement aux étoiles fixes, dans l'espace de 100 ans; les Aphélies de la terre, de Vénus & de Mercure, seroient dans le même tems & dans le même intervalle de tems, 18 minutes 36 secondes, 11 minutes 27 secondes & 4 minutes 29 secondes. Mais, pour calculer ces mouvemens avec une certaine précision, il faudroit calculer l'action de chaque planète sur toutes les autres, car il est prouvé que tous les Aphélies ont un mouvement causé par l'attraction des autres planètes, ainsi que l'apogée de la lune a un mouvement causé par l'attraction du soleil: on peut voir le calcul de ce mouvement de l'Aphélie, produit par les attractions étrangères, dans le XXII^e livre de mon Astronomie, & dans les pièces de M. Euler, sur les inégalités de Saturne, de Jupiter & de la terre, dans la pièce de Clairaut sur les inégalités de la lune, & dans les recherches de M. d'Alembert.

Ce qu'il y a de plus nécessaire à expliquer ici au sujet de l'Aphélie des planètes, est la manière d'en déterminer la position & le mouvement, par des observations astronomiques. La méthode la plus simple est celle que Kepler tiroit de la nature du mouvement elliptique, (*De Stella Maris*, p. 204.) Le point de l'Aphélie *A* (Astr. fig. 86) est celui où la planète a la plus petite vitesse, & le périhélie *P* est le point de la plus grande vitesse; le grand axe *AP* de l'ellipse sépare deux portions de l'orbite qui sont égales, semblables, & parcourues en tems égaux; & avec les mêmes degrés de vitesse; mais si l'on tire, par le foyer de l'ellipse, une autre ligne comme *DSE* qui ne passe point en *A* & en *P*, elle partagera l'ellipse en deux parties *DAE*, *DBPE*, qui ne seront ni égales, ni parcourues en tems égaux. La partie *DAE*, où se trouve l'Aphélie, exigera plus de tems que l'autre, ou plus de la moitié de la révolution; ainsi, l'on peut choisir deux observations d'une planète, où les longitudes observées réduites au soleil aient été diamétralement opposées entr'elles; & si les tems de ces observations sont éloignés aussi d'une demi-révolution de la planète, on saura, par-là même, quelles ont été dans les aphélie; plus l'intervalle approchera de la demi-révolution juste, plus les positions observées approcheront d'être celles des aphélie, ou de l'Aphélie & du périhélie. Cette méthode réussit très-bien pour trouver l'apogée du soleil. (*Mém. de l'Acad. 1757, pag. 141.*)

Pour les planètes dont les oppositions sont rares, il est difficile d'avoir deux longitudes vues du soleil diamétralement opposées; on est obligé de supposer connues l'excentricité & la plus grande équation, & l'on trouve la situation de l'Aphélie par une autre considération. L'on prend deux observations faites aux environs du point *A*, & du point *F* qui est vers les moyennes distances, on a le mouvement vrai, ou l'angle *ASF*, mais par la durée connue de la révolution, on fait toujours quel est le mouvement moyen pour un intervalle de tems donné; la différence du mouvement vrai au mouvement moyen doit être d'accord avec l'équation de l'orbite calculée, en supposant qu'on connoisse bien le lieu *A* de l'Aphélie; mais si l'on se trompe sur le lieu de l'Aphélie, il y aura une erreur dans l'équation calculée vers le point *A*, ou l'équation change rapidement; il n'y en aura presque point vers la moyenne distance *F*, où l'équation ne varie pas sensiblement, étant à son maximum; ainsi, le mouvement total calculé de *A* en *F*, ne pourra être conforme au mouvement observé, que quand on aura employé dans le calcul un lieu de l'Aphélie exactement connu; alors on changera d'hypothèse jusqu'à ce que l'on ait accordé le calcul avec l'observation, & l'on reconnoitra ainsi la vraie situation de l'Aphélie.

La troisième méthode pour déterminer l'Aphélie est celle que j'ai employée pour Mercure, & qui m'a très-bien réussi; elle consiste à observer la plus

grande digression de la planète vers ses moyennes distances. Supposons que la terre T voit la planète F par un rayon visuel TF qui touche l'orbite en F & qui marque la plus grande digression STF ; pour peu que vous changez la situation AP de la ligne des apsidés, le rayon SF changera de situation & sortira de l'angle STF du côté du point G , en sorte que l'angle d'élongation augmentera & deviendra STG ; le calcul ne s'accordera plus avec l'observation que je suppose faite sur la ligne TF ; ainsi, l'élongation observée nous apprend quelle situation il faut donner au point A de l'aphélie pour que le calcul s'accorde avec l'observation; donc en faisant différentes hypothèses, on trouvera quel est le vrai lieu de l'aphélie. (*Mém. de l'Acad. 1766, pag. 498.*)

Enfin il y a une quatrième méthode plus générale pour déterminer l'aphélie d'une planète; elle consiste à employer trois observations rapportées au soleil, pour déterminer à-la-fois les trois principaux éléments d'une orbite, c'est-à-dire, l'aphélie, l'excentricité & l'époque du moyen mouvement; pourvu que ces observations soient réparties vers les apsidés & les moyennes distances; j'en ai donné le calcul appliqué à un exemple dans les *Mémoires de l'Académie pour 1754*; les principes sont d'ailleurs les mêmes que ceux dont je viens de faire usage; il s'agit de convertir les anomalies vraies en anomalies moyennes, dans différentes hypothèses d'aphélies & d'excentricités, jusqu'à ce qu'on ait trouvé deux différences d'anomalies moyennes, exactement d'accord avec les intervalles des observations.

On trouvera au *sup.* planète le résultat des calculs que j'ai faits sur toutes les planètes, en consultant mes tables, pour avoir le lieu de l'aphélie en 1750, avec l'augmentation pour cent ans; ce changement ne seroit que de $1^{\circ} 25' 49''$ comme celui de la précession des équinoxes, si les aphélies étoient aussi fixes que les étoiles, & qu'ils n'eussent d'autre changement en longitude que celui qui vient de la rétrogradation du point équinoxial, d'où l'on compte ces longitudes; ainsi, l'excès de ces mouvements sur celui de la précession, est le déplacement réel des aphélies, en un siècle, où le mouvement absolu, que j'ai mis dans la dernière colonne. Au reste ces quantités sont peu sensibles, & par conséquent n'ont pu être déterminées avec une bien grande exactitude. (*M. de LA LANDE*).

APHELLAN, nom de la belle étoile des gémeaux, marquée α .

APIS, taureau sacré des Egyptiens, emblème du taureau céleste ou équinoxial, qui étoit consacré dans les religions, de tous les peuples anciens comme l'emblème du renouvellement de la nature, au printemps.

APIS, constellation; Voyez **ABRIE**.

APOCATASTASIS, (*Astron.*) signifie révolution; Voyez **GRANDE ANNÉE**.

APOGÉE, (*Astron.*) vient de deux mots grecs $\alpha\pi\omicron$, longe, & $\gamma\epsilon$, terra, & signifie le point dans lequel une planète est la plus éloignée de la terre. Le soleil & la lune ont sui-tout un apogée qui est le sommet du grand axe des orbites, qu'ils décrivent ou paroissent décrire autour de la terre, car, quoique la terre tourne réellement autour du soleil, on dit souvent, pour se conformer à l'ancien usage, que le soleil est apogée lorsque la terre est aphélie, & les apparences sont absolument les mêmes quant au mouvement annuel; la manière de déterminer le lieu de l'apogée d'une planète, est exactement la même que pour déterminer le lieu de l'aphélie pour le soleil & les planètes supérieures. Voyez **APHÉLIE**. Le lieu de l'apogée du soleil, au commencement de 1750, étoit à $3^{\circ} 8' 38'' 4$ suivant les tables de la Caille, & son mouvement, par rapport aux équinoxes, est de $1^{\circ} 49' 10''$ par siècle. La cause de ce mouvement est l'attraction des planètes, sur-tout de vénus & de jupiter, comme on le peut voir dans la pièce de *M. Euler sur les inégalités de la terre*, qui a remporté le prix de l'Académie des Sciences, en 1756; elle est dans le huitième volume des pièces couronnées, imprimé en 1771. On peut voir aussi les recherches de *M. d'Alembert* sur différents points importants du système du monde; le Mémoire de *M. Clairaut* sur l'orbite apparente du soleil qui est dans les Mémoires de l'Académie, pour 1754, & la seconde édition de mon *Astronomie*.

L'apogée de la lune, en 1750, étoit à $5^{\circ} 21' 2'' 31'' 3$ & son mouvement dans l'espace d'une année commune est de $1^{\circ} 10' 39'' 50''$; suivant la table de Mayer, la révolution de l'apogée, par rapport aux étoiles fixes, est de 8 ans 311 jours ou 3211 jours $8^{\frac{1}{2}}$ $57' 3''$. Outre le mouvement progressif de l'apogée de la lune, les astronomes ont considéré long-tems l'orbite de la lune comme étant sujette à un balancement dans son apogée, joint à une variation dans l'excentricité. Horrocius fut le premier auteur de cette hypothèse ingénieuse que Newton adopta dans son fameux livre des Principes, & sur laquelle sont fondées les tables de la lune de Halley & celles de Flamsteed, que *M. le Monnier* a données dans les institutions astronomiques. *M. Euler* est le premier qui ait substitué à cette hypothèse une équation beaucoup plus commode, & que l'on appelle évéction: la quantité est de $1^{\circ} 20' 34''$. Pour rendre raison de l'hypothèse d'Horrocius dans les principes de l'attraction, il faut considérer que le mouvement de l'apogée de la lune vient de ce que la force centrale de la lune vers la terre est diminuée, & le mouvement doit être le plus grand quand la ligne des syzygies concourt avec la ligne des apsidés, ou lorsque le soleil répond à l'apogée ou au périégée de la lune. Quand il est dans les quadratures, le mouvement de l'apogée est au contraire le plus lent, parce que la diminution totale de la force centrale est la plus petite; quand le soleil est à

45°. des apfides, le mouvement vrai de l'apogée est égal au mouvement moyen; mais son vrai lieu est alors le plus différent du lieu moyen, & l'équation est la plus-forte parce qu'elle est le résultat de tous les degrés de vitesse que l'apogée a reçus jusques-là; cette équation dans les tables de Halley montoit à 12° 18'.

Il y a aussi une inégalité dans le lieu de l'apogée qui provient des distances du soleil à la terre & qui est de 23° 12' additive quand le soleil est à 3 signes d'anomalie, c'est une équation annuelle.

Le mouvement de l'apogée de la lune est difficile à calculer par la théorie de l'attraction. Clairaut, en 1747, avoit cru que la théorie ne donnoit que la moitié du mouvement qui s'observe; il annonça solennellement ce résultat dans l'assemblée publique de l'Académie, du 15 novembre 1747, & il fit imprimer son Mémoire dans le volume de 1745, pag. 336; mais le volume n'étoit pas encore achevé d'imprimer qu'il lut à l'Académie, le 17 mai 1749, une espèce de rétractation qui se trouve dans le même volume, pag. 557, & plus en détail dans les Mémoires de 1748, pag. 433. La première théorie détaillée où l'on ait vu que la loi de l'attraction satisfaisoit exactement au mouvement de l'apogée, est la pièce de Clairaut, qui remporta le prix de l'Académie de Pétersbourg proposé en 1750. M. Euler, qui en étoit juge, m'a raconté qu'il avoit trouvé la chose si extraordinaire, qu'il n'avoit pu en être persuadé que quand il fut parvenu au même résultat par une méthode qui lui étoit particulière; il vit alors que des termes que tous les géomètres avoient cru absolument négligeables dans la théorie de la lune, influoient beaucoup sur l'apogée. Clairaut lui-même n'y étoit parvenu qu'en cherchant par un calcul très-rigoureux la valeur d'un terme qu'il falloit ajouter, suivant lui, à l'expression générale de l'attraction newtonienne pour trouver une autre loi d'attraction, propre à représenter le mouvement de l'apogée. Cette question ne fait aujourd'hui aucune difficulté, & M. d'Alembert a démontré de son côté que l'attraction du soleil en raison inverse du carré de la distance explique parfaitement la révolution de l'apogée de la lune, telle qu'elle se trouve par les observations. (DE LA LANDE).

APOLLOÏE, (*Astron.*) nom que quelques astronomes ont donné à l'apside supérieure de l'orbite du quatrième satellite de jupiter, ou au point de son plus grand éloignement, quoique ce terme soit composé d'un mot grec & d'un mot latin.

APOLLONIEN, adj. m. On désigne quelquefois l'hyperbole & la parabole ordinaire, par les noms d'hyperbole & de paraboles Apolloniennes, ou d'Apollonius, pour les distinguer de quelques autres courbes d'un genre plus élevé, & auxquelles on a aussi donné le nom d'hyperbole & de parabole. Ainsi $x = y$ y désigne la parabole apollonienne; $a = x^2 y$ désigne l'hyperbole apollonienne; mais $a = x^2 y^2$ désigne une parabole du 3^e degré; $a^2 = x^2 y^2$ désigne une hyperbole du même degré. Voyez PARABOLE

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

& HYPERBOLE. On appelle la parabole & l'hyperbole ordinaires, parabole & hyperbole d'Apollonius, parce que nous avons de cet ancien géomètre un traité des sections coniques fort étendu. Ce mathématicien qu'on appelle Apollonius Pergas, parce qu'il étoit de Perge en Pamphlie, vivoit environ 200 ans avant Jésus-Christ. Il ramassa sur les sections coniques, tout ce qu'avoient fait avant lui Aristée, Eudoxe de Cnide, Menéchme, Euclide, Conon, Trafidée, Nicotele: ce fut lui qui donna aux trois sections coniques les noms de parabole, d'ellipse & d'hyperbole, qui non-seulement les distinguent, mais encore les caractérisent. Voyez leurs articles. Il avoit fait huit livres qui parvinrent entiers jusqu'à nous de Pappus d'Alexandrie, qui vivoit sous Théodose; on ne put retrouver que les quatre premiers livres, jusqu'en 1658, que le fameux Borelli trouva dans la bibliothèque du Florence un manuscrit arabe qui contenoit, outre ces quatre premiers, les trois suivans: aide d'un professeur d'arabe, qui ne savoit point de Géométrie, il traduisit ces livres, & les donna au public. Voyez l'éloge de M. Viviani, par M. de Fontenelle, *Hist. acad.* 1703.

Il semble que le huitième livre d'Apollonius ait été retrouvé depuis, car on lit dans l'éloge de M. Halley, par M. de Mairan (*Hist. acad.* 1742), que M. Halley donna en 1717 une traduction latine des huit livres d'Apollonius. Mais ce huitième livre d'Apollonius, qui se trouve dans la 1^{re} édition donnée par M. Halley, n'est point de cet ancien géomètre, & des sept autres; il a été rétabli par l'éditeur sur les indications de Pappus. Voyez l'*Hist. des Mathém.* de Montucla. Tom. I, pag. 282. (O)

APONECOMÉTRIE, f. f. (*Géom.*) est l'art ou la manière de mesurer la distance des objets éloignés. Voyez DISTANCE. Ce mot vient des mots grecs *ἀπὸν*, longueur, & *μετρεῖν*, mesurer. (O)

APORON ou APORISME, signifie chez quelques anciens géomètres un problème difficile à résoudre, mais dont il n'est pas certain que la solution soit impossible. Voyez PROBLÈME.

Ce mot vient du grec *ἀπορον*, qui signifie quelque chose de très-difficile, & même d'impraticable; il est formé d'*ἀ* privatif, & de *πορον*, passage. Tel est le problème de la quadrature du cercle. Voyez QUADRATURE, &c.

Lorsque l'on proposoit une question à quelque philosophe Grec, sur-tout de la secte des académiciens, s'il n'en pouvoit donner la solution, sa réponse étoit *ἀπορον*, je ne la conçois pas; je ne suis pas capable de l'éclaircir. (O).

APOTELESMA, (*Astron.*) signifie prédiction; dans Sextus Empiricus, il signifie essence, ce qui a été fait, achevé, décidé. (M. DE LA LANDE).

APOTHEME, f. m. dans la Géométrie élémentaire, est la perpendiculaire menée du centre d'un polygone régulier sur un de ses côtés.

Ce mot vient du grec *ἀποθῆ*, ab, th, & *μετρον*, so,

pono, je pose; apparemment comme qui diroit
ligne tirée depuis le centre jusques sur le côté. (O)

APOTOME, f. m. mot employé par quelques auteurs, pour désigner la différence de deux quantités incommensurables. Tel est l'excès de la racine quarrée de 2 sur 1. Voyez INCOMMENSURABLE.

Ce mot est dérivé du verbe grec *ἀποτμήω*, *abscindo*, je retranche; un apotome en Géométrie, est l'excès d'une ligne donnée sur une autre ligne qui lui est incommensurable. Tel est l'excès de la diagonale d'un quarré sur le côté. (O)

A P P

APPAREIL, f. m. (*Hydrod.*) : quelquefois on appelle ainsi le piston d'une pompe.

APPARENCE, f. f. (*perspective*) : représentation ou projection d'une figure, d'un corps ou d'un objet quelconque, sur le plan du tableau. Voyez PERSPECTIVE & PROJECTION.

On se sert du terme d'*apparence directe*, pour marquer la vue d'un objet par des rayons directs, c'est-à-dire, par des rayons qui viennent de l'objet sans avoir été ni réfléchis ni rompus. Voy. DIRECT & RAYON; Voyez aussi OPTIQUE & VISION.

APPARENT, adj. (*persp.*) : lieu apparent. Le lieu apparent d'un objet, en Optique, est celui où on le voit. Comme la distance apparente d'un objet est souvent fort différente de sa distance réelle, le lieu apparent est souvent fort différent du lieu vrai. Le lieu apparent est principalement du lieu où l'on voit un objet; en l'observant à-travers un ou plusieurs verres, ou par le moyen d'un ou plusieurs miroirs. Voyez DIOPTRIQUE, MIROIR, &c.

Nous disons que le lieu apparent est différent du lieu vrai; car lorsque la réfraction que souffrent à-travers un verre les principaux rayons que chaque point d'un objet fort proche envoie à nos yeux, a rendu ces rayons moins divergens; ou lorsque par un effet contraire, les rayons qui viennent d'un objet fort éloigné sont rendus par la réfraction aussi divergens que s'ils venoient d'un plus proche; alors il est nécessaire que l'objet paroisse à l'œil avoir changé de lieu; or le lieu que l'objet paroit occuper, après ce changement produit par la divergence ou la convergence des rayons, est ce qu'on appelle son lieu apparent. Il en est de même dans des miroirs. Voyez VISION.

Les Opticiens vont fort partagés sur le lieu apparent d'un objet vu par un miroir, ou par un verre. La plupart avoient cru, jusqu'à ces derniers tems, que l'objet paroisoit dans le point où le rayon réfléchi ou rompu passant par le centre de l'œil, rencontroit la perpendiculaire menée de l'objet sur la surface du miroir ou du verre. C'est le principe que le pere Tacquet a employé dans sa Catoptrique, pour expliquer les phénomènes des miroirs convexes & concaves; c'est aussi celui

dont M. de Mairan s'est servi pour trouver la courbe apparente du fond d'un bassin plein d'eau, dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'académie de 1740. Mais le pere Tacquet convient lui-même, à la fin de sa Catoptrique, que le principe dont il s'est servi n'est pas général, & qu'il est contredit par l'expérience. A l'égard de M. de Mairan, il paroit donner ce principe comme un principe de Géométrie plutôt que d'Optique; & il convient que Newton, Barrow, & les plus célèbres auteurs ne l'ont pas entièrement admis. Ceux-ci, pour déterminer le lieu apparent de l'objet, imaginent d'abord que l'objet envoie sur la surface du verre ou du miroir, deux rayons fort proches l'un de l'autre, lesquels après avoir souffert une ou plusieurs réfractions ou réflexions, entrent dans l'œil. Ces rayons rompus ou réfléchis, étant prolongés, concourent en un point, & ils entrent par conséquent dans l'œil comme s'ils venoient de ce point; d'où il s'ensuit, selon Newton & Barrow, que le lieu apparent de l'objet est au point de concours des rayons rompus ou réfléchis qui entrent dans l'œil, & ce point est aisé à déterminer par la Géométrie.

Voyez l'optique de Newton, & les leçons optiques de Barrow. Ce dernier auteur rapporte même une expérience qui paroît sans réplique, & par laquelle il est démontré que l'image apparente d'un fil à plomb enfoncé dans l'eau, est courbe; d'où il résulte que le lieu apparent d'un objet vu par réfraction n'est point dans l'endroit où le rayon rompu coupe la perpendiculaire menée de l'objet sur la surface rompante. Mais il faut avouer aussi que Barrow, à la fin de ses leçons d'optique, fait mention d'une expérience qui paroît contraire à son principe sur le lieu apparent de l'image; il ajoute que cette expérience est aussi contraire à l'opinion du pere Tacquet, qu'à la sienne; malgré cela Barrow n'en est pas moins attaché à son principe sur le lieu apparent de l'objet, qui lui paroît évident & très-simple; & il croit que, dans le cas particulier où ce principe semble ne pas avoir lieu, on n'a dû attribuer la cause qu'au peu de lumieres que nous avons sur la vision directe. A l'égard de M. Newton, quoiqu'il suive le principe de Barrow sur le lieu apparent de l'image, il paroit regarder la solution de ce problème comme une des plus difficiles de l'optique: *Puncti illius, dit-il, accurata determinatio problema soluti difficilissimum præbuit, nisi hypothesi alicui saltem verisimili, si non accurata vera, nitatur assertio.* Lec. opt. schol. Prop. VIII. pag. 80. Voyez MIROIR & DIOPTRIQUE.

Quoi qu'il en soit, voici des principes dont tous les Opticiens conviennent.

Si un objet est placé à une distance d'un verre convexe, moindre que celle de son foyer, on pourra déterminer son lieu apparent: s'il est placé au foyer, son lieu apparent ne pourra être déterminé; on le verra seulement dans ce dernier cas extrêmement éloigné, ou plutôt on le verra très-concavement.

Le lieu *apparent* ne pourra point encore se déterminer, si l'objet est placé au-delà du foyer d'un verre convexe; cependant si l'objet est plus éloigné du verre convexe que le foyer, & que l'œil soit placé au-delà de la base distincte, son lieu *apparent* sera dans la base distincte. On appelle *base distincte* un plan qui passe par le point de concours des rayons rompus. Voyez LENTILLE.

De même si un objet est placé à une distance d'un miroir concave, moindre que celle de son foyer, on peut déterminer son lieu *apparent*: s'il est placé au foyer, il paraîtra infiniment éloigné, ou plutôt il paraîtra confusément, son lieu *apparent* ne pouvant être déterminé.

Si l'objet est plus éloigné du miroir que le foyer, & que l'œil soit placé au-delà de la base distincte, le lieu *apparent* sera dans la base distincte. Voyez MIROIR, CONCAVE & CATOPTRIQUE.

On peut toujours déterminer le lieu *apparent* de l'objet dans un miroir convexe. (O).

APPARENT, *apparus*, adj. m. en Astronomie hauteur *apparente*, est celle qu'on observe, & qui est affectée par la *refraction* & le *parallaxe*.

Conjonction *apparente*. Il y a une *conjonction apparente* de deux planètes lorsque leurs longitudes *apparentes*, vues de la surface de la terre, sont les mêmes. La *conjonction apparente* est distinguée de la *conjonction vraie*, où le centre de la terre est dans un même plan perpendiculaire à l'écliptique avec les centres des deux planètes. Voyez CONJONCTION.

Horizon *apparent* ou *sensible*; c'est le grand cercle qui termine notre vue, ou celui qui est formé par la rencontre *apparente* du ciel & de la terre.

Cet horizon sépare la partie visible ou supérieure du ciel d'avec la partie inférieure qui nous est invisible, à cause de la rondeur de la terre. L'horizon *apparent* diffère de l'horizon *rationnel* qui lui est parallèle, mais qui passe par le centre de la terre. Voyez HORIZON. On peut concevoir un cône dont le sommet seroit dans notre œil, & dont la base seroit le plan circulaire qui termine notre vue; ce plan est l'horizon *apparent* ou *sensible*. Voyez ARRASEMENT.

Le diamètre *apparent* du soleil; de la lune ou d'une planète, est la quantité de l'angle sous lequel un observateur placé sur la surface de la terre, aperçoit ce diamètre; on le distingue du diamètre réel qui se compte en lieues ou en toises.

Les diamètres *apparents* des corps célestes ne sont pas toujours les mêmes. Le diamètre *apparent* du soleil n'est jamais plus petit que $31' 31''$ au commencement de juillet, & jamais plus grand que quand il est dans son périhélie au commencement de janvier; il est alors de $32' 36''$: on trouvera les autres diamètres au mot PLANÈTE.

Quand les objets font fort éloignés de l'œil, leurs diamètres *apparents*, c'est-à-dire, les grands dont on les voit, sont proportionnels aux angles sous lesquels ils sont vus; ainsi, quoique

le soleil & la lune soient fort différens l'un de l'autre pour la grandeur réelle, cependant leur diamètre *apparent* est à-peu-près le même, parce qu'on les voit à-peu-près sous le même angle. La raison de cela est que quand deux corps sont fort éloignés, quelque différence qu'il y ait entre leurs distances réelles, cette différence n'est point aperçue par nos yeux, & nous les jugeons l'un & l'autre à la même distance *apparente*; d'où il s'ensuit que la grandeur doit on les voit-est alors proportionnelle à l'angle optique ou visuel. Par conséquent si deux objets sont fort éloignés, & que leurs grandeurs réelles soient comme leurs distances réelles, ces objets paraîtront de la même grandeur, parce qu'ils seront vus sous des angles égaux.

Il y a une différence très-sensible entre les grandeurs *apparentes* ou diamètres *apparents* du soleil & de la lune vers l'horizon, & leurs diamètres *apparents* lorsqu'ils sont fort élevés au méridien. Ce phénomène a beaucoup occupé les philosophes; le P. Malbranche est celui qui paroît l'avoir expliqué de la manière la plus vraisemblable, & nous donnerons son explication au mot DIAMÈTRE.

La différence est encore plus singulière quand on regarde dans une lunette; souvent une personne y juge la planète grande comme une assiette, & l'autre comme une pièce de six sous; il ne peut en être y avoir de règle, parce qu'il n'y a point de terme de comparaison, & l'on estime la grandeur *apparente* au hasard, suivant le rapport qui s'établit involontairement entre l'impression qu'on éprouve alors dans l'œil, & celle qu'on a coutume d'éprouver en regardant des objets familiers.

La grandeur *apparente* peut donc changer, quoique l'angle du diamètre *apparent* ne change pas; ainsi, quoique l'angle optique soit la mesure de la grandeur *apparente*, suivant les auteurs d'Optique, d'autres opticiens prétendent avec beaucoup de fondement que la grandeur *apparente* d'un objet ou plutôt le jugement que nous en portons, ne dépend pas seulement de l'angle sous lequel il est vu; & pour le prouver, ils disent qu'un écart de six pieds vu à six pieds de distance, & un main d'un pied vu à un pied de distance, sont vus l'un & l'autre sous le même angle, & que cependant le écart paroît beaucoup plus grand; d'où ils concluent que tout le reste étant d'ailleurs égal, la grandeur *apparente* d'un objet dépend beaucoup de la distance *apparente*, c'est-à-dire, de l'éloignement auquel il nous paroît être. Voyez ANGLE, DIAMÈTRE.

Ainsi, quand on dit que l'angle optique est la mesure de la grandeur *apparente*, on doit restreindre cette proposition aux cas où la distance *apparente* est supposée la même; ou bien l'on doit entendre par le mot de grandeur *apparente* de l'objet, non pas la grandeur sous laquelle il paroît

M ij

véritablement, mais la grandeur de l'usage qu'il nous a fond de l'œil. Cette image est en effet proportionnelle à l'angle sous lequel on voit l'objet; & en ce sens on peut dire que la grandeur apparente d'un objet est d'autant de degrés que l'angle optique sous lequel on voit cet objet en contient. Voyez VISION.

Diffuse apparente est celle que l'on observe en degrés, minutes & secondes entre deux astres, avant qu'on l'ait dégagée de la réfraction qui la fait paraître trop petite, & de la parallaxe qui change aussi ces distances, c'est-à-dire, ces arcs *apparens* compris entre deux astres, que l'on observe. Voyez LONGITUDE.

Tems apparent est la même chose que *tems vrai*; il diffère du tems moyen à raison de l'équation du tems. (M. DE LA LARDE.)

APPLATI, adj. m. On appelle *sphéroïde applati* un sphéroïde dont l'axe est plus petit que le diamètre de l'équateur. Voyez SPHÉROÏDE.

APPLICATION, c'est l'action d'appliquer une chose à une autre, en les approchant, ou en les mettant l'une auprès de l'autre.

On définit le mouvement, l'application successive d'un corps aux différentes parties de l'espace. Voy. MOUVEMENT.

On entend quelquefois en Géométrie par application, ce que nous appelons en Arithmétique division. Ce mot est plus d'usage en latin qu'en français: *applicare* 6 ad 3, est la même chose que *diviser* 6 par 3. Voyez DIVISION.

Application, se dit encore de l'action de poser ou d'appliquer l'une sur l'autre deux figures planes égales ou inégales.

C'est par l'application ou superposition qu'on démontre plusieurs propositions fondamentales de la Géométrie élémentaire; par exemple, que deux triangles qui ont une même base & les mêmes angles à la base, sont égaux en tout; que le diamètre d'un cercle le divise en deux parties parfaitement égales; qu'un carré est partagé par sa diagonale en deux triangles égaux & semblables, &c. Voyez SUPERPOSITION.

APPLICATION d'une science à une autre, en général se dit de l'usage qu'on fait des principes & des vérités qui appartiennent à l'une pour perfectionner & augmenter l'autre.

En général, il n'est point de science ou d'art qui ne tiennent en partie à quelqu'autre. Le discours préliminaire qui est à la tête de l'Encyclopédie, & une multitude d'articles de ce Dictionnaire en fournissent la preuve.

APPLICATION de l'Algèbre ou de l'Analyse à la Géométrie. L'Algèbre étant, comme nous l'avons dit à son article, le calcul des grandeurs en général, & l'Analyse l'usage de l'Algèbre pour découvrir les quantités inconnues; il étoit naturel qu'après avoir découvert l'Algèbre & l'Analyse, on songeât à appliquer ces deux sciences à la Géométrie, puisque les lignes, les surfaces, & les

solides dont la Géométrie s'occupe, sont des grandeurs mesurables & comparables entre elles, & dont on peut par conséquent assigner les rapports. Voyez ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE. Cependant jusqu'à M. Descartes, personne n'y avoit pensé, quoique l'Algèbre eût déjà fait d'assez grands progrès, sur-tout entre les mains de Viète. Voyez ALGÈBRE. C'est dans la Géométrie de M. Descartes que l'on trouve pour la première fois l'application de l'Algèbre à la Géométrie, ainsi que des méthodes excellentes pour perfectionner l'Algèbre même: ce grand génie a rendu par-là un service immortel aux Mathématiques, & a donné la clé des plus grandes des découvertes qu'on pût espérer de faire dans cette science.

Il a le premier appris à exprimer par des équations la nature des courbes, à résoudre par le secours de ces mêmes courbes, les problèmes de Géométrie; enfin à démontrer souvent les théorèmes de Géométrie par le secours du calcul algébrique, lorsqu'il seroit trop pénible de les démontrer autrement en se servant des méthodes ordinaires. On verra aux articles CONSTRUCTION, EQUATION, COURBE, en quoi consiste cette application de l'Algèbre à la Géométrie. Nous ignorons si les anciens avoient quelque secours semblable dans leurs recherches; s'ils n'en ont pas eu on ne peut que les admirer d'avoir été si loin sans ce secours. Nous avons le traité d'Archimède sur les spirales, & les propres démonstrations; il est difficile de savoir si ces démonstrations exposent précisément la méthode par laquelle il est parvenu à découvrir les propriétés des spirales; ou si, après avoir trouvé ces propriétés par quelque méthode particulière, il a eu dessein de cacher cette méthode par des démonstrations embarrassées. Mais s'il n'a point en effet suivi d'autre méthode que celle qui est contenue dans ces démonstrations mêmes, il est étonnant qu'il ne se soit pas égaré; & on ne peut donner une plus grande preuve de la profondeur & de l'étendue de son génie: car Boullaud avoue qu'il n'a pas entendu les démonstrations d'Archimède, & Viète les a injustement accusées de paralogisme.

Quoi qu'il en soit, ces mêmes démonstrations qui ont coûté tant de peine à Boullaud & à Viète, & peut-être tant à Archimède, peuvent aujourd'hui être extrêmement facilitées par l'application de l'Algèbre à la Géométrie. On en peut dire autant de tous les ouvrages géométriques des anciens, que presque personne ne lit, par la facilité que donne l'Algèbre de réduire leurs démonstrations à quelques lignes de calcul.

Cependant M. Newton, qui connoissoit mieux qu'un autre tous les avantages de l'Analyse dans la Géométrie, se plaint en plusieurs endroits de ses ouvrages, de ce que la lecture des anciens géomètres est abandonnée.

En effet, on regarde communément la méthode dont les anciens se sont servis dans leurs livres

de Géométrie, comme plus rigoureuse que celle de l'Analyse; & c'est principalement sur cela que sont fondées les plaintes de M. Newton, qui craignoit que par l'usage trop fréquent de l'Analyse, la Géométrie ne perdît cette rigueur qui caractérise ses démonstrations. On ne peut nier que ce grand homme ne fût fondé, au moins en partie, à recommander jusqu'à un certain point la lecture des anciens géomètres. Leurs démonstrations étant plus difficiles, exercent davantage l'esprit; l'accoutument à une application plus grande, lui donnent plus d'étendue, & le forment à la patience & à l'opiniâtreté, si nécessaires pour les découvertes. Mais il ne faut rien outrer; & si on s'en tenoit à la seule méthode des anciens, il n'y a pas d'apparence que, même avec le plus grand génie, on pût faire dans la Géométrie de grandes découvertes, ou du moins en aussi grand nombre qu'avec le secours de l'Analyse. A l'égard de l'avantage qu'on veut donner aux démonstrations faites à la manière des anciens d'être plus rigoureuses que les démonstrations analytiques, je doute que cette prétention soit bien fondée. J'ouvre les principes de Newton; je vois que tout y est démontré à la manière des anciens; mais en même tems je vois clairement que Newton a trouvé ses théorèmes par une autre méthode que celle par laquelle il les démontre, & que ses démonstrations ne sont proprement que des calculs analytiques qu'il a traduits, & déguilés en substituant le nom des lignes à leur valeur algébrique. Si on prétend que les démonstrations de Newton sont rigoureuses, ce qui est vrai; pourquoi les traductions de ces démonstrations en langage algébrique, ne seroient-elles pas rigoureuses aussi? Que j'appelle une ligne, AB , ou que je la désigne par l'expression algébrique a , quelle différence en peut-il résulter pour la certitude de la démonstration? A la vérité la dernière dénomination a cela de particulier que quand j'aurai désigné toutes les lignes par des caractères algébriques, je pourrai faire sur ces caractères beaucoup d'opérations, sans songer aux lignes ni à la figure; mais cela même est un avantage; l'esprit est soulagé, il n'a pas trop de toutes ses forces pour résoudre certains problèmes, & l'Analyse l'épargne autant qu'il est possible. Il suffit de savoir que les principes du calcul sont certains; la main calcule en toute sûreté, & arrive presque machinalement à un résultat qui donne le théorème ou le problème que l'on cherchoit, & auquel sans cela l'on ne seroit point parvenu, ou l'on ne seroit arrivé qu'avec beaucoup de peine. Il ne tiendra qu'à l'analyse de donner à sa démonstration ou à sa solution la rigueur prétendue qu'on croit lui manquer; il lui suffira pour cela de traduire la démonstration dans le langage des anciens, comme Newton a fait les siennes. Qu'on se contente donc de dire que l'usage trop fréquent & trop facile de l'A-

nalyse peut rendre l'esprit paresseux, & on aura raison, pourvu que l'on convienne en même tems de la nécessité absolue de l'Analyse pour un grand nombre de recherches; mais je doute fort que cet usage rende les démonstrations mathématiques moins rigoureuses. On peut regarder la méthode des anciens comme une route difficile, tortueuse, embarrassée, dans laquelle le géomètre guide ses lecteurs: l'analyse placée à un point de vue plus élevé, voit, pour ainsi dire, cette route d'un coup-d'œil; il ne tient qu'à lui d'en parcourir tous les sentiers, d'y conduire les autres, & de les y arrêter aussi long-tems qu'il le veut.

Au reste, il y a des cas où l'usage de l'Analyse, loin d'abrégier les démonstrations, les rendroit au contraire plus embarrassées. De ce nombre sont entr'autres plusieurs problèmes ou théorèmes, où il s'agit de comparer des angles entr'eux. Ces angles ne sont exprimables analytiquement que par leurs sinus, & l'expression des sinus des angles est souvent compliquée; ce qui rend les constructions & les démonstrations difficiles en se servant de l'Analyse. Au reste, c'est aux grands géomètres à savoir quand ils doivent faire usage de la méthode des anciens, ou lui préférer l'Analyse. Il seroit difficile de donner sur cela des règles exactes & générales.

APPLICATION de la Géométrie à l'Algèbre. Quoiqu'il soit beaucoup plus ordinaire & plus commode d'appliquer l'Algèbre à la Géométrie, que la Géométrie à l'Algèbre, cependant cette dernière application a lieu en certains cas. Comme on représente les lignes géométriques par des lettres, on peut quelquefois représenter par des lignes les grandeurs numériques que des lettres expriment, & il peut même dans quelques occasions en résulter plus de facilité pour la démonstration de certains théorèmes, ou la résolution de certains problèmes. Pour en donner un exemple simple, je suppose que je veuille prendre le carré de $a + b$; je puis par le calcul algébrique démontrer que ce carré contient le carré de a , plus celui de b , plus deux fois le produit de a par b . Mais je puis aussi démontrer cette proposition en me servant de la Géométrie. Pour cela, je n'ai qu'à faire un carré, dont je partagerai la base & la hauteur chacune en deux parties, dont j'appellerai l'une a & l'autre b ; ensuite tirant par les points de division les lignes parallèles aux côtés du carré, je diviserai ce carré en quatre surfaces, dont on verra au premier coup-d'œil que l'une sera le carré de a , une autre celui de b , & les deux autres seront chacune un rectangle formé de a & de b ; d'où il s'ensuit que le carré du binôme $a + b$ contient le carré de chacune des deux parties, plus deux fois le produit de la première par la seconde. Cet exemple, très-simple & à la portée de tout le monde, peut servir à faire voir comment on applique la Géométrie à l'Algèbre, c'est-à-dire, comment on peut

se servir quelquefois de la Géométrie pour démontrer les théorèmes d'Algèbre.

Au reste, l'application de la Géométrie à l'Algèbre n'est pas si nécessaire dans l'exemple que nous venons de rapporter, que dans plusieurs autres, trop compliqués pour que nous en fassions ici une énumération fort étendue. Nous nous contenterons de dire que la considération, par exemple, des courbes de genre parabolique, & du cours de ces courbes par rapport à leur axe, est souvent utile pour démontrer aisément plusieurs théorèmes sur les équations & sur leurs racines. Voyez entr'autres l'usage que M. l'abbé de Gua a fait de ces sortes de courbes, *Mém. acad.* 1741, pour démontrer la fameuse règle de Descartes sur le nombre des racines des équations. Voyez PARABOLIQUE, CONTRAÉCTION, &c.

On peut même quelquefois appliquer la Géométrie à l'Arithmétique, c'est-à-dire, se servir de la Géométrie pour démontrer plus aisément sans Analyse & d'une manière générale certains théorèmes d'Arithmétique; par exemple, que la suite des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, &c. ajoutés successivement, donne la suite des carrés 1, 4, 9, 16, 25, &c.

Pour cela, faites un triangle rectangle ABE (*Mécan. fig. 65*) dont un côté soit horizontal & l'autre vertical (je le désigne par *horizontal* & *vertical*, pour fixer l'imagination); divisez le côté vertical AB en tant de parties égales que vous voudrez, & par les points de division 1, 2, 3, 4, &c. menez les parallèles 1f, 2g, &c. à BE , vous aurez d'abord le petit triangle $A1f$, ensuite le trapèze 1fg2, qui vaudra trois fois ce triangle; puis un troisième trapèze 2gh3, qui vaudra cinq fois ce triangle; de sorte que les espaces terminés par les parallèles 1f, 2g, &c. seront représentés par les nombres suivans, 1, 3, 5, 7, &c. en commençant par le triangle $A1f$, & désignant ce triangle par 1.

Or les sommes de ces espaces seront les triangles $A1f$, $A2g$, $A3h$, &c. qui sont comme les carrés des côtés $A1$, $A2$, $A3$, c'est-à-dire, comme 1, 4, 9, &c. Donc la somme des nombres impairs donne la suite des nombres carrés. On peut sans doute démontrer cette proposition algébriquement; mais la démonstration précédente peut satisfaire ceux qui ignorent l'Algèbre. Voy. ACCÉLÉRATION.

APPLICATION de la Géométrie & de l'Algèbre à la Mécanique. Elle est fondée sur les mêmes principes que l'application de l'Algèbre à la Géométrie. Elle consiste principalement à représenter par des équations les courbes que décrivent les corps dans leur mouvement, à déterminer l'équation entre les espaces que les corps décrivent (lorsqu'ils sont animés par des forces quelconques), & le tems qu'ils emploient à parcourir ces espaces, &c. On ne peut à la vérité com-

parer ensemble deux choses d'une nature différente, telles que l'espace & le tems; mais on peut comparer le rapport des parties du tems avec celui des parties de l'espace parcouru. Le tems par la nature coule uniformément, & la mécanique suppose cette uniformité. Du reste, sans connaître le tems en lui-même, & sans en avoir de mesure précise, nous ne pouvons représenter plus clairement le rapport de ces parties, que par celui des parties d'une ligne droite indéfinie. Or l'analogie qu'il y a entre le rapport des parties d'une telle ligne, & celui des parties de l'espace parcouru par un corps qui se meut d'une manière quelconque, peut toujours être exprimé par une équation. On peut donc imaginer une courbe, dont les abscisses représentent les portions du tems écoulé depuis le commencement du mouvement; les ordonnées correspondantes désignent les espaces parcourus durant ces portions de tems. L'équation de cette courbe exprimera, non le rapport des tems aux espaces, mais, si on le parle ainsi, le rapport du rapport que les parties de tems ont à leur unité, à celui que les parties de l'espace parcouru ont à la leur; car l'équation d'une courbe peut être considérée ou comme exprimant le rapport des ordonnées aux abscisses, ou comme l'équation entre le rapport que les ordonnées ont à leur unité, & celui que les abscisses correspondantes ont à la leur.

Il est donc évident que, par l'application seule de la Géométrie & du calcul, on peut, sans le secours d'aucun autre principe, trouver les propriétés générales du mouvement varié suivant une loi quelconque. On peut voir à l'article ACCÉLÉRÉ, un exemple de l'application de la Géométrie à la Mécanique; les tems de la descente d'un corps pesant y sont représentés par les abscisses d'un triangle, les vitesses par les ordonnées (voyez ABSCISSE & ORDONNÉE), & les espaces parcourus, par l'aire des parties du triangle. Voyez TRAJECTOIRE, MOUVEMENT, TEMS, &c.

APPLICATION de la Mécanique à la Géométrie. Elle consiste principalement dans l'usage qu'on fait quelquefois du centre de gravité des figures pour déterminer les solides qu'elles forment. Voyez CENTRE DE GRAVITÉ.

APPLICATION de la Géométrie & de l'Astronomie à la Géographie. Elle consiste en trois choses. 1.^o A déterminer par les opérations géométriques & astronomiques la figure du globe que nous habitons. Voy. FIGURE DE LA TERRE, DEGRÉ, &c. 2.^o A trouver par l'observation des longitudes & des latitudes la position des lieux. Voyez LONGITUDE & LATITUDE. 3.^o A déterminer par des opérations géométriques la position des lieux peu éloignés l'un de l'autre. Voy. CARTE.

L'Astronomie & la Géométrie sont aussi d'us

grand usage dans la navigation. Voyez NAVIGATION, &c.

APPLICATION de la Géométrie & de l'Analyse à la Physique. C'est à M. Newton qu'on la doit comme on doit à M. Descartes l'application de l'Algèbre à la Géométrie. Elle est fondée sur les mêmes principes que l'application de l'Algèbre à la Géométrie. La plupart des propriétés des corps ont entr'elles des rapports plus ou moins marqués que nous pouvons comparer, & c'est à quoi nous parvenons par la Géométrie & par l'Analyse ou Algèbre. C'est sur cette application que sont fondées toutes les sciences physicomathématiques. Une seule observation ou expérience donne souvent toute une science. Supposez, comme on le fait par l'expérience, que les rayons de lumière se réfléchissent en faisant l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion, vous aurez toute la Catoptrique. Voy. CATOPTRIQUE. Cette expérience une fois admise, la Catoptrique devient une science purement géométrique, puisqu'elle se réduit à comparer des angles & des lignes données de position. Il en est de même d'une infinité d'autres. En général, c'est par le secours de la Géométrie & de l'Analyse que l'on parvient à déterminer la quantité d'un effet qui dépend d'un autre effet mieux connu. Donc cette science nous est presque toujours nécessaire dans la comparaison & l'examen des faits que l'expérience nous découvre. Il faut avouer cependant que les différents sujets de Physique ne sont pas également susceptibles de l'application de la Géométrie. Plusieurs expériences, telles que celles de l'aimant, de l'électricité, & une infinité d'autres, ne donnent aucune prise au calcul; en ce cas il faut s'abstenir de l'y appliquer. Les géomètres tombent quelquefois dans ce défaut, en substituant des hypothèses aux expériences, & calculant en conséquence; mais ces calculs ne doivent avoir de force qu'autant que les hypothèses sur lesquelles ils sont appuyés, sont conformes à la nature, & il faut pour cela que les observations les confirment, ce qui par malheur n'arrive pas toujours. D'ailleurs quand les hypothèses seroient vraies, elles ne sont pas toujours suffisantes. S'il y a dans dans un effet un grand nombre de circonstances dues à plusieurs causes qui agissent à-la-fois, & qu'on se contente de considérer quelques-unes de ces causes, parce qu'étant plus simples, leur effet peut être calculé plus aisément: on pourra bien par cette méthode avoir l'effet partiel de ces causes; mais cet effet sera fort différent de l'effet total qui résulte de la réunion de toutes les causes.

APPLICATION de la Méthode géométrique à la Métaphysique. On a quelquefois abusé de la Géométrie dans la Physique, en appliquant le calcul des propriétés des corps à des hypothèses arbitraires. Dans les sciences qui ne peuvent par leur nature être soumises à aucun calcul, on a abusé

de la méthode des géomètres, parce qu'on ne pouvoit abuser que de la méthode. Plusieurs ouvrages métaphysiques, qui ne contiennent souvent rien moins que des vérités certaines, ont été exécutés à la manière des géomètres, & on y voit à toutes les pages les grands mots d'axiome, de théorème, de corollaire, &c.

Les auteurs de ces ouvrages se font apparemment imaginés que de tels mots faisoient par quelque vertu secrète l'essence d'une démonstration, & qu'en s'en servant à la fin d'une proposition, ce qu'il falloit démontrer, ils rendroient démontré ce qui ne l'étoit pas. Mais ce n'est point à cette méthode que la Géométrie doit sa certitude, c'est à l'évidence & à la simplicité de son objet; & comme un livre de Géométrie pourroit être très-bon en s'écartant de la forme ordinaire, un livre de Métaphysique ou de Morale peut souvent être mauvais en suivant la méthode des Géomètres. Il faut même se défier de ces sortes d'ouvrages; car la plupart des prétendues démonstrations n'y sont fondées que sur l'abus des mots. Ceux qui ont réfléchi sur cette matière, savent combien l'abus des mots est facile & ordinaire, sur-tout dans les matières métaphysiques. C'est en quoi on peut dire que les Scolastiques ont excellé. On ne sauroit trop regretter qu'ils n'aient pas fait de leur agacité un meilleur usage.

APPLICATION de la Métaphysique à la Géométrie. On abuse quelquefois de la Métaphysique en Géométrie, comme on abuse de la méthode des Géomètres en Métaphysique. Ce n'est pas que la Géométrie n'ait, comme toutes les autres sciences une métaphysique qui lui est propre; cette métaphysique est même certaine & incontestable, puisque les propositions géométriques qui en résultent, sont d'une évidence à laquelle on ne sauroit se refuser. Mais, comme la certitude des Mathématiques vient de la simplicité de son objet, la métaphysique n'en sauroit être trop simple & trop lumineuse: elle doit toujours se réduire à des notions claires, précises & sans aucune obscurité. En effet, comment les conséquences pourroient-elles être certaines & évidentes, si les principes ne l'étoient pas? Cependant quelques auteurs ont cru pouvoir introduire dans la Géométrie une métaphysique souvent assez obscure, & qui pis est, démontrer par cette métaphysique des vérités dont on étoit déjà certain par d'autres principes. C'étoit le moyen de rendre ces vérités douteuses, si elles avoient pu le devenir. La Géométrie nouvelle a principalement donné occasion à cette mauvaise méthode. On a cru que les infiniment petits qu'elle considère étoient des quantités réelles; on a voulu admettre des infinis plus grands les uns que les autres; on a reconnu des infiniment petits de différents ordres, en regardant tout cela comme des réalités; au lieu de chercher à réduire ces suppositions & ces calculs à des notions simples. Voyez DIFFÉRENTIEL, INFINI, & INFINIMENT PETIT.

Un autre abus de la Métaphysique en Géométrie

métier, consiste à vouloir se borner dans certains cas à la Métaphysique pour des démonstrations géométriques. En supposant même que les principes métaphysiques dont on peut se servir soient certains & évidents, il n'y a guère de propositions géométriques qu'on puisse démontrer rigoureusement avec ce seul secours; presque toutes demandant, pour ainsi dire, la toise & le calcul. Cette manière de démontrer est bien matérielle, si l'on veut; mais enfin c'est presque toujours la seule qui soit sûre; c'est la plume à la main, & non pas avec des raisonnemens métaphysiques, qu'on peut faire des combinaisons & des calculs exacts.

Au reste, cette dernière métaphysique dont nous parlons, est bonne jusqu'à un certain point, pourvu qu'on ne s'y borne pas: elle fait entrevoir les principes des découvertes; elle nous fournit des vues; elle nous met dans le chemin: mais nous ne sommes bien sûrs d'y être, si on peut s'exprimer de la sorte, qu'après nous être aidés du bâton du calcul, pour connoître les objets que nous n'entrevoions auparavant que confusément.

Il semble que les grands Géomètres devroient être toujours excellens Métaphysiciens, au moins sur les objets de leur science: cela n'est pourtant pas toujours. Quelques Géomètres ressembleraient à des personnes qui auroient le sens de la vue contraire à celui du toucher; mais cela ne prouve que mieux combien le calcul est nécessaire pour les vérités géométriques. Au reste, je crois qu'on peut du moins assurer qu'un Géomètre, qui est mauvais Métaphysicien sur les objets dont il s'occupe, fera à coup sûr Métaphysicien détectable sur le reste. Ainsi, la Géométrie, qui mesure les corps, peut servir en certains cas à mesurer les esprits même.

APPLICATION *d'une chose à une autre*, en général se dit, en matière de Science ou d'Art, pour désigner l'usage dont la première est pour connoître ou perfectionner la seconde. Ainsi, l'application de la cycloïde aux pendules, signifie l'usage qu'on a fait de la cycloïde pour perfectionner les pendules. Voyez PENDULE, CYCLOÏDE, &c., & ainsi d'une infinité d'autres exemples. (O.)

APPLICATION, terme d'Astrologie, qui exprimoit le rapport d'un degré précédent à un degré suivant, quant aux influences. *Psol. de judiciis, l. 1 in fine.* (D.L.)

APPLIQUÉE, s. f. en Géométrie, c'est en général une ligne droite terminée par un courbe dont elle coupe le diamètre; ou en général, c'est une ligne droite qui se termine par une de ses extrémités à une courbe, & par qui l'autre extrémité se termine encore à la courbe même, ou à une ligne droite tracée sur le plan de cette courbe. Ainsi, (Scd. con. fig. 26) *EM, MM*, sont des appliquées à la courbe *MAAM*. Voyez COURBE, DIAMÈTRE, &c.

Le terme appliquée est synonyme à ordonnée. V. ORDONNÉE (O.)

APPLIQUER, signifie, en Mathématiques, trans-

porter une ligne donnée, soit dans un cercle, soit dans une autre figure curviligne ou rectiligne, en sorte que les deux extrémités de cette ligne soient dans le périmètre de la figure.

Appliquer signifie aussi diviser, sur-tout dans les Auteurs Latins. Ils ont accoustumé de dire *duc AB in CD*, mené *AB* sur *CD*; pour multiplier *AB* par *CD*, ou faire un pallelogramme rectangle de ces deux lignes; & appliquée *AB* ad *CD*, appliqué *AB* à *CD*, pour diviser *AB* par *CD*, ce qu'on exprime ainsi $\frac{AB}{CD}$. On entend encore par appliquer, tracer l'une sur l'autre des figures différentes; mais dans les autres sens est égale.

APOLLON (Astronom.), nom que quelques Auteurs ont donné à l'étoile des gémeaux, appelée aussi *casor*, c'est la précédente & la plus belle des deux; elle est marquée « (D.L.).

APPROCHE, s. f. (Mécan.). La courbe aux approches égales, *accessus aequalis*, demandée aux Géomètres par M. Leibnitz, est fameuse par la difficulté qu'ils eurent à en trouver l'équation. Voici la question.

Trouver une courbe le long de laquelle un corps descendant par l'action seule de la pesanteur, approche également de l'horizon en des tems égaux, c'est-à-dire, trouver la courbe *AMP* (Méch. fig. 41), qui soit telle que si un corps pesant se meut le long de la concavité *AMP* de cette courbe, & qu'on tire à volonté les lignes horizontales *QM*, *RN*, *SO*, *TP*, &c. également distantes l'une de l'autre, il parcourt en tems égaux les arcs *MN*, *NO*, *OP*, &c. terminés par ces lignes.

M. Bernoulli, Varignon & d'autres ont trouvé que c'étoit la seconde parabole cubique, placée de manière que son sommet *A* fut la partie supérieure. On doit de plus remarquer que le corps qui la doit décrire, pour s'approcher également de l'horizon en tems égaux, ne peut pas la décrire dès le commencement de sa chute. Il faut qu'il tombe d'abord en ligne droite d'une certaine hauteur *VA*, que la nature de cette parabole détermine; & ce n'est qu'avec la vitesse acquise par cette chute qu'il peut commencer à s'approcher également de l'horizon en tems égaux.

M. Varignon a généralisé la question à son ordinaire, en cherchant la courbe qu'un corps doit décrire dans le vuide pour s'approcher également du point donné en tems égaux, la loi de la pesanteur étant supposée quelconque.

M. de Maupertuis a aussi résolu le même problème, pour le cas où le corps se mouvrait dans un milieu résistant comme le quarré de la vitesse, ce qui rend la question beaucoup plus difficile que dans le cas où l'on suppose que le corps se meut dans le vuide. Voyez *Hist. acad. royale des Sciences*, ann. 1699, pag. 82, & an. 1730, pag. 129, *Mém.* p. 333. Voyez aussi DESCENTE (O.)

APPROXIMATION, s. f. (Alg.) opération par laquelle on trouve d'une manière approchée la valeur

leur d'une quantité qu'on ne peut pas trouver rigoureusement.

Cette opération est d'usage pour les racines des nombres qui ne sont pas des puissances parfaites; pour trouver la valeur approchée de l'inconnue dans une équation qu'on ne peut pas résoudre exactement, &c. Entrons dans quelques détails.

I. Tous les Traités d'Arithmétique enseignent à trouver par approximation les racines carrées & cube des nombres qui ne sont pas des carrés parfaits ou des cubes parfaits. On peut parvenir facilement au même but, pour une racine quelconque, au moyen de l'algèbre, comme je vais l'expliquer.

Soit d'abord à tirer la racine carrée approchée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait. Je commence par observer qu'un pareil nombre (il s'agit toujours de nombres entiers) est compris entre deux carrés consécutifs, c'est-à-dire, entre deux carrés dont les racines ne diffèrent que de l'unité. D'où il suit que tout nombre non carré peut être représenté par la formule $m^2 \pm n$; m^2 étant le carré supérieur ou inférieur à ce nombre, n la partie qu'il faut ajouter à m^2 , ou en soustraire, pour former le nombre en question. Cela posé, je considère que $\sqrt{m^2 \pm n}$ est la même que $(m^2 \pm n)^{\frac{1}{2}}$ (voyez EXPOSANT); & je développe $(m^2 \pm n)^{\frac{1}{2}}$ en série, par le moyen de la formule du binôme (voyez BINÔME); ce qui me donne $\sqrt{m^2 \pm n} = m \pm \frac{n}{2m} - \frac{n^2}{8m^3} \pm \frac{n^3}{16m^5} - \&c.$ On voit que m & n étant supposés des nombres entiers, cette série convergera toujours, pourvu que $\frac{n}{m}$ ne surpasse pas l'unité.

Par exemple, soit le nombre 150, qui n'est pas un carré parfait, & dont on demande la racine approchée: je commence par chercher, par les règles de l'arithmétique, la racine du plus grand carré contenu dans 150; cette racine est 12, & le carré 144; d'où je vois que 150 est compris entre le carré de 12, c'est-à-dire 144, & celui de 13, c'est-à-dire 169; mais, comme le nombre 150 est plus voisin de 144 que de 169, je le rapporte à la formule $m^2 + n$, en prenant $m^2 = 144$, $n = 6$. Alors la formule devient $12 + \frac{6}{24}$

$$= 12 + \frac{1}{4} = 12,25$$

ou 12,25. Cette série converge. Il suffira de prendre les trois premiers termes pour avoir la valeur approchée de toute la suite, ou de la racine carrée de 150. Or les deux premiers termes, qui ont le signe +, étant ajoutés ensemble, donnent $12 + \frac{1}{4}$, dont retranchant la fraction $\frac{1}{16}$ ou $\frac{1}{14}$, on aura, pour résultat des trois termes en question, $12 + \frac{1}{14}$, ou (en réduisant la partie $\frac{1}{14}$ en parties décimales, voyez ce mot), 12,247595, qui diffère à peine de la vraie racine de $\frac{150}{1000000}$.

Soit, pour le second exemple, le nombre 1289, Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

qui n'est pas un carré parfait. On trouve d'abord que la racine du plus grand carré, contenu dans ce nombre, est 35, & que le carré est 1225. Le carré immédiatement supérieur, c'est-à-dire, celui de 36 est 1296. Par conséquent le nombre proposé est compris entre les deux carrés consécutifs 1225 & 1296, mais plus approchant du second que du premier. Je le rapporte donc à la formule $m^2 - n$, en prenant $m^2 = 1296$, $n = 7$. Alors la série devient $36 - \frac{7}{72} + \frac{49}{5184} - \&c.$ dont prenant seulement les trois premiers termes, on a 35,902644 pour la racine carrée approchée de 1289.

Le procédé est le même pour la racine cube; la racine quatrième, &c. Par exemple, un nombre qui n'est pas un cube parfait, peut être représenté par $m^3 \pm n$, m^3 étant le cube supérieur ou inférieur, n la partie additive ou soustractive, qui complète le nombre proposé. Alors on a $\sqrt[3]{m^3 \pm n} = (m^3 \pm n)^{\frac{1}{3}} = m \pm \frac{n}{3m^2} - \frac{n^2}{9m^4} \pm \frac{n^3}{27m^6} - \frac{10n^4}{243m^8} \pm \&c.$ L'application aux nombres n'a aucune difficulté.

II. L'art de résoudre par approximation les équations qu'on ne peut pas résoudre en rigueur, est fondé sur quelques principes généraux que je vais expliquer. Je commence par les équations numériques, c'est-à-dire par les équations où il n'y a point d'autre quantité littérale que l'inconnue.

III. THÉORÈME. Si, en substituant dans une équation quelconque deux nombres différens à la place de l'inconnue, on obtient des résultats de signes contraires; l'une des valeurs de l'inconnue sera comprise entre les deux nombres substitués.

Soit, par exemple, l'équation $x^4 + px^3 + qx^2 + rx = 0$; supposons que ses quatre racines soient $x = a$, $x = b$, $x = c$, $x = d$, & qu'on ait $a > b$, $b > c$, $c > d$. Nous aurons $(x - a) \cdot (x - b) \cdot (x - c) \cdot (x - d) = 0$; & en substituant successivement g & h à la place de x , nous formerons les deux produits:

$$(A) \dots (g - a) \times (g - b) \times (g - c) \times (g - d),$$

$$(B) \dots (h - a) \times (h - b) \times (h - c) \times (h - d).$$

Cela posé, 1^o soient $g > a$; $h < a$ & $h > b$: il est clair que tous les facteurs du produit (A) sont positifs, que le premier facteur du produit (B) est négatif & les autres positifs; donc le produit (A) est positif, le produit (B) négatif, & la racine a est comprise entre g & h .

2^o Soient $g > b$, & $g < a$; $h < b$ & $h > c$: le premier facteur de (A) est négatif, les autres positifs; les deux premiers facteurs de (B) sont négatifs, les autres positifs; donc le produit (A) est négatif, le produit (B) positif, & la racine b comprise entre g & h .

3.^o Soient $g > c$, & $g < b$; $h < c$ & $h > d$: les deux premiers facteurs de (A) sont négatifs, & les deux autres positifs; les trois premiers facteurs de (B) sont négatifs, le quatrième positif; donc le produit (A) est positif, le produit (B) négatif, & la racine c est comprise entre g & h .

4.^o Enfin, soient $g > d$ & $g < c$; $h > d$: les trois premiers facteurs de (A) sont négatifs, le quatrième positif; les quatre facteurs de (B) sont négatifs; donc le produit (A) est négatif, le produit (B) positif, & la racine d est comprise entre g & h .

On appliquera facilement la même démonstration à une équation de tout autre degré.

IV. COROLLAIRE I. Il suit de là que si les deux nombres g & h ne diffèrent entr'eux que de l'unité, la valeur qu'on obtiendra pour x , en mettant g ou h à la place de cette inconnue, ne différera pas d'une unité de la vraie valeur de x .

V. COROLLAIRE II. Toute équation dont le dernier terme est négatif, le premier étant positif, a nécessairement au moins une racine positive. Car soit l'équation générale $x^n + p x^{n-1} + q x^{n-2} + \dots - k = 0$. Si l'on fait $x = 0$, on aura le résultat négatif $-k$; & si l'on fait $x = \infty$ (a), on aura le résultat positif $+\infty$. Ainsi, on a ici $g = 0$, $h = \infty$. Donc l'une des valeurs de x est comprise entre 0 & ∞ ; elle est par conséquent l'un des nombres réels positifs compris entre ces deux limites.

VI. COROLLAIRE III. Toute équation d'un degré impair a , au moins, une racine réelle, laquelle sera positive ou négative, selon que le dernier terme de l'équation sera négatif ou positif, le premier étant toujours positif. En effet, on voit d'abord que le premier cas est compris dans l'article précédent. Pour démontrer le second, on observera que le nombre des termes d'une équation d'un degré impair étant pair, si l'on change les signes de ces termes pris de deux en deux à compter depuis le second inclusivement jusqu'au dernier, les racines positives deviendront négatives, & les négatives, positives (Voyez RACINE). Or, par ce changement de signes, le dernier terme de l'équation devient négatif. Donc la nouvelle équation a , au moins, une racine positive, & par conséquent l'équation primitive a , au moins, une racine négative correspondante.

VII. COROLLAIRE IV. Une équation d'un degré pair, dont le dernier terme est négatif, a au moins deux racines réelles, l'une positive, l'autre négative. Car d'abord elle a une racine réelle positive (V). Ensuite si l'on change les signes de ses termes pris de deux en deux, à compter depuis le second jusqu'au dernier, pour changer les racines positives en négatives, & les négatives en positives; on aura une équation dont le dernier terme demeurera le même en tout que celui de

la proposée. Donc cette nouvelle équation a au moins une racine réelle positive; & par conséquent la racine correspondante de l'équation proposée sera réelle & négative.

VIII. REMARQUE. Il peut se faire qu'une équation ne donne jamais de résultats de signes contraires, quelques nombres qu'on substitue à la place de l'inconnue. Cela arrive, 1.^o lorsque l'équation contient seulement des racines égales deux à deux, quatre à quatre, &c. Ainsi, par exemple, l'équation $(x-a)^2 \times (x-b)^2 \dots = 0$, conservera évidemment toujours le même signe, quelque valeur qu'on attribue à x .

2.^o Lorsque l'équation contient seulement des racines imaginaires. Telle est l'équation $(x+a+b\sqrt{-1}) \cdot (x+a-b\sqrt{-1}) \cdot (x-c+d\sqrt{-1}) \cdot (x-c-d\sqrt{-1}) \dots = 0$, qui aura toujours le même signe, quelque valeur qu'on donne à x . Sur quoi il faut se rappeler que les imaginaires vont toujours deux à deux, & que les deux racines qui composent une même paire, ne diffèrent jamais que par le signe de la partie imaginaire.

3.^o Lorsque l'équation contient tout-à-la-fois des racines égales deux à deux, quatre à quatre, &c., & des racines imaginaires. Telle est l'équation, $(x-a)^2 \cdot (x-b)^2 \cdot (x+c+d\sqrt{-1}) \cdot (x-c-d\sqrt{-1}) \dots = 0$.

Concluons de-là que toute équation qui donne des résultats de signes contraires, en mettant à la place de l'inconnue des nombres réels, différens, ne tombe dans aucun des trois cas précédens.

IX. PROBLÈME. Résoudre une équation quelconque, sinon rigoureusement, au moins par approximation.

Je commence par examiner si cette équation ne contient pas des racines égales; ces racines, lorsqu'il y en a, se trouvent, comme on l'expliquera au mot *racine*; & on parvient à une équation d'un degré inférieur qui ne contient plus de racines égales. J'examine encore si l'équation réduite n'a pas de diviseurs commensurables d'une dimension; ces diviseurs se trouvent par la méthode qu'on expliquera au mot *diviseur commensurable*. Au moyen de ces recherches préliminaires, on n'aura plus à résoudre que des équations qui contiennent des racines réelles inégales & incommensurables, ou des racines imaginaires, ou des racines en partie réelles inégales & incommensurables, en partie imaginaires. Je suppose donc que les équations qu'il faut ici résoudre par approximation, sont de cette nature: on verra par les exemples suivans comment il faut opérer en général. Ces différens exemples ont chacun leur difficulté particulière & se rapportent à différentes sortes d'équations.

EXEMPLE I. Résoudre par une première approximation, l'équation $x^3 + 5x + 7 = 0$?

Comme cette équation est d'un degré impair, & que son dernier terme est positif, je suis assuré (VI)

(a) Ce caractère on sert en général à désigner une grandeur infinie quelconque.

qu'elle a au moins une racine réelle négative, & que par conséquent je ne puis pas manquer d'obtenir des résultats de signes contraires, en substituant pour x deux nombres négatifs différens. Je fais donc d'abord $x=0$, ou $x=-0$, ce qui donne le résultat positif $+7$; je fais $x=-1$, ce qui donne encore un résultat positif $+2$; je fais $x=-2$, ce qui donne le résultat négatif -11 . D'où je conclus que l'une des racines de l'équation est comprise entre -1 & -2 . Les deux autres racines sont imaginaires; mais, si elles étoient réelles, on détermineroit semblablement leurs limites.

Nous apprendrons bientôt à trouver des limites plus étroites pour la racine réelle.

EXEMPLE II. Résoudre par une première approximation l'équation $x^4 - 16x^3 + 7x + 37 = 0$?

Supposons successivement $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$, &c; puis $x=-0$, $x=-1$, $x=-2$; $x=-4$ &c; nous aurons la table qu'on voit ici :

Suppositions.	Résultats.	Suppositions.	Résultats.
$x=0$	$+37$	$x=-0$	$+37$
$x=1$	$+29$	$x=-1$	$+15$
$x=2$	$+3$	$x=-2$	-25
$x=3$	-5	$x=-3$	-47
$x=4$	$+65$	$x=-4$	$+9$
$x=5$	$+297$		

D'où nous devons conclure que l'une des valeurs de x est comprise entre 2 & 3 ; une seconde, entre 3 & 4 ; une troisième, entre -1 & -2 ; enfin la quatrième entre -3 & -4 .

EXEMPLE III. Résoudre, par une première approximation, l'équation $x^4 - 15x^3 + 7x + 37 = 0$?

En faisant successivement $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$, $x=4$, $x=5$, &c., on trouvera toujours des résultats positifs; mais on ne doit pas se hâter d'en conclure que l'équation n'a pas de racines positives: car il peut se faire que les valeurs supposées pour x , n'arrivent par de trop grands sauts. Le plus court moyen de s'en assurer, est de changer l'équation en une autre dont les racines soient plus grandes, par exemple, dix fois plus grandes, & d'examiner si en augmentant successivement d'une unité la nouvelle inconnue, on ne parviendra pas à des résultats de signes contraires. Je fais donc $x = \frac{y}{10}$;

(je ferois $x = \frac{y}{n}$, si je voulois avoir une équation dont les racines fussent n fois plus grandes).

La supposition $x = \frac{y}{10}$ change l'équation proposée en celle-ci: $y^4 - 1500y^3 + 7000y + 370000 = 0$. Ensuite je suppose successivement $y=0$, $y=1$, $y=2$, $y=3$, ... $y=10$, $y=11$, $y=12$, ... $y=20$, $y=21$, $y=22$, &c.;

& je trouve que les deux suppositions $y=24$, $y=25$, donnent des résultats de signes contraires. Ainsi l'une des valeurs de y est entre 24 & 25 ; & par conséquent, la valeur correspondante de x est entre 2.4 & 2.5 . Même procédé, s'il est nécessaire, pour les autres racines de l'équation proposée.

EXEMPLE IV. Trouver dans l'équation $x^4 + 3x + 7 = 0$, dont les racines sont imaginaires, les expressions approchées de ces racines?

Je feins que l'équation proposée provient de celle-ci: $(x + p + q\sqrt{-1}) \times (x + p - q\sqrt{-1}) = 0$, ou $x^4 + 2px + p^2 + q^2 = 0$, p & q étant des quantités réelles, qu'il faut déterminer, du moins à-peu-près. Or l'équation proposée & l'équation feinte devant être identiques, on aura $2p=3$, $p^2 + q^2=7$. Nous connoissons d'abord p , puisque sa valeur est $\frac{3}{2}$; & substituons cette valeur dans l'équation $p^2 + q^2=7$; nous aurons $q^2=7 - \frac{9}{4} = \frac{19}{4}$, ou $q = \pm \frac{\sqrt{19}}{2} = 0$. Cette équation a (VII) deux racines réelles, l'une positive, l'autre négative; & en faisant successivement $q=0$, $q=1$, $q=2$, $q=3$, &c., puis $q=-1$, $q=-2$, &c., on trouve que la racine positive est entre 1 & 3 , & la négative entre -2 & -3 .

Cet exemple est fort simple; mais on opérera de même dans les cas analogues plus composés. Quel que soit le degré d'une équation qui contient des racines imaginaires, ces racines vont toujours deux à deux, & peuvent être regardées comme produites par des équations du second degré: elles font donc toujours réduisibles à la forme qu'on a attribuée aux racines de l'équation précédente. Ainsi, en feignant qu'une équation dont les racines sont imaginaires est le produit de plusieurs paires de racines imaginaires, semblables à celles de l'exemple précédent, & comparant terme à terme l'équation proposée avec l'équation feinte, on aura plusieurs équations qui serviront à éliminer tous les coefficients inconnus des racines feintes, à l'exception d'un seul qui se trouvera dans une équation finale, laquelle aura, au moins, une racine réelle. On prendra cette racine pour la valeur du coefficient dont on vient de parler; ensuite en remontant aux autres équations des coefficients, on parviendra à les déterminer tous, à-peu-près. Il est clair que leurs valeurs seront des quantités réelles, & que les racines de l'équation ne font imaginaires que parce que les coefficients des équations feintes, sont en partie multipliés par $\sqrt{-1}$.

X. SCHOLIE I. La transformation employée dans l'exemple III, a non-seulement l'avantage de lever facilement la difficulté qui se rencontre dans les questions de cette nature; mais elle sert encore à trouver, d'une manière plus approchée, les racines d'une équation, & en la répétant plusieurs fois, on poussera l'approximation aussi loin qu'on voudra. Pour rendre ceci clair, reprenons l'équation $x^4 + 5x + 7 = 0$ (Exemple I). Je la change en une autre dont les racines soient dix fois plus grandes, en

éstant $x = \frac{7}{10}$; ce qui me donne $y^1 + 500y + 7000 = 0$; je détermine deux nombres qui ne diffèrent que de 1, & entre lesquels soit comprise la valeur de y ; & comme j'ai déjà trouvé que la valeur de x est entre -1 & -2 , je vois tout de suite que celle de y est entre -10 & -20 . Réserons cet intervalle. La supposition $y = -10$, donne pour l'équation en y , un résultat positif, & la supposition $y = -20$ donne un résultat négatif. Laissons $y = -15$; nous aurons un résultat négatif; donc la valeur de y est entre -10 & -15 . Soit $y = -12$; on aura encore un résultat négatif; donc la valeur de y est entre -10 & -12 . Soit $y = -11$; on aura un résultat positif; donc la valeur de y est entre -11 & -12 ; & celle de x est entre $-1,1$ & $-1,2$.

Pour pousser l'approximation plus loin, je change l'équation en y en une autre dont les racines soient dix fois plus grandes que les valeurs de y , on cent fois plus grandes que celles de x . Je fais donc

$y = \frac{1}{10}$; & l'équation en y se change en celle-ci: $z^1 + 50000z + 7000000 = 0$. Et comme la valeur de y est entre -11 & -12 , celle de z sera entre -110 & -120 . La supposition $z = -110$ donne pour l'équation en z , un résultat positif, & la supposition $z = -120$ donne un résultat négatif. Laissons $z = -115$; nous aurons un résultat négatif; donc la valeur de z est entre -110 & -115 . Soit $z = -112$; nous aurons un résultat négatif; donc la valeur de z est entre -110 & -112 . Soit $z = -111$; le résultat est positif; donc la valeur de z est entre -111 & -112 ; celle de y entre $-11,1$ & $-11,2$, & celle de x entre $-1,11$ & $-1,12$. On connoît donc x à moins de $\frac{1}{100}$ près; & en continuant à opérer toujours de la même manière, on pourra trouver une valeur qui diffère d'autant peu qu'on voudra de celle de x .

Je serai observer, en passant, que la transformation d'une équation en une autre dont les racines soient 10 fois, 100 fois, 1000 fois, &c., plus grandes, sert à changer une équation qui contient des parties décimales en un autre qui n'en contient pas. Par exemple, soit l'équation $x^1 + 5,745x^2 + 6,7847x + 9,7428 = 0$; le coefficient du second terme contenant trois figures décimales, je change l'équation en une autre dont les racines soient cent fois plus grandes; je fais donc $x = \frac{1}{100}$ ce qui me donne $y^1 + 5745y^2 + 6784700y + 974280000 = 0$, équation où il n'y a point de parties décimales.

XI. SCHOLIE II. Quand on a trouvé, à moins de $\frac{1}{100}$ près, l'une des racines d'une équation, la méthode suivante, due à Newton, donne par un calcul très-expéditif la valeur de cette racine, approchée aussi près qu'on voudra. Par exemple, soit encore notre équation $x^1 + 5x + 7 = 0$, dans laquelle la valeur

de x est, à moins de $\frac{1}{100}$ près, $-1,1$, ainsi que nous l'avons trouvé.

Qu'on prenne $x = -1,1$, & z , étant ce qu'il faudroit joindre à $-1,1$, pour avoir exactement x . Qu'au moyen de cette valeur, on élimine x de l'équation proposée $x^1 + 5x + 7 = 0$; on aura la transformée $z^1 - 1,1z + 8,63z + 0,169 = 0$. Or, comme la quantité z est au-dessous de $\frac{1}{100}$, & que par conséquent son carré est au-dessous de $\frac{1}{10000}$, on cube au-dessous de $\frac{1}{1000000}$; il est clair que les deux termes qui contiennent z^1 , & z^2 , sont beaucoup plus petits que les autres, & qu'ils peuvent être négligés. Nous aurons en conséquence $8,63z + 0,169 = 0$; ce qui donne $z = -\frac{0,169}{8,63} = -0,019$, à-peu-près.

Donc $x = -1,1 + z = -1,119$, à-peu-près.

L'approximation peut être poussée beaucoup plus loin par divers moyens qui dépendent tous de la même méthode. D'abord nous pouvons écrire l'équation générale en z , sous cette forme: $z = \dots$

$-\frac{0,169}{8,63}$ Substituant dans le dénominateur, $z^1 = -1,11 + 8,63z$, à la place de z , la première valeur approchée $-0,019$, & à la place de z^1 la valeur pareillement approchée $0,003361$, on aura, $z = -\frac{0,169}{8,631} = -0,0194$, à-peu-près. Donc $x = -1,1194$, à-peu de chose près.

La même équation générale en z peut être résolue, sans négliger d'autre terme que z^1 . Par-là, on a l'équation du second degré, $-z^2 + 8,63z + 0,169 = 0$, laquelle donne $z = -0,0195$, à-peu-près. Donc $x = -1,1195$, à-peu-près.

Enfin, de la même manière qu'on s'est servi de la première valeur $-1,1$, approchée de x , pour trouver la seconde valeur $-1,119$ qui est plus exacte; nous pouvons nous servir de celle-ci pour en trouver une troisième encore plus exacte. Supposons donc $x = -1,119 + u$; & mettons cette valeur dans l'équation proposée $x^1 + 5x + 7 = 0$. Et comme les termes qui contiendront u^1 & u^2 peuvent être rejetés sans scrupule, dispensons-nous d'écrire ces termes, pour nous épargner des calculs inutiles. La transformée en u sera donc simplement, $8,75648u + 0,00383185 = 0$. D'où l'on tire à-peu-près, $u = -0,00044$. Donc $x = -1,11944$, à-peu-près.

Il est clair que par le moyen de cette troisième valeur approchée de x , on peut en trouver une quatrième encore plus approchée, ainsi de suite.

Je passe à la résolution approchée des équations littérales, c'est-à-dire, des équations qui, outre l'inconnue, contiennent encore d'autres lettres quelconques.

XII. Les méthodes d'approximation pour les équations numériques, s'appliquent également aux équations littérales homogènes qui contiennent simplement deux lettres, c'est-à-dire l'inconnue, & une autre lettre connue. Par exemple, si on propose

Équation $x^4 - 5a^2x^3 + 7a^3x^2 + 11a^4 = 0$, qui ne contient que l'inconnue x , & la quantité connue a ; on supposera $a = 1$, & par-là on aura l'équation numérique $x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 11 = 0$. Quand on aura trouvé les racines de cette équation, on les multipliera par a , & on aura celles de la proposée. Il n'est donc pas question ici de ces sortes d'équations.

On doit observer que si une équation où il ne paroît que deux lettres, n'étoit pas homogène, elle seroit censée contenir trois lettres, parce que les termes où les dimensions sont les moindres, doivent être censés multipliés par les puissances d'une lettre que l'on a regardée comme l'unité & qui est sous-entendue. De même, une équation où il ne paroît que trois lettres, & qui n'est pas homogène, doit être censée contenir quatre lettres, ainsi de suite.

XIII. PROBLÈME. Trouver, au moyen d'une suite infinie convergente, la valeur approchée de l'une des racines d'une équation qui contient plus de deux lettres?

Soit, par exemple, l'équation homogène & à trois lettres $x^4 + a^2x^3 + abx^2 - 2a^2b^2 = 0$. Les deux quantités données a & b doivent être regardées comme inégales; car si on avoit $a = b$, l'une ou l'autre de ces lettres pourroit être chassée de l'équation qui ne contiendroit alors que deux lettres.

I. Cas: $a > b$. Je feins qu'on ait $x = A + Bb^2 + Cb^3 + Db^4 + \&c.$; A, B, C, D , &c. étant des coefficients inconnus qu'il s'agit de déterminer. Au moyen de cette valeur de x , l'équation proposée $x^4 + a^2x^3 + abx^2 - 2a^2b^2 = 0$, donne, en ordonnant le second membre par rapport à b :

$$\begin{aligned} x^4 &= A^4 + 3A^2B \cdot b + 3AB^2 \cdot b^2 + B^4 \cdot b^4 + \&c. \\ &\quad + 3A^2Cb^3 + 3A^2Db^4 + \&c. \\ &\quad + 6ABC \cdot b^3 + \&c. \\ + a^2x^3 &= a^2A^3 + a^2B \cdot b + a^2C \cdot b^2 + a^2D \cdot b^3 + \&c. \\ + abx^2 &= aAb^2 + aA^2b + aBb^3 + aCb^4 + \&c. \\ - 2a^2b^2 &= -2a^2b^2 \\ - b^4 &= \dots\dots\dots - b^4. \end{aligned}$$

Et comme on a $x^4 + a^2x^3 + abx^2 - 2a^2b^2 = 0$, il s'en suit que la somme de toutes les suites qui composent le second membre de l'expression précédente, doit être aussi égale à zéro. Donc chaque terme particulier de cette somme doit être zéro. En effet, la valeur de b peut être aussi petite qu'on voudra; & si on la suppose infiniment petite, on verra, en comparant entr'eux les termes du second membre, que le premier doit être regardé comme infini par rapport au second, le second comme infini par rapport au troisième, le troisième comme infini par rapport au quatrième, ainsi de suite. D'où il résulte qu'aucun terme ne peut être détruit ni par ceux qui le précèdent, ni par ceux qui le suivent, & que par conséquent

la totalité des termes ne seroit pas zéro, si chacun d'eux en particulier n'étoit pas zéro. On aura donc, pour déterminer A, B, C, D , &c. les équations particulières $A^4 + a^2A^3 - 2a^2 = 0$; $(3A^2 \cdot B + a^2B^2 + aA^3)b = 0$; $(3AB^2 + 3A^2C + a^2C + aB)b^2 = 0$; $(B^4 + 3A^2D + 6ABC + a^2D + aC - 1)b^4 = 0$, &c. La première donne $A = a$; la seconde donne (en divisant tout par b , & mettant pour A la valeur a), $3a^2B + a^2B + a^2 = 0$, & par conséquent $B = -\frac{1}{2}$. La troisième donne (en chassant b^2, A, B), $\frac{1}{2}a + 4a^2C = 0$, & par conséquent $C = -\frac{1}{8a}$. La quatrième donne sem-

blablement $D = -\frac{11}{112a^2}$, &c. Substituons ces valeurs de A, B, C, D , &c. dans la suite feinte; & nous aurons $x = a - \frac{1}{2}b + \frac{b^2}{8a} + \frac{11b^3}{112a^2} + \&c.$ qui est la suite cherchée dans le premier cas. On voit que cette suite est convergente.

Il est à propos de remarquer qu'on a déterminé le premier coefficient A par la résolution de l'équation $A^4 + a^2A^3 - 2a^2 = 0$; résolution qui a été facile, parce que cette équation est décomposable en diviseurs rationnels. Mais si, en pareil cas, l'équation n'étoit pas décomposable en diviseurs rationnels, on détermineroit au moins A par approximation (XII), puisque l'équation est homogène, & ne contient que deux lettres.

II. Cas: $a < b$. Je feins qu'on ait $x = A + Ba + B^2a^2 + Da^3 + \&c.$ Donc, en ordonnant le second membre par rapport à a , on aura:

$$\begin{aligned} x^4 &= A^4 + 3A^2B \cdot a + 3AB^2 \cdot a^2 + B^4 \cdot a^4 + \&c. \\ &\quad + 3A^2Ca^3 + 3A^2Da^4 + \&c. \\ &\quad + 6ABC \cdot a^3 + \&c. \\ + a^2x^3 &= \quad + Aa^3 \quad + B^2a^4 + \&c. \\ + abx^2 &= \quad + Aab + Bba^2 \quad + C \cdot ba^3 + \&c. \\ - 2a^2 &= \quad \quad \quad - 2a^2 \\ - b^4 &= \quad \quad \quad - b^4. \end{aligned}$$

Donc, à cause de $x^4 + a^2x^3 + abx^2 - 2a^2 - b^4 = 0$; le second membre de l'expression précédente sera aussi zéro. De plus, chacun des termes en particulier de cette expression sera zéro. Ainsi, on aura les équations $A^4 - b^4 = 0$; $(3A^2B + Ab^2)a = 0$; $(3AB^2 + 3A^2C + A + Bb)a^2 = 0$; $(B^4 + 3A^2D + 6ABC + B + Cb - 1)a^4 = 0$, &c., lesquelles donnent $A = b$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = -\frac{1}{8b}$, $D = -\frac{11}{112b^2}$, &c. Donc, en mettant pour A, B, C, D , &c., leurs valeurs, la suite feinte deviendra, $x = b - \frac{1}{2}a + \frac{a^2}{8b} + \frac{11a^3}{112b^2} + \&c.$

XIV. COROLLAIRE. La valeur trouvée pour x étant l'une des trois racines de l'équation proposée $x^4 + a^2x^3 + abx^2 - 2a^2b^2 = 0$; si l'on nomme

M cette racine, & qu'on divise l'équation par $x - M = 0$, on obtiendra une équation d'un degré plus bas, dont on connoitra, à peu de choses près, les coefficients & le dernier terme, & dont on déterminera les racines par un procédé semblable au précédent, supposé que ces racines soient réelles. Il en sera de même pour les équations des degrés plus élevés.

XV. SCHOLIE. Les équations qui contiennent plus de trois lettres, peuvent se traiter, à-peu-près, de la même manière. Toute la difficulté qu'on éprouve à former les suites qui doivent exprimer les valeurs de l'inconnue, consiste à choisir, parmi les termes de l'équation, ceux qui sont plus grands que les autres, & qui déterminent en conséquence la loi suivant laquelle la série doit descendre. Newton a donné, pour cela, une règle fort commode, qu'on appelle ordinairement le *parallélogramme de Newton*. Elle est expliquée de la manière la plus claire & la plus détaillée dans un excellent Ouvrage de M. Cramer, qui a pour titre : *Introduction à l'Analyse des Lignes courbes Algébriques*, Gen. 1750. (L. B.)

* Nous allons ajouter une autre Méthode d'avoir la valeur approchée de toutes les racines d'une équation numérique déterminée. Cette Méthode est de M. de la Grange, qui l'a donnée dans les volumes XXXIII & XXXIV des Mémoires de Berlin.

Le premier objet que se propose M. de la Grange, est de trouver toutes les racines réelles, positives & négatives d'une équation ; mais, pour cela, il faut commencer par connoître le nombre de ces racines. Soit donc la proposée $x - a \cdot x - b \cdot x - c \dots = 0$, il est aisé de voir que si je mets à la place de x un nombre positif quelconque, les $x - a$, $x - b$, $x - c$, &c. resteront toujours positifs, si a , b , c , sont des nombres négatifs ; que s'ils sont imaginaires, le produit de chaque paire d'imaginaires sera aussi toujours positif, & il en sera de même de chaque paire de racines égales quel que soit leur signe : donc si on divise une équation proposée en deux facteurs A & B , dont l'un A renferme les racines imaginaires, les racines négatives, ou enfin les paires des racines égales, & B les racines réelles, positives & négatives, la valeur du facteur A ne changera point de signe, quelque nombre positif qu'on mette à la place de x , & restera toujours positive. Je considère donc seulement le facteur B , que je suppose égal à $x - a' \cdot x - b' \cdot x - c' \dots$ les a' , b' , c' , étant des nombres positifs, & $a' < b' < c' < \dots$, &c. dans ce cas si je mets pour x un nombre plus petit que a' , tous les facteurs seront négatifs ; & si je mets pour x un nombre $> a' & < b'$, ils seront encore tous négatifs hors le facteur $x - a'$, qui sera positif ; donc le produit B changera de signe ; il en changera encore lorsque l'on mettra pour x un nombre $> b' < c'$, & encore

lorsqu'on mettra pour x un nombre $> c'$, & plus petit que la racine suivante, & ainsi de suite, en sorte que si on met pour x , 0, a , $2a$, $3a$, &c. où la différence a soit plus petite que la plus petite différence entre deux racines consécutives, il y aura autant de racines réelles positives inégales que la valeur de la quantité égale à zero changera de signe ; il faut donc connoître maintenant, 1.^o un nombre tel qu'un mettant pour x un nombre quelconque plus grand, B ne change point de signe, afin de ne pas être obligé d'attendre à l'infini la substitution des 0, a , $2a$, $3a$, &c. pour x ; 2.^o un nombre a , tel qu'il soit plus petit que la plus petite différence entre deux racines consécutives, ou en général entre deux racines.

Pour le premier point, comme cette valeur de x doit rendre B positif, le signe du premier terme l'étant aussi, il est clair que prenant un nombre égal au coefficient le plus grand des termes négatifs augmenté de l'unité, B ne deviendra pas négatif, en mettant pour x ce nombre ou un nombre plus grand ; car prenant le cas le plus défavorable, celui où l'on auroit $x = ax + bx + \dots + g$, a , b , $\dots$, g étant positifs, on trouvera que $p + 1 = p \cdot p + 1 + p \cdot p + 1 \dots > ap + 1 + bp + 1 \dots$ puisque a , b , $\dots$, g par l'hypothèse ne peuvent être plus grands que p .

Pour le second point, on prendra d'abord l'équation entre les différences des racines de la proposée, & pour cela on remarquera que soit u cette différence, & mettant au lieu de x , $x + u$ dans la proposée, on aura une équation qui devra avoir lieu en même tems que la proposée, & éliminant x , il restera une équation en u , qui sera l'équation cherchée. Cette équation ne contiendra que des puissances paires de u , parce que soient a & b , deux racines de la proposée, il est clair que l'équation pour les différences aura également pour racines $a - b$ & $b - a$, & que par conséquent $u^2 - a - b^2$ sera un des diviseurs. De plus, elle sera autant de fois divisible par u^4 , qu'il y aura de racines égales entr'elles. Puis donc que nous cherchons un nombre plus petit que cette différence entre des racines inégales, mettant au lieu de u^4 la quantité 1, on aura une équation en z , & connoissant une valeur plus grande que la plus grande racine positive de cette équation, l'unité divisée par la racine quarrée de cette valeur sera plus petite que la plus petite différence entre les racines ; & l'on trouvera cette valeur par la même méthode, que la limite des racines positives de la proposée trouvée ci-dessus. Cela posé, si on substitue à la place de x les nombres 0, a , $2a$, $3a$, $\dots$, a , étant $\frac{1}{\sqrt{g}}$ jusqu'au nombre $p + 1$, qui surpasse la plus

grande racine positive, on aura autant de racines positives qu'il y aura de changements de signes; mettant ensuite au lieu de x une quantité $-x$, & faisant les mêmes opérations, il y aura autant de racines négatives inégales que de changement de signes.

Quant aux racines égales, soit $X=0$ la proposée, $\frac{dX}{dx}=0$ aura lieu en même tems, s'il y a des racines égales. Mais de plus soit $\frac{d^2X}{dx^2}=x+a \cdot x + b \cdot x + c$ &c. $X=fx+a \cdot x + b \cdot x + c \cdot x + N = \frac{x+a^2}{2} \cdot x + b \cdot x + c \cdot x + \dots - \frac{x+a^2}{2} \cdot fx + b \cdot x + c \cdot x + \dots dx + N$. Soit maintenant X aussi divisible par $x+a$, il faut qu'en mettant $-a$ pour x dans cette intégrale, elle devienne zero; donc $N=0$; donc X est divisible par $x+a$; donc toute racine commune entre X & $\frac{dX}{dx}=0$, donne une égalité de racines entre celles de $X=0$; prenant donc le commun diviseur de X & $\frac{dX}{dx}$, il est clair qu'il contient & ne contient que les racines égales de X , élevées à des puissances moindres d'une unité que dans X ; donc, traitant le commun diviseur comme la proposée, on trouvera que la proposée a autant de racines réelles positives ou négatives égales en nombre pair, que le commun diviseur a de racines inégales. Ensuite, si j'appelle X' le commun diviseur, & que j'aie celui de X' & de $\frac{dX'}{dx}$, j'aurai autant de racines égales, trois à trois, ou en nombre impair au-dessus de trois, que le diviseur commun a de racines inégales, & ainsi de suite. Soit, par exemple, m le degré de l'équation & $n < m$ le nombre des racines inégales, déterminé par la méthode ci-dessus, & où les racines égales en nombre impair sont comptées pour une racine, p celui des racines inégales du premier commun diviseur, r celui des mêmes racines pour le second diviseur commun, & s pour le troisième, & qu'il n'y en ait point au-delà, la proposée aura $n-r+2p-2s+3r+4s \dots$ racines réelles, $n-r$ inégales, $p-s$ égales deux à deux, r égales trois à trois, & s égales quatre à quatre, & les r racines égales trois à trois auront été déterminées parmi les n racines que la méthode ci-dessus trouve par l'équation $X=0$, de même que les s parmi celles du commun diviseur de X & de dX égale à zero.

Le nombre de racines imaginaires est égal au nombre total des racines moins celui des réelles; donc on aura le nombre des racines; & quant à la distinction de celles qui sont égales, on les trouvera comme ci-dessus, en connaissant le nombre de racines imaginaires des diviseurs communs.

Maintenant si on veut avoir une valeur approchée d'une des racines réelles positives & inégales de la proposée, on prendra une série, $0, a, 2a,$

$3a$, &c. où a est à-la-fois plus petit que l'unité; & plus petit que la plus petite différence entre deux racines; on mettra successivement dans la proposée pour x les différens termes de cette série, & l'on observera le point où en mettant l'une après l'autre deux valeurs consécutives, le résultat changera de signe; alors la plus petite de ces valeurs ne différera de la plus petite des racines positives que d'une quantité moindre que a . Appellant p cette valeur, je ferai $x=p+\frac{1}{q}$, & j'aurai une équation en q , que je traiterai comme la proposée; appellant q la première valeur, j'aurai $x=p+\frac{1}{q+\frac{1}{r}}$

& une équation en u ; appellant r la première valeur de u , trouvée toujours par la même méthode, j'aurai $x=p+\frac{1}{q+\frac{1}{r+\frac{1}{s}}}$ valeur qui approche continu-

lement de la vraie, puisque, par l'hypothèse, q, r, s , &c. sont des quantités plus grandes que l'unité.

Si a est plus petit que 1, faisant $a=\frac{b}{c}$, a & b sont des entiers, on n'aura qu'à mettre, au lieu de x , une autre quantité $\frac{z}{c}$, & on aura pour l'équation en z , $a \cdot z = a$, & par conséquent a sera un entier & pourra être supposé r , & on aura, 1.^o les quantités p, q, r , &c. égales à des nombres entiers, ce qui simplifie la fraction continue; 2.^o on aura une valeur exacte de la racine toutes les fois qu'elle y en a une rationnelle (voyez la fin de l'article), pourvu que tous les coefficients de l'équation en q soient entiers, ce qu'il est toujours possible de faire.

On pourra trouver, par cette méthode, successivement une valeur approchée de toutes les racines positives de la proposée; pour trouver celles de ces racines qui pourroient en avoir d'autres égales, appellant $X=0$, la proposée, prenant le commun diviseur de X & dX , ce commun diviseur contiendra les racines de la proposée, qui en ont d'autres qui leur sont égales, & elles seront toutes inégales entr'elles dans ce diviseur. Substituant donc dans ce diviseur la même série $0, a, 2a, 3a$, &c. ou $0, 1, 2, 3, 4 \dots$ que dans la proposée, on trouvera l'approximation, qui soient aussi racines approchées du diviseur, & toutes celles qui sont dans le cas indiquent que, dans la proposée, elles sont égales au moins deux à deux; on trouvera de même celles qui sont égales trois à trois, en cherchant le commun diviseur de $X, \frac{dX}{dx}, \frac{d^2X}{dx^2}$, & ainsi de suite.

Après avoir ainsi trouvé toutes les racines positives, faisant $x=-x$, on aura une équation en x , dont on cherchera les racines positives; & les prenant avec le signe $-$, on aura les racines négatives cherchées.

Quant aux imaginaires, qui font de la plus grande importance pour la solution approchée des équations différentielles (voyez ci-dessous à l'article EQUATION SECULAIRE), on fera $x = a + b\sqrt{-1}$, & prenant la partie réelle & la partie imaginaire de ce que devient la proposée après cette substitution, les égalant chacune à zéro, éliminant a , on parviendra d'abord à avoir $a = \frac{A}{B}$, A & B étant des fonctions rationnelles & entières de b , de plus on aura une équation en b . Cela posé, il est clair que chaque valeur réelle de b donnera une valeur réelle de a , à moins que A , B , ne soient nuls en même tems que la proposée. Si donc cela n'a point lieu, on prendra dans l'équation en b les valeurs approchées des racines réelles positives à chacune desquelles répondra une racine négative de la même valeur, on aura a en mettant dans $\frac{A}{B}$ au lieu de b cette valeur approchée, & par conséquent on connoîtra une valeur approchée des deux racines imaginaires $a + b\sqrt{-1}$, $a - b\sqrt{-1}$. Mais si l'équation en b a lieu en même tems que $A = 0$ & $B = 0$, on prendra le commun diviseur de ces trois équations, ensuite on divisera par ce commun diviseur l'équation en b , & chaque racine de l'équation ainsi divisée donnera une valeur de b ; ensuite prenant le diviseur commun à une équation du second degré trouvée en éliminant a & de la forme $M a^2 + N a + P = 0$, on observera si le commun diviseur, M , N & P , peuvent être en même tems égaux à zéro. Si cela ne peut arriver, on prendra les racines de ce commun diviseur à chacune desquelles répondent les deux racines de l'équation en a ; si M , N , P , peuvent devenir nuls, en même tems que le commun diviseur on prendra de nouveau le commun diviseur de ces quatre fonctions, & une équation du troisième degré trouvée en éliminant a , & qui sera de la forme $M' a^3 + N' a^2 + P' a + Q' = 0$, & on opérera comme ci-dessus, & ainsi de suite.

Toutes les fois que, dans la recherche des racines approchées, on aura substitué dans chaque approximation la série $0, 1, 2, 3, \dots$ à la place de la racine, on sera sûr de trouver la valeur exacte lorsqu'elle sera rationnelle; en effet, cette valeur exacte est nécessairement entre p , première valeur trouvée, & $p + 1$, entre $p + \frac{1}{q}$ & $p + \frac{1}{q+1}$; q étant un entier, entre $p + \frac{1}{q+r}$ & $p + \frac{1}{q+r+1}$, & ainsi de suite. Or soit $\frac{m}{n}$ la quantité plus petite que 1 à ajouter à p pour avoir la vraie valeur, q sera égal au quotient de n par m , plus un reste, $\frac{n}{m}$, $n' < m$; de même, r sera égal au quotient de m par a' un reste $\frac{n'}{a'}$, m' ; étant plus petit que n ;

donc, en suivant toujours, on parviendra à un reste nul ou égal à $\frac{1}{n}$, & par conséquent à la valeur exacte. Voyez FRACTIONS CONTINUES.

La méthode dont je viens de rendre compte, est générale pour toutes les équations numériques, & elle donne pour tous les cas d'une manière certaine une valeur aussi approchée qu'on veut de chacune des racines. Elle a de plus l'avantage qu'il est inutile de connoître d'ailleurs la valeur approchée des racines, comme cela étoit nécessaire dans la méthode de Newton.

Méthode d'avoir les valeurs approchées des racines d'une équation algébrique déterminée.

Il faudroit, pour que cette méthode fût générale, pouvoir trouver autant d'expressions de l'inconnue en séries convergentes que la proposée a de racines réelles.

Commençons par chercher un moyen général de réduire la valeur de x en série; pour cela, je remarque que quelle que soit une fonction de x qui soit égale à y , je puis supposer que j'aie l'équation $y - x + x = 0$, ou $x = y + x$; donc si je cherche à avoir en $y + x$ la valeur d'une fonction de x , j'aurai, par le théorème de Taylor, démontré à l'article SÉRIE,

$$x = y + \frac{d^2 y}{dy^2} x + \frac{d^3 y}{dy^3} x^2 + \dots$$

& par conséquent,

$$0 = y + \frac{d^2 y}{dy^2} x + \frac{d^3 y}{dy^3} x^2 + \dots$$

faissant donc $0 = y + B$, dans la seconde formule, & ordonnant par rapport aux puissances de y , il est aisé de voir que B doit être une série, dont le premier terme sera du second degré, égalant à zéro le terme qui, après la substitution, est de ce degré; & prenant la valeur qui donne pour B , j'aurai celle du premier terme de la vraie valeur de B , elle est $\frac{d^2 y}{dy^2} y$, je ferai ensuite

$B = \frac{d^2 y}{dy^2} y + C$, ou C est une série, dont le premier terme est du troisième degré; & continuant ainsi, je trouverai

$$0 = y + \frac{d^2 y}{dy^2} y + \frac{d^3 y}{dy^3} y^2, \text{ \&c.}$$

par la même méthode,

$$\frac{d^2 y}{dy^2} = \frac{y^2}{2} + \frac{2 d^2 y}{2 \cdot 1 \cdot dy} + \frac{3 d^3 y^2}{2 \cdot 1 \cdot 4 dy^2} + \&c.$$

$$\frac{d^3 y}{dy^3} = \frac{y^3}{2 \cdot 3} + \frac{3 d^2 y^2}{2 \cdot 1 \cdot 4 dy} + \frac{2 \cdot 1 \cdot 3 d^3 y^2}{2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 dy^2} + \&c.$$

substituant ces valeurs dans l'expression de x , y, l'ordonnant par rapport aux puissances de $y + x$, & réduisant chaque rang de termes, j'aurai finalement,

$$x = y + \frac{dy^2 y}{dy^2} + \frac{d^2 y^2 dy}{2 dy} + \frac{d^3 y^3 dy}{2 \cdot 1 \cdot 4 dy^2} + \&c.$$

.... série, dont la loi est très-facile à saisir.

Il est aisé de voir que, si ϕx contenoit encore y , on auroit également la valeur de ϕx en y , quand même ϕx contierdroit aussi y , en observant alors dans la manière de prendre les différences, que $\frac{d\phi y}{dy}$ ou

$\frac{d\phi y}{dy}$, soit alors égale à ce que devient $\frac{d\phi x}{dx}$;

$\frac{d\phi x}{dx}$, si, après la différenciation, on met y pour x ,

ou ce qui revient au même, il faut différencier en regardant comme constants les y qui se trouvent dans ϕx . On voit de-là comment, si l'on a $\phi' x$, $y=0$, on aura (par une série) ϕx en y , & de même en une fonction quelconque de x & y . Si l'on veut appliquer cette manière d'avoir en y la valeur de x , lorsqu'on a par une équation en x & en y la solution des équations déterminées, on observera : 1.^o que si on l'applique immédiatement, on n'aura que des expressions réelles & rationnelles pour la valeur de x ; 2.^o que pouvant prendre pour y telle quantité qu'on voudra, on aura une infinité de valeurs de x ; 3.^o que parmi toutes ces valeurs, il n'y en aura de réellement différentes, qu'autant que la proposée peut avoir des racines; 4.^o qu'il y en aura un nombre de convergences différentes entr'elles, égal au nombre de racines réelles; 5.^o que si on prend un nombre m moindre que n degré de l'équation, qu'on

faite $a \pm x^m = 0$, & qu'on substitue, au lieu de x , la valeur en t , on aura une nouvelle équation, d'où tirant les valeurs d & e en série, on aura autant de valeurs imaginaires données par chaque série que l'équation $x \pm t = 0$ a de racines imaginaires, & la proposée aura autant des racines imaginaires, si une de ces séries est convergente.

Ces principes posés, on voit qu'il s'agit d'abord de savoir distinguer entre une infinité de séries celles qu'on peut prendre pour des racines différentes; soit

donc la proposée $a + bx + cx^2 = \dots + px^n = 0$; il est aisé de voir que, si on fait $a=0$, il y a une racine qui s'évanouira, deux qui s'évanouiront, si on fait à-la-fois a & $b=0$, trois, si on fait a , b , & $c=0$, & ainsi de suite. Par conséquent, si on fait d'abord

$b=0$, on aura $a + cx^2 = \dots + px^n = 0$, l'équation aura deux racines égales à zéro, en faisant $a=0$, & par conséquent deux racines infiniment petites & égales aux deux racines de $a + cx^2 = 0$ lorsque a est infiniment petit. Il est aisé en effet de voir que a étant infiniment petit, & b manquant, la proposée a deux racines infiniment petites, que dans le cas de deux racines infiniment petites, c se réduit à être le produit de toutes les autres racines, puisque les autres termes qui entrent dans c disparaissent devant celui-là; & qu'ainsi a , qui est le produit de toutes les racines, étant divisé par c , devient le produit des deux racines infiniment petites, qui sont par conséquent égales aux racines de

Mathématiques. Tome I, L.^{re} Partie,

l'équation $a + cx^2 = 0$. De même si on fait b & c égaux à zéro, & a infiniment petit, trois des racines de l'équation deviendront égales à celles de l'équation $a + cx^3 = 0$, & ainsi de suite.

Si donc on a différentes séries qui représentent la valeur de x , on pourra distinguer par-là celles qui sont réellement différentes, c'est-à-dire, qui appartiennent à des racines différentes.

La méthode proposée ci-dessus donne une valeur de x en quantités connues toutes les fois que x est donné par une équation déterminée, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de transcendentes. Mais on n'est pas sûr d'avoir cette valeur par une série qui soit toujours convergente. C'est par cette raison que je vais indiquer ici une méthode élémentaire & très-simple, par laquelle on parviendra toujours à toutes les valeurs approchées de x .

1.^o Si la fonction $X=0$ a plusieurs valeurs, on les prendra successivement; ainsi, X sera considéré dans la suite comme une fonction qui n'a qu'une valeur répondante à chaque valeur de x .

2.^o On cherchera d'abord les valeurs de x positives qui tendent $X=0$, & on commencera par déterminer pour x une quantité telle qu'en l'augmentant, x ne puisse plus changer de signe, ni devenir zéro, ce qui sera toujours possible toutes les fois que $X=0$ n'aura pas une infinité de racines. Ce dernier cas se rappellerait aux autres en mettant au lieu de x , $x = \sin x$, par exemple, en effet alors au lieu de x , on auroit un angle dont le sinus est x , & au lieu d'un seul X à examiner, on en mettroit une infinité répondants à l'angle dont le sinus est $x + m\pi$, m étant un entier quelconque.

3.^o Connoissant les limites de x , on prendra $x + \frac{1}{y}$ qu'on substituera dans la proposée, & on aura $X' = 0$, alors $\frac{1}{y}$ représentera les différences qu'il y a entre x & la valeur de la racine de l'équation $X=0$.

4.^o Substituant dans $X=0$ les valeurs successives en nombres entiers de x , depuis $x=0$ jusqu'à la limite, & cherchant pour chacune les limites de y , j'aurai $y < A$, A étant cette limite, donc il n'y a point de racines de $X=0$ entre cette valeur de x & $x + \frac{1}{A}$.

5.^o Prenant ensuite toutes les valeurs $x + \frac{1}{A}$ entre 0 & la limite de x , on fera la même opération, & par ce moyen on parviendra à approcher des valeurs de x .

6.^o Pour trouver les valeurs négatives, on fera dans la proposée $x = -x$, & on cherchera les valeurs positives de x .

7.^o Pour trouver s'il y a des racines égales, on égalera à zéro la quantité $\frac{dX}{dx}$, ensuite on cher-

cherà les racines positives ou négatives, & on verra fi les racines ne diffèrent de celles de $X=0$ que d'une petite quantité, & si, en répétant les *approximations*, cette différence diminue continuellement.

La méthode de M. de la Grange fournit un moyen d'avoir en série la valeur d'une quantité quelconque y en x : lorsque y est donnée par une équation en x & y , & que cette équation est différentielle, on parviendra également à avoir une telle série: soit en effet une équation différentielle en y & x , on fera en sorte qu'elle ne contienne plus que dx ; cela posé, si l'équation mise sous une forme rationnelle & entière, ayant tous ses rangs, & la plus haute différence se trouvant dans le premier, elle n'a

point de terme constant, on fera $y = A e^{fx} + B e^{fx} + C e^{fx} + A' e^{2fx} + B' e^{2fx} + C' e^{2fx}$ &c. & r^n aura A, B, C , &c. arbitraires; & si n est l'ordre de l'équation, f sera donné par une équation du degré n , f par la même équation, &c. en sorte que f, f', f'' sont les différentes racines de cette

équation: 2.^e la substitution de $A e^{fx} + B e^{fx}$ &c. dans le premier rang donnera des termes égaux

chacun à chacun à ceux que $A e^{fx} + B e^{fx}$ &c. produit dans le second; donc A, B , &c. seront donnés en A, B , & ainsi de suite: 3.^e si l'équation en f a deux racines égales, soit f cette racine, il faudra

faire $A x e^{fx} + B e^{fx}$ &c. en effet, si $P d^n y + Q d^{n-1} y + R d^{n-2} y$ &c. est le premier rang de la

proposée, on aura $A (P f^n + Q f^{n-1} + R f^{n-2} + \dots)$

$= 0$ & $B \cdot (P f^{n-1} + Q f^{n-2} + R f^{n-3} + \dots) + A (n P f^{n-1} + n-1 Q f^{n-2} + n-2 R f^{n-3} + \dots) = 0$; donc on aura à-la-fois,

$$P f^n + Q f^{n-1} + R f^{n-2}, \text{ \&c.} = 0,$$

& $n P f^{n-1} + n-1 Q f^{n-2} + n-2 R f^{n-3}, \text{ \&c.} = 0$.

Ce qui a lieu toutes les fois que l'équation en f a deux racines égales. On prouvera de même que, si cette

équation en f a trois, il faudra faire $y = A x^2 e^{fx} + B x e^{fx} + C e^{fx}$

& $D e^{fx}$, &c. & ainsi de suite, pour quatre, cinq,

&c. racines égales: 4.^e au lieu de $A e^{fx} + B e^{fx}$ &c.

$C e^{2fx}$ &c. on voit que, dans le cas de deux racines

égales, c'est $A' x^2 e^{2fx} + B' x e^{2fx} + C' e^{2fx} +$

$D' x e^{fx}$ &c. qu'il faut prendre, & ainsi de suite.

Par la même raison que, dans le cas des racines égales, il faut prendre, dans le 1.^{er} rang de la valeur

de y , un terme $A x e^{fx}$ pour chaque racine égale, deux à deux, & ainsi de suite: de même, si l'on a f & f' étant deux racines, la somme de ces deux racines chacune multipliée par un nombre entier positif, égale à une de ces racines, ou à une autre des racines de l'équation en f , il est clair que, soit n & m ces nombres, & qu'on ait $n f + m f' = f''$, le

terme $A e^{n f + m f' x}$ disparaîtra du 1.^{er} rang de l'équation en y , on ne pourra donc point, en dé-

terminant A , faire disparaître les termes $e^{n f + m f' x}$ qui se trouveront dans les rangs supérieurs, & il

faudra supposer, pour y parvenir dans la valeur

de y , un terme $A x + B e^{fx}$. La même

chose a lieu pour la somme de trois racines, &c. On en peut tirer cette règle générale, que toutes les fois que l'équation en f a des racines positives & négatives commensurables, la valeur de y contiendra x . La même chose a lieu lorsqu'il y a une valeur de f égale à zéro. Cette remarque a lieu, quelque méthode que l'on emploie, pour intégrer l'équation en y .

Si la proposée avait eu un terme constant, & qu'elle eût contenu y au premier rang, on aurait fait

$y = A + B e^{fx} + C e^{fx} + A' e^{2fx} + B' e^{2fx}$

& si y avait été dans les rangs supérieurs, on aurait trouvé les $B; C$, &c. toujours arbitraires, & f par une équation d'un degré dépendant du rang de la valeur hypothétique, où l'on se sera arrêté: si y manque dans les rangs supérieurs de la proposée, alors f est encore donnée ici par une équation du degré n .

Si la proposée ne contient pas y au premier rang, & qu'elle ait un terme constant, il faudra prendre

$y = A x + B e^{fx} + C e^{fx}$ &c. $A x^2 + B' x e^{fx}$ &c.

& procéder, comme ci-dessus. Au reste, le cas où il y a un terme constant se peut rappeler aisément à celui où il manque, il suffit de différencier l'équation proposée.

La forme de y n'est pas la même dans ces deux méthodes: dans la première la valeur des f & leur nombre changent à mesure qu'on prend un plus grand nombre de termes de la série. Dans la seconde x entre nécessairement dans la valeur de y .

Cette méthode d'avoir en série la valeur de y ; lorsqu'on a une équation différentielle en y & en x ; s'applique au cas, où ayant m équations en $m+1$ variables $x, u, y, \dots, x$, on cherche à exprimer $x, u, y, \dots$ par une fonction en x .

On peut même l'étendre aux équations aux différences finies, où Δx est supposé constant, la solution sera la même absolument, à cela près que les arbitraires $A, B, C, \&c.$ seront dans ce cas égales à des

fonctions de e ; a étant tel que $e = 1 + \Delta x$, & ces fonctions telles qu'elles ne changent pas de valeur, lorsque x devient $x + \Delta x$.

Cette même méthode s'appliquera encore aux équations aux différences partielles; soit en effet une de ces équations qui ne contienne que z , & les différences, sans contenir de x de y , ni de terme constant, si je fais $z = A e^{f x + g y} + B e^{f' x + g' y} + \&c.$

On aura, si $f, g, f', g', \&c.$ sont des fonctions de x & y , $A, B, \&c.$ arbitraires, une équation en f & g , en sorte que f sera tout ce qu'on voudra, & g donné en f , & que le terme $A e^{f x + g y} + \&c.$ sera la somme de tous ces nombres dont le terme est infini.

S'il y a un nombre constant, & que z soit dans le premier rang, on fera $z = A + B e^{f x + g y} + \&c.$, & alors, selon le rang où l'on s'arrêtera, l'équation en f & g sera d'un ordre plus élevé.

Le moyen pour déterminer les arbitraires, sera le même que dans les équations linéaires. (Voyez l'article EQUATIONS LINÉAIRES).

La méthode exposée jusqu'ici sert à donner y en x , lorsqu'on sait que y est très-petit, & qu'on n'en peut négliger une certaine puissance. Voici une autre méthode qui peut servir à avoir y en x , quand x est très-petit, lorsque l'équation est du premier ordre.

Elle est fondée sur cette remarque, que, si $A dx + B dy$ est une équation qui a tous les termes, A & B étant rationnels, & que le facteur $\frac{A}{B}$ ces fonctions étant du degré m , rende différentielle exacte une équation peu différente de $A dx + B dy = 0$, on pourra, en prenant $\frac{A}{B} + \frac{Z}{Z'}$ pour facteurs de $A dx + B dy$, faire Z & Z' d'un degré tel que, négligeant les secondes dimensions des coefficients de Z & Z' , & des petits coefficients de $A dx + B dy$, dans la condition d'intégrabilité, on pourra faire en sorte que le nombre des coefficients indéterminés surpasse celui des équations de comparaison; donc on aura en série l'intégrale de $A dx + B dy$, toutes les fois que l'on aura celle d'une équation peu différente; donc on l'aura toutes les fois que l'on pourra regarder x comme une quantité très-petite.

On peut étendre cette méthode aux ordres plus élevés.

On peut aussi employer, pour les équations différentielles, la méthode suivante :

Soit, $1^{\circ} dy = \phi(x) dx$, A la valeur de y ,

lorsque $x = a$. La valeur de y , lorsque $x = a + \Delta x$; Δx étant très-petit, pourra être supposée, en générale, égale à $A + \phi(a) \Delta x + \frac{\phi'(a)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \&c.$

Nous nous arrêterons au second terme; on voit qu'on pourroit également ne s'arrêter qu'au 3.^e au 4.^e &c. Par la même raison, pour $x = a + \Delta x$, on aura,

$$y = A + \phi(a) \Delta x + \frac{\phi'(a)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \phi(a + \Delta x) \Delta x + \frac{\phi'(a + \Delta x)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \&c.$$

Pour $x + \Delta x$, y sera,

$$A + \phi(a) \Delta x + \frac{\phi'(a)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \phi(a + \Delta x) \Delta x + \frac{\phi'(a + \Delta x)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \phi(a + 2 \Delta x) \Delta x + \frac{\phi'(a + 2 \Delta x)}{2 \Delta a} \Delta x^2 + \&c.$$

& ainsi de suite jusqu'à $m \Delta x = x$. On aura donc, par ce moyen, une valeur approchée de y , & d'autant plus approchée, qu'on aura pu prendre m plus grand à Δx plus petit.

2.^o Soit une équation $dy = \phi \cdot dx$, nous supposons d'abord qu'on connoisse des valeurs de y répondantes à $x = a$, $x = a + \Delta x$, $x = a + 2 \Delta x$, $x = a + 3 \Delta x$, ... nous supposons ensuite Δx étant regardé comme très-petit,

$$\Delta \cdot \frac{dy}{dx} = \phi \cdot \Delta x + \phi' \cdot \Delta x^2$$

$$\Delta^2 \cdot \frac{dy}{dx} = \phi \cdot \Delta x^2 + \phi' \cdot \Delta x^3$$

$n \cdot y = \phi \cdot \Delta x^n + \phi' \cdot \Delta x^{n+1}$, où $\phi' \cdot \Delta x^{n+1} + \&c.$ sont pris en différentiant ϕ en x & y , regardant les $y, \frac{dy}{dx}$, ... comme des fonctions de x , & mettant à la place de $\frac{dy}{dx}$ sa valeur ϕ .

Cela posé, les $\phi' \cdot \Delta x^{n+1} + \&c.$ seront de même que des fonctions de $x, y, \frac{dy}{dx}, \dots \frac{d^n y}{dx^n}$, & l'on

aura par conséquent n équation aux différences finies entre les $n + 1$ indéterminées $x, y, \dots \frac{d^n y}{dx^n}$, & par conséquent, après avoir éliminé une équation finale entre $x, y, \dots \frac{d^n y}{dx^n}$.
O'ij

$\Delta \frac{n \cdot n + 1}{2}$. D'où il résulte qu'ayant une valeur de y donnée pour $x = a$, $a + \Delta x$, $a + \left(\frac{n \cdot n + 1}{2}\right) \Delta x$, on aura une valeur approchée de y , répondante à $x = a + \frac{n \cdot n + 1}{2} \Delta x$, & successivement de la même manière que ci-dessus, pour $x = a + \left(\frac{n \cdot n + 1}{2} - 1\right) \Delta x + m \Delta x$.

Il suffit pour l'objet de cet ouvrage d'indiquer ici les principes généraux de cette méthode, & nous n'entrerons point dans le détail, ni des moyens de la simplifier, ni de ceux de l'appliquer au cas où les valeurs de y connues, ne répondroient pas à des valeurs de x en proportion arithmétique.

Après avoir donné le moyen d'avoir y en x par une série lorsque y est donné par une équation différentielle, supposons que y soit très-petit, qu'on puisse en négliger une certaine puissance, & voyons ce qui doit arriver.

1.^o La série, par laquelle y est exprimé, peut ou ne pas contenir x , ou le contenir.

2.^o Si elle ne contient pas x , & que toutes les racines f soient ou réelles négatives, ou imaginaires avec une partie réelle négative, il est évident que la série, en conservant les mêmes coefficients, pourra être convergente depuis une certaine valeur donnée de x jusqu'à $x = \infty$.

3.^o Si elle ne contient que des racines positives réelles ou imaginaires avec la partie réelle positive, la série ne sera convergente avec les mêmes coefficients, que depuis une certaine valeur négative de x jusqu'à $x = -\infty$.

4.^o Si la série contenant x , cette variable ne mène qu'à une puissance finie & déterminée, quel que loin que l'on pousse la série, alors si les séries particulières qui multiplient les puissances de x sont convergentes pour toute l'étendue des valeurs de x , la série pourra être censée représenter y à très-peu près pour toutes ces valeurs.

5.^o Si x est introduit dans la série parce qu'il y a dans l'équation en f des racines égales, & que les coefficients de l'équation en y ne soient connus qu'à-peu-près, on ne pourra prononcer que x ne doit pas entrer dans la série, excepté quand ses racines seront très-inégaux, & on ne sera jamais sûr que x doive y entrer.

6.^o Il en sera de même si x est introduit dans la série, parce qu'il y a des racines telles que leurs sommes multipliées par des nombres entiers positifs, soient égales à une racine de la même équation. Mais on doit en excepter le cas où cette propriété des racines a lieu, parce qu'il manque à l'équation certains termes qui doivent manquer par la nature même du problème proposé. Voyez EQUATION SÉCULAIRE.

7.^o Toutes les fois que l'équation n'aura que de

racines imaginaires pures, c'est-à-dire, que la série sera composée de sinus & de cosinus multipliés de x , cette série contiendra nécessairement x au 3.^o rang. En effet, soient deux racines imaginaires $+b\sqrt{-1}$, $-b\sqrt{-1}$, nous aurons au 3.^o rang $(+b\sqrt{-1} - b\sqrt{-1})x + b\sqrt{-1}x$

$= b\sqrt{-1}x$ terme qui faisait, par l'hypothèse, à l'équation du terme linéaire en y . Voyez EQUATION SÉCULAIRE.

8.^o Toutes les fois que la série ne donne la valeur de y convergente que pour une certaine étendue des valeurs de x , on sera obligé à prendre de nouvelles valeurs de y avec de nouveaux coefficients arbitraires qu'on déterminera d'après les valeurs de y , données par une des séries précédentes dans des points où cette série étoit encore convergente. (M. D. C.)

APPUI ou POINT D'APPUI d'un levier, est le point fixe autour duquel le poids & la puissance sont en équilibre dans un levier; ainsi, dans une balance ordinaire le point du milieu par lequel on suspend la balance, est le point d'appui. Le point d'appui d'un levier, lorsque la puissance & les poids ont des directions parallèles, est toujours chargé d'une quantité égale à la somme de la puissance & du poids. Ainsi, dans une balance ordinaire à bras égaux, la charge du point d'appui est égale à la somme des poids qui sont dans les plats de la balance, c'est-à-dire, au double d'un de ces poids. On voit aussi par cette raison, que l'appui est moins chargé dans la balance appelée romaine ou peson, que dans la balance ordinaire; car pour peser, par exemple, un poids de six livres avec la balance ordinaire, il faut de l'autre côté un poids de six livres, & la charge de l'appui est de douze livres, au lieu qu'en se servant du peson, on peut peser le poids de six livres avec un poids d'une livre, & la charge de l'appui n'est alors que sept livres. Voyez PESON, ROMAINE, &c. (D)

APPULSE, (Astron.) exprime la proximité de la lune à une étoile, soit qu'il y ait éclipse, soit que le bord de la lune passe seulement à quelques minutes de l'étoile, de manière à être observée dans le même champ de la lunette. On observe les appulses avec soin pour déterminer les lieux de la lune, les erreurs des tables & les longitudes des lieux. On se sert, pour ces observations, d'un micromètre, avec lequel on observe les différences d'ascensions droites & de déclinaisons entre l'étoile & le bord de la lune, ou bien d'un héliomètre ou micromètre objectif, pour mesurer les distances entre l'étoile & le bord de la lune avant & après le moment de la plus courte distance. On calcule les appulses en rapportant la lune à sa place sur une figure ou zodiaque, comme celui de Senex ou de d'Huilland, fait sous les yeux de M. le Monnier, & cela est suffisant pour les prédire dans les Ephémérides ou dans la Connaissance des temps. (D. L.)

APPUYÉ, adj. m. on dit, en terme de Géométrie, que les angles dont le sommet est dans la circonférence de quelque segment de cercle, s'appuient ou sont posés sur l'arc de l'autre segment de dessous. Ainsi (Géométrie, fig. 12) l'angle BAD , dont le sommet est dans la circonférence du segment $BCHD$, est dit appuyé sur l'autre segment BOD . Voyez SEGMENT.

A P R

APRETÉ, f. f. (Méch.) se dit de l'inégalité & de la rudesse de la surface d'un corps, par laquelle quelques-unes de ses parties s'élèvent tellement au dessus du reste, qu'elles empêchent de passer la main dessus avec aisance & liberté. Voyez PARTICULE.

L'apreté ou la rudesse est opposée à la douceur, à l'égalité, à ce qui est uni ou poli, &c. Le frottement des surfaces contiguës vient de leur apreté. Voyez SURFACE & FROTTEMENT.

L'apreté plus ou moins grande des surfaces des corps, est une chose purement relative. Les corps qui nous paroissent avoir la surface la plus unie, étant vus au microscope, ne sont plus qu'un tissu de rugosités & d'inégalités.

Suivant ce que M. Boyle rapporte de Vermeulen, aveugle très-fameux par la délicatesse & la finesse de son toucher, avec lequel il distinguoit les couleurs, il paroîtroit que chaque couleur a son degré ou son espèce particulière d'apreté. Le noir paroît être la plus rude, de même qu'il est la plus obscure des couleurs; mais les autres ne sont pas plus douces à proportion qu'elles sont plus éclatantes; c'est-à-dire, que la plus rude n'est pas toujours celle qui réfléchit le moins de lumière: car le jaune est plus rude que le bleu; & le vert, qui est la couleur moyenne, est plus rude que l'une & l'autre. Voyez COULEUR & LUMIÈRE. (O)

APSIDES, *auges, apsidæ*, (Astron.) ce mot exprime les deux sommets d'une orbite elliptique; il vient de *ἀψή* courbure ou tourne, parce que ce sont les points où l'orbite se courbe, se reploie & change de direction. L'apside supérieure, la grande apside, *summa apsis*, s'appelle apogée, quand il s'agit du soleil & de la lune; aphélie quand on parle des planètes principales; & quelquefois apoïjee, quand il s'agit des satellites de Jupiter; la petite apside, *infima apsis*, est le périée ou le périhélie.

La droite qui passe par le centre de l'orbite de la planète, & qui joint ces deux points, s'appelle la ligne des apsidæ de la planète. C'est le grand axe d'une orbite elliptique; telle est la ligne AP , Planches d'Astronomie, fig. 83 & suiv., tirée de l'aphélie A , au périhélie P . Voyez ORBITE & PLANÈTE.

On compte l'excentricité sur la ligne des apsidæ;

car c'est la distance du centre C de l'orbite de la planète au foyer S de l'orbite. Voyez EXCENTRICITÉ.

Newton a donné dans son livre des Principes, une très-belle méthode pour déterminer le mouvement des apsidæ d'une planète causé par l'attraction d'une autre, en supposant que l'orbite décrite par la planète soit peu différente d'un cercle; il a fait voir que si le soleil étoit immobile, & que toutes les planètes pédisent vers lui en raison inverse du carré de leurs distances, le mouvement des apsidæ seroit nul, c'est-à-dire que la ligne de la plus grande distance & la ligne de la plus petite distance, seroient éloignées de 180 degrés l'une de l'autre, & ne formeroient qu'une seule ligne droite. Ce qui fait donc que les deux points des apsidæ ne sont pas toujours exactement en ligne droite avec le soleil, c'est que par la tendance mutuelle des planètes les unes vers les autres, leur gravitation vers le soleil n'est pas précisément en raison inverse du carré de la distance. Newton donne une méthode très-élégante pour déterminer le mouvement des apsidæ, en supposant qu'on connoisse la force qui est ajoutée à la gravitation de la planète vers le soleil, & que cette force ajoutée ait toujours sa direction vers le soleil.

Cependant quelque belle que fût cette méthode, elle ne pouvoit suffire, comme l'observe M. d'Alembert, parce que dans toutes les planètes, tant premières que secondaires, la force ajoutée à la gravitation vers le foyer de l'orbite, n'a presque jamais sa direction vers ce foyer: aussi M. Newton ne s'en servit point pour déterminer le mouvement des apsidæ de l'orbite lunaire; & M. Clairaut fit voir que le calcul rigoureux de l'attraction du soleil sur la lune, étoit nécessaire pour trouver le mouvement de l'apogée de la lune conforme à l'observation. La manière de déterminer par observation la situation des apsidæ, a été expliquée au mot APHÉLIE. (D. L.)

APUS ou **APOUS**, (Astron.) c'est-à-dire, *pedibus carens*; quelquefois aussi par corruption *Apis*; mais ce nom est réservé à l'Abeille ou à la mouche. *Apus* est le nom d'une constellation méridionale, appelée en français l'oiseau de paradis, *avis india, manucodiata, ou paradisæa*, c'est le nom que lui donne M. Linné. Cette constellation, dans les cartes de Bayer, a douze étoiles; il y en a un plus grand nombre dans le catalogue de M. l'abbé de la Caille. Voyez *Coelum australe stelliferum*, & les Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris de 1752, pag. 569. La principale étoile de cette constellation est de la cinquième grandeur; elle avoit en 1750 214° 52' 45" d'ascension droite, & 77° 57' 6" de déclinaison australe: ainsi elle passe au méridien 37° au-dessous de l'horizon de Paris. (D. L.)

AQUARIUS, Voyez VERSEAU.

AQUEDUC, f. m. (*Hid.*) bâtiment de pierre, fait dans un terrain inégal, pour conserver le niveau de l'eau, & la conduire d'un lieu dans un autre. Ce mor est formé d'*aqua*, eau, & de *ductus*, conduit.

On en distingue de deux sortes, d'apparens & de souterrains. Les apparens sont construits à-travers les vallées & les fondrières, & composés de tremaux & d'arcades; tels sont ceux d'Arcueil, de Marli, & de Bucq, près de Versailles. Les souterrains sont percés à-travers les montagnes, conduits au-dessous de la superficie de la terre, bâtis de pierre de taille & de moellons, & couverts en-dessus de voûtes ou de pierres plates, qu'on appelle *dalles*: ces dalles mettent l'eau à l'abri du soleil; tels sont ceux de Roquencourt, de Belleville, & du Pré S. Gervais.

On distribue encore les *aqueducs* en doubles ou triples, c'est-à-dire, portés sur deux ou trois rangs d'arcades: tel est celui du Pont-du-Gard en Languedoc, & celui qui fournit de l'eau à Constantinople; auxquels on peut ajouter l'*aqueduc* que Procope dit avoir été construit par Cosroës, roi de Perse, pour la ville de Petra en Mingrelie; il avoit trois conduits sur une même ligne, les uns élevés au-dessus des autres.

Souvent les *aqueducs* sont pavés; quelquefois l'eau roule sur un lit de ciment fait avec art, ou sur un lit naturel de glaise: ordinairement elle passe dans des cuvettes de plomb, ou des auges de pierre de taille, auxquelles on donne une pente imperceptible pour faciliter son mouvement; aux côtés de ces cuvettes sont ménagés de petits sentiers où l'on peut marcher au besoin. Les *aqueducs*, les perriers, les tranchées, &c. amènent les eaux dans un réservoir; mais ne les élèvent point. Pour devenir jaillissantes, il faut qu'elles soient renfermées dans des tuyaux. (K)

* Les *aqueducs* de toute espèce étoient jadis une des merveilles de Rome: la grande quantité qu'il y en avoit; les frais immenses employés à faire venir des eaux d'endroits éloignés de treize, quarante, soixante, & même cent mille sur des arcades, ou continuées ou suppléées par d'autres travaux, comme des montagnes coupées ou des roches percées; tout cela doit surprendre: on n'entreprend rien de semblable aujourd'hui; on n'oseroit même penser à acheter si cherement la commodité publique. On voit encore en divers endroits de la campagne de Rome de grands restes de ces *aqueducs*; des arcs continués dans un long espace, au-dessus desquels étoient les canaux qui portoient l'eau à la ville; ces arcs sont quelquefois bas, quelquefois d'une grande hauteur, selon les inégalités du terrain. Il y en a à deux arcades l'une sur l'autre; & cela de crainte que la trop grande hauteur d'une seule arcade, ne renvêlât la structure, moins solide: ils sont communément de briques, si bien cimentées, qu'on a peine à en détacher des morceaux. Quand l'élévation du terrain

étoit énorme, on recouroit aux *aqueducs* souterrains; ces *aqueducs* portoient les eaux à ceux qu'on avoit élevés sur terre, dans les fonds & les pentes des montagnes. Si l'eau ne pouvoit avoir de la pente qu'en passant au-travers d'une roche, on la perçoit à la hauteur de l'*aqueduc* supérieur: on en voit un semblable au-dessus de Tivoli, & au lieu nommé *Vicovaro*. Le canal qui formoit la suite de l'*aqueduc*, est coupé dans la roche vive l'espace de plus d'un mille, sur environ cinq pieds de haut & quatre de large.

Une chose digne de remarque, c'est que ces *aqueducs* qu'on pouvoit conduire en droite ligne à la ville, n'y parvenaient que par des sinuosités fréquentes. Les uns ont dit qu'on avoit suivi ces obliquités, pour éviter les frais d'arcades d'une hauteur extraordinaire; d'autres, qu'on s'étoit proposé de rompre la trop grande impetuosité de l'eau qui, coulant en ligne droite par un espace immense, auroit toujours augmenté de vitesse, endommageant les canaux, & donné une boisson peu nette & mal-saine. Mais on demande pourquoi y ayant une si grande pente de la cascade de Tivoli à Rome, on est allé prendre l'eau de la même rivière à vingt milles & davantage plus haut; que dis-je vingt milles, à plus de trente, en y comptant les détours d'un pays plein de montagnes. On répond que la raison d'avoir des eaux meilleures & plus pures, suffisoit aux Romains pour croire leurs travaux nécessaires & leurs dépenses justifiées; & si l'on considère d'ailleurs que l'eau du Teveron est chargée de parties minérales, & n'est pas saine, on fera comment de cette réponse.

Si l'on jette les yeux sur la planche 118 du IV. volume des *Antiquités* du P. Montfaucon, on verra avec quels soins ces immenses ouvrages étoient construits. On y laissoit d'espace en espace des soupiraux; afin que si l'eau venoit à être arrêtée par quelque accident, elle put se dégorger jusqu'à ce qu'on eût dégagé son passage. Il y avoit encore dans le canal même de l'*aqueduc* des puits où l'eau se jettoit, se reposoit & déchargeoit son limon, & des piscines où elle s'étendoit & se purifioit.

L'*aqueduc* de l'*Aqua-Marcia* a l'arc de ferme pieds d'ouverture: le tout est composé de trois différentes sortes de pierres; l'une rougeâtre, l'autre brune & l'autre de couleur de terre. On voit en haut deux canaux, dont le plus élevé étoit de l'eau nouvelle du Teveron, & celui de dessous étoit de l'eau appelée *Claudienne*; l'édifice entier a soixante & dix pieds romains de hauteur.

À côté de cet *aqueduc*, on a, dans le P. Montfaucon, la coupe d'un autre à trois canaux; le supérieur est d'eau *Julia*, celui du milieu, d'eau *Tepula*, & l'inférieur, d'eau *Marcia*.

L'arc de l'*aqueduc* d'eau *Claudienne* est de très-belle pierre de taille; celui de l'*aqueduc* d'eau *Néronienne* est de brique: ils ont l'un & l'autre soixante-douze pieds romains de hauteur.

Le canal de l'*aqueduc* qu'on appelloit *Aqua-*

Appia mérite bien que nous en fassions mention, par sa singularité qu'on y remarque; c'est de n'être pas uni comme les autres, d'aller comme par degrés, en sorte qu'il est beaucoup plus étroit en bas qu'en haut.

Le consul Frontin, qui avoit la direction des *aqueducs* sous l'empereur Nerva, parle de neuf *aqueducs* qui avoient 1394 tuyaux d'un pouce de diamètre. Vigerus observe que, dans l'espace de vingt-quatre heures, Rome recevoit 50000 muids d'eau.

Nous pourrions encore faire mention de l'*aqueduc* de Drusus & de celui de Rimini; mais nous nous contenterons d'observer ici qu'Auguste fit réparer tous les *aqueducs*; & nous passerons ensuite à d'autres monumens dans le même genre, & plus importants encore, de la magnificence romaine.

Un de ces monumens est l'*aqueduc* de Metz, dont il reste encore aujourd'hui un grand nombre d'arcades; ces arcades traversoient la Moselle, rivière grande & large en cet endroit. Les sources abondantes de Gorzeournissoient l'eau à la Naumachie; ces eaux s'assembloient dans un réservoir; de-là elles étoient conduites par des canaux souterrains faits de pierre de taille, & si spacieux qu'un homme pouvoit y marcher droit: elles passaient la Moselle sur ces hautes & superbes arcades qu'on voit encore à deux lieues de Metz, si bien maçonnées & si bien cimentées, qu'excepté la partie du milieu, que les glaces ont emportée, elles ont résisté & résistent aux injures les plus violentes des saisons. De ces arcades, d'autres *aqueducs* conduisoient les eaux aux bains & au lieu de la Naumachie.

Si l'on en croit Colmenarès, l'*aqueduc* de Ségovie peut être comparé aux plus beaux ouvrages de l'antiquité. Il en reste cent cinquante-neuf arcades, toutes de grandes pierres sans ciment. Ces arcades avec le reste de l'édifice ont cent deux pieds de haut; il y a deux rangs d'arcades l'un sur l'autre; l'*aqueduc* traverse la ville & passe par-dessus la plus grande partie des maisons qui sont dans le fond.

Après ces énormes édifices, on peut parler de l'*aqueduc* que Louis XIV. a fait bâtir proche Maintenon, pour porter les eaux de la rivière de Bucq à Versailles; c'est peut-être le plus grand *aqueduc* qui soit à présent dans l'univers; il est de 7000 brasses de long sur 1560 de haut, & a 242 arcades.

Les cloaques de Rome, ou ses *aqueducs* souterrains, étoient aussi comestibles parmi les merveilles; ils s'étendoient sous toute la ville, & se subdivisoient en plusieurs branches qui se déchargeoient dans la rivière; c'étoient de grandes & hautes voûtes bâties solidement, sous lesquelles on alloit en bateau; ce qui faisoit dire à Pline que la ville étoit suspendue en l'air, & qu'on navigoit sous les maisons; c'est ce qu'il appelle le plus grand ouvrage qu'on ait jamais entrepris. Il y avoit sous

ces voûtes des endroits où des charrettes chargées de soixante pouvoient passer; ces voûtes faisoient le pavé des rues. Il y avoit d'espace en espace des trous où les immondiées de la ville étoient précipitées dans les cloaques. La quantité incroyable d'eau que les *aqueducs* apportent à Rome y étoit aussi déchargée. On y avoit encore détourné des ruisseaux, d'où il arrivoit que la ville étoit toujours nette, & que les ordures ne séjournoient point dans les cloaques, & étoient promptement rejetées dans la rivière.

Ces édifices sont capables de frapper de l'admiration la plus forte; mais ce seroit avoir la vue bien courte que de ne pas la porter au-delà, & que de n'être pas tenté de remonter aux causes de la grandeur & de la décadence du peuple qui les a construits. Cela n'est point de notre objet; mais le lecteur peut consulter là-dessus les *Considérations* de M. le Président de Montesquieu, & celles de M. l'Abbé de Mably; il verra dans ces ouvrages, que les édifices ont toujours été & seront toujours comme les hommes, excepté peut-être à Sparte, où l'on trouve de grands hommes dans des maisons petites & chéives; mais cet exemple est trop singulier pour tirer à conséquence.

ARA

ARAINÉE (*Astron.*): on donne quelquefois ce nom à l'un des cercles d'un astrolabe, qui est percé à jour & porte différens bras, dont les extrémités marquent la position des étoiles, *planisph. d'Astronomie*, fig. 230. L'*arainée* tourne sur un planisphère où sont tracés les différens cercles auxquels on rapporte la position des étoiles pour trouver leur lever & leur coucher, &c. Voyez *ASTROLABE*. (D. L.)

ARAMECH, voyez *ARCTURUS*.

ARBALÈTE, f. f. (*Astron. navig.*), instrument avec lequel on observoit autrefois sur mer la hauteur du soleil, & qui est fait comme une espèce de croix. On l'appelle aussi *arbalète*, *flèche*, *rayon astronomique*, *radiomètre*, *croix géométrique*, *verge d'or*, autrefois *bâton de jacob*, en anglais *jacob staff*, *cross-staff* (bâton à croix) *fore-staff* (bâton de devant), parce que l'on observe par-devant, ou en se tournant du côté du soleil; tandis qu'avec le quartier anglais on tourne le dos au soleil pour en mesurer la hauteur.

Cet instrument dérive des règles parallactiques de Ptolémée (*planches d'Astronomie*, fig. 235); car si l'on suppose que la règle *OD* soit toujours fixée perpendiculairement au bâton *AG*, on aura une *arbalète*. On en trouvera la figure dans le Dictionnaire de Marine; mais nous avons à parler ici de l'histoire & des progrès de ce genre d'observations. Jean Werner, né à Nuremberg en 1468, est le premier qui décrivit l'*arbalète* en 1514, & il la recommandoit aux marins pour ob-

servir les longitudes en mer par des distances de la lune aux étoiles (*Wales astronomical observations*, 1777, introd. p. xxiv). Je crois que ce sont les observations de Werner qui furent imprimées en 1514; mais son livre de *motu sphaerae*, est de 1522 (Weidler, pag. 335). Appian, en 1524, & Gemma-Frisius en 1530, en recommandoient aussi l'usage.

Le P. Fournier, dans son *Hydrographie*, p. 495, dit que ce que les caldéens appelloient bâton de Jacob, & les astronomes rayon astronomique, est nommé *arbalète* ou *flèche* par Martin Cortez & Michel Coignet, en leurs ouvrages, & généralement par tous les matelots. Les flamands, dit-il, l'appellent *graiboge*; en écrit graat boogh en hollandais. Les espagnols l'appellent *balajilla*. Le P. Dechalles l'appelle *cruz geometrica*.

Le bâton, la flèche, ou la verge de l'instrument, a 3 ou 4 pieds de longueur; elle porte une pièce appelée par les anciens *traverseira*, & *curseur*, parce qu'elle se met de travers & en croix sur la verge ou flèche; on la fait courir le long de cette flèche; nos matelots l'appellent *marreau*; on a des marreaux de trois grandeurs différentes: c'est-à-dire, de 12 pouces, de 6 & de 1 1/2 (Fournier, pag. 495). Dans le Dictionnaire de Marine d'Aubin, il y a *curseur* & *marreau*. Ozanam, dans son Dictionnaire, pag. 256, dit que le traverseira ou marreau se met le long de la flèche, & qu'on appelle cet instrument *verge d'or* par excellence, parce qu'il est le plus commode de tous les instruments.

Ozanam, dans la table, met *flèche d'arbalète*; ce qui prouve qu'il adopte le nom d'*arbalète* de préférence. MM. Bouguer & la Caille, pag. 181, édit. de 1769, in-8.^o, l'appellent *arbalète*.

Gemma-Frisius (*principia Astronomiae Cosmographicae*, 1530), est le premier qui ait parlé de trois marreaux dans l'*arbalète*; il en est parlé aussi dans Michel Coignet d'Anvers: instruction nouvelle des points plus excellents & nécessaires touchant l'art de naviguer; & dans Waeghenar, hollandais, qui fut si célèbre par ses cartes marines, que les matelots anglois appellent encore un Waeghenar un volume de cartes pour la navigation.

Thomas Digges, en 1573, parle des transversales qui étoient dans son *arbalète*, comme étant imaginées depuis long-tems par Richard Chancellor.

Pierre Massé, dans son histoire des Indes, dit que Martin de Bohème, disciple de Regiomontanus, recommandoit l'*astrolabe*; c'est-à-dire, un cercle divisé en degrés, & suspendu à une boucle pour prendre hauteur en mer; mais l'on ne voit pas que l'on s'en servit alors. Werner, qui décrit l'*arbalète*, en recommande l'usage, ainsi que Appian dans la *Cosmographie*, écrite vers 1524 (*Wales*, pag. xxij).

On faisoit aussi une *semi-arbalète*, où il n'y avoit qu'un demi-marreau, & les degrés y étoient une fois plus grand que sur les flèches ordinaires. Vers la fin du 16.^e siècle, on substitua un arc de cercle à la place des marreaux. John Davis, celui qui donna son nom au détroit de Davis, par lequel on alla dans la baie de Baffin, sous le cercle polaire, vers 1583, publia en 1594 un livre, intitulé : *Seaman's secrets*, où il décrit le *back-staff*; il est décrit dans Metius, *Astronomica institutio*, 1605; & de *Arte navigandi*, 1624; *Doctrina Sphaerica*, 1630: d'abord il n'y avoit qu'un arc ou glissoit le marreau de l'œil; celui qui forme l'ombre étoit fixé à une règle droite emmanchée à l'extrémité du rayon de l'instrument, & il étoit plus loin du centre ou du marreau de l'horizon, que l'arc même de l'instrument. On l'appelle *back-staff*, bâton de derrière, parce qu'on tourne le dos au soleil, par opposition à l'*arbalète*, appelée *fore-staff*. (Robertson). Dans le *Lexicon Technicum* de Harris, il est décrit au mot *back-staff*, & il l'appelle aussi *back-quadrant*, *Davis's quadrant*. L'ancienne *arbalète* est décrite au mot *Cross-staff*, quoique l'auteur dise qu'on l'appelle communément *fore-staff*; il dit, voyez *Cross-staff*.

Le quartier de Davis avoit un arc de 60 degrés; & sur un des rayons un marreau ou pinule qui couloit & portoit une ouverture; mais il ne garda pas long-tems cette forme: car vers 1600, ou à-peu-près, on étendit l'arc jusqu'à 90.^e partie au-dessous du rayon & du marreau d'ombre qui y étoit fixé, jusqu'au degré qui parut le plus convenable; & dans cet état, il fut généralement connu sous le nom de *bow* (arc) *arbalète*. Peu d'années après, il reçut une autre perfection, & prit la forme qu'il a actuellement. Le marreau d'ombre étant jusqu'alors placé à une grande distance du centre, l'ombre étoit trop mal terminée sur le marreau d'horizon; & si le tems n'étoit pas très-clair, on ne la distinguoit pas du tout; il fallut donc diminuer le rayon de cette partie où est la pinule d'ombre: l'on ne fait pas aujourd'hui à qui l'on doit ces perfection; & quelques-uns pensent que ce fut l'auteur lui-même, mais cela est douteux. On trouvera dans le Dictionnaire de Marine la figure du quartier de Davis.

Ces trois instruments, l'*astrolabe*, l'*arbalète* & le quart de Davis, prirent différentes formes; le premier produisit le demi-cercle, *sea-rings* (ancien marin) *sea-quadrant* (quartier marin); le second produisit la *semi-arbalète*, le bâton de Hood, *Hood's staff*, &c. & le dernier produisit le *plough* (charrue), ainsi nommé à cause de la forme, parce que l'arc plus petit, & le marreau plus grand lui donnoient presque la forme d'une charrue; il y eut encore le quartier d'Elton (Elton's quadrant), qui seroit un peu des deux précédents. *M. Wales*, pag. xxix.

M Bouguer

M. Bouguet appelle l'instrument dans sa forme actuelle *quartier anglais*, ou *quart de nonante*; il dit que l'arc de 60° a 8 ou 9 pouces de rayon, l'arc 30° & 18 à 20 pouces; il appelle les *vane* des anglais des espèces de pinules ou de petits marteaux, & se sert indifféremment de ces deux mots *pinule* ou *marteau*.

M. Bourdée, dans son *Manuel des Marins*, 1773, ne se sert que des mots *quart de nonante* & de *marteau*. Aubin, dans son *Dictionnaire de Marine*, 1702, l'appelle aussi *quart de nonante*. Robertson, dans ses *Eléments de Navigation*, tom. 2, pag. 297, édit. de 1772, décrit seulement celui qu'il appelle *Davis's quadrant*, & que les étrangers appellent, dit-il, *english quadrant*. Suivant cet auteur, il y a un arc de 65° d'un plus petit rayon, sur lequel glisse la pinule de l'ombre, *shade vane*, ou *glais-vane* si l'on y met un verre ou une lentille. Il y a aussi un arc de 25° d'un rayon trois fois plus long, sur lequel glisse la pinule de l'œil *sight vane*; l'œil se place au petit trou de cette pinule, & regarde l'horizon par la fente de la pinule du centre, appelée *horizon vane*, sur laquelle tombe aussi le bord supérieur de l'ombre de la première pinule.

Flamsteed & Halley y substituèrent une lentille sur le marteau d'ombre, pour que l'on distinguât mieux l'image du soleil. Mais tous ces instruments ont fait place pour l'usage de la navigation au *quartier de réflexion*; & tous les navigateurs qui ont des connaissances, ou qui aiment l'exactitude se servent de ce dernier. Voyez QUARTIER DE RÉFLEXION. (D. L.)

A R C

ARC, f. m. (Géom.); c'est une portion de courbe, par exemple, d'un cercle, d'une ellipse ou d'une autre courbe. Voyez COURBE.

Arc de cercle, est une portion de circonférence, moindre que la circonférence entière du cercle. Tel est *arc AEB*, (Géom. fig. 20). Voyez CERCLE & CIRCONFÉRENCE. La droite *AB*, qui joint les extrémités d'un arc, s'appelle *corde*; & la perpendiculaire *DE* tirée sur le milieu de la corde, s'appelle *flèche*. Voy. CORDE, FLÈCHE. Tous les angles sont mesurés par des arcs. Pour avoir la valeur d'un angle, on décrit un arc de cercle, dont le centre soit au sommet de l'angle. Voyez ANGLE. Tout cercle est supposé divisé en 360° . Un arc est plus ou moins grand, selon qu'il contient un plus grand ou un plus petit nombre de ces degrés. Ainsi, l'on dit un arc de 30° , de 80° , de 100° . Voyez DEGRÉ. La mesure des angles par les arcs de cercle, est fondée sur ce que la courbure du cercle est uniforme. Les arcs d'une autre courbe ne pourroient y servir.

Arcs concentriques, sont ceux qui ont le même centre; ainsi, dans la figure 21, les arcs *b* & *H*, Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie,

& *K*, sont des arcs concentriques. Voyez CONCENTRIQUE.

Arcs égaux, c'est ceux qui contiennent le même nombre de degrés d'un même cercle ou de cercles égaux. Dans le même cercle ou dans des cercles égaux, les cordes égales soutiennent des arcs égaux. Un rayon *CE* (fig. 20) qui coupe en deux parties égales en *D* une corde *AB*, coupe aussi en *E* l'arc *AEB* en deux parties égales, & est perpendiculaire à la corde, & vice versa. Le problème de couper un arc en deux parties égales sera donc résolu, en tirant une ligne *CE* perpendiculaire sur le milieu *D* de la corde.

Arcs semblables, ce sont ceux qui contiennent le même nombre de degrés de cercles inégaux. Tels sont les arcs *AXB* & *DHE*, figure 22. Si deux rayons partent du centre de deux cercles concentriques, les arcs compris entre ces deux rayons ont le même rapport à leurs circonférences entières; & les deux secteurs, le même rapport à la surface entière de leurs cercles.

Arc semi-diurne (*Astron.*), c'est l'arc du parallèle diurne d'un astre qui est compris entre le méridien & l'horizon; il règle le temps qui s'écoule depuis le lever jusqu'au passage par le méridien, & depuis ce passage jusqu'au coucher; ainsi, le calcul du lever ou du coucher d'un astre, se réduit à celui des arcs semi-diurnes, qui changent à raison de la hauteur du pôle du lieu, & de la déclinaison de l'astre. On en trouve une table fort détaillée dans la plupart des anciens volumes de la *Connaissance des temps*, ouvrage que l'Académie publie chaque année, pour l'usage des astronomes & des navigateurs. Voy. LEVER, COUCHER.

Arc d'émersion ou *arc de vision* (*Astron.*) est la quantité dont il faut que le soleil soit abaissé verticalement au-dessous de l'horizon pour qu'un autre astre soit visible à la vue simple; on estime ordinairement l'arc d'émersion de dix-huit degrés pour les plus petites étoiles, de quatorze degrés pour les étoiles de troisième grandeur, de onze à douze degrés pour les étoiles de première grandeur, comme pour mars & saturne, de dix degrés pour mercure & jupiter, & de cinq degrés pour venus; mais ce dernier varie beaucoup, & il se réduit même à rien, puisque l'on voit quelquefois venus en plein jour, le soleil étant très-élevé sur l'horizon. Voyez CRÉPUSCULE.

L'arc de rétrogradation est un arc de l'écliptique qu'une planète semble décrire, en se mouvant contre l'ordre des signes. Voyez RÉTROGRADATION.

ARC de position, angle de position (terme d'*Astron.*) l'arc de l'équateur compris entre le méridien & le cercle horaire ou cercle de déclinaison qui passe par le pôle & par l'astre dont on s'occupe; c'est la même chose que ce que nous appelons aujourd'hui *angle horaire*. On l'appelloit *arc de*

position parce qu'il marquoit la distance du cercle de position au méridien, ou l'arc de l'équateur qui doit passer depuis le moment où l'autre est dans le cercle de position jusqu'à celui où il passera au méridien. (D. L.).

ARC-EN-CIEL, *iris*, f. m. (Opt.) météore en forme d'arc de diverses couleurs, qui paroît lorsque le tems est pluvieux, dans une partie du ciel opposée au soleil, & qui est formé par la réfraction des rayons de cet astre, au travers des gouttes sphériques d'eau dont l'air est alors rempli. **VOYEZ** MÉTÉORE, PLUIE & RÉFRACTION.

On voit par l'ordinaire un second *arc-en-ciel* qui entoure le premier à une certaine distance. Ce second *arc-en-ciel* s'appelle *arc-en-ciel extérieur*, pour le distinguer de celui qu'il renferme, & qu'on nomme *arc-en-ciel intérieur*. L'arc intérieur a les plus vives couleurs, & s'appelle pour cela l'arc principal. Les couleurs de l'arc extérieur sont plus faibles, & de-là vient qu'il porte le nom de second arc. S'il paroît un troisième arc, ce qui arrive fort rarement, ses couleurs sont encore moins vives que les précédentes. Les couleurs sont renversées dans les deux arcs; celles de l'arc principal sont dans l'ordre suivant, à compter du dedans en dehors: violet, indigo, bleu, verd, jaune, orange, rouge; elles sont arrangées au contraire dans le second arc en cet ordre: rouge, orange, jaune, verd, bleu, indigo, violet; ce sont les mêmes couleurs que l'on voit dans les rayons du soleil qui traversent un prisme de verre. **VOYEZ** PRISME. Les physiciens font aussi mention d'un *arc-en-ciel lunaire* & d'un *arc-en-ciel marin*, dont nous parlerons plus bas.

L'*arc-en-ciel*, comme l'observe M. Newton, ne paroît jamais que dans les endroits où il pleut & où le soleil luit en même tems; l'on peut le former par art en tournant le dos au soleil & en faisant jaillir de l'eau, qui poussée en l'air & dispersée en gouttes, vienne tomber en forme de pluie; car le soleil domant sur ces gouttes, fait voir un *arc-en-ciel* à tout spectateur qui se trouve dans une juste position à l'égard de cette pluie & du soleil, sur-tout si l'on met un corps noir derrière les gouttes d'eau.

Antoine de Dominis montre dans son livre, de *radio visû & lucis*, imprimé à Venise en 1611, que l'*arc-en-ciel* est produit dans des gouttes rondes de pluie, par deux réfractions de la lumière solaire, & une réflexion entre deux; & il confirme cette explication par des expériences qu'il a faites avec une phiole & des boules de verre pleines d'eau exposées au soleil. Il faut cependant reconnaître que quelques anciens avoient avancé, antérieurement à Antoine de Dominis, que l'*arc-en-ciel* étoit formé par la réfraction des rayons du soleil dans des gouttes d'eau. Kepler avoit eu la même pensée, comme on le voit par les lettres qu'il écrivit à Brenger en 1605, & à Harriot en 1606. Descartes, qui a suivi dans ses météores

l'explication d'Antoine de Dominis, a corrigé celle de l'arc extérieur. Mais, comme ces savans hommes ne connoissoient point la véritable origine des couleurs, l'explication qu'ils ont donnée de ce météore est défectueuse à quelques égards. Antoine de Dominis a cru que l'*arc-en-ciel* extérieur étoit formé par les rayons qui rafoient les extrémités des gouttes de pluie, & qui venoient à l'œil après deux réfractions & une réflexion. Or on trouve, par le calcul, que ces rayons, dans leur seconde réfraction, doivent faire un angle beaucoup plus petit avec le rayon du soleil qui passe par l'œil, que l'angle sous lequel on voit l'*arc-en-ciel* intérieur; & cependant l'angle sous lequel on voit l'*arc-en-ciel* extérieur, est beaucoup plus grand que celui sous lequel on voit l'*arc-en-ciel* intérieur: de plus, les rayons qui tombent fort obliquement sur une goutte d'eau, ne sont point de couleurs sensibles dans leur seconde réfraction, comme on le verra aisément par ce que nous dirons dans la suite. A l'égard de M. Descartes, qui a le premier expliqué l'*arc-en-ciel* extérieur par deux réflexions & deux réfractions, il n'a pas remarqué que les rayons extrêmes qui sont le rouge, ont leur réfraction beaucoup moindre que selon la proportion de 3 à 4, & que ceux qui sont le violet ont beaucoup plus grande: de plus, il s'est contenté de dire qu'il venoit plus de lumière à l'œil sous les angles de 41° & de 42°, que sous les autres angles, sans prouver que cette lumière doit être colorée; & ainsi il n'a pas suffisamment démontré d'où vient qu'il paroît des couleurs sous un angle d'environ 42°, & qu'il n'en paroît point sous ceux qui sont au-dessous de 40°, & au-dessus de 44° dans l'*arc-en-ciel* intérieur. Ce célèbre auteur n'a donc pas suffisamment expliqué l'*arc-en-ciel*, quoiqu'il ait fort avancé cette explication. Newton l'a achevée par le moyen de sa doctrine des couleurs.

Théorie de l'arc-en-ciel. Pour concevoir l'origine de l'*arc-en-ciel*, examinons d'abord ce qui arrive lorsqu'un rayon de lumière qui vient d'un corps éloigné, tel que le soleil tombe sur une goutte d'eau sphérique, comme sont celles de la pluie. Soit donc une goutte d'eau *ADKN* (Tab. Opt. fig. 45), & les lignes *EF*, *BA*, des rayons lumineux qui parient du centre du soleil, & que nous pouvons concevoir comme parallèles entr'eux à cause de l'éloignement immense de cet astre. Le rayon *BA* étant le seul qui tombe perpendiculairement sur la surface de l'eau, & tous les autres étant obliques, il est aisé de concevoir que tous ceux-ci souffriront une réfraction & s'approcheront de la perpendiculaire; c'est-à-dire, que le rayon *EF*, par exemple, au lieu de continuer son chemin suivant *FG*, se rompra au point *F*; & s'approchera de la ligne *HFI* perpendiculaire à la goutte en *F*, pour prendre le chemin *FK*. Il en est de même de tous les autres rayons proches du rayon *EF*,

Auxquels se détourneront de F vers K , où il y en aura vraisemblablement quelques-uns qui s'échapperont dans l'air, tandis que les autres se réfléchiront suivant la ligne KN , pour faire des angles d'incidence & de réflexion égaux entr'eux. *VOYEZ RÉFLEXION.*

De plus, comme le rayon KN & ceux qui le suivent, tombent obliquement sur la surface de ce globe, ils ne peuvent repasser dans l'air sans le rompre de nouveau & s'éloigner de la perpendiculaire MNL ; de sorte qu'ils ne peuvent aller directement vers Y , & sont obligés de se détourner vers P . Il faut encore observer ici que quelques-uns des rayons, après qu'ils sont arrivés en N , ne passent point dans l'air, mais se réfléchissent de nouveau vers Q , où souffrant une réfraction comme tous les autres, ils ne vont point en droite ligne vers P , mais vers R , en s'éloignant de la perpendiculaire TV . Mais, comme on ne doit avoir égard ici qu'aux rayons qui peuvent affecter l'œil, que nous supposons placé un peu au-dessous de la goutte, au point Z , par exemple, nous laissons ceux qui se réfléchissent de N vers Q comme inutiles, à cause qu'ils ne parviennent jamais à l'œil du spectateur. Cependant il faut observer qu'il y a d'autres rayons, comme 2, 3, qui se rompant de 3 vers 4, de-là se réfléchissent vers 5, & de 5 vers 6, puis se rompant suivant 6, 7, peuvent enfin arriver à l'œil qui est placé au dessous de la goutte.

Ce que l'on a dit jusqu'ici est très-évident: mais, pour déterminer précisément les degrés de réfraction de chaque rayon de lumière, il faut recourir à un calcul, par lequel il paroît que les rayons qui tombent sur le quart de cercle AD , continuent leur chemin suivant les lignes que l'on voit tirées dans la goutte $ADKN$, où il y a trois choses extrêmement importantes à observer. En premier lieu, les deux réfractions des rayons à leur entrée & à leur sortie sont telles, que la plupart des rayons qui étoient entrés parallèles sur la surface AF , forment divergens, c'est-à-dire, s'écartent les uns des autres, & n'arrivent point jusqu'à l'œil. En second lieu, du faisceau de rayons parallèles qui tombent sur la partie AD de la goutte, il y en a une petite partie qui, ayant été rompus par la goutte, viennent se réunir au fond de la goutte dans le même point, & qui étant réfléchis de ce point, forment de la goutte parallèles entr'eux comme ils y étoient entrés. Comme ces rayons sont proches les uns des autres, ils peuvent agir avec force sur l'œil en cas qu'ils puissent y entrer, & c'est pour cela qu'on les a nommés *rayons efficaces*; au lieu que les autres s'écartent trop pour produire un effet sensible, ou du moins produire des couleurs aussi vives que l'*arc-en-ciel*. En troisième lieu, le rayon NP a une ombre ou obscurité sous lui; car puisqu'il ne sort aucun rayon

de la surface $N4$, c'est la même chose que si cette partie étoit couverte d'un corps opaque. On peut ajouter à ce que l'on vient de dire, que le même rayon NP a de l'ombre au-dessus de l'œil, puisque les rayons qui sont dans cet endroit n'ont pas plus d'effet que s'ils n'existoient point du tout.

De-là il s'ensuit que, pour trouver les rayons efficaces, il faut trouver les rayons qui ont le même point de réflexion, c'est-à-dire, qu'il faut trouver quels sont les rayons parallèles & contigus, qui, après la réfraction, se rencontrent dans le même point de la circonférence de la goutte, & se réfléchissent de-là vers l'œil.

Or supposons que NP soit le rayon efficace; & que EF soit le rayon incident qui correspond à NP , c'est-à-dire, que F soit le point où il tombe un petit faisceau de rayons parallèles, qui après s'être rompus, viennent se réunir en K , pour se réfléchir de-là en N , & sortir suivant NP ; & nous trouverons par le calcul que l'angle ONP , compris entre le rayon NP & la ligne ON tirée du centre du soleil, est de $41^{\circ} 30'$. On enseignera ci-après la méthode de le déterminer.

Mais comme, outre les rayons qui viennent du centre du soleil à la goutte d'eau, il en part une infinité d'autres des différents points de la surface, il nous reste à examiner plusieurs autres rayons efficaces, sur-tout ceux qui partent de la partie supérieure & de la partie inférieure du soleil.

Le diamètre apparent du soleil étant d'environ $32'$, il s'ensuit que si le rayon EF passe par le centre du soleil, un rayon efficace qui partira de la partie supérieure du soleil, tombera plus haut que le rayon EF de $16'$, c'est-à-dire, fera avec ce rayon EF un angle d'environ $16'$. C'est ce que fait le rayon GH (fig. 46) qui souffrant la même réfraction que EF , se détourne vers I & de-là vers L , jusqu'à ce que sortant avec la même réfraction que NP , il parvienne en M pour former un angle de $41^{\circ} 14'$ avec la ligne ON .

De même le rayon QR qui part de la partie inférieure du soleil, tombe sur le point R , $16'$ plus bas, c'est-à-dire fait un angle de $16'$ en dessous avec le rayon EF , & souffrant une réfraction, il se détourne vers S & de-là vers T , où passant dans l'air il parvient jusqu'à P ; de sorte que la ligne TV & le rayon OT forment un angle de $41^{\circ} 46'$.

À l'égard des rayons qui viennent à l'œil après deux réflexions & deux réfractions, on doit regarder comme efficaces ceux qui, après ces deux réflexions & ces deux réfractions, sortent de la goutte parallèles entr'eux.

Supputant donc les réflexions des rayons qui viennent, comme 23 (fig. 45), du centre du soleil, & qui, pénétrant dans la partie inférieure

ricure de la goutte, souffrent, ainsi que nous l'avons supposé, deux réflexions & deux réfractions, & entrent dans l'œil par des lignes parallèles à celle qui est marquée par 67 (fig. 47), nous trouvons que les rayons que l'on peut regarder comme efficaces, par exemple 67, forment avec la ligne 86 tirée du centre du soleil, un angle 867 d'environ 52° : d'où il s'ensuit que le rayon efficace qui part de la partie la plus élevée du soleil, fait avec la même ligne 85 un angle moindre de 16° ; & celui qui vient de la partie inférieure un angle plus grand de 16° .

Imaginons donc que $A B C D E F$ soit la route du rayon efficace depuis la partie la plus élevée du soleil jusqu'à l'œil F ; l'angle $86 F$ sera d'environ $51^{\circ} 44'$. De même, si $G H I K L M$ est la route d'un rayon efficace qui part de la partie inférieure du soleil & aboutit à l'œil, l'angle $86 M$ approche de $52^{\circ} 16'$.

Comme il y a plusieurs rayons efficaces outre ceux qui partent du centre du soleil, ce que nous avons dit de l'ombre souffre quelque exception ; car, des trois rayons qui sont tracés (fig. 45 & 46), il n'y a que les deux extrêmes qui aient de l'ombre à leur côté extérieur.

A l'égard de la quantité de lumière, c'est-à-dire du faisceau de rayons qui se réunissent dans un certain point, par exemple, dans le point de réflexion des rayons efficaces, on peut le regarder comme un corps lumineux terminé par l'ombre. Au reste, il faut remarquer que jusqu'ici nous avons supposé que tous les rayons de lumière se rompoient également ; ce qui nous a fait trouver les angles de $41^{\circ} 30'$ & de 52° . Mais les différents rayons qui parviennent ainsi jusqu'à l'œil, sont de diverses couleurs, c'est-à-dire, propres à exciter en nous l'idée de différentes couleurs ; & par conséquent ces rayons font différemment rompus de l'eau dans l'air, quoiqu'ils tombent de la même manière sur une surface réfrangible : car on fait que les rayons rouges, par exemple, souffrent moins de réfraction que les rayons jaunes, ceux-ci moins que les bleus, les bleus moins que les violets, & ainsi des autres. Voyez COULEUR.

Il suit de ce qu'on vient de dire, que les rayons différents ou hétérogènes se séparent les uns des autres & prennent différentes routes, & que ceux qui sont homogènes se réunissent & aboutissent au même endroit. Les angles de $41^{\circ} 30'$ & de 52° , ne sont que pour les rayons d'une moyenne réfrangibilité, c'est-à-dire, qui, en se rompant, s'approchent de la perpendiculaire plus que les rouges, mais moins que les rayons violets ; & de-là vient que le point lumineux de la goutte où se fait la réfraction, paroît bordé de différentes couleurs, c'est-à-dire, que le rouge, le verd & le bleu, naissent de différents rayons rouges, verts & bleus du soleil, que les diffé-

rentes gouttes transmettent à l'œil, comme il arrive lorsqu'on regarde des objets éclairés à travers un prisme. Voyez PRISME.

Telles sont les couleurs qu'un seul globe de pluie doit représenter à l'œil : d'où il s'ensuit qu'un grand nombre de ces petits globules venant à se repandre dans l'air, y sera appercevoir différentes couleurs, pourvu qu'ils soient tellement disposés, que les rayons efficaces puissent affecter l'œil ; car ces rayons ainsi disposés, formeront un arc-en-ciel.

Pour déterminer maintenant quelle doit être cette disposition, supposons une ligne droite tirée du centre du soleil à l'œil du spectateur, telle que $V X$ (fig. 46), que nous appellons ligne d'aspect : comme elle part d'un point extrêmement éloigné, on peut la supposer parallèle aux autres lignes tirées du même point ; or on fait qu'une ligne droite qui coupe deux parallèles, forme des angles alternes égaux. Voyez ALTERNE.

Imaginons donc un nombre indéfini de lignes tirées de l'œil du spectateur à l'endroit opposé au soleil où sont des gouttes de pluie, lesquelles forment différents angles avec la ligne d'aspect, égaux aux angles de réfraction des différents rayons réfrangibles, par exemple, des angles de $41^{\circ} 46'$, de $41^{\circ} 30'$, & de $41^{\circ} 40'$. Ces lignes tombant sur des gouttes de pluie éclairées du soleil, formeront des angles de même grandeur avec les rayons tirés du centre du soleil aux mêmes gouttes ; de sorte que les lignes, ainsi tirées de l'œil, représenteront les rayons qui occasionnent la sensation de différentes couleurs.

Celle, par exemple, qui forme un angle de $41^{\circ} 46'$, représentera les rayons les moins réfrangibles ou rouges des différentes gouttes ; & celle de $41^{\circ} 40'$ les rayons violets qui sont les plus réfrangibles. On trouvera les couleurs intermédiaires & leurs réfrangibilités dans l'espace intermédiaire. Voyez ROUGE.

On fait que l'œil étant placé au sommet d'un cône, voit les objets sur sa surface comme s'ils étoient dans un cercle, au moins lorsque ces objets sont assez éloignés de lui : car quand différents objets sont à une distance assez considérable de l'œil, ils paroissent être à la même distance. Nous en avons donné la raison dans l'article APPARENT ; d'où il s'ensuit qu'un grand nombre d'objets ainsi disposés, paroissent rangés dans un cercle sur la surface du cône. Or l'œil de notre spectateur est ici au sommet commun de plusieurs cônes formés par les différentes espèces de rayons efficaces & la ligne d'aspect. Sur la surface de celui dont l'angle au sommet est le plus grand, & qui contient tous les autres, sont ces gouttes ou parties de gouttes qui paroissent rouges ; les gouttes de couleur de pourpre font sur la superficie du cône qui forme le plus petit angle à son sommet ; & le bleu, le verd, &c. sont dans les cônes intermédiaires. Il s'ensuit donc

que les différentes espèces de gouttes doivent paraître comme si elles étoient disposées dans autant de bandes ou arcs colorés, comme on le voit dans l'*arc-en-ciel*.

M. Newton explique cela d'une manière plus scientifique, & donne aux angles des valeurs un peu différentes. Supposons, dit-il, que O (fig. 48) soit l'œil du spectateur, & OP une ligne parallèle aux rayons du soleil; & soient POE , POF des angles de $46^{\circ} 17'$, & de $42^{\circ} 2'$, que l'on suppose tourner autour de leur côté commun OP : ils décriront par les extrémités E , F , de leurs autres côtés OE & OF , les bords de l'*arc-en-ciel*.

Car, si E , F sont des gouttes placées en quelque endroit que ce soit des surfaces coniques décrites par OE , OF , & qu'elles soient éclairées par les rayons du soleil SE , SF ; comme l'angle SEO est égal à l'angle POE qui est de $46^{\circ} 17'$, ce sera le plus grand angle qui puisse être fait par la ligne SE ; & par les rayons les plus réfringibles qui sont rompus vers l'œil après une seule réflexion; & par conséquent toutes les gouttes qui se trouvent sur la ligne OE , enverront à l'œil, dans la plus grande abondance possible, les rayons les plus réfringibles, & par ce moyen seront sentir le violet le plus foncé vers la région où elles sont placées.

De même l'angle SFO étant égal à l'angle POF qui est de $42^{\circ} 2'$, sera le plus grand angle selon lequel les rayons les moins réfringibles puissent sortir des gouttes après une seule réflexion; & par conséquent ces rayons seront envoyés à l'œil dans la plus grande quantité possible par les gouttes qui se trouvent sur la ligne OF , & qui produiront la sensation du rouge le plus foncé en cet endroit.

Par la même raison, les rayons qui ont des degrés intermédiaires de réfringibilité viendront dans la plus grande abondance possible des gouttes placées entre E & F , & seront sentir les couleurs intermédiaires dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de réfringibilité, c'est-à-dire, en avançant de E en F , ou de la partie intérieure de l'arc à l'extérieure dans cet ordre, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé & le rouge: mais le violet étant mêlé avec lumière blanche des nues, & mélange le fera paraître foible, & tirant sur le pourpre.

Comme les lignes OE , OF peuvent être situées indifféremment dans tout autre endroit des surfaces coniques dont nous avons parlé ci-dessus, ce que l'on a dit des gouttes & des couleurs placées dans ces lignes, doit s'entendre des gouttes & des couleurs distribuées en tout autre endroit de ces surfaces; par conséquent le violet sera répandu dans tout le cercle décrit par l'extrémité E du rayon OE autour de OP ; le rouge dans tout le cercle décrit par F , & les autres couleurs dans les cercles décrits par les

points qui sont entre E & F . Voilà quelle est la manière dont se forme l'*arc-en-ciel* intérieur.

Arc-en-ciel extérieur. Quant au second *arc-en-ciel* qui entoure ordinairement le premier, en assignant les gouttes qui doivent paraître colorées, nous excluons celles qui partant de l'œil, sont des angles un peu au-dessous de $42^{\circ} 2'$, mais non pas celles qui en sont de plus grands.

Car si l'on tire de l'œil du spectateur une infinité de pareilles lignes, dont quelques-unes fassent des angles de $50^{\circ} 57'$ avec la ligne d'aspect, par exemple OG ; d'autres des angles de $54^{\circ} 7'$, par exemple OH , il faut de toute nécessité que les gouttes sur lesquelles tomberont ces lignes, fassent voir des couleurs, sur-tout celles qui forment l'angle de $50^{\circ} 57'$.

Par exemple, la goutte G paraîtra rouge, la ligne GO étant la même qu'un rayon efficace, qui, après deux réflexions & deux réfractions, donne le rouge; de même les gouttes sur lesquelles tombent les lignes qui sont avec OP des angles de $54^{\circ} 7'$, par exemple, la goutte H paraîtra couleur de pourpre; la ligne OH étant la même qu'un rayon efficace, qui, après deux réflexions & deux réfractions, donne la couleur de pourpre.

Or s'il y a un nombre suffisant de ces gouttes; & que la lumière du soleil soit assez forte pour n'être point affoiblie par deux réflexions & réfractions consécutives, il est évident que ces gouttes doivent former un second arc semblable au premier. Dans les rayons les moins réfringibles, le moindre angle sous lequel une goutte peut envoyer des rayons efficaces après deux réflexions, a été trouvé, par le calcul, de $50^{\circ} 57'$; & dans les plus réfringibles, de $54^{\circ} 7'$.

Supposons l'œil placé au point O , comme ci-dessus, & que POG , POH soient des angles de $50^{\circ} 57'$, & de $54^{\circ} 7'$: si ces angles tournent autour de leur côté commun OP , avec leurs autres côtés OG , OH , ils décriront les bords de l'*arc-en-ciel* $CHDG$, qu'il faut imaginer, non pas dans le même plan que la ligne OP , ainsi que la figure le présente, mais dans un plan perpendiculaire à cette ligne.

Car si GO sont des gouttes placées en quelque endroit que ce soit des surfaces coniques décrites par OG , OH , & qu'elles soient éclairées par les rayons du soleil; comme l'angle SGO est égal à l'angle POG de $50^{\circ} 57'$, ce sera le plus petit angle qui puisse être fait par les rayons les moins réfringibles après deux réflexions; & par conséquent toutes les gouttes qui se trouvent sur la ligne OG , enverront à l'œil dans la plus grande abondance possible, les rayons les moins réfringibles, & seront sentir par ce moyen le rouge le plus foncé vers la région où elles sont placées.

De même l'angle SHO étant égal à l'angle POH , qui est de $54^{\circ} 7'$, sera le plus petit

angle sous lequel les rayons les plus réfrangibles puissent sortir des gouttes après deux réflexions ; & par conséquent ces rayons seront envoyés à l'œil dans la plus grande quantité qu'il soit possible par les gouttes qui sont placées dans la ligne OH , & produiront la sensation du violet le plus foncé dans cet endroit.

Par la même raison, les rayons qui ont des degrés intermédiaires de réfrangibilité viendront dans la plus grande abondance possible des gouttes entre G & H , & seront sentir les couleurs intermédiaires dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de réfrangibilité, c'est-à-dire, en avançant de G en H , ou de la partie intérieure de l'arc à l'extérieure, dans cet ordre, le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, & le violet.

Et comme les lignes OG , OH peuvent être finies indifféremment en quelque endroit que ce soit des surfaces coniques, ce qui vient d'être dit des gouttes & des couleurs qui sont sur ces lignes doit être appliqué aux gouttes & aux couleurs qui sont en tout autre endroit de ces surfaces.

C'est ainsi que seront formés deux arcs colorés ; l'un intérieur, & composé de couleurs plus vives par une seule réflexion ; & l'autre extérieur, & composé de couleurs plus faibles par deux réflexions.

Les couleurs de ces deux arcs seront dans un ordre opposé l'une à l'égard de l'autre ; le premier ayant le rouge en dedans & le pourpre en dehors ; & le second le pourpre en dehors & le rouge en dedans, & ainsi du reste.

Arc-en-ciel artificiel. Cette explication de l'arc-en-ciel est confirmée par une expérience facile : elle consiste à suspendre une boule de verre pleine d'eau en quelque endroit où elle soit exposée au soleil, & d'y jeter les yeux, en se plaçant de telle manière que les rayons qui viennent de la boule à l'œil puissent faire avec les rayons du soleil un angle de 42 ou de 50° ; car si l'angle est d'environ 42 ou 43° , le spectateur (supposé en O) verra un rouge fort vif sur le côté de la boule opposé au soleil, comme en F ; & si cet angle devient plus petit, comme il arrivera en faisant descendre la boule jusqu'en E , d'autres couleurs paraîtront successivement sur le même côté de la boule, savoir, le jaune, le vert & le bleu.

Mais si l'on fait l'angle d'environ 50° , en haussant la boule jusqu'en G , il paraîtra du rouge sur le côté de la boule qui est vers le soleil, quoiqu'un peu faible ; & si l'on fait l'angle encore plus grand, en haussant la boule jusqu'en H , le rouge se changera successivement en d'autres couleurs en jaune, vert & bleu. On observe la même chose lorsque, sans faire changer de place à la boule, on hausse ou l'on baisse l'œil pour donner à l'angle une grandeur convenable.

On produit encore, comme nous l'avons dit,

un arc-en-ciel artificiel, en tournant le dos au soleil, & jetant en haut de l'eau dont on aura rempli sa bouche ; car on verra dans cette eau des couleurs de l'arc-en-ciel, pourvu que les gouttes soient poussées assez haut pour que les rayons tirés de ces gouttes à l'œil du spectateur, fassent des angles de plus de 41° avec le rayon OP .

Dimension de l'arc-en-ciel. Descartes a le premier déterminé son diamètre par une méthode indirecte, avançant que la grandeur dépend du degré de réfraction du fluide, & que le sinus d'incidence est à celui de réfraction dans l'eau, comme 150 à 187 . Voyez RÉFRACTION.

M. Halley a depuis donné, dans les *Transactions philosophiques*, une méthode simple & directe de déterminer le diamètre de l'arc-en-ciel, en supposant donné le degré de réfraction du fluide, ou réciproquement de déterminer la réfraction du fluide par la connoissance que l'on a du diamètre de l'arc-en-ciel. Voici en quoi consiste sa méthode. 1.^o Le rapport de la réfraction, c'est-à-dire, des sinus d'incidence & de réfraction étant connu, il cherche les angles d'incidence & de réfraction d'un rayon, qu'on suppose devenir efficace après un nombre déterminé de réflexions, c'est-à-dire, il cherche les angles d'incidence & de réfraction d'un faisceau de rayons infiniment proches, qui, tombant parallèles sur la goutte, sortent parallèles après avoir souffert au dedans de la goutte un certain nombre de réflexions déterminées. Voici la règle qu'il donne pour cela. Soit une ligne donnée AC (*Opt. fig. 49*) on la divisera en D , en sorte que DC soit à AC en raison du sinus de réfraction au sinus d'incidence ; ensuite on la divisera de nouveau en E , en sorte que AC soit à AE comme le nombre donné de réflexions augmenté de l'unité est à cette même unité ; on décrira après cela sur le diamètre AE le demi-cercle ABE ; puis du centre C & du rayon CD on tracera un arc DB , qui coupe le demi-cercle au point B ; on mènera les lignes AB , CB , ABC , ou son complément à deux droits, fera l'angle d'incidence, & CAB l'angle de réfraction qu'on demande.

2.^o Le rapport de la réfraction & l'angle d'incidence étant donnés, on trouvera ainsi l'angle qu'un rayon de lumière qui sort d'une boule après un nombre donné de réflexions fait avec la ligne d'aspect, & par conséquent la hauteur & la largeur de l'arc-en-ciel. L'angle d'incidence & le rapport de réfractions étant donnés, l'angle de réfraction est aussi. Or, si l'on multiplie ce dernier par le double du nombre des réflexions augmenté de 2, & qu'on retranche du produit le double de l'angle d'incidence, l'angle résidant sera celui que l'on cherche.

Supposons avec M. Newton que le rapport de réfraction soit comme 108 à 81 pour les rayons rouges, comme 109 à 81 pour les bleus, &c. le

problème précédent donnera les angles fous lesquels on voit les couleurs.

- I. Arc-en-ciel.** { rouge 42 d. 21'.
violet 40 d. 16'.
Le spectateur ayant le dos tourné au soleil, parce que des rayons qui viennent à l'œil du spectateur, après une ou deux réflexions, sont du même côté de la goutte que les rayons incidents.
- II. Arc-en-ciel.** { rouge 50 d. 51'.
violet 54 d. 39'.
Le spectateur ayant le visage tourné vers le soleil, parce que les rayons qui viennent à l'œil du spectateur, après trois ou quatre réflexions, sortent de la goutte d'un côté opposé à celui par où ils y sont entrés, & conséquemment sont, par rapport au soleil, d'un autre côté de la goutte que les rayons incidents.

Si l'on demande l'angle formé par un rayon après trois ou quatre réflexions, & par conséquent la hauteur à laquelle on devroit appercevoir le troisième & le quatrième *arc-en-ciel*, qui sont très-rarement & très-peu sensibles, à cause de la diminution que souffrent les rayons par tant de réflexions répétées, on aura

- III. Arc-en-ciel.** { rouge 41 d. 17'.
violet 37 d. 9'.
Le spectateur ayant le visage tourné vers le soleil, parce que les rayons qui viennent à l'œil du spectateur, après trois ou quatre réflexions, sortent de la goutte d'un côté opposé à celui par où ils y sont entrés, & conséquemment sont, par rapport au soleil, d'un autre côté de la goutte que les rayons incidents.
- IV. Arc-en-ciel.** { rouge 43 d. 51'.
violet 49 d. 33'.
Le spectateur ayant le visage tourné vers le soleil, parce que les rayons qui viennent à l'œil du spectateur, après trois ou quatre réflexions, sortent de la goutte d'un côté opposé à celui par où ils y sont entrés, & conséquemment sont, par rapport au soleil, d'un autre côté de la goutte que les rayons incidents.

Il est aisé sur ce principe de trouver la largeur de l'*arc-en-ciel*; car le plus grand demi-diamètre du premier *arc-en-ciel*, c'est-à-dire de sa partie extérieure, étant de 42° 11', & le moindre, savoir, de la partie intérieure, de 40° 16', la largeur de la bande mesurée du rouge au violet sera de 1° 55'; & le plus grand diamètre du second *arc* étant de 44° 9', & le moindre de 50° 58', la largeur de la bande sera de 3° 11', & la distance entre les deux *arc-en-ciel* de 8° 47'.

On regarde dans ces mesures le soleil comme un point; c'est pourquoi, comme son diamètre est d'environ 30', & qu'on a pris jusqu'ici les rayons qui passent par le centre du soleil, on doit ajouter ces 30' à la largeur de chaque bande ou *arc* de rouge ou violet; savoir, 15' en dessous au violet à l'*arc* intérieur, & 15' en dessous au rouge dans le même *arc*; & pour l'*arc-en-ciel* extérieur, 15' en dessous au violet, & 15' en dessous au rouge; & il faudra retrancher 30' de la distance qui est entre les deux *arc*.

La largeur de l'*arc-en-ciel* intérieur sera donc de 2° 25', & celle du second de 3° 41' & leur distance de 8° 17'. Ce sont là les dimensions de l'*arc-en-ciel*; & elle sont conformes à très-peu près à celle que l'on trouve en mesurant un *arc-en-ciel* avec des instrumens.

Phénomènes particuliers de l'arc-en-ciel. Il est aisé de déduire de cette théorie tous les phénomènes particuliers de l'*arc-en-ciel*: 1.^o par exemple, pourquoi l'*arc-en-ciel* est toujours de même largeur? c'est parce que les degrés de réfrangibilité des rayons rouges & violets qui forment les couleurs extrêmes, sont toujours les mêmes.

2.^o Pourquoi on voit quelquefois les jambes de l'*arc-en-ciel* contigües à la surface de la terre, & pourquoi d'autres fois ces jambes ne viennent pas jusqu'à terre? c'est parce qu'on ne voit l'*arc-en-ciel* que dans les endroits où il pleut; or si la pluie est assez étendue pour occuper un espace plus grand que la portion visible du cercle que décrit le point E, on verra un *arc-en-ciel* qui ira jusqu'à terre, sinon l'on ne verra d'*arc-en-ciel* que dans la partie du cercle occupée par la pluie.

3.^o Pourquoi l'*arc-en-ciel* change de situation à mesure que l'œil en change, pourquoi, pour parler comme le vulgaire, il suit ceux qui le suivent, & suit ceux qui le fuient? c'est que les gouttes colorées sont disposées sous un certain angle autour de la ligne d'aspect, qui varie à mesure qu'on change de place. De-là vient aussi que chaque spectateur voit un *arc-en-ciel* différent.

Au reste, ce changement de l'*arc-en-ciel* pour chaque spectateur, n'est vrai que rigoureusement parlant; car les rayons du soleil étant censés parallèles, deux spectateurs voisins l'un de l'autre ont assez sensiblement le même *arc-en-ciel*.

4.^o D'où vient que l'*arc-en-ciel* forme une portion du cercle, tantôt plus grande & tantôt plus petite? c'est que sa grandeur dépend du plus ou moins d'étendue de la partie de la superficie conique, qui est au-dessus de la surface de la terre dans le tems qu'il paroît; & cette partie est plus grande ou plus petite, suivant que la ligne d'aspect est plus inclinée ou oblique à la surface de la terre, cette obliquité augmentant à proportion que le soleil est plus élevé, ce qui fait que l'*arc-en-ciel* diminue à proportion que le soleil s'élève.

5.^o Pourquoi l'*arc-en-ciel* ne paroît jamais lorsque le soleil est élevé d'une certaine hauteur? c'est que la surface conique sur laquelle il doit paroître est cachée sous terre lorsque le soleil est élevé de plus de 42°; car alors la ligne O P, parallèle aux rayons du soleil, fait avec l'horizon en dessous un angle de plus de 42°, & par conséquent la ligne O E, qui doit faire un angle de 42° avec O P, est au dessous de l'horizon, de sorte que le rayon E O rencontre la surface de la terre, & ne sauroit arriver à l'œil. On voit aussi que si le soleil est plus élevé de 42°, mais moins que 54°, on verra l'*arc-en-ciel* extérieur, sans l'*arc-en-ciel* intérieur.

6.^o Pourquoi l'*arc-en-ciel* ne paroît jamais plus grand qu'un demi-cercle? le soleil n'est jamais visible au-dessous de l'horizon, & le centre de l'*arc-en-ciel* est toujours dans la ligne d'aspect; or dans

le cas où le soleil est à l'horizon, cette ligneraie la terre; donc elle ne s'élève jamais au dessus de la surface de la terre.

Mais si le spectateur est placé sur une éminence considérable, & que le soleil soit dans ou sous l'horizon, alors la ligne d'aspect dans laquelle est le centre de l'*arc-en-ciel*, sera considérablement élevée au dessus de l'horizon, & l'*arc-en-ciel* pour lors sera plus d'un demi-cercle; & même si le lieu est extraordinairement élevé, & que la pluie soit proche du spectateur, il peut arriver que l'*arc-en-ciel* forme un cercle entier.

7.^e Comment l'*arc-en-ciel* peut paroître interrompu & tronqué à sa partie supérieure? rien n'est plus simple à expliquer. Il ne faut pour cela qu'un nuage qui intercepte les rayons, & les empêche de venir de la partie supérieure de l'*arc* à l'œil du spectateur; car dans ce cas, n'y ayant que la partie inférieure qui soit vue, l'*arc-en-ciel* paroît tronqué à sa partie supérieure. Il peut encore arriver qu'on ne voie que les deux jambes de l'*arc-en-ciel*, parce qu'il ne pleut point à l'endroit où devoit paroître la partie supérieure de l'*arc-en-ciel*.

8.^e Par quelle raison l'*arc-en-ciel* peut paroître quelquefois renversé? si le soleil étant élevé de 41^e 46' les rayons tombent sur la surface de quelque lac spacieux, dans le milieu duquel le spectateur soit placé, & qu'en même tems il pleuve, les rayons venant à se réfléchir dans les gouttes de pluie, produiront le même effet que si le soleil étoit sous l'horizon, & que les rayons vinssent de bas en haut; ainsi, la surface du cône sur laquelle les gouttes colorées doivent être placées, sera tout-à-fait au dessus de la surface de la terre. Or, dans ce cas, si la partie supérieure est couverte par des nuages, & qu'il n'y ait que la partie inférieure sur laquelle les gouttes de pluie tombent, l'*arc* sera renversé.

9.^e Pourquoi l'*arc-en-ciel* ne paroît pas toujours exactement rond, & qu'il est quelquefois incliné? c'est que la rondeur exacte de l'*arc-en-ciel* dépend de son éloignement, qui nous empêche d'en juger: or, si la pluie qui le forme est près de nous, on appercevra ses irrégularités; & si le vent chasse la pluie, en sorte que la partie supérieure soit plus sensiblement éloignée de l'œil que l'inférieure, l'*arc* paroît incliné; en ce cas l'*arc-en-ciel* pourra paroître ovale, comme le paroît un cercle incliné vu d'assez loin.

10.^e Pourquoi les jambes de l'*arc-en-ciel* paroissent quelquefois inégalement éloignées? si la pluie se termine du côté du spectateur dans un plan tellement incliné à la ligne d'aspect, que le plan de la pluie forme avec cette ligne un angle aigu du côté du spectateur, & un angle obtus de l'autre côté, la surface du cône sur lequel sont placées les gouttes qui doivent faire paroître l'*arc-en-ciel*, sera tellement disposée, que la partie de cet *arc* qui sera du côté gauche, paroît plus proche de l'œil que celle du côté droit.

C'est un phénomène fort rare de voir en même

tems trois *arc-en-ciel*; les rayons colorés du troisième sont toujours fort faibles, à cause de leurs triples réflexions; aussi ne peut-on jamais voir un troisième *arc-en-ciel*, à moins que l'air ne soit entièrement noir pardevant, & fort clair par derrière.

M. Halley a vu, en 1698, à Chester trois *arc-en-ciel* en même tems, dont deux étoient les mêmes que l'*arc-en-ciel* intérieur & l'extérieur qui paroissent ordinairement. Le troisième étoit presque aussi vis que le second, & ses couleurs étoient arrangées comme celles du premier *arc-en-ciel*; les deux jambes reposoient à terre au même endroit où reposoient celles du premier *arc-en-ciel*, & il conçoit en haut le second *arc-en-ciel*, divisant à peu-près cet *arc* en trois parties égales. D'abord on ne voyoit pas la partie de cet *arc* qui étoit à gauche; mais elle parut ensuite fort éclatante: les points où cet *arc* conçoit l'*arc* extérieur, parurent ensuite se rapprocher, & bientôt la partie supérieure du troisième *arc-en-ciel* se confondit avec l'*arc-en-ciel* extérieur. Alors l'*arc-en-ciel* extérieur perdit sa couleur en cet endroit, comme cela arrive lorsque les couleurs se confondent & tombent les unes sur les autres; mais aux endroits où les deux couleurs rouges tombent l'une sur l'autre en se coupant, la couleur rouge parut avec plus d'éclat que celle du premier *arc-en-ciel*. M. Senguer a vu en 1685 un phénomène semblable, dont il fait mention dans sa *Physique*. M. Halley faisant attention à la manière dont le soleil luisoit, & à la position du terrain qui recevoit ses rayons, croit que ce troisième *arc-en-ciel* étoit causé par la réflexion des rayons du soleil qui tomboient sur la rivière Dee qui passe à Chester.

M. Celsius a observé à Dalécarlie, province de Suède, très-coupée de lacs & de rivières, un phénomène à peu-près semblable, le 8 Août 1743, vers les 6 à 7 heures du soir, le soleil étant à 11^e 30' de hauteur; & le premier qui en ait observé de pareils, a été M. Étienne, Chanoine de Chartres le 10 Août 1665. Voyez le *Journ. des Sav. & les transact. phil.* de 1666, & l'*Hist. acad. des Scienc. an. 1742*.

Vitellion dit avoir vu à Padoue quatre *arc-en-ciel* en même tems; ce qui peut fort bien arriver, quoique Vicomercatus soutienne le contraire.

M. Langwith a vu en Angleterre un *arc-en-ciel* solaire avec ses couleurs ordinaires; & sous ce premier *arc-en-ciel* on en voyoit un autre, dans lequel il y avoit tant de verd, qu'on ne pouvoit distinguer ni le jaune ni le bleu. Dans un autre tems, il parut encore un *arc-en-ciel* avec ses couleurs ordinaires, au dessus duquel on remarquoit un *arc* bleu d'un jaune clair en haut, & d'un verd foncé en bas. On voyoit de tems en tems au dessous deux *arc*s de pourpre rouge, & deux de pourpre verd. Le plus bas de tous ces *arc*s étoit de couleur de pourpre, mais fort faible; & il paroisoit & disparoisoit à diverses reprises, M. Mulchenbroek explique

explique ces différentes apparences par les observations de M. Newton sur la lumière. Voyez l'*Essai de Physiq. de cet auteur*, art. 1611.

ARC-EN-CIEL lunaire. La lune forme aussi quelquefois un arc-en-ciel par la réfraction que souffrent les rayons dans les gouttes de pluie qui tombent la nuit. Voyez LUNE. Ariotte dit qu'on ne l'avoit point remarqué avant lui, & qu'on ne l'apperçoit qu'à la pleine lune. Sa lumière dans d'autres tems est trop foible pour frapper la vue après deux réfractions & une réflexion.

Ce Philosophe nous apprend qu'on vit paroître de tems en tems un arc-en-ciel lunaire, dont les couleurs étoient blanches. Gemma Frisius dit aussi qu'il en a vu un coloré; ce qui est encore confirmé par M. Végriers, & par Dan Sennert, qui en a observé un semblable en 1599. Snellius dit en avoir vu deux en deux ans de tems, & R. Plot en a remarqué un en 1675. En 1711, il en parut un dans la Province de Darbyshire en Angleterre.

L'arc-en-ciel lunaire a toutes les mêmes couleurs que le solaire, excepté qu'elles sont presque toujours plus foibles, tant à cause de la différente intensité des rayons, qu'à cause de la différente disposition du milieu. M. Toresby, qui a donné la description d'un arc-en-ciel lunaire dans les *Transf. phil.* n.° 331, dit que cet arc étoit admirable par la beauté & l'éclat de ses couleurs; il dura environ dix minutes, après quoi un nuage en déroba la vue.

M. Weidler a vu en 1719 un arc-en-ciel lunaire, lorsque la lune étoit à demi-pleine, dans un tems calme, & où il pleuvoit un peu; mais à peine put-il reconnoître les couleurs; les supérieures étoient un peu plus distinctes que les inférieures: l'arc disparut lorsque la pluie vint à cesser. M. Musschenbroek dit en avoir observé un le premier octobre 1729, vers les 10 heures du soir; il pleuvoit très-fort à l'endroit où il voyoit l'arc-en-ciel, mais il ne put distinguer aucune couleur, quoique la lune eût alors beaucoup d'éclat. Le même auteur rapporte que le 17 août 1736, à la même heure, on vit à Visselstein un arc-en-ciel lunaire fort grand, fort éclatant; mais cet arc-en-ciel n'étoit par-tout que de couleur jaune.

ARC-EN-CIEL marin. L'arc-en-ciel marin est un phénomène qui paroît quelquefois lorsque la mer est extrêmement tourmentée, & que le vent agitant la superficie des vagues, fait que les rayons du soleil, qui tombent dessus, s'y rompent & y peignent les mêmes couleurs que dans les gouttes de pluie ordinaires. M. BOWTKE observe dans les *Traductions philosophiques*, que les couleurs de l'arc-en-ciel marin sont moins vives, moins distinctes, & de moindre durée que celles de l'arc-en-ciel ordinaire, & qu'on y distingue à peine plus de deux couleurs; savoir du jaune du côté du soleil, & un verd pâle du côté opposé.

Mais ces arcs sont plus nombreux, car on en voit souvent 20 ou 30 à-la-fois; ils paroissent à

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

midi, & dans une position contraire à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire renversés; ce qui est une suite nécessaire de ce que nous avons dit en expliquant les phénomènes de l'arc-en-ciel solaire.

On peut encore rapporter à cette classe une espèce d'arc-en-ciel blanc, que Menzies & d'autres disent avoir observé à l'heure de midi. M. Mariotte, dans son *Essai de Physique*, dit que ces arcs-en-ciel sans couleurs, se forment dans les brouillards, comme les autres se font dans la pluie; & il assure en avoir vu à trois différentes fois, tant le matin après le lever du soleil, que la nuit à la clarté de la lune.

Le jour qu'il vit le premier, il avoit fait un grand brouillard au lever du soleil; une heure après le brouillard se sépara par intervalles. Un vent qui venoit du levant ayant poussé un de ces brouillards séparés à deux ou trois cens pas de l'observateur, & le soleil dardant ses rayons dessus, il parut un arc-en-ciel semblable, pour la figure, la grandeur & la situation, à l'arc-en-ciel ordinaire. Il étoit tout blanc, hors un peu d'obscurité qui le terminoit à l'extérieur; la blancheur du milieu étoit très-éclatante, & surpassoit de beaucoup celle qui paroisoit sur le reste du brouillard: l'arc n'avoit qu'environ un degré & demi de largeur. Un autre brouillard ayant été poussé de même, l'observateur vit un autre arc-en-ciel semblable au premier. Ces brouillards étoient si épais qu'il ne voyoit rien au-delà.

Il attribue ce défaut de couleurs à la petitesse des vapeurs imperceptibles qui composent les brouillards: d'autres croient plutôt qu'il vient de la tenuité excessive des petites vésicules de la vapeur, qui n'étant en effet que de petites pellicules aqueuses remplies d'air, ne rompent point assez les rayons de lumière, outre qu'elles sont trop petites pour séparer les différens rayons colorés. De-là vient qu'elles réfléchissent les rayons aussi composés qu'elles les ont reçus, c'est-à-dire blancs.

Rohault parle d'un arc-en-ciel qui se forme dans les prairies par la réfraction des rayons du soleil dans les gouttes de rosée. *Traité de Physique.*

Nous ne nous arrêterons pas ici à exposer les sentimens ridicules des anciens philosophes sur l'arc-en-ciel. Plin & Plutarque rapportent que les prêtres dans leurs offrandes se servoient par préférence du bois sur lequel l'arc-en-ciel avoit reposé, & qui en avoit été mouillé, parce qu'ils s'imaginoient, on ne fait pourquoi, que ce bois rendoit une odeur bien plus agréable que les autres. Voyez l'*Essai de Physique* de Mussch. d'où nous avons tiré une partie de cet article. V. aussi le *Traité des météores* de Descartes, l'*Optique* de Newton, les *Lectures optiques* de Barow, & le quatrième volume des *Œuvres* de Jean Bernoulli, imprimées à Lausanne, 1743. On trouve dans ces différens ouvrages & dans plusieurs autres, la théorie de l'arc-en-ciel.

*Finissons cet article par une réflexion philosophique. On ne fait pas pourquoi une pierre tombe,

Q

& on fait la cause des couleurs de l'*arc-en-ciel*, quoique ce phénomène soit beaucoup plus surprenant que le premier pour la multitude. Il semble que l'étude de la nature soit propre à nous enorgueillir d'une part, & à nous humilier de l'autre. (O).

* Pour faire aisément concevoir les phénomènes de l'*arc-en-ciel*, Mülchenbrock a imaginé une machine, par le moyen de laquelle on les représente tout aisément, & d'une manière très-claire. (AAAA, fig. 29.) est une table à quatre pieds, ouverte à son milieu, afin qu'on puisse faire monter & descendre à travers cette table un corps conique. *BC* est la moitié d'un cône, dont le sommet est en *D*. Ce sommet est appuyé sur un axe transversal sur lequel tourne le cône *BC* & sur lequel il s'élève au dessus de la table, ou sur lequel il s'abaisse au dessous : à l'extrémité du même sommet est adapté un œil de la grandeur ordinaire de l'œil d'un homme, & qui sert à représenter l'œil du spectateur : outre cela, une verge de fer longue de trois piés est adaptée au cône & à l'axe, l'extrémité de cette verge se termine par un manche *M* : un globe doré *S* est enfilé sur cette verge, & ce globe représente le soleil ; la base du cône *B* est entourée d'une large bande semi-circulaire, sur laquelle on peint les sept couleurs de l'iris : le côté du cône forme avec l'axe un angle de $40^{\circ} 17'$: la largeur de la bande peinte sur la base du cône, est de près de deux degrés, conformément à la largeur ordinaire d'une iris principale. *E, E*, sont deux plans triangulaires mobiles, dont le centre du mouvement est placé au dessus du sommet du cône ; ces deux plans sont constamment appliqués à chaque côté du cône : ils servent à cacher l'échancrure faite à la table, & représentent en même temps l'horizon. On verra dans la figure à combien ils sont constamment appliqués aux deux côtés du cône. Cela posé, lorsque la tige de fer, ainsi que le soleil *S*, est parallèle à l'horizon, la moitié du cône est au dessus de la table, & l'œil du spectateur qui est en *D*, voit la bande colorée semi-circulaire placée à la base du cône ; mais, lorsque la main de l'observateur saisit le manche de la tige de fer & élève le soleil *S*, le cône s'abaisse, ainsi que le limbe qui est adhérent à la base du cône, qui alors devient moindre qu'un demi-cercle. Si on élève encore le soleil *S*, on abaisse toujours dans la même proportion le cône, & conséquemment l'arc qui représente l'iris diminue aussi ; ce qui a lieu jusqu'à ce que le soleil *S* soit élevé à $42^{\circ} 1'$; car alors tout l'*arc-en-ciel* se trouve au dessus de l'horizon, & les plans *E, E* couvrent entièrement le cône. Ce limbe coloré appliqué à la base du cône, représente la pluie qui tombe au devant & au loin du spectateur, dans le tems qu'on observe dans le ciel un ample *arc-en-ciel*. Mais, comme il arrive quelquefois que l'*arc-en-ciel* paroît plus petit, lorsque la pluie qui tombe n'est pas éloignée du spectateur, il y a sur cette machine un autre *arc* plan *L*, sur lequel on peint

les sept couleurs de l'iris, qui est placé à une plus proche distance du sommet du cône, & dont la largeur est proportionnée de la même façon que cet *arc* forme un demi-cercle sur l'horizon, lorsque le soleil est à l'horizon, & qu'il est tout-à-fait caché par les plans *E, E*, lorsque le soleil est élevé à $42^{\circ} 1'$ au dessus de l'horizon : on représente donc aisément, à l'aide de cette machine, comment il arrive que l'*arc-en-ciel* paroisse quelquefois très-ample, & quelquefois très-petit.

Il y a outre cela sur cette machine un autre limbe *N*, placé au dessus du premier limbe *L* : ce limbe *N* représente la seconde iris, & les couleurs de cette dernière y sont peintes dans un ordre renversé. On a donné à ce dernier limbe une largeur suffisante, pour que cette iris paroisse à l'œil du spectateur placé en *D*, de $3^{\circ} 8'$ de largeur. Ce limbe représente fin demi-cercle au dessus de la table, lorsque le soleil *S* est placé dans le plan de cette table, ou se trouve à l'horizon. Mais lorsque le soleil *S* est élevé à $54^{\circ} 7'$ au dessus de l'horizon, ce limbe descend au dessous de l'horizon, & se dérobe à l'œil du spectateur. Les bords intérieurs des plans *E, E*, ceux qui sont conigus, & qui touchent les côtés du cône, sont aussi peints des mêmes couleurs que l'iris ; ils ont les mêmes dimensions que l'iris elle-même dans l'endroit où ils touchent le limbe de la base *B* : mais leur largeur va toujours en diminuant, & ils se terminent en un point auprès du sommet du cône. Ces bords colorés représentent les jambes de l'iris, celles qu'on remarque à la campagne dans une iris naturelle, lorsqu'une nuée qui lance la pluie passe sur la tête du spectateur, & fait tomber des gouttes de pluie qui s'attachent à l'herbe. La figure 31 représente la même machine, mais vue par derrière : on y voit même le limbe coloré qui est adhérent à la base du cône. Les plans triangulaires *E, E*, sont tirés par les cordes *H, H*, qui passent sur la circonférence de deux poulies horizontales *K, K*, pour venir embrasser les gorges de deux autres poulies verticales *R, R* : on attache aux extrémités de ces cordes deux points *P, P*, par le moyen desquels les deux plans sont constamment tirés & appliqués contre les côtés du cône ; & par ce moyen l'échancrure faite à la table est continuellement cachée, & les plans *E, E* représentent l'horizon. On peut consulter sur cela, & sur ce qui y a rapport, les *Transactions philosophiques d'Angleterre*, n. 240, 267, 275 ; les *Notes de Clarke*, sur la *Physique de Rohaut*, part. III, chap. 17 ; les *Ouvrages de Jean Bernoulli*, vol. IV, pag. 197 ; l'*Optique de Newton*, & ses *Leçons d'optique* ; *Smith's complete system of Optics*, Book. 2, c. 10 ; *Martin*, dans la *Philosoph. Britan.*, vol. II. Le célèbre *Noëmus* a décrit l'iris dans ses vers, d'une manière fort élégante (+).

ARCHITECTURE. *Hydraulique*, c. f. Application des principes de l'Hydrodynamique à la construction de tous les ouvrages mécaniques où l'ac-

tion d'un fluide quelconque, eau, air, vapeur de l'eau, &c., est employée, soit comme puissance motrice, soit comme résistance à combattre ou à vaincre, soit de toutes ces manières à-la-fois.

On voit par-là qu'en général toutes les machines hydrauliques, les moulins, les pompes, les chapelets, la construction des digues, des batardeaux, des épis, de canaux de navigation, &c., se rapportent à l'*architectured hydraulique*.

L'ouvrage de M. Belidor sur cette matière, quoique défectueux en plusieurs endroits du côté de la théorie, renferme une multitude de détails très-utiles dans la pratique.

M. Fabre, Ingénieur hydraulique du pays de Provence, & correspondant de l'Académie royale des Sciences, &c., a publié en 1783, un ouvrage sur la manière de construire les machines hydrauliques, &c. en particulier les moulins à bled : ouvrage excellent, plein de recherches nouvelles, & où la théorie & l'expérience sont très-utilement combinées ensemble. (L. B.)

ARCTIQUE, adj. c'est, en *Astronomie*, une épithète qu'on a donné au pôle septentrional, ou au pôle qui s'éleve sur notre horizon. Voyez **POLE**.

Le pôle septentrional a été appelé *pôle arctique*, du mot grec *αρκτικός*, qui signifie *ourse*; d'où l'on a fait le terme *arctique*, épithète qu'on a donnée au pôle septentrional; parce que la dernière étoile située dans la queue de la petite ourse, en est très-voisine. Voyez **OURSE**.

Le cercle polaire arctique est un petit cercle de la sphère parallèle à l'équateur, & éloigné du pôle arctique de 23° 28'. C'est de ce pôle qu'il prend le nom d'*arctique*.

Ce cercle & le cercle polaire antarctique sont opposés, sont déterminés par les pôles de l'écliptique. On peut les concevoir décrits par le mouvement des pôles de l'écliptique autour des pôles de l'équateur ou du monde. Depuis ce cercle jusqu'au pôle arctique, est comprise la partie de la terre appelée zone froide septentrionale. Les observations faites en 1736 par les astronomes de l'Académie des Sciences, pour déterminer la figure de la terre, ont été faites sous le cercle polaire arctique. Voyez **FIGURE DE LA TERRE**.

Proclus & les anciens Grecs appelloient cercle arctique, celui qui est tout entier sur l'horizon, tel seroit à Paris le cercle éloigné de 41° 10' de l'équateur.

ARCTOPHYLAX, terme d'*Astronomie*, nom d'une constellation qu'on appelle ordinairement le *Bouvier*. *Arctophylax* signifie *gardien de l'ourse*; il est dérivé des deux mots grecs *αρκτικός*, *ourse*, & *φυλάξ*, *je garde*. La constellation du *Bouvier* est ainsi appelée, parce qu'elle se trouve près de la grande & de la petite ourse. (O)

ARCTURUS, (*Astron.*) en grec *αρκτούρος* dérivé d'*αρκτός*, *ourse*, & de *αρκτός*, *queue*; c'est une étoile fixe de première grandeur, située dans la constel-

lation du *bouvier*, vers laquelle se dirige la queue de la grande ourse. Voyez **BOUVIER**. Voyez aussi **OURSE** & **CONSTELLATION**. On l'appelle en Arabe *Armeck*.

Cette étoile a été fort célèbre chez les anciens, comme on le voit, pas ce vers de Virgile:

Arcturum, pluviosque Hyadas, geminosque Triones.

Il en est aussi parlé dans l'Ecriture en plusieurs endroits, comme on le voit par ces passages: *Qui fecit arcturum & orion & hyadas, & interiora aubri*, Job, c. ix. v. 9. & c. xxxviii. v. 31. *Nuncquid conjungere valebis micantes stellas pleiadas, aut gyrum arcturi poteris dissipare?* Mais il est douteux si le mot *arcturi* convient en effet à cette étoile.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette étoile est le mouvement propre qu'on y observe, de quatre minutes par siècle, quantité dont cette étoile avance vers le midi & diminue de latitude, ce qui parait venir d'un déplacement physique de cette étoile; il n'y en a aucune où il soit plus sensible; suivant les observations de Flamsteed, la latitude d'*arcturus* en 1690 étoit de 30° 57' 0"; suivant la Caille, en 1750 elle n'étoit que de 30° 54' 31" ce qui fait une diminution de 2° 29" pour 60 ans ou de 4' 8" par siècle, & comme cette latitude devoit diminuer de 15" par la cause générale, il reste 3' 53" pour le changement particulier propre à cette étoile & qui annonce un déplacement. J'ai fait voir que le soleil avec tout notre système, éprouve un semblable déplacement. Voyez **SOLEIL**. (D. L.)

ARCTUS, *αρκτός*, sub. m. (*Astronomie*) c'est le nom que les Grecs ont donné à deux constellations de l'hémisphère septentrional, que nous appellons la petite ourse & la grande ourse. Voyez **OURSE**.

A R E

ARÉOMETRE, f. m. (*Hyd.*) : instrument qui sert à mesurer la densité ou le pesanteur des fluides. Voyez **FLUIDE**, **GRAVITÉ**, **PESANTEUR** & **DENSITÉ**.

L'*aréomètre* ordinairement est de verre; il consiste en un globe rond & creux, qui se termine en un tube long, cylindrique & petit; on ferme ce tube hermétiquement, après avoir fait encre dans le globe autant de mercure qu'il en faut pour fixer le tube dans une position verticale, lorsque l'instrument est plongé dans l'eau. On divise ce tube en degrés, comme on voit (*Hyd. figure 10*); & l'on estime la pesanteur d'un fluide, par le pins on le moins de profondeur à laquelle le globe descend; en sorte que le fluide dans lequel il descend le moins bas est le plus pesant; & celui dans lequel il descend le plus bas, est le plus léger.

En effet, c'est une loi générale, qu'un corps pesant s'enfoncé dans un fluide, jusqu'à ce qu'il

occupe dans ce fluide la place d'un volume qui lui soit égal en pefanteur : de-là il s'enfuit que plus un fluide est dense, c'est-à-dire, plus il est pefant, plus la partie du fluide qui fera égale en poids à l'*aréomètre*, fera d'un petit volume, & par conséquent le volume de fluide que l'*aréomètre* doit déplacer sera aussi d'autant plus petit, que le fluide est plus pefant : ainsi, plus le fluide est pefant, moins l'*aréomètre* doit s'y enfoncer. Il doit donc s'enfoncer moins dans l'eau que dans le vin, moins dans le vin que dans l'eau-de-vie, &c. comme il arrive en effet.

Il y a un autre *aréomètre* de l'invention de M. Hombert : on en trouve la description suivante dans les *Transac. philos. n.° 262. A, fig. 11*, c'est une bouteille de verre ou matras, dont le col *CB* est si étroit, qu'une goutte d'eau y occupe cinq ou six lignes : à côté de ce col est un petit tube capillaire *D* de la longueur de six pouces, & parallèle au col *CB*. Pour remplir ce vaisseau, on verse la liqueur par l'orifice *B*, dans lequel on peut mettre un petit entonnoir; on versera jusqu'à ce qu'on voie sortir la liqueur par l'orifice *D*, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle soit dans le col *CB*, à la hauteur *C*; par ce moyen, on aura toujours le même volume ou la même quantité de liqueur; & conséquemment, on pourra trouver par le moyen d'une balance qu'elle est, parmi les différentes liqueurs dont on aura rempli cet *aréomètre*, celle dont la pefanteur absolue est la plus grande, ou qui pèse le plus.

Il faut avoir quelcun égard à la saison de l'année, & au degré de chaleur ou de froid qui regne dans l'air; car il y a des liqueurs que la chaleur raréfie, & que le froid condense beaucoup plus que d'autres, & qui occupent plus ou moins d'espace, selon qu'il fait plus ou moins chaud ou froid. Voyez *PE-
SANTÉUR SPÉCIFIQUE, RARÉFACTION, &c.*

A l'aide de cet instrument, son savant auteur a construit la table suivante, qui montre, tant pour l'été que pour l'hiver, les différentes pefanteurs spécifiques des fluides, dont l'usage est le plus ordinaire en Chymie.

ARÉOMETRE PESÉ EN ÉTÉ EN HIVER.

plcin de	Onc.	Drag.	Gr.	Onc.	Drag.	Gr.
Vif-argent.	01	00	06	11	00	31
Huile de tartre. . . .	01	03	08	01	03	31
Esprit d'urine.	01	00	32	01	00	43
Huile de vitriol. . . .	01	03	58	01	04	03
Esprit de nitre.	01	10	40	01	10	70
Sel.	01	00	39	01	00	47
Eau-forte.	01	01	38	01	01	55
Esprit-de-vin	00	06	47	00	06	61
Eau de rofiers.	00	07	53	00	07	57
Eau distillée.	00	80	07	00	07	54

L'instrument vuide pefoit une dragme vingt-huit grains.

Une autre méthode pour connoître le degré de

pefanteur d'un fluide, est de fufpendre une masse de verre natif & de figure ronde à un crin de cheval, que l'on attache au-dessous d'un petit plat : cette masse ainsi fufpendue dans l'air à une balance bien jufte, demeure en équilibre avec un poids fait en forme de bassin, & fufpendu à l'autre bras de la balance; on plonge ensuite le corps de verre dans la liqueur dont on veut examiner la pefanteur, & fur-le-champ l'autre bras de la balance s'élève & devient plus léger, parce que le corps de verre a perdu dans la liqueur une partie de son poids : on met ensuite sur le petit plat auquel le crin de cheval est attaché, autant de poids qu'il en faut pour que l'équilibre soit rétabli; & ces poids ajoutés indiquent ce que la masse de verre a perdu de son poids dans la liqueur; or le poids que ce corps a perdu est égal au poids d'un pareil volume de la liqueur; donc on connoît par-là ce que pèse un volume de la liqueur égal à celui du petit corps de verre.

M. Musschenbroëck paroît préférer cette dernière méthode à toutes les autres qu'on a imaginées pour pefer les liqueurs. Il prétend que la méthode de M. Hombert en particulier a ses inconvénients, parce que la vertu attractive du tuyau étroit, fait que la liqueur y monte plus haut que dans le col large; & comme les liqueurs ont une vertu attractive différente, il devra y avoir aussi une grande différence entre les hauteurs dans le col large, lorsqu'elles seront élevées jusqu'à l'orifice du tuyau étroit.

Si, au haut de la tige de l'*aréomètre*, on met quelque petite lame de métal, &c. il s'enfoncera plus avant, quoique dans la même liqueur. En effet, la partie plongée de l'*aréomètre* soulève autant de liqueur qu'il en faut, pour faire équilibre à l'instrument entier. S'il pèse une once, par exemple, il soulève moins d'eau que de vin, quant au volume, parce qu'il faut plus de vin que d'eau pour le poids d'une once; & comme il ne fait monter la liqueur qu'en s'enfonçant, il doit donc plonger plus avant dans celle qui est la plus légère. Si l'on augmente le poids de l'*aréomètre* par addition de quelque lame de métal ou autrement, il s'enfoncera plus avant, quoique dans la même liqueur; parce qu'alors il en faut une plus grande quantité pour lui faire équilibre. (*M. FOMERY*).

Cela sert à expliquer divers faits. Si l'on les corps qui flottent, s'enfoncent plus ou moins, suivant la densité du fluide, une barque chargée en mer aura donc moins de parties hors de l'eau, si elle vient à remonter une rivière; car l'eau salée pèse plus que la douce, & les navigateurs assurent qu'ils en sentent bien la différence. On doit donc avoir égard à cet effet, & ne pas rendre la charge aussi grande qu'elle pourroit l'être, si l'on prévoit qu'on doit passer par une eau moins chargée de sel, que celle où l'on s'embarque. On a vu quelquefois des îles flottantes, c'est-à-dire, des portions de terre assez considérables qui se détachent du con-

vinent, & se trouvant moins pesantes que l'eau, se soutiennent à la surface, & flottent au gré des vents. L'eau mine peu-à-peu certains terrains, qui sont plus propres que d'autres à se dissoudre: ces sortes d'excavations s'augmentent avec le tems, & s'étendent au loin: le dessus demeure lié par les racines des plantes & des arbres, & le sol n'est ordinairement qu'une terre bitumineuse fort légère; de sorte que cette espèce de croûte est moins pesante que le volume d'eau sur lequel elle est roque, quand un accident quelconque vient à la détacher de la terre ferme, & à la mettre à flot. L'exemple de l'*aréomètre* fait voir encore qu'il n'est pas besoin, pour surnager, que le corps flottant soit d'une manière plus légère que l'eau. Car cet instrument ne se soutient point en vertu du verre qui du mercure, dont il est fait, mais seulement parce qu'il a, avec peu de solidité, un volume considérable qui répond à une quantité d'eau plus pesante. Ainsi, l'on pourroit faire des barques de plomb, ou de tout autre métal, qui ne s'enfonceroient pas. Et en effet, les chariots d'artillerie portent souvent à la suite des armées des gondoles de cuivre, qui servent à établir des ponts pour le passage des troupes. (M. FORMEY).

Il faut apporter d'ailleurs précautions dans la construction & l'usage de cet instrument. 1.^o Il faut que les liqueurs dans lesquelles on plonge l'*aréomètre*, soient exactement au même degré de chaleur ou de froid, afin qu'on puisse être sûr que leur différence de densité ne vient point de l'une de ces deux causes, & que le volume de l'*aréomètre* même n'en ait reçu aucun changement.

2.^o Que le col de l'instrument sur lequel sont marquées les gradations, soit par-tout d'une grosseur égale; car s'il n'est d'une forme irrégulière, les degrés marqués à égales distances ne mesureront pas des volumes de liqueurs semblables en se plongeant; il sera plus sûr & plus facile de graduer cette échelle relativement à la forme du col, en chargeant successivement l'instrument de plusieurs petits poids bien égaux, dont chacun produira l'enfoncement d'un degré.

3.^o On doit avoir soin que l'immersion se fasse bien perpendiculairement à la surface de la liqueur, sans quoi l'obliquité empêcheroit de compter avec justesse le degré d'enfoncement.

4.^o Comme l'usage de cet instrument est borné à des liqueurs qui diffèrent peu de pesanteur entre elles, on doit bien prendre garde que la partie qui surnage ne se charge de quelque vapeur ou saleté, qui occasionneroit un mécompte dans une estimation où il s'agit de différences peu considérables. Et lorsque l'*aréomètre* passe d'une liqueur à l'autre, on doit avoir soin que sa surface ne porte aucun enduit, qui empêche que la liqueur où il entre ne s'applique exactement contre cette surface.

5.^o Enfin, malgré toutes ces précautions, il

reste encore la difficulté de bien juger le degré d'enfoncement, parce que certaines liqueurs s'appliquent mieux que d'autres au verre; & qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'elles le touchent, s'élèvent plus ou moins au-dessus de leur niveau. Quand on se sert de l'*aréomètre* que nous avons décrit, il faut le plonger d'abord dans la liqueur la moins pesante, & remarquer à quelle graduation se rencontre sa surface: ensuite il faut le rapporter dans la plus dense, & charger le haut de la tige, ou du col, de poids connus, jusqu'à ce que le degré d'enfoncement soit égal au premier. La somme des poids qu'on aura ajoutés, pour rendre cette immersion égale à la première, fera la différence des pesanteurs spécifiques entre les deux liqueurs. Nous devons ces remarques à M. FORMEY, qui les a tirées de M. l'abbé Nollet, *Lect. Phys.* (O).

ARGO, le navire argo ou le vaisseau des argonautes, sub. m. C'est le nom d'une constellation de l'hémisphère méridionale, appelée plus communément le NAVIRE.

ARGUMENT (Astron.), en général c'est la quantité de laquelle dépend une équation, une inégalité, une circonstance quelconque du mouvement d'une planète. Ainsi, l'*argument* de latitude est la distance d'une planète à son nœud, parce que la latitude en dépend. L'anomalie ou la distance à l'apogée ou à l'aphélie, est l'*argument* de l'équation du centre ou de l'équation de l'orbite, puisque cette équation se calcule dans un orbite elliptique pour chaque degré d'anomalie, & qu'elle ne varie qu'à raison du changement de l'anomalie. Il faut avoir quatorze *arguments* pour calculer le lieu de la lune par nos nouvelles tables, parce qu'il y a quatorze inégalités dans son mouvement, & quatorze équations dans le calcul; la première est de 11' 16", multipliées par le sinus de l'anomalie moyenne du soleil; parce que cette équation, qui n'est de 11' 16" que quand le soleil est à 90° de son apogée, diminue comme le sinus de la distance à cet apogée, ou de l'anomalie du soleil; ainsi, cette anomalie, est l'*argument* de la première équation; il en est ainsi des autres.

L'*argument* annuel est la distance du soleil à l'apogée de la lune.

L'*argument* de la parallaxe est l'effet qu'elle produit dans l'observation, & qui sert à trouver la véritable quantité de la parallaxe horizontale; ainsi, quand M. de la Caille & moi observâmes la lune, au même instant, l'un au cap de Bonne-Espérance, & l'autre à Berlin, nous trouvâmes dans la déclinaison 83' de différence, c'étoit l'*argument* ou l'indication d'une parallaxe horizontale d'un degré, plus ou moins. (D. L.)

ARGYROÏSME, adj. est le nom que certains auteurs donnent à une comète de couleur argen-

sine, qui diffère très-peu de l'héliomètre, sinon qu'elle est d'une couleur plus brillante, & qu'elle jette assez d'éclat pour éblouir les yeux de ceux qui la regardent. Ce mot est formé du grec *αργυρεα*, argent, & du mot latin *coma*, chevelure. Voyez HÉLIOMÈTRE. (O).

A R I

ARIADNE, (*Astron.*) Voyez COURONNE.

ARIDED, (*Astron.*) nom de l'étoile qui est à la queue du cygne, marquée par la lettre β.

ARIES, (*Astron.*) V. BELIER.

ARION, (*Astron.*) V. ORION.

ARISTÉE, (*Astron.*) V. OPHIUCUS.

ARITHMÉTICIEN, f. m. se dit en général d'une personne qui fait l'Arithmétique, & plus communément d'une personne qui l'enseigne. Voyez ARITHMÉTIQUE. Il y a des experts jurés écrivains arithméticiens. Voyez EXPERT, JURÉ, &c. (E).

ARITHMÉTIQUE, f. f. Ce mot vient du grec *αριθμητική*, nombre. C'est l'art de démontrer, ou cette partie des Mathématiques qui considère les propriétés des nombres. On y apprend à calculer exactement, facilement, promptement. L'arithmétique est la base de toutes les Sciences mathématiques; car les rapports de toutes les espèces de quantités se réduisent finalement en nombres. V. NOMBRE, MATHÉMATIQUES, CALCUL.

Quelques auteurs définissent l'Arithmétique, la science de la quantité discrète. Voyez DISCRET & QUANTITÉ.

Les quatre grandes règles ou opérations, appelées l'addition, la soustraction, la multiplication & la division, composent proprement toute l'Arithmétique. Voyez ADDITION, &c.

Il est vrai que pour faciliter & expédier rapidement des calculs de commerce, des calculs astronomiques, &c. on a inventé d'autres règles fort utiles, telles que les règles de proportion, d'alliage, de fausse position, de compagnie, d'extraction de racines, de progression, de change, de troc, d'escompte, de réduction ou de rabais, &c. mais en faisant de ces règles, on s'aperçoit que ce sont seulement différentes applications des quatre règles principales. Voy. RÈGLE. Voyez aussi PROPORTION, ALLIAGE, &c.

Nous n'avons rien de bien certain sur l'origine & l'invention de l'Arithmétique: mais ce n'est pas trop risquer que de l'attribuer à la première société qui a eu lieu parmi les hommes, quoique l'histoire n'en fixe ni l'auteur ni le temps. On conçoit clairement qu'il a fallu s'appliquer à l'art de compter dès que l'on a été nécessaire à faire des partages, & à les combiner de mille diffé-

rentes manières. Ainsi, comme les tyriens passent pour être les premiers commerçants de tous les peuples anciens, plusieurs auteurs croient qu'on doit l'Arithmétique à cette nation. Voyez COMMERCE.

Joseph assure que par le moyen d'Abraham, l'Arithmétique passa d'Asie en Egypte, où elle fut extrêmement cultivée & perfectionnée; d'autant plus que la Philosophie & la Théologie des égyptiens rouloient entièrement sur les nombres. C'est de-là que nous viennent toutes ces merveilles qu'ils nous rapportent de l'unité, du nombre trois; des nombres quatre, sept, dix. Voyez UNITÉ, &c.

En effet, Kircher fait voir, dans son *Œdip. Egypt.* tom. II, pag. 2, que les égyptiens expliquoient tout par des nombres. Pythagore lui-même assure que la nature des nombres est répandue dans tout l'univers, & que la connaissance des nombres conduit à celle de la divinité, & n'en est presque pas différente.

La science des nombres passa de l'Egypte dans la Grèce; d'où, après avoir reçu de nouveaux degrés de perfection par les astronomes de ce pays, elle fut connue des romains, & de-là est enfin venue jusqu'à nous.

Cependant l'ancienne Arithmétique n'étoit pas, à beaucoup près, aussi parfaite que la moderne: il paroît qu'alors elle ne servoit guère qu'à considérer les différentes divisions des nombres; on peut s'en convaincre en lisant les traités de Nicomache, écrits ou composés dans le troisième siècle depuis la fondation de Rome & celui de Boèce, qui existent encore aujourd'hui. En 1556, Xylander publia en latin un abrégé de l'ancienne Arithmétique, écrite en grec par Pheleus. Jordanus compola ou publia, dans le douzième siècle, un ouvrage beaucoup plus ample de la même espèce, que Faber Stapulensis donna en 1480, avec un commentaire.

L'Arithmétique, telle qu'elle est aujourd'hui, se divise en différentes espèces, comme théorique, pratique, instrumentale, logarithmique, numérique, spéculative, décimale, tétracorde, duodécimale, sexagesimale, &c.

L'Arithmétique théorique est la science des propriétés & des rapports des nombres abstraits, avec les raisons & les démonstrations des différentes règles. Voyez NOMBRE.

On trouve une Arithmétique théorique dans les septième, huitième, neuvième livres d'Euclide. Le moine Barlaam a aussi donné une théorie des opérations ordinaires, tant en entiers qu'en fractions, dans un livre de sa composition, intitulé: *Logistica*, & publié en latin par Jean Chambers, anglois, l'an 1600. On peut y ajouter l'ouvrage italien de Lucas de Burgo, mis au jour en 1523: cet auteur y a donné les différentes divisions de nombres de Nicomache & leurs propriétés, conformément à la doctrine d'Euclide, avec le calcul

des entiers & des fractions, & des extractions de racines, &c.

L'*Arithmétique* pratique est l'art de compter ou de calculer, c'est-à-dire, l'art de trouver des nombres par le moyen de certains nombres donnés, dont la relation aux premiers est connue; comme si l'on demandoit, par exemple, de déterminer le nombre égal aux deux nombres donnés, 6, 8.

Le premier corps complet d'*Arithmétique* pratique nous a été donné en 1556 par Tartaglia, vénitien: il consiste en deux livres; le premier contient l'application de l'*Arithmétique* aux usages de la vie civile; & le second, les fondemens ou des principes de l'Algèbre. Avant Tartaglia, Süselius avoit donné quelque chose sur cette matière en 1544: on y trouve différentes méthodes & remarques sur les triangles, &c.

Nous supprimons une infinité d'autres auteurs de pure pratique qui sont venus depuis, tels que Gemma Frisius, Metius, Clavius, Ramus, &c.

Maurolicus, dans ses *Opuscula mathematica* de l'année 1577, a joint la théorie à la pratique de l'*Arithmétique*; il l'a même perfectionnée à plusieurs égards: Henrichius a fait la même chose dans son *Arithmetica perfecta* de l'année 1609, où il a réduit toutes les démonstrations en forme de syllogisme, ainsi que Tacquet dans la *theoria & praxis Arithmetica* de l'année 1704. (E)

Les ouvrages sur l'*Arithmétique* sont si communs parmi nous, qu'il seroit inutile d'en faire le dénombrement.

L'*Arithmétique* instrumentale est celle où les règles communes s'exécutent par le moyen d'instrumens imaginés pour calculer avec facilité & promptitude; comme les bâtons de Neper. (Voy. NEPER), l'instrument de M. Sam. Moreland, qui en a publié lui-même la description en 1666; celui de M. Leibnitz, décrit dans les *Miscellan. Berolin.* la machine arithmétique de M. Pascal, dont on donnera la description plus bas, &c.

L'*Arithmétique* logarithmique, est celle qui s'exécute par les tables des logarithmes. Voyez LOGARITHME. Ce qu'il y a de meilleur là-dessus est l'*Arithmetica logarithmica* de Hn. Briggs, publiée 1624.

On ne doit pas oublier les *tables arithmétiques universelles* de Protopharèse, publiées en 1610 par Herwart, moyennant lesquelles la multiplication se fait aisément & exactement par l'addition, & la division par la soustraction.

Les chinois ne se servent guère de règles dans leurs calculs; au lieu de cela, ils font usage d'un instrumens qui consiste en une petite lame longue d'un pié & demi, traversée de dix ou douze fils de fer, où sont enfilées de petites boules rondes: en les tirant ensemble, & les pliant ensuite l'un après l'autre, suivant certaines conditions & conventions, ils calculent à-peu-près comme nous

faisons avec des jettons, mais avec tant de facilité & de promptitude, qu'ils peuvent suivre une personne qui lit un livre de compte, avec quelque rapidité qu'elle aille; & à la fin l'opération se trouve faite: ils ont aussi leurs méthodes de la prouver. Voyez le P. le Comte. Les indiens calculent à-peu-près de même avec des cordes chargées de nœuds.

L'*Arithmétique* numérique est celle qui enseigne le calcul des nombres ou des quantités abstraites désignées par des chiffres: on en fait les opérations avec des chiffres ordinaires ou arabes. Voyez CARACTÈRE & ARABE.

L'*Arithmétique* spéculative est celle qui enseigne le calcul des quantités désignées par les lettres de l'alphabet. Voyez SPÉCIEUSE. Cette *Arithmétique* est ce que l'on appelle ordinairement l'*Algèbre* ou *Arithmétique littéraire*. Voyez ALGÈBRE.

Wallis a joint le calcul numérique à l'algèbre, & démontré par ce moyen les règles des fractions, des proportions, des extractions de racines, &c.

Wels en a donné un abrégé sous le titre de *Elementa arithmetica*, en 1698.

L'*Arithmétique* décimale s'exécute par une suite de dix caractères, de manière que la progression va de dix en dix. Telle est notre *Arithmétique*, où nous faisons usage des dix caractères arabes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; après quoi nous recommençons 10, 11, 12, &c.

Cette méthode de calculer n'est pas fort ancienne; elle étoit totalement inconnue aux grecs & aux romains. Gerbert, qui devint pape dans la suite sous le nom de Silvestre II, l'introduisit en Europe, après l'avoir reçue des maîtres d'Espagne. Il est fort vraisemblable que cette progression a pris son origine des dix doigts de la main, dont on faisoit usage dans les calculs avant que l'on eût réduit l'*Arithmétique* en art.

Les millionnaires de l'Orient nous assurent qu'aujourd'hui même les indiens font très-experts à calculer par leurs doigts, sans se servir de plume ni d'encre. Voyez les *lettres édif. & curieuses*. Ajoutez à cela que les naturels du Pérou, qui font tous leurs calculs par le différent arrangement des grains de maïs, l'emportent beaucoup, tant par la justesse que par la célérité de leurs comptes, sur quelque européen que ce soit avec toutes ses règles.

L'*Arithmétique* binaire est celle où l'on n'emploie uniquement que deux figures, l'unité ou 1 & le 0. Voyez BINAIRE.

M. Dagincourt nous a donné dans les *Miscell. Berol.* tom. I, un long mémoire sur cette *Arithmétique* binaire; il y fait voir qu'il est plus aisé de découvrir par ce moyen les loix des progressions, qu'en se servant de toute autre méthode où l'on seroit usage d'un plus grand nombre de caractères.

L'*Arithmétique* tétraïque est celle où l'on

n'emploie que les figures 1, 2, 3 & 0. Erhard Weigel nous a donné un traité de cette *Arithmétique*; mais la binaire & la tétraïque ne font guère que de curiosité, relativement à la pratique, puisque l'on peut exprimer les nombres d'une manière beaucoup plus abrégée par l'*Arithmétique* décimale.

L'*Arithmétique* vulgaire roule sur les entiers & les fractions. Voyez ENTIER & FRACTION.

L'*Arithmétique* sexagésimale est celle qui procède par soixantaines, ou bien c'est la doctrine des fractions sexagésimales. Voyez SEXAGÉSIMAL. Sam. Reyher a inventé une espèce de baguettes sexagésimales, à l'imitation des bâtons de Néper, par le moyen desquelles on fait avec facilité toutes les opérations de l'*Arithmétique* sexagésimale.

L'*Arithmétique* des infinis est la méthode de trouver la somme d'une suite de nombres dont les termes sont infinis, ou d'en déterminer les rapports. Voyez INFINI, SUITE ou SERIE, &c.

M. Wallis est le premier qui ait traité à fond de cette méthode, ainsi qu'il parait par ses *Opera mathematica*, où il en fait voir l'usage en Géométrie pour déterminer l'aire des surfaces & la solidité des corps, ainsi que leurs rapports; mais la méthode des fluxions, qui est l'*Arithmétique* universelle des infinis, excute tout cela d'une manière beaucoup plus prompte & plus commode, indépendamment d'une infinité d'autres choses auxquelles la première ne sauroit atteindre. Voyez FLUXIONS, CALCUL, &c.

Sur l'*Arithmétique* des incommensurables ou irrationnels, voyez INCOMMENSURABLE, IRRATIONNEL, &c.

Jean de Sacrobosco ou Hallfax composa, en 1212, selon Vossius, un traité d'*Arithmétique*; mais ce traité a toujours resté manuscrit; & selon M. l'abbé de Gu, Paciolo, qui a donné le premier livre d'Algebre, est aussi le premier auteur d'*Arithmétique* qui ait été imprimé. Voyez ALGÈBRE. (E)

* Jusqu'ici nous nous sommes contentés d'exposer en abrégé ce que l'on trouve à-peu-près dans la plupart des ouvrages mathématiques sur la science des nombres, & nous n'avons guère fait que traduire l'article *Arithmétique* tel qu'il se trouve dans l'Encyclopédie anglaise: tâchons présentement d'entrer davantage dans les principes de cette science, & d'en donner une idée plus précise.

Nous remarquerons d'abord que tout nombre, suivant la définition de M. Newton, n'est proprement qu'un rapport. Pour entendre ceci, il faut remarquer que toute grandeur qu'on compare à une autre, est ou plus petite, ou plus grande, ou égale; qu'ainsi toute grandeur a un certain rapport avec une autre à laquelle on la compare, c'est-à-dire, qu'elle y est contenue ou la contient d'une certaine manière. Ce rapport ou cette manière de

contenir ou d'être contenu, est ce qu'on appelle nombre; ainsi, le nombre 3 exprime le rapport d'une grandeur à une autre plus petite, que l'on prend pour l'unité, & que la plus grande contient trois fois; au contraire, la fraction $\frac{1}{2}$ exprime le rapport d'une certaine grandeur à une plus grande, que l'on prend pour l'unité, & qui est contenue trois fois dans cette plus grande. Tout cela sera exposé plus en détail aux articles NOMBRE, FRACTION, &c.

Les nombres étant des rapports aperçus par l'esprit & distingués par des signes particuliers, l'*Arithmétique*, qui est la science des nombres, est donc l'art de combiner entr'eux ces rapports, en le servant pour faire cette combinaison des signes mêmes qui les distinguent. De-là les quatre principales règles de l'*Arithmétique*; car les différentes combinaisons qu'on peut faire des rapports, se réduisent ou à examiner l'excès des uns sur les autres, ou la manière dont ils se contiennent. L'addition & la soustraction ont le premier objet, puisqu'il ne s'agit que d'y ajouter ou d'y soustraire des rapports; le second objet est celui de la multiplication & de la division, puisqu'on y détermine de quelle manière un rapport en contient un autre. Tout cela sera expliqué plus en détail aux articles MULTIPLICATION & DIVISION.

Il y a, comme l'on sait, deux sortes de rapports, l'arithmétique & le géométrique. Voyez RAPPORT. Les nombres ne sont proprement que des rapports géométriques; mais il semble que dans les deux premières règles de l'*Arithmétique* on considère arithmétiquement ces rapports, & que dans les deux autres on les considère géométriquement. Dans l'addition de deux nombres (car toute addition se réduit proprement à celle de deux nombres), l'un des deux nombres représente l'excès de la somme sur l'autre nombre. Dans la multiplication, l'un des deux nombres est le rapport géométrique du rapport à l'autre nombre. Voyez SOMME, PRODUIT.

A l'égard du détail des opérations particulières de l'*Arithmétique*, il dépend de la forme & de l'institution des signes par lesquels on désigne les nombres. Notre *Arithmétique*, qui n'a que dix chiffres, seroit fort différente si elle en avoit plus ou moins; & les romains qui avoient des chiffres différents de ceux dont nous servons, devoient aussi avoir des règles d'*Arithmétique* toutes différentes des nôtres. Mais toute *Arithmétique* se réduit toujours aux quatre règles dont nous parlons, parce que de quelque manière qu'on désigne ou qu'on écrive les rapports, on ne peut jamais les combiner que de quatre façons, & même, à proprement parler, de deux manières seulement, dont chacune peut être envisagée sous deux faces différentes.

On pourroit dire encore que toutes les règles de l'*Arithmétique* se réduisent ou à former un tout

tout par la réunion de différentes parties, comme dans l'addition & la multiplication, ou à résoudre un tout en différentes parties, ce qui s'exécute par la soustraction & la division. En effet, la multiplication n'est qu'une addition répétée, & la division n'est aussi qu'une soustraction répétée. D'où il s'ensuit encore que les règles primitives de l'Arithmétique peuvent à la rigueur se réduire à l'addition & à la soustraction. La multiplication & la division ne sont proprement que des manières abrégées de faire l'addition d'un même nombre plusieurs fois à lui-même, ou de soustraire plusieurs fois un même nombre d'un autre; aussi M. Neuton appelle-t-il les règles de l'Arithmétique, *compositio & resolutio arithmetica*, c'est-à-dire, *composition & résolution des nombres*.

ARITHMÉTIQUE universelle; c'est ainsi que M. Neuton appelle l'Algèbre ou calcul des grandeurs en général; & ce n'est pas sans raison que cette dénomination lui a été donnée par ce grand homme, dont le génie également lumineux & profond parait avoir remonte dans toutes les sciences à leurs vrais principes métaphysiques. En effet, dans l'Arithmétique ordinaire on peut remarquer deux espèces de principes; les premiers sont des règles générales, indépendantes des signes particuliers par lesquels on exprime les nombres; les autres sont des règles dépendantes de ces mêmes signes, & ce sont celles qu'on appelle plus particulièrement *règles de l'Arithmétique*. Mais les premiers principes ne sont autre chose que des propriétés générales des rapports, qui ont lieu de quelque manière que ces rapports soient désignés: telles sont, par exemple, ces règles; si on ôte un nombre d'un autre, cet autre nombre joint avec le reste, doit rendre le premier nombre; si on divise un grandeur par une autre, le quotient multiplié par le diviseur doit rendre le dividende; si on multiplie la somme de plusieurs nombres par la somme de plusieurs autres, le produit est égal à la somme des produits de chaque partie par toutes les autres, &c.

De-là il s'ensuit d'abord qu'en désignant les nombres par des expressions générales, c'est-à-dire qui ne désignent pas plus un nombre qu'un autre, on pourra former certaines règles relatives aux opérations qu'on peut faire sur les nombres ainsi désignés. Ces règles le réduisent à représenter de la manière la plus simple qu'il est possible, le résultat d'une ou de plusieurs opérations qu'on peut faire sur les nombres exprimés d'une manière générale; & ce résultat ainsi exprimé, ne sera proprement qu'une opération arithmétique indiquée; opération qui variera selon qu'on donnera différentes valeurs arithmétiques aux quantités qui, dans le résultat dont il s'agit, représentent des nombres.

Pour mieux faire entendre cette notion que nous donnons de l'Algèbre, parcourons-en les quatre règles ordinaires, & commençons par l'addition. Elle consiste, comme nous l'avons vu dans l'article *Mathématique, Tome I, 1.^{re} Partie*.

ADDITION, à ajouter ensemble avec leurs signes, sans aucune autre opération, les quantités dissimulables, & à ajouter les coefficients des quantités semblables: par exemple, si j'ai à ajouter ensemble les deux grandeurs dissimulables a , b , j'écrirai simplement $a+b$; c'est-à-dire que si on désigne a par quelque nombre, & b par un autre, il faudra ajouter ensemble ces deux nombres; ainsi, $a+b$ n'est que l'indication d'une addition arithmétique, dont le résultat sera différent, selon les valeurs numériques qu'on assignera à a & à b . Je suppose présentement qu'on me propose d'ajouter $5a$ avec $3a$, je pourrais écrire $5a+3a$, & l'opération arithmétique seroit indiquée comme ci-dessus; mais, en examinant $5a$ & $3a$, je vois que cette opération peut être indiquée d'une manière plus simple: car quelque nombre que a représente, il est évident que ce nombre pris 5 fois, plus ce même nombre pris 3 fois, est égal au même nombre pris 8 fois; ainsi je vois qu'au lieu de $5a+3a$, je puis écrire $8a$, qui est l'expression abrégée, & qui m'indique une opération arithmétique plus simple que ne me l'indique l'expression $5a+3a$.

C'est là-dessus qu'est fondée la règle générale de l'addition algébrique, d'ajouter les grandeurs semblables en ajoutant leurs coefficients numériques, & écrivant ensuite la partie littérale une fois.

On voit donc que l'addition algébrique se réduit à exprimer de la manière la plus simple la somme ou le résultat de plusieurs nombres exprimés généralement, & à ne laisser, pour ainsi dire, à l'arithmétique, que le moins de travail à faire qu'il est possible. Si on est de même de la soustraction algébrique. Si je veux retrancher b de a , j'écris simplement $a-b$, parce que je ne peux pas représenter cela d'une manière plus simple; mais si j'ai à retrancher $3a$ de $5a$, je n'écrirai point $5a-3a$, parce que cela me donneroit plusieurs opérations arithmétiques à faire, en cas que je voulusse donner à a une valeur numérique; j'écrirai simplement $2a$; expression plus simple & plus commode pour le calcul arithmétique. V. SOUSTRACTION.

J'en dis autant de la multiplication & de la division. Si je veux multiplier $a+b$ par $c+d$, je puis écrire indifféremment $(a+b) \times (c+d)$, ou $a+c+b+d$; & souvent même je préférerais la première expression à la seconde, parce qu'elle semble demander moins d'opérations arithmétiques: car il ne faut que deux additions & une multiplication pour la première, & pour la seconde il faut trois additions & quatre multiplications. Mais si j'ai à multiplier $5a$ par $3a$, j'écrirai $15a$ au lieu de $5a \times 3a$, parce que dans ce dernier cas j'aurois trois opérations arithmétiques à faire, & que dans le premier je n'en ai que deux; une pour trouver aa , & l'autre pour multiplier a par 15 . De même si j'ai $a+b$ à multiplier par $a-b$, j'écrirai $aa-bb$, parce que ce résultat sera souvent plus commode que l'autre, pour les calculs arithmétiques, & que d'ailleurs j'en tire un

théorème, savoir que le produit de la somme des deux nombres, par la différence de ces deux nombres, est égal à la différence des carrés de ces deux nombres. C'est ainsi qu'on a trouvé que le produit de $a+b$ par $a-b$, c'est-à-dire le carré de $a+b$, étoit $aa+2ab+bb$, & qu'il contenoit par conséquent le carré des deux parties, plus deux fois le produit de l'une par l'autre; ce qui sert à extraire la racine quarrée des nombres Voy. QUARRÉ & RACINE QUARRÉE.

Dans la division, au lieu d'écrire $\frac{20ab}{b}$, j'écrirai simplement $4a$; au lieu d'écrire $\frac{ab-x}{a+x}$, j'écrirai $a-x$; mais, si j'ai à diviser b par h d , j'écrirai $\frac{bx}{d}$, ne pouvant trouver une expression plus simple.

On voit donc par-là que M. Neuton a eu raison d'appeller l'Algèbre *Arithmétique universelle*, puisque les règles de cette science ne consistent qu'à extraire, pour ainsi dire, ce qu'il y a de général & de commun dans toutes les *Arithmétiques* particulières qui se feroient avec plus ou moins ou autant de chiffres que la nôtre, & à présenter sous la forme la plus simple & la plus abrégée, ces opérations *arithmétiques* inépuables.

Mais, dira-t-on, à quoi bon tout cet échaffaudage? Dans toutes les questions que l'on peut se poser sur les nombres, chaque nombre est désigné & énoncé. Quelle utilité y a-t-il de donner à ce nombre une valeur littérale dont il semble qu'on peut se passer? Voici l'avantage de cette dénomination.

Toutes les questions qu'on peut proposer sur les nombres, ne sont pas aussi simples que celles d'ajouter un nombre donné à un autre ou de l'en soustraire; de les multiplier ou de les diviser l'un par l'autre. Il est des questions beaucoup plus compliquées, & pour la solution desquelles on est obligé de faire des combinaisons dans lesquelles le nombre ou les nombres que l'on cherche doivent entrer. Il faut donc avoir un art de faire ces combinaisons sans connoître les nombres que l'on cherche, & pour cela il faut exprimer ces nombres par des caractères différens des caractères numériques, parce qu'il y auroit un très-grand inconvénient à exprimer un nombre inconnu par un caractère numérique qui ne pourroit lui convenir que par un très-grand hasard. Pour rendre cela plus sensible par un exemple, je suppose que l'on cherche deux nombres dont la somme soit 100, & la différence 60. Je vois d'abord qu'en désignant les deux nombres inconnus par des caractères numériques à volonté, par exemple l'un par 25, & l'autre par 50, je leur donnerois une expression très-fausse, puisque 25 & 60 ne feroient point aux conditions de la question. Il en seroit de même d'une infinité d'autres dénominations numériques. Pour éviter cet inconvénient, j'appelle le plus grand

de ces nombres x , & le plus petit y ; & j'ai par cette dénomination algébrique les deux conditions ainsi exprimées: x plus y égal à 100, & x moins y égal à 60; ou en caractères algébriques:

$$x + y = 100.$$

$$x - y = 60. \text{ Voyez CARACTÈRE.}$$

Puisque $x + y$ est égal à 100, & $x - y$ égal à 60; je vois que 100, joint avec 60, doit être égal à $x + y$, joint à $x - y$. Or, pour ajouter $x + y$ à $x - y$, il faut, suivant les règles de l'addition algébrique écrire $2x$; je vois donc que $2x$ est égal à 160, c'est-à-dire que 160 est le double du plus grand nombre cherché; donc ce nombre est la moitié de 160, c'est-à-dire 80: d'où il est facile de trouver l'autre qui est y : car puisque $x + y$ est égal à 100, & que x est égal à 80, donc 80 plus y est égal à 100; donc y est égal à 100 dont on a retranché 80, c'est-à-dire 20; donc les deux nombres cherchés sont 80 & 20: en effet leur somme est 100, & leur différence est 60.

Au reste, je ne prétends pas faire voir par cet article la nécessité de l'Algèbre, car elle ne seroit encore guère nécessaire, si on ne proposoit pas des questions plus compliquées que celle-ci: j'ai voulu seulement faire voir par cet exemple très-simple, & à la portée de tout le monde, comment par le secours de l'Algèbre on parvient à trouver les nombres inconnus.

L'expression algébrique d'une question n'est autre chose, comme l'a fort bien remarqué M. Neuton, que la traduction de cette même question en caractères algébriques; traduction qui a cela de commode & d'essentiel, qu'elle se réduit à ce qu'il y a d'absolument nécessaire dans la question, & que les conditions superflues en sont bannies. Nous allons en donner, d'après M. Neuton, l'exemple suivant.

Question énoncée par le langage ordinaire.	La même question traduite algébriquement.
--	---

On demande trois nombres avec ces conditions.

$$x, y, z.$$

Qu'ils soient en proportion géométrique continue.

$$x:y::y:z, \text{ ou } xz=yy.$$

Voyez PROPORTION.

Que leur somme soit 20.

$$x + y + z = 20.$$

Et que la somme de leurs quarrés soit 140.

$$xx + yy + zz = 140.$$

Ainsi la question se réduit à trouver les trois inconnues x, y, z , par les trois équations $xz=yy$, $x+y+z=20$, $xx+yy+zz=140$. Il ne s'agit

plus qu'à tirer de ces trois équations la valeur de chacune des Inconnues.

On voit donc qu'il y a dans l'*Arithmétique universelle* deux parties à distinguer.

La première est celle qui apprend à faire les combinaisons & le calcul des quantités représentées par des signes plus universels que les nombres; de manière que les quantités inconnues, c'est-à-dire dont on ignore la valeur numérique, puissent être combinées avec la même facilité que les quantités connues, c'est-à-dire auxquelles on peut assigner des valeurs numériques. Ces opérations ne supposent que les propriétés générales de la quantité, c'est-à-dire qu'on y envisage la quantité simplement comme quantité, & non comme représentée & fixée par telle ou telle expression particulière.

La seconde partie de l'*Arithmétique universelle* consiste à savoir faire usage de la méthode générale de calculer les quantités, pour découvrir les quantités qu'on cherche par le moyen des quantités qu'on connoît. Pour cela il faut, 1.^o représenter de la manière la plus simple & la plus commode la loi du rapport qu'il doit y avoir entre les quantités connues & les inconnues. Cette loi de rapport est ce qu'on nomme *équation*; ainsi, le premier pas à faire lorsqu'on a un problème à résoudre, est de résoudre d'abord le problème à l'équation la plus simple.

Ensuite il faut tirer de cette équation la valeur ou les différentes valeurs que doit avoir l'inconnue qu'on cherche; c'est ce qu'on appelle *résoudre l'équation*. Voyez l'article EQUATION, où vous trouverez là-dessus un plus long détail, auquel nous renvoyons, ayant dû nous borner dans cet article à donner une idée générale de l'*Arithmétique universelle*, pour en détailler les règles dans les articles particuliers. Voyez aussi PROBLÈME, RACINE, &c.

La première partie de l'*Arithmétique universelle* s'appelle proprement *Algèbre*, ou science du calcul des grandeurs en général; la seconde s'appelle proprement *Analyse*: mais ces deux noms s'emploient assez souvent l'un pour l'autre. V. ALGÈBRE & ANALYSE.

Nous ignorons si les anciens ont connu cette science: il y a pourtant bien de l'apparence qu'ils avoient quelque moyen semblable pour résoudre ou au moins les questions numériques; par exemple, les questions qui ont été appellées *questions de Diophante*. Voyez DIOPHANTE; voyez aussi APPLICATION de l'*Analyse* à la Géométrie.

Selon M. l'Abbé de Gua, dans son excellente *Histoire de l'Algèbre*, dont on trouve la plus grande partie à l'art. ALGÈBRE de ce Dictionnaire, Théon paroit avoir cru que Platon est l'inventeur de l'*Analyse*; & Pappus nous apprend que Diophante & d'autres auteurs anciens s'y étoient principalement appliqués, comme Euclide, Apollonius, Aristée, Eratostène, & Pappus lui-même. Mais nous ignorons en quoi consistoit précisément leur

Analyse, & en quoi elle pouvoit différer de la nôtre ou lui ressembler. M. de Malezieu, dans ses *Elémens de Géométrie*, prétend qu'il est moralement impossible qu'Archimède soit arrivé à la plupart de ses belles découvertes géométriques, sans le secours de quelque chose d'équivalent à notre *Analyse*; mais tout cela n'est qu'une conjecture; & il seroit bien singulier qu'il n'en restât pas au moins quelque vestige dans quelqu'un des ouvrages des anciens géomètres. M. de l'Hôpital, ou plutôt M. de Fontenelle, qui est l'auteur de la préface des *Infinités petits*, observe qu'il y a apparence que M. Pascal ait arrivé à force de tête & sans *Analyse*, aux belles découvertes qui composent son *Traité de la roulette*, imprimé sous le nom d'Étienne. Pourquoi n'en seroit-il pas de même d'Archimède & des anciens?

Nous n'avons encore parlé que de l'usage de l'*Algèbre* pour la résolution des questions numériques; mais ce que nous venons de dire de l'*Analyse* des anciens, nous conduit naturellement à parler de l'usage de l'*Algèbre* dans la *Géométrie*: cet usage consiste principalement à résoudre les problèmes géométriques par l'*Algèbre*, comme on résout les problèmes numériques, c'est-à-dire à donner des noms algébriques aux lignes connues & inconnues; & après avoir énoncé la question algébrique, à calculer de la même manière que si on résolvait un problème numérique. Ce qu'on appelle en *Algèbre* *équation d'une courbe*, n'est qu'un problème géométrique indéterminé, dont tous les points de la courbe donnent la solution; & ainsi du reste. Dans l'application de l'*Algèbre* à la *Géométrie*, les lignes connues ou données sont représentées par des lettres de l'alphabet, comme les nombres connus ou donnés dans les questions numériques; mais il faut observer que les lettres qui représentent des lignes dans la solution d'un problème géométrique, ne pourroient pas toujours être exprimées par des nombres. Je suppose, par exemple, que dans la solution d'un problème de *Géométrie*, on ait deux lignes connues, dont l'une que j'appellerai *a* soit le côté d'un carré, & l'autre que j'appellerai *b* soit la diagonale de ce même carré; je dis que si on assigne une valeur numérique à *a*, il sera impossible d'assigner une valeur numérique à *b*, parce que la diagonale d'un carré & son côté sont incommensurables. V. INCOMMENSURABLE, DIAGONALE, HYPOTHÈSE, &c. Ainsi, les calculs algébriques appliqués à la *Géométrie* ont un avantage, en ce que les caractères qui expriment les lignes données peuvent marquer des quantités commensurables ou incommensurables; au lieu que dans les problèmes numériques, les caractères qui représentent les nombres donnés ne peuvent représenter que des nombres commensurables. Il est vrai que le nombre inconnu qu'on cherche, peut être représenté par une expression algébrique qui désigne un incommensurable; mais alors c'est une marque que ce nombre inconnu & cherché

n'existe point, que la question ne peut être résolue qu'à-peu-près, & non exactement; au lieu que dans l'application de l'Algèbre à la Géométrie, on peut toujours assigner par une construction géométrique la grandeur exacte de la ligne inconnue, quand même l'expression qui désigne cette ligne seroit incommensurable. On peut même souvent assigner la valeur de cette ligne, quoiqu'on ne puisse pas en donner l'expression algébrique, soit commensurable, soit incommensurable: c'est ce qui arrive dans le cas irréductible du troisième degré. Voyez IRREDUCTIBLE.

Un des plus grands avantages qu'on a tirés de l'application de l'Algèbre à la Géométrie, est le calcul différentiel; on en trouva l'idée au mot DIFFÉRENTIEL, avec une notion exacte de la nature de ce calcul. Le calcul différentiel a produit l'intégral. Voyez CALCUL & INTÉGRAL.

Il n'y a point de géomètre tant soit peu habile, qui ne connoisse aujourd'hui plus ou moins l'usage intime de ces deux calculs dans la Géométrie transcendante.

M. Newton nous a donné sur l'Algèbre un excellent ouvrage, qu'il a intitulé *Arithmetica universalis*. Il y traite des règles de cette science, & de son application à la Géométrie. Il y donne plusieurs méthodes nouvelles, qui ont été commentées pour la plupart par M. d'Gravelande dans un petit ouvrage très-utile aux commençans, intitulé: *Elementa algebrae*, & par M. Clairaut dans ses *Eléments d'Algèbre*. Voyez à l'article ALGÈBRE les noms de plusieurs auteurs qui ont traité de cette science.

Sur la manière d'appliquer l'Algèbre à la Géométrie, c'est-à-dire de réduire en équation les questions géométriques, nous ne connoissons rien de meilleur ni de plus lumineux que les règles données par M. Newton, p. 82 & suiv. de son *Arithmetica universalis*, édition de Leyde 1732, jusqu'à la page 96; elles font trop précieuses pour être abrégées & trop longues pour être insérées ici dans leur entier; ainsi, nous y renvoyons nos lecteurs; nous dirons seulement qu'elles peuvent se réduire à ces deux règles.

Première règle. Un problème géométrique étant proposé (& on pourroit en dire autant d'un problème numérique) comparez ensemble les quantités connues & inconnues que renferme ce problème, & sans distinguer les connues d'avec les inconnues, examinez comment toutes ces quantités dépendent les unes des autres; & quelles sont celles qui étant connues, seroient connoître les autres en procédant par une méthode synthétique.

Seconde règle. Parmi ces quantités qui seroient connoître les autres, & que je nomme pour cette raison *synthétiques*, cherchez celle qui seroient connoître les autres le plus facilement, & qui pourroient être trouvées le plus facilement, si on ne les supposoit point connues; & regardez ces quantités comme celles que vous devez traiter de connues.

C'est la-dessus qu'est fondée la règle des Géomètres, qui disent que pour résoudre un problème

géométrique algébriquement, il faut le supposer résolu: en effet, pour résoudre ce problème, il faut se représenter toutes les lignes, tant connues qu'inconnues, comme des quantités qu'on a devant les yeux, & qui dépendent toutes les unes des autres, en sorte que les connues & les inconnues puissent réciproquement & à leur tour être traitées, si l'on veut, d'inconnues & de connues. Mais en voilà assez sur cette matière, dans un ouvrage où l'on ne doit en exposer que les principes généraux. Voyez APPLICATION (O).

* *ARITHMÉTIQUE politique*; c'est celle dont les opérations ont pour but des recherches utiles à l'art de gouverner les peuples, telles que celles du nombre des hommes qui habitent un pays; de la quantité de nourriture qu'ils doivent consommer; du travail qu'ils peuvent faire; du tems qu'ils ont à vivre; de la fertilité des terres; de la fréquence des naufrages, &c. On conçoit aisément que ces découvertes & beaucoup d'autres de la même nature, étant acquises par des calculs fondés sur quelques expériences bien constatées, ne ministrent habile en tiroient une foule de conséquences pour la perfection de l'agriculture, pour le commerce tant intérieur qu'extérieur, pour les colonies, pour le cours & l'emploi de l'argent, &c. Mais souvent les ministres (je n'ai garde de parler sans exception) croient n'avoir pas besoin de passer par des combinaisons & des suites d'opérations arithmétiques: plusieurs s'imaginent être doués d'un grand génie naturel qui les dispense d'une marche si lente & si pénible, sans compter que la nature des affaires ne permet ni ne demande presque jamais la précision géométrique. Cependant si la nature des affaires la demandoit & la permettoit, je ne doute point qu'on ne parvint à se convaincre que le monde politique, aussi bien que le monde physique, peut se régler à beaucoup d'égards par poids, nombre & mesure.

Le Chevalier Petty, Anglois, est le premier qui ait publié des essais sous ce titre. Le premier est sur la multiplication du genre humain; sur l'accroissement de la ville de Londres, ses degrés, ses périodes, ses causes & ses suites. Le second, sur les maisons, les habitants, les morts & les naissances de la ville de Dublin. Le troisième est une comparaison de la ville de Londres & de la ville de Paris; le chevalier Petty s'efforce de prouver que la capitale de l'Angleterre l'emporte sur celle de la France par tous ces côtés. M. Anzout a attaqué cet essai par plusieurs objections, auxquelles M. le chevalier Petty a fait des réponses. Le quatrième tend à faire voir qu'il meurt à l'Hôtel-Dieu de Paris environ trois mille malades par an, par mauvaise administration. Le cinquième est divisé en cinq parties: la 1^{re} est en réponse à M. Anzout; la 2^e contient la comparaison de Londres & de Paris sur plusieurs points; la troisième évalue le nombre des paroissiens des 124 paroisses de Londres à 696 mille; la quatrième est une recherche sur les habitants de Londres,

de Paris, d'Amsterdam, de Venise, de Rome, de Dublin, de Bristol, & de Rouen; la cinquième à le même objet, mais relativement à la Hollande & au reste des Provinces-Unies. Le sixième embrasse l'étendue & le prix des terres, les peuples, les maisons, l'industrie, l'économie, les manufactures, le commerce, la pêche, les artisans, les marins ou gens de mer, les troupes de terre, les revenus publics, les intérêts, les taxes, le lucre, les banques, les compagnies, le prix des hommes, l'accroissement de la marine & des troupes; les habitations, les lieux, les constructions de vaisseaux, les forces de mer, &c. relativement à tout pays en général, mais particulièrement à l'Angleterre, la Hollande, la Zélande, & la France. Cet essai est adressé au Roi; c'est presque dire que les résultats en sont favorables à la nation anglaise. C'est le plus important de tous les essais du chevalier Petty; cependant il est très-court, si on le compare à la multitude & à la complication des objets. Le chevalier Petty prétend avoir démontré dans environ une centaine de petites pages in-12, gros caractère : 1.^o Qu'une petite contrée avec un petit nombre d'habitans peu équivaloir par sa situation, son commerce & sa police, à un grand pays & à un peuple nombreux, soit qu'on les compare par la force ou par la richesse, & qu'il n'y a rien qui tende plus efficacement à établir cette égalité que la marine & le commerce maritime. 2.^o Que toutes sortes d'impôts & de taxes publiques rendent plutôt à augmenter qu'à affaiblir la société & le bien public. 3.^o Qu'il y a des empêchemens naturels & durables à jamais, à ce que la France devienne plus puissante par mer que l'Angleterre ou la Hollande: nos français ne porteront pas un jugement favorable des calculs du chevalier Petty sur cette proposition, & je crois qu'ils auront raison. 4.^o Que par son fonds & son produit naturels, le peuple & le territoire de l'Angleterre sont à-peu-près égaux en richesse & en force au peuple & au territoire de France. 5.^o Que les obstacles qui s'opposent à la grandeur de l'Angleterre, ne sont que contingens & amovibles. 6.^o Que depuis quarante ans la puissance & la richesse de l'Angleterre se sont fort accrues. 7.^o Que la dixième partie de toute la dépense des sujets du roi suffiroit pour entretenir cent mille hommes d'infanterie, trente mille hommes de cavalerie, quarante mille hommes de mer; & pour acquitter toutes les autres charges de l'état, ordinaires & extraordinaires, dans la seule supposition que cette dixième partie seroit bien imposée, bien perçue & bien employée. 8.^o Qu'il y a plus de sujets dans un emploi qu'il n'en faudroit pour procurer à la nation deux millions par an, s'ils étoient convenablement occupés, & que ces occupations font toutes prêtes, & naissent de ces ouvriers. 9.^o Que la nation a assez d'argent pour faire aller son commerce.

10.^o Enfin que la nation a tout autant de ressources qu'il lui en faut pour embrasser tout le commerce de l'univers, de quelque nature qu'il soit.

Voilà comme on voit des prétentions bien excessives; mais quelles qu'elles soient, le lecteur fera bien d'examiner dans l'ouvrage du chevalier Petty les raisonnemens & les expériences sur lesquels il s'appuie: dans cet examen, il ne faudra pas oublier qu'il arrive des révolutions, soit en bien, soit en mal, qui changent en un moment la face des états, & qui modifient & même anéantissent les suppositions; & que les calculs & leurs résultats ne sont pas moins variables que les événemens. L'ouvrage du chevalier Petty fut composé avant 1699. Selon cet auteur, quoique la Hollande & la Zélande ne contiennent pas plus de 1,000,000 d'arpens de terre, & que la France en contienne au moins 8,000,000, cependant ce premier pays a presque un tiers de la richesse & de la force de ce dernier. Les rentes des terres en Hollande sont à proportion de celles de France, comme de 7 ou 8 à 1. (Observez qu'il est question ici de l'état de l'Europe en 1699; & c'est à cette année que se rapportent tous les calculs du chevalier Petty, bons ou mauvais). Les habitans d'Amsterdam sont $\frac{2}{3}$ de ceux de Paris ou de Londres; & la différence entre ces deux dernières villes n'est, selon le même auteur, que d'environ une vingtième partie. Le port de tous les vaisseaux appartenans à l'Europe, se montent à environ deux millions de tonneaux, dont les anglais ont 500,000, les Hollandais 900,000, les Français 100,000, les Hambourgeois, Danois, Suédois, & les habitans de Danzick 250,000; l'Espagne, le Portugal, l'Italie, &c. à-peu-près autant. La valeur des marchandises qui forment annuellement de la France, pour l'usage de différens pays, se monte en tout à environ 5,000,000 livres sterling; c'est-à-dire, quatre fois autant qu'il en entre dans l'Angleterre seule. Les marchandises qu'on fait sortir de la Hollande pour l'Angleterre valent 300,000 livres sterling; & ce qui sort de-là pour être répandu par tout le reste du monde, vaut 18,000,000 livres sterling. L'argent que le roi de France leve annuellement en tems de paix fait environ 6 $\frac{1}{2}$ millions sterling. Les sommes levées en Hollande & Zélande sont autour de 2,100,000 l. sterling; & celles provenant de toutes les Provinces-unies sont ensemble environ 3,000,000 liv. sterling. Les habitans d'Angleterre sont à-peu-près au nombre de 6,000,000; & leurs dépenses à raison de 7 livres sterling par an, pour chacun d'eux, font 42,000,000 liv. sterling, ou 8000 liv. sterling par semaine. La rente des terres en Angleterre est d'environ 8,000,000 sterling; & les intérêts & profits des biens propres à-peu-près autant. La rente des maisons en Angleterre 4,000,000 l. sterling. Le profit du travail de tous les habitans se monte à 26,000,000 livres sterling par an. Les habitans d'Irlande sont au nombre de 1,100,000.

Le bled conformément en Angleterre, comptant le froment à 5 schellings le boisseau, & l'orge à 2 $\frac{1}{2}$, se monte à dix millions sterlin. La marine d'Angleterre avoit besoin en 1699, c'est-à-dire, du tiers du chevalier Petty, ou à la fin du dernier siècle, de 36,000 hommes pour les vaisseaux de guerre, & 48,000 pour les vaisseaux marchands & autres; & il ne falloit pour toute la marine de France que 15,000 hommes. Il y a en France environ treize millions & demi d'ames; & en Angleterre, & Ecoffe & Irlande, environ neuf millions & demi. Dans les trois royaumes d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande, il y a environ 20,000 ecclésiastiques; & en France, il y en a plus de 270,000. Le royaume d'Angleterre a plus de 40,000 matelots, & la France n'en a pas plus de 10,000. Il y avoit pour lors en Angleterre, en Ecoffe, en Irlande, & dans les pays qui en dépendent, des vaisseaux dont le port se montoit environ à 60,000 tonneaux, ce qui vaut à-peu-près quatre millions & demi de livres sterlin. La ligne marine autour de l'Angleterre, de l'Ecoffe, de l'Irlande, & des lies adjacentes, est d'environ 3,800,000 mille. Il y a dans le monde entier environ 300,000,000 d'ames, dont il n'y a qu'environ 80,000,000 avec lesquels les anglois & les hollandois soient en commerce. La valeur de tous les effets de commerce ne passe pas 45,000,000 sterlin. Les manufactures d'Angleterre qu'on fait sortir du royaume se montent annuellement à environ 5,000,000 l. sterlin. Le plomb, le fer-blanc & le charbon, à 500,000 l. sterlin par an. La valeur des marchandises de France qui entrent en Angleterre, ne passe pas 1,200,000 livres sterlin par an. Enfin il y a en Angleterre environ 6,000,000 sterlin d'espèces monnoyées. Tous ces calculs, comme nous l'avons dit, sont relatifs à l'année 1699, & ont dû sans doute bien changer depuis.

M. Davenant, autre auteur d'*arithmetic politique*, prouve qu'il ne faut pas compter absolument sur plusieurs des calculs du chevalier Petty; il en donne d'autres qu'il a faits lui-même, & qui se trouvent fondés sur les observations de M. King. En voici quelques-uns.

L'Angleterre contient, dit-il, 39,000,000 d'arpens de terre. Les habitants, selon son calcul, sont à-peu-près au nombre de 5,545,000 ames, & ce nombre augmente sous les ans d'environ 9000, déduction faite de ceux qui peuvent périr par les pestes, les maladies, les guerres, la marine, &c. & de ceux qui vont dans les colonies. Il compte 530,000 habitants dans la ville de Londres; dans les autres villes & bourgs d'Angleterre 870,000, & dans les villages & hameaux 4,100,000. Il estime la rente annuelle des terres à 10,000,000 sterlin; celle des maisons & des bâtimens à 2,000,000 par an; le produit de toutes sortes de grains, dans une année passablement abondante, à 9,275,000 liv. sterlin; la rente annuelle des terres en bled à 2,000,000, & leur produit net au-dessus

de 9,000,000 sterlin; la rente des pâturages, des prairies, des bois des forêts, des dunes, &c. à 7,000,000 sterlin; le produit annuel des bestiaux en beurre, fromage & lait, peut monter, selon lui, à environ 2 $\frac{1}{2}$ millions sterlin. Il estime la valeur de la laine tondue annuellement à environ 2,000,000 sterlin; celle des chevaux, qu'on élève tous les ans à environ 150,000 liv. sterlin; la consommation annuelle de viande pour nourrir, à environ 3,350,000 liv. sterlin; celle du suif & des cuirs environ 600,000 liv. sterlin; celle du foin pour la nourriture annuelle des chevaux, environ 1,300,000 liv. sterlin; & pour celle des autres bestiaux, 1,000,000 sterlin; le bois de bâtiment coupé annuellement 500,000 liv. sterlin. Le bois à brûler, &c. environ 500,000 livres sterlin. Si toutes les terres d'Angleterre étoient également distribuées parmi tous les habitants, chacun auroit pour sa part environ 7 $\frac{1}{2}$ arpens. La valeur du froment, du seigle & de l'orge, nécessaire pour la subsistance de l'Angleterre, se monte au moins à 6,000,000 sterlin par an. La valeur des manufactures de laines travaillées en Angleterre est d'environ 8,000,000 par an; & toutes les marchandises de laine qui sortent annuellement de l'Angleterre, passent la valeur de 2,000,000 sterlin. Le revenu annuel de l'Angleterre, sur quoi tous les habitants se nourrissent & s'entretiennent, & payent tous les impôts & taxes, se monte, selon lui, à environ 43,000,000; celui de la France à 81,000,000, & celui de la Hollande à 18,250,000 livres sterlin.

Le major Grant, dans ses observations sur les *listes mortuaires*, compte qu'il y a en Angleterre 39,000 quarres de terre; qu'il y a en Angleterre & dans la principauté de Galles 4,600,000 ames; que les habitants de la ville de Londres sont à-peu-près au nombre de 640,000; c'est-à-dire, la quatorzième partie de tous les habitants de l'Angleterre; qu'il y a en Angleterre & dans le pays de Galles, environ 10,000 paroisses; qu'il y a 25,000,000 d'arpens de terre en Angleterre & dans le pays de Galles, c'est-à-dire, environ 4 arpens pour chaque habitant; que de 100 enfans qui naissent, il n'y en a que 64 qui atteignent l'âge de 6 ans; que dans 100, il n'en reste que 40 en vie au bout de 16 ans; que dans 100, il n'y en a que 25 qui passent l'âge de 26 ans; que 16 qui vivent 36 ans accomplis, & 10 seulement dans 100 vivent jusqu'à la fin de leur 46^e année; & dans le même nombre, qu'il n'y en a que 6 qui aillent à 56 ans accomplis; que 3 dans 100 qui atteignent la fin de 66 ans; & que dans 100 il n'y en a qu'un qui soit en vie au bout de 76 ans, & que les habitants de la ville de Londres sont changés deux fois dans le cours d'environ 64 ans. Veyer Vix, &c. MM. de Moivre, Bernoulli, de Montmort & de Parcieux, se sont exercés sur des sujets relatifs à l'*Arithmétique politique*; on peut consulter la doctrine des hasards, de

M. de Moivre; l'art de conjecturer, de M. Bernoulli; l'analyse des jeux de hasard, de M. de Moivre; l'ouvrage sur les rentes viagères & les tontines, &c. de M. de Parcieux, & quelques mémoires de M. Halley, répandus dans les *Transactions philosophiques*, avec les articles de notre Dictionnaire, HASARD, JEU, PROBABILITÉ, COMBINAISON, ASENT, VIE, MORT, NAISSANCE, ANNUITÉ, RENTE, TONTINE, &c. (M. DIDEROT).

L'*Aritmétique politique* est, dans un sens plus étendu, l'application du calcul aux sciences politiques. Cette branche des Mathématiques a trois objets principaux, comme toutes celles qui ont pour but l'application du calcul à la connaissance de la nature : ainsi, on peut la diviser en trois parties; la première est l'art de se procurer des faits précis & tels que le calcul puisse s'y appliquer, & de réduire les faits particuliers qui ont été observés à des résultats plus ou moins généraux; la seconde a pour objet de tirer de ces faits les conséquences auxquels ils conduisent; la troisième enfin doit enseigner à déterminer la probabilité de ces faits & de ces conséquences.

Dans la plupart des sciences physiques on néglige presque absolument cette 3^e partie, parce que les faits sur lesquels on s'appuie, & par conséquent les conséquences qu'on en déduit, ont une probabilité très-approchée de la certitude; que d'ailleurs les faits sont presque toujours susceptibles d'être connus avec une très-grande précision, ce qui dispense de rechercher avec quel degré de probabilité on peut se répondre que les erreurs ne seront pas au-delà de certaines limites; & qu'enfin toutes les fois que ces faits ou leurs conséquences ne doivent pas servir de base à notre conduite, il est en général peu important de déterminer avec exactitude leur degré de probabilité.

Ainsi, par exemple, si on a découvert une nouvelle planète, on cherche d'abord à s'en procurer des observations exactes; on déduit ensuite de ces observations les éléments de son orbite; mais personne ne songe à déterminer quel est le degré de probabilité qu'on ne s'est pas écarté de la vérité d'une quantité plus ou moins grande, soit parce qu'on fait d'avance que cette probabilité diffère peu de la certitude, soit parce que la connaissance exacte de cette probabilité seroit absolument inutile; & qu'il suffit de savoir qu'elle est ou fort grande ou très-petite.

Au contraire, si on applique le calcul à des questions de médecine pratique, comme il faudroit régler la conduite d'après les résultats de ce calcul, il seroit indispensable de s'assurer de leur degré de probabilité.

La plupart des questions d'*Aritmétique politique* sont dans ce dernier cas.

Par exemple, supposons qu'on veuille calculer le taux d'une rente viagère, il ne suffit pas de

se procurer des tables de mortalité exactes & applicables à la question qu'on se propose de résoudre, & d'en déduire par le calcul le taux de cette rente, il faut de plus déterminer la probabilité que, par l'événement, le taux réel ne s'écartera pas de celui que donne le calcul au-delà de certaines limites.

L'*Aritmétique politique* n'a commencé à être une science que vers la fin du siècle dernier, & il paroît que c'est en Angleterre qu'elle a pris naissance: il y a lieu de croire que les anciens n'en ont eu aucune idée. Les loix romaines assujettissoient les successeurs testamentaires à un droit envers le Fils; & comme pour éluder la loi on se bornoit à léguer un simple usufruit, on imagina d'assujettir cet usufruit à une partie du droit. La proportion qu'il convient d'établir entre le droit payé pour la propriété & celui qu'il faut payer pour l'usufruit, est une question d'*Aritmétique politique* assez compliquée; mais on a lieu de croire que les romains ne faisoient pas même que cette question pût exister, & qu'ils fixèrent cette proportion au hasard.

Les recherches que l'on a faites sur cette science depuis le commencement de ce siècle, se bornent à des tables en général très-peu précises des productions de différens pays, & de l'étendue de leur commerce, du profit annuel qui en résulte, à l'examen de quelques questions de droit. (Voyez la thèse de Nicolas Bernoulli, citée à l'article ASENT) au calcul des annuités & des différens espèces d'intérêts, à celui des rentes viagères, des tontines & des autres emprunts de ce genre, au calcul des différentes formes de loterie, à la manière de former les tables de mortalité, & d'en déduire des conséquences qui intéressent à-la-fois la politique & l'histoire naturelle de l'homme.

On ne peut regarder ces recherches que comme une très-petite partie d'une des sciences les plus étendues & les plus utiles. En général, les géomètres se sont plus occupés des méthodes de calcul que de l'examen des principes d'après lesquels chaque question devoit être résolue; ils n'ont presque traité que celles pour lesquelles la nécessité & la possibilité d'y appliquer le calcul se faisoit sentir au premier coup-d'œil, & ils ont rarement cherché à y soumettre les objets qui paroissent devoir s'y refuser; enfin ils n'ont point étendu les principes & les méthodes de calcul qu'ils ont employées aux différentes questions auxquelles ces principes & ces calculs peuvent s'appliquer. Leur but principal étoit le progrès de l'analyse mathématique plutôt que celui des sciences politiques.

Nous chercherons dans plusieurs articles de ce Dictionnaire à faire sentir toute l'importance & toute l'étendue d'une science qu'on doit regarder encore comme presque nouvelle, & qui ne peut faire de grands progrès qu'autant qu'elle sera cul-

divés par des hommes qui joindront à une connoissance approfondie des sciences politiques, des talens pour la Géométrie. Voyez les articles *ÉVÉNEMENTS*, *PROBABILITÉ DES DÉCISIONS*, *PREUVE*, *PRODUIT*, *PRIX*, *POPULATION*, *SALUBRITÉ*, *OPINIONS*, &c. (*M. D. C.*)

ARITHMÉTIQUE, pris adjectivement, se dit de tout ce qui a rapport aux nombres, ou à la science des nombres, ou qui s'exécute par le moyen des nombres. On dit opération arithmétique, de toute opération sur les nombres.

MOYEN arithmétique.

PROGRESSION arithmétique.

PROPORTION arithmétique.

RAPPORT arithmétique.

MOYEN.

PROGRESSION.

PROPORTION.

RAPPORT.

Triangle arithmétique. Voyez TRIANGLE.

Échelles arithmétiques, est le nom que donne M. de Buffon (*Mém. Acad. 1741*) aux différentes progressions de nombres, suivant lesquelles l'Arithmétique auroit pu être formée. Pour entendre ceci, il faut observer que notre Arithmétique ordinaire s'exécute par le moyen de dix chiffres, & qu'elle a par conséquent pour base la progression arithmétique décuple ou dénaire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voyez PROGRESSION, &c. Il est vraisemblable, comme nous l'avons remarqué plus haut, que cette progression doit son origine au nombre des doigts des deux mains, par lesquels on a dû naturellement commencer à compter : mais il est visible aussi que cette progression en elle-même est arbitraire, & qu'au lieu de prendre dix caractères pour exprimer tous les nombres possibles, on auroit pu en prendre moins ou plus de dix. Supposons, par exemple, qu'on en eût pris cinq seulement, 0, 1, 2, 3, 4 ; en ce cas tout nombre passé cinq, auroit eu plus d'un chiffre, & cinq auroit été exprimé par 10 ; car 1 dans la seconde place, qui dans la progression ordinaire vaut dix fois plus qu'à la première place, ne vaudroit dans la progression quintuple que cinq fois plus. De même 11 auroit représenté 6 ; 25 auroit été représenté par 100, & tout nombre au-dessus de 25, auroit eu trois chiffres ou davantage. Au contraire si on prenoit vingt chiffres ou caractères pour représenter les nombres, tout nombre au-dessous de 20 n'auroit qu'un chiffre ; tout nombre au-dessous de 400 n'en auroit que deux, &c.

La progression la plus courte dont on puisse se servir pour exprimer les nombres, est celle qui est composée de deux chiffres seulement, 0, 1, & c'est ce que M. Leibnitz a nommé *Arithmétique binaire*. Voyez BINAIRE. Cette Arithmétique auroit l'inconvénient d'employer un trop grand nombre de chiffres pour exprimer des nombres

assez petits, & il est évident que cet inconvénient aura d'autant plus lieu, que la progression qui servira de base à l'Arithmétique, aura moins de chiffres. D'un autre côté, si on employoit un trop grand nombre de chiffres pour l'Arithmétique, par exemple vingt ou trente chiffres au lieu de dix, les opérations sur les nombres deviendroient trop difficiles ; je n'en veux pour exemple que l'addition. Il y a donc un milieu à garder ici, & la progression décuple, outre son origine qui est assez naturelle, paroit tenir ce milieu : cependant il ne faut pas croire que l'inconvénient fût fort grand, si on avoit pris neuf ou douze chiffres au lieu de dix. Voyez CHIFFRE & NOMBRE.

M. de Buffon, dans le mémoire que nous avons cité, donne une méthode fort simple & fort abrégée pour trouver tout d'un coup la manière d'écrire un nombre donné dans une échelle arithmétique quelconque, c'est-à-dire, en supposant qu'on se serve d'un nombre quelconque de chiffres pour exprimer les nombres. Voyez BINAIRE. (O)

* ARITHMÉTIQUE (*machine*) ; c'est un assemblage ou système de roues & d'autres pièces, à l'aide desquelles des chiffres ou imprimés ou gravés se meuvent, & exécutent dans leur mouvement les principales règles de l'Arithmétique.

La première machine arithmétique qui ait paru ; est de Blaise Pascal, né à Clermont en Auvergne le 19 juin 1623 ; il l'inventa à l'âge de dix-neuf ans. On en a fait quelques autres depuis lui, au jugement même de M. de l'Académie des Sciences, paroissent avoir sur celle de Pascal des avantages dans la pratique : mais celle de Pascal est la plus ancienne ; elle a pu servir de modèle à toutes les autres : c'est pourquoi nous l'avons préférée.

Cette machine n'est pas extrêmement compliquée ; mais entre ses pièces il y en a une sur-tout qu'on nomme le *sautoir*, qui se trouve chargée d'un si grand nombre de fonctions, que le reste de la machine en devient très-difficile à expliquer. Pour se convaincre de cette difficulté, le lecteur n'a qu'à jeter les yeux sur les figures du recueil des machines approuvées par l'Académie, & sur le discours qui a rapport à ces figures & à la machine de Pascal : je suis sûr qu'il lui paroitra, comme à nous, presque aussi difficile d'entendre la machine de Pascal, avec ce qui en est dit dans l'ouvrage que nous venons de citer, que d'imaginer une autre machine arithmétique. Nous allons faire en sorte qu'on ne puisse pas porter le même jugement de notre article, sans toutefois nous engager à exposer le mécanisme de la machine de Pascal d'une manière si claire, qu'on n'ait besoin d'aucune convention d'esprit pour le saisir. Au reste, cet endroit de notre Dictionnaire ressemblera à beaucoup d'autres, qui ne sont destinés qu'à ceux qui ont quelque habitude de s'appliquer.

Les

Les parties de la machine arithmétique se ressemblant presque toutes par leur figure, leur disposition & leur jeu, nous avons cru qu'il étoit inutile de représenter la machine entière: la portion qu'on en voit *Pl. II. d'arithmétique*, suffira pour en donner une juste idée. *N O P R*, fig. 1, est une plaque de cuivre qui forme la surface supérieure de la machine. On voit à la partie inférieure de cette plaque, une rangée *N O* de cercles *Q*, *Q*, *Q*, &c. tous mobiles, autour de leurs centres *Q*. Le premier à la droite a douze dents; le second, en allant de droite à gauche, en a vingt; & tous les autres en ont dix. Les pièces qu'on aperçoit en *S*, *S*, *S*, &c., & qui s'avancent sur les disques des cercles mobiles *R*, *R*, *R*, &c., sont des étiochios ou arrêts qu'on appelle *potences*. Ces étiochios sont fixes & immobiles; ils ne posent point sur les cercles qui se peuvent mouvoir librement sous leurs pointes; ils ne servent qu'à arrêter un stylet, qu'on appelle *directeur*, qu'on tient à la main, & dont on place la pointe entre les dents des cercles mobiles *Q*, *Q*, *Q*, &c. pour les faire tourner dans la direction 6, 5, 4, 3, &c. quand on se sert de la machine.

Il est évident par le nombre des dents des cercles mobiles *Q*, *Q*, *Q*, &c. que le premier à droite marque les deniers; le second en allant de droite à gauche, les sous; le troisième, les unités de livres; le quatrième, les dixaines; le cinquième, les centaines; le sixième, les mille; le septième, les dixaines de mille; le huitième, les centaines de mille; & quoiqu'il n'y ait que huit, on auroit pu, en agrandissant la machine, pousser plus loin le nombre de ces cercles.

La ligne *Y Z* est une rangée de trous, à-travers lesquels on aperçoit des chiffres. Les chiffres aperçus ici sont 46,309 l. 15 f. 10 d. mais on verra par la suite qu'on en peut faire paroître d'autres à discrétion par les mêmes ouvertures.

La bande *P R* est mobile de bas en haut; on peut en la prenant par ses extrémités *R*, *P*, la faire descendre sur la rangée des ouvertures 46,309 l. 15 f. 10 d. qu'elle couvrirait; mais alors on apercevrait une autre rangée parallèle de chiffres à-travers des trous placés directement au-dessus des premiers.

La même bande *P R* porte des petites roues gravées de plusieurs chiffres, toutes avec une aiguille au centre, à laquelle la petite roue sert de cadran: chacune de ces roues portent autant de chiffres que les cercles mobiles *Q*, *Q*, *Q*, &c. auxquelles elles correspondent perpendiculairement. Ainsi, *V* 1 porte douze chiffres ou plutôt à douze divisions; *V* 2 en a vingt; *V* 3 en a dix; *V* 4 dix; &c. ainsi de suite.

A B C D, fig. 2. est une tranche verticale de la machine, faite selon une des lignes ponctuées *m x*, *m x*, *m x*, &c. de la figure 1, n'importe laquelle; car chacune de ces tranches, comprise entre deux parallèles *m x*, *m x*, contient toutes

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

les parties de la fig. 2: outre quelques autres dont nous ferons mention dans la suite. 1 *Q* 2 représente un des cercles mobiles *Q* de la fig. 1, ce cercle entraîne par son axe *Q* 3, la roue à chevilles 4, 5. Les chevilles de la roue 4, 5, font mouvoir la roue 6, 7, la roue 8, 9, & la roue 10, 11, qui sont toutes fixées sur un même axe. Les chevilles de la roue 10, 11, engrennent dans la roue 12, 13, & la font mouvoir, & avec elle le barillet 14, 15.

Sur le barillet 14, 15, même fig. 2, soient tracées l'une au-dessus de l'autre, deux rangées de chiffres de la manière qu'on va dire. Si l'on suppose que ce barillet soit celui de la tranche des deniers, soient tracées les deux rangées:

0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Si le barillet 14, 15, est celui de la tranche des sous, soient tracées les deux rangées:

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10;
19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Si le barillet 14, 15, est celui de la tranche des unités de livres, soient tracées les deux rangées:

0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Il est évident, 1.^o que c'est de la rangée inférieure des chiffres tracés sur les barillots, que quelques-uns paroissent à-travers les ouvertures de la ligne *X Z*, & que ceux qui paroissent à-travers les ouvertures couvertes de la bande mobile *P R*, sont de la rangée supérieure. 2.^o Qu'en tournant, fig. 1, le cercle mobile *Q*, on arrêtera sous une des ouvertures de la ligne *X Z*, tel chiffre que l'on voudra; & que le chiffre retranché de 11 sur le barillet des deniers, donnera celui qui lui correspond dans la rangée supérieure des deniers; retranché de 29 sur le barillet des sous, il donnera celui qui lui correspond dans la rangée supérieure des sous; retranché de 9 sur le barillet des unités de livres, il donnera celui qui lui correspond dans la rangée supérieure des unités de livres, & ainsi de suite. 3.^o Que pareillement celui de la bande supérieure du barillet des deniers, retranché de 11, donnera celui qui lui correspond dans la rangée inférieure, &c.

La pièce *a b c d e f g h i k l*, qu'on entrevoit, même fig. 2. est celle qu'on appelle le *fautoir*. Il est important d'en bien considérer la figure, la position & le jeu; car sans une connoissance très-exacte de ces trois choses, il ne faut pas espérer d'avoir une idée précise de la machine: aussi avons-nous répété cette pièce en trois figures différentes,

a b c d e f g h i k l, fig. 2, est le futoir, comme nous venons d'en avvertir : 1 2 3 4 6 7 *x y T z v*, l'est aussi, fig. 3. & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l'est encore, fig. 4.

Le futoir, fig. 2, a deux anneaux ou portions de douilles, dans lesquelles passe la portion *f k* & *g l* de l'axe de la roue à chevilles 8 9 ; il est mobile sur cette partie d'axe. Le futoir fig. 3, a une concavité ou partie échancrée 3, 4, 5 ; un coude 7, 8, 9, pratiqués pour laisser passer les chevilles de la roue 8, 9 ; deux anneaux dont on voit un en 9, l'autre est couvert par une portion de la roue 6, 7 ; à la partie inférieure de l'échancrure 3, 4, 5 ; en 2, une espèce de coulisse, dans laquelle le cliquet 1 est suspendu par le tenon 2, & pressé par un ressort entre les chevilles de la roue 8, 9. Pour qu'on aperçoive ce ressort & son effet, on a rompu, fig. 3, un des côtés de la coulisse en *x, y* ; 12 est le cliquet ; 2 le tenon qui le tient suspendu ; & *Z v* le ressort qui appuie sur son talon, & pousse son extrémité entre les chevilles de la roue 8, 9.

Ce qui précède bien entendu, nous pouvons passer au jeu de la machine. Soit figure 2, le cercle mobile *Q 2*, mis dans la direction *Q 2*, la roue à chevilles 4, 5, sera mise, & la roue à chevilles 6, 7 ; & fig. 3, la roue VIII, IX ; car c'est la même que la roue 8, 9 de la figure 2. Cette roue VIII, IX, sera mise dans la direction VIII, VIII, IX, IX. La première de ces deux chevilles *r, s*, entrera dans l'échancrure du futoir ; le futoir continuera d'être élevé, à l'aide de la seconde cheville *R S*. Dans ce mouvement, l'extrémité 1 du cliquet sera entraînée ; & se trouvant à la hauteur de l'entre-deux de deux chevilles immédiatement supérieur à celui où elle étoit, elle y sera poussée par le ressort. Mais la machine est construite de manière que ce premier échappement n'est pas plutôt fait, qu'il s'en fait un autre, celui de la seconde cheville *R S* de dessous la partie 3, 4, du futoir : ce second échappement laisse le futoir abandonné à lui-même ; le poids de sa partie 4 5 6 7 8 9, fait agir l'extrémité 1 du cliquet contre la cheville de la roue 8, 7, sur laquelle elle vient de s'appuyer par le premier échappement ; fait tourner la roue 8, 9, dans le sens 8, 8, 9, 9, & par conséquent aussi dans le même sens la roue 10, 11, & la roue 12, 13, en sens contraire, ou dans la direction 13, 13, 12 ; & dans le même sens que la roue 12, 13, le barillet 14, 15. Mais telle est encore la construction de la machine que, quand par le second échappement, celui de la cheville *R S* de dessous la partie 3, 4, du futoir, ce futoir se trouve abandonné à lui-même, il ne peut descendre & entraîner la roue 8, 9, que d'une certaine quantité déterminée. Quand il est descendu de cette quantité, la partie *T*, fig. 2. de la coulisse rencontre l'étochio *r* qui l'arrête.

Maintenant si l'on suppose 1.^e que la roue VIII, IX, a douze chevilles, la roue *X, XI* autant,

& la roue XII, XIII autant encore : 2.^e que la roue 8, 9 a vingt chevilles, la roue 10, 11 vingt, & la roue 12, 13, autant : 3.^e que l'extrémité *T* du futoir, figure 3, rencontre l'étochio *r* précisément quand la roue 8, 9, fig. 4, a tourné d'une vingtième partie, il s'enfuira évidemment que le barillet XIV, XV, fera un tour sur lui-même, tandis que le barillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que de la vingtième partie.

Si l'on suppose 2.^e que la roue VIII, IX a vingt chevilles, la roue *X, XI* autant, & la roue XII, XIII autant : 2.^e que la roue 8, 9, ait dix chevilles, la roue 10, 11 autant, & la roue 12, 13 autant : 3.^e que l'extrémité *T* du futoir soit arrêtée, figure 3, par l'étochio *r*, que quand la roue 8, 9, figure 4, a tourné d'une dixième partie, il s'enfuira évidemment que le barillet XIV, XV fera un tour entier sur lui-même, tandis que le barillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que de la dixième partie.

Si l'on suppose, 3.^e que la roue VIII, IX ait dix chevilles, la roue *X, XI* autant, & la roue XII, XIII autant : 2.^e que la roue 8, 9 ait pareillement dix chevilles, la roue 10, 11 autant, & la roue 12, 13 autant aussi : 3.^e que l'extrémité *T* du futoir fig. 3, ne soit arrêtée par l'étochio *r*, que quand la roue 8, 9, fig. 4, aura tourné d'un dixième, il s'enfuira évidemment que le barillet XIV, XV fera un tour entier sur lui-même, tandis que le barillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que d'un dixième.

On peut donc, en général, établir tel rapport qu'on voudra entre un tour entier du barillet XIV, XV, & la partie dont le barillet 14, 15 tournera dans le même sens.

Donc, si l'on écrit sur le barillet XIV, XV les deux rangées de nombre suivantes, l'une au-dessus de l'autre, comme on le voit,

0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

& sur le barillet 14, 15, les deux rangées suivantes, comme on le voit,

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,

19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

& que les zéros des deux rangées inférieures des barillots correspondent exactement aux intervalles *A, B*, il est clair qu'au bout d'une révolution du barillet XIV, XV, le zéro correspondra encore à l'intervalle *B* ; mais que ce sera le chiffre *I* du barillet 14, 15, qui correspondra dans le même sens à l'intervalle *A*.

Done, si l'on écrit sur le barillet XIV, XV les deux rangées suivantes, comme on les voit,

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,

19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

& sur le barillet 14, 15, les deux rangées suivantes, comme on les voit,

0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

& que les zeros des deux rangées inférieures des barillettes correspondent en même tems aux intervalles *A, B*, il est clair que dans ce cas, de même que dans le premier, lorsque le zero du barillet *XIV*, *XV* correspondra, après avoir fait un tour, à l'intervalle *B*, le barillet 14, 15 présentera à l'ouverture ou espace *A*, le chiffre 1.

Il en sera toujours ainsi, quel que soient les rangées de chiffres que l'on trace sur le barillet *XIV*, *XV*, & sur le barillet 14, 15; dans le premier cas, le barillet *XIV*, *XV* tournera sur lui-même, & présentera les douze caractères à l'intervalle *B*, quand le barillet 14, 15, n'ayant tourné que d'un vingtième, présentera à l'intervalle *A*, le chiffre 1. Dans le second cas, le barillet *XIV*, *XV* tournera sur lui-même, & présentera ses vingt caractères à l'ouverture ou intervalle *B*, pendant que le barillet 14, 15, n'ayant tourné que d'un dixième, présentera à l'ouverture ou intervalle *A*, le chiffre 1. Dans le troisième cas, le barillet *XIV*, *XV* tournera sur lui-même, & aura présenté ses dix caractères à l'ouverture *B*, quand le barillet 14, 15, n'ayant tourné que d'un dixième, présentera à l'ouverture ou intervalle *A*, le chiffre 1.

Mais au lieu de faire toutes ces suppositions sur deux barillettes, je peux les faire sur un grand nombre de barillettes, tous assemblés les uns avec les autres, comme on voit ceux de la fig. 4. Rien n'empêche de supposer à côté du barillet 14, 15 un autre barillet placé par rapport à lui, comme il est placé par rapport au barillet *XIV*, *XV*, avec les mêmes roues, un sautoir & tout le reste de l'assemblage. Rien n'empêche que je ne puisse supposer douze chevilles à la roue *VIII*, *IX* & les deux rangées 0, 11, 10, 9, &c. tracées

11, 0, 1, 2, &c.

sur le barillet *XIV*, *XV*, vingt chevilles à la roue 8, 9, & les deux rangées 0, 19, 18, 17, 16, 15, &c.

19, 0, 1, 2, 3, 4, &c.

tracées sur le barillet 14, 15; dix chevilles à la première, pareille à la roue 8, 9, & les deux rangées 0, 9, 8, 7, 6, &c. sur le troisième ba-

9, 0, 1, 2, 3, &c.

rillet; dix chevilles à la seconde pareille de 8, 9, & les deux rangées 0, 9, 8, 7, 6, &c. sur le

9, 0, 1, 2, 3, &c.

quatrième barillet; dix chevilles à la troisième pareille de 8, 9, & les deux rangées 0, 9, 8, 7, 6, &c.

9, 0, 1, 2, 3, &c.

sur le cinquième barillet, & ainsi de suite.

Rien n'empêche de supposer que tan-

dis que le premier barillet présentera ses douze chiffres à son ouverture; le second ne présentera plus que le chiffre 1 à la sienne; que tandis que le second barillet présentera ses vingt chiffres à son ouverture, ou intervalle, le troisième ne présentera que le chiffre 1; que tandis que le troisième barillet présentera ses dix caractères à son ouverture, le quatrième n'y présentera que le chiffre 1; que tandis que le quatrième barillet présentera ses dix caractères à son ouverture, le cinquième barillet ne présentera à la sienne que le chiffre 1, & ainsi de suite.

D'où il s'ensuivra, 1.^o qu'il n'y aura aucun nombre qu'on ne puisse écrire avec ces barillettes; car après les deux échappements, chaque équipage de barillet demeure isolé, est indépendant de celui qui le précède du côté de la droite, peut tourner sur lui-même tant qu'on voudra dans la direction *VIII*, *VIII*, *IX*, & par conséquent offrir à son ouverture celui des chiffres de la rangée inférieure qu'on jugera à propos: mais les intervalles *A, B*, sont aux cylindres nuds *XIV*, *XV*, 14, 15, ce que leur sont les ouvertures de la ligne *Y, X*, fig. 1, quand ils sont couverts de la plaque *NO RP*.

2.^o Que le premier barillet marquera des deniers, le second des sous, le troisième des unités de livres, le quatrième des dizaines, le cinquième des centaines, &c.

3.^o Qu'il faut un tour du premier barillet, pour un vingtième du second; un tour du second, pour un dixième du troisième; un tour du troisième, pour un dixième du quatrième; & que par conséquent les barillettes suivent entre leurs mouvements la proportion qui règne entre les chiffres de l'Arithmétique, quand ils expriment des nombres; que la proportion des chiffres est toujours gardée dans les mouvements des barillettes, quelle que soit la quantité des tours qu'on fasse faire au premier, ou au second ou au troisième, & que par conséquent de même qu'on fait les opérations de l'Arithmétique avec des chiffres, on peut les faire avec les barillettes & les rangées de chiffres qu'ils ont.

4.^o Que, pour cet effet, il faut commencer par mettre tous les barillettes de manière que les zeros de leur rangée inférieure correspondent en même tems aux ouvertures de la bande *YZ*, & de la plaque *NO RP*; car si tandis que le premier barillet, par exemple, présente 0 à son ouverture, le second présente 4 à la sienne, il est à présumer que le premier barillet a déjà fait quatre tours; ce qui n'est pas vrai.

5.^o Qu'il est assez indifférent de faire tourner les barillettes dans la direction *VIII*, *VIII*, *IX*; que ce mouvement ne dérange rien à l'effet de la machine; mais qu'il ne faut pas qu'ils aient la liberté de rétrograder; & c'est aussi la fonction du cliquet supérieur *C* de la leur ôter.

Il permet, comme on voit, aux roues de tourner dans le sens *VIII*, *VIII*, *IX*: mais il les empêche de tourner dans le sens contraire.

6.^e Que les roues ne pouvant tourner que dans la direction VIII, VIII, IX, c'est de la ligne ou rangée de chiffres inférieure des barillets qu'il faut se servir pour écrire un nombre; par conséquent pour faire l'addition; & par conséquent encore pour faire la multiplication; & que comme les chiffres des rangées sont dans un ordre renversé, la soustraction se doit faire sur la rangée supérieure, & par conséquent aussi la division.

Mais tous ces corollaires s'éclairciront davantage par l'usage de la machine, & la manière de faire les opérations.

Mais, avant que de passer aux opérations, nous ferons observer encore une fois que chaque roue 6, 7, fig. 4, a sa correspondance 4, 5, fig. 2; & chaque roue, 4, 5, son cercle mobile Q; que chaque roue 8, 9, a son cliquet supérieur & son cliquet inférieur; que ces deux cliquets ont une de leurs fonctions communes; c'est d'empêcher les roues VIII, IX, 8, 9, de retrograder; enfin que le talon 1, pratiqué au cliquet inférieur, lui est essentiel.

Usage de la machine arithmétique pour l'addition. Commencez par couvrir de la bande P R, la rangée supérieure d'ouvertures, en sorte que cette bande soit dans l'état où vous la voyez fig. 1; mettez ensuite toutes les roues de la bande inférieure ou rangée à zéro; & soient les sommes à ajouter :

69 7 8
584 15 6
342 12 9

Prenez le conducteur; portez sa pointe dans la huitième denture du cercle Q, le plus à la droite; faites tourner ce cercle jusqu'à ce que l'arrêt ou la potence s vous empêche d'avancer.

Passés à la roue des sous, ou au cercle Q qui suit immédiatement celui sur lequel vous avez opéré en allant de la droite à la gauche; portez la pointe du conducteur dans la septième denture, à compter depuis la potence; faites tourner ce cercle jusqu'à ce que la potence s vous arrête; passez aux livres, aux dizaines, & faites la même opération sur leur cercle Q.

En vous y prenant ainsi, votre première somme sera évidemment écrite; opérez sur la seconde précisément comme vous avez fait sur la première, sans vous embarrasser des chiffres qui se présentent aux ouvertures, puis sur la troisième. Après votre troisième opération, remarquez les chiffres qui paraîtront aux ouvertures de la ligne YZ, ils marqueront la somme totale de vos trois sommes partielles.

Démonstration. Il est évident que si vous faites tourner le cercle Q des deniers de huit parties, vous aurez 8 à l'ouverture correspondante à ce cercle : Il est encore évident que si vous faites tourner le même cercle de six autres parties, comme il est divisé en douze, c'est la même chose que si vous l'aviez fait tourner de douze parties, plus 2,

mais en le faisant tourner de douze, vous auriez remis à zéro le barillet des deniers correspondant à ce cercle des deniers, puisqu'il eût fait un tour exact sur lui-même; mais il n'a pu faire un tour sur lui-même, que le second barillet, ou celui des sous n'ait tourné d'un vingtième, & par conséquent mis le chiffre 1 à l'ouverture des sous. Mais le chiffre des deniers n'a pu rester à zéro; car ce n'est pas seulement de douze parties que vous l'avez fait tourner, mais de douze parties plus deux. Vous avez donc fait en lui comme si le barillet des deniers étant à zéro, celui des sous à 1, vous eussiez fait tourner le cercle Q des deniers de deux dentures; mais en faisant tourner le cercle Q des deniers de deux dentures, on met le barillet des deniers à 2, ou ce barillet présente 2 à son ouverture. Donc le barillet des deniers offrira 2 à son ouverture, & celui des sous 1, mais 8 deniers & 6 deniers sont 14 deniers, ou un sou, plus 2 deniers; ce qu'il falloit en effet ajouter; & ce que la machine a donné. La démonstration sera la même pour tout le reste de l'opération.

Exemple de la soustraction. Commencez par baisser la bande P R sur la ligne XY d'ouvertures inférieures; écrivez la plus grande somme sur les ouvertures de la ligne supérieure, comme nous l'avons prescrit pour l'addition par le moyen du conducteur; faites l'addition de la somme à soustraire, ou de la plus petite avec la plus grande, comme nous l'avons prescrit à l'exemple de l'addition; cette addition faite, la soustraction se fera aussi. Les chiffres qui paraîtront aux ouvertures marqueront la différence des deux sommes, ou l'excès de la grande sur la petite, ce que l'on cherchoit.

Soit
9121 9 12
dont il faut soustraire 8989 16 11

Si vous exécutez ce que nous vous avons prescrit, vous trouverez aux ouvertures 131 9 3.

Démonstration. Quand j'écris le nombre 9121 l. 9 s. 2 d. pour faire paraître 2 à l'ouverture des deniers, je suis obligé de faire passer avec le directeur, onze dentures du cercle Q des deniers; car il y a à la rangée supérieure du barillet des deniers onze termes depuis 0 jusqu'à 2; si à ce doit s'ajouter encore 11, je tomberai sur 3; car il faut encore que je fasse faire onze dentures aux cercles Q; or comptant 11, depuis 2, on tombe sur 3. La démonstration est la même pour le reste. Mais remarquez que le barillet des deniers n'a pu tourner de 22, sans que le barillet des sous n'ait tourné d'un vingtième ou de douze deniers. Mais comme à la rangée d'en haut, les chiffres vont en retrogradant dans le sens que les barillets tournent; à chaque tour du barillet des deniers, les chiffres du barillet des sous diminuent d'une unité; c'est-à-dire que l'emprunt que l'on fait pour un barillet est acquitté sur l'autre, ou que la soustraction s'exécute comme à l'ordinaire.

Exemple de multiplication. Revenez aux ouvertures inférieures; faites remonter la bande P R sur les ouvertures supérieures; mettez toutes les roues à zero; par le moyen du conducteur, comme nous l'avons dit plus haut. Ou le multiplicateur n'a qu'un caractère, ou il en a plusieurs; s'il n'a qu'un caractère, on écrit, comme pour l'addition, autant de fois le multiplicande qu'il y a d'unités dans ce chiffre du multiplicateur; ainsi, la somme 1245 étant à multiplier par 3, j'écris ou pose trois fois cette somme à l'aide de mes roues & des cercles Q; après la dernière fois, il paroît aux ouvertures 3735, qui est en effet le produit de 1245 par 3.

Si le multiplicateur a plusieurs caractères, il faut multiplier tous les chiffres du multiplicande par chacun de ceux du multiplicateur, les écrire de la même manière que pour l'addition; mais il faut observer au second multiplicateur de prendre pour première roue celle des dizaines.

La multiplication n'étant qu'une espèce d'addition, & cette règle se faisant évidemment ici par voie d'addition, l'opération n'a pas besoin de démonstration.

Exemple de division. Pour faire la division, il faut se servir des ouvertures supérieures; faites donc descendre la bande P R sur les inférieures; mettez à zero toutes les roues fixes sur cette bande, & qu'on appelle *roues de quotient*; faites paroître aux ouvertures votre nombre à diviser, & opérez comme nous allons dire.

Soit la somme 65 à diviser par cinq; vous dites, en fix, cinq y est; & vous ferez tourner votre roue comme si vous vouliez additionner 5 & 6; cela fait, les chiffres des roues supérieures allant toujours en rétrogradant, il est évident qu'il ne paroît plus que 1 à l'ouverture où il paroisoit 6; car dans 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; 1 est le cinquième terme après 6.

Mais le diviseur 5 n'est plus dans 1, marquez donc 1 sur la roue des quotiens, qui répond à l'ouverture des dizaines; passez ensuite à l'ouverture des unités, ôtez-en 5 autant de fois qu'il sera possible, en ajoutant 5 au caractère qui paroît à cette ouverture ou zero, ou un nombre plus petit que cinq, & qu'il n'y ait que des zeros aux ouvertures qui précèdent: à chaque addition faites passer l'aiguille de la roue des quotiens qui est au dessous de l'ouverture des unités, du chiffre 1 sur le chiffre 2, sur le chiffre 3; en un mot, sur un chiffre qui ait autant d'unités que vous ferez de soustractions: ici, après avoir ôté trois fois 5 du chiffre qui paroisoit à l'ouverture des unités, il est venu zero; donc 5 est 13 fois en 65.

Il faut observer ici qu'en ôtant une fois 5 du chiffre qui paroît aux unités, il vient tout de suite zero à cette ouverture; mais que pour cela l'opération n'est pas achevée, parce qu'il reste une unité à l'ouverture des dizaines, qui fait, avec le zero qui suit, 10, qu'il faut épuiser; or il est évident

que 5 ôté deux fois de 10, il ne restera plus rien; c'est-à-dire que pour exhaustion totale, ou que pour avoir zero à toutes les ouvertures, il faut encore soustraire 5 deux fois.

Il ne faut pas oublier que la soustraction se fait exactement comme l'addition, & que la seule différence qu'il y ait, c'est que l'une le fait sur les nombres d'en bas, & l'autre sur les nombres d'en haut.

Mais si le diviseur a plusieurs caractères, voici comment on opérera: soit 9989 à diviser par 124, on ôtera 1 de 9, chiffre qui paroît à l'ouverture des mille; 2 du chiffre qui paroît à l'ouverture des centaines; & 5 du chiffre qui paroît à l'ouverture des dizaines, & l'on mettra l'aiguille des cercles du quotient, qui répond à l'ouverture des dizaines, sur le chiffre 1. Si le diviseur 124 peut s'ôter encore une fois de ce qui paroît, après la première soustraction, aux ouvertures des mille, des centaines & des dizaines, on l'ôtera & on tournera l'aiguille du même cercle du quotient sur 2, & on confirmera jusqu'à l'exhaustion la plus complète qu'il sera possible; pour cet effet, il faudra réitérer ici la soustraction huit fois sur les trois mêmes ouvertures; l'aiguille du cercle du quotient qui répond aux dizaines, sera donc sur 8, & il ne se trouvera plus aux ouvertures que 69, qui ne peut plus se diviser par 124; on mettra donc l'aiguille du cercle du quotient, qui répond à l'ouverture des unités, sur 9, ce qui marquera que 124 ôté 80 fois de 9989, il reste ensuite 69.

Manière de réduire les livres en sous & les sous en deniers. Réduire les livres en sous, c'est multiplier par 20 les livres données; & réduire les sous en deniers, c'est multiplier par douze. Voyez MULTIPLICATION.

Convertir les sous en livres & les deniers en sous, c'est diviser dans le premier cas par 20, & dans le second par douze. Voyez DIVISION.

Convertir les deniers en livres, c'est diviser par 240. Voyez DIVISION.

Il parut en 1715 une autre machine arithmétique, d'une composition plus simple que celle de M. Pascal, & que celle qu'on avoit déjà faites à l'imitation; elle est de M. de l'Epine; & l'Académie a jugé qu'elle contenoit plusieurs choses nouvelles & ingénieusement pensées. On la trouvera dans le recueil des machines: on y en verra encore une autre de M. Boissierdieu, dont l'Académie fait aussi l'éloge. Le principe de ces machines une fois connu, il y a peu de mérite à les varier: mais il falloit trouver ce principe; il falloit appercevoir que si l'on fait tourner verticalement de droite à gauche un barillet chargé de deux suites de nombres placées l'une au dessus de l'autre, en cette sorte, 0, 9, 8, 7, 6 &c.

9, 0, 1, 2, 3 &c.

l'addition se faisoit sur la rangée supérieure, & la

soustraction sur l'inférieure, précisément de la même manière. (*M. DIDEROT*).

A R M

ARMILLAIRE, adj. en *Astronomie*; c'est ainsi que l'on appelle une *sphère armillaire*, composée de plusieurs cercles de métal ou de bois, qui représentent différents cercles de la sphère du monde, mis ensemble dans leur ordre naturel. Ce mot *armillaire* est formé d'*armilla*, qui veut dire un bracelet. La sphère *armillaire* sert à aider l'imagination pour concevoir l'arrangement des cieux & le mouvement des corps célestes.

On en voit la représentation dans la première planche d'*Astronomie*; elle sera expliquée au mot *sphère*. Il y a cette différence entre le globe & la sphère *armillaire*, que la sphère est à jour, & ne contient précisément que les principaux cercles; au lieu que le globe est entièrement solide, & que les cercles y sont simplement tracés. Outre la sphère *armillaire*, qui représente les différents cercles qu'on imagine sur le globe terrestre ou céleste, il y a d'autres sphères *armillaires*, qui représentent les orbites ou les cercles que décrivent les planètes dans les différents systèmes. Ainsi, il y a la sphère *armillaire* de Ptolémée, celle de Copernic, celle de Tycho; ces différentes sphères représentent les différents arrangements des planètes, suivant ces astronomes. Mais quoique le système de Copernic soit le véritable, la sphère de Ptolémée est la plus usitée, & suffit pour les notions élémentaires, comme étant la plus simple.

ARMILLES, f. m. pl. (*Astronomie. Instrum.*) Les *armilles* d'Alexandrie sont célèbres dans l'*Astronomie*, par les observations de Tymochares & d'Eratosthène. La plus ancienne observation faite à Alexandrie sous le règne des Ptolémées, environ 294 ans avant J. C., sur la déclinaison de l'épi de la Vierge, fut faite avec ces *armilles*; & ces observations servirent à Hipparque pour découvrir le changement de situation des étoiles fixes ou la précession des équinoxes. Ces *armilles* consistoient probablement en deux cercles de cuivre, fixés dans le plan de l'équateur & du méridien, & peut-être un troisième cercle mobile, à-peu-près comme l'astrolabe que Ptolémée décrit dans l'*Almageste*. Ces *armilles* avoient une demi-aune de diamètre, suivant Proclus; & comme l'aune des anciens étoit, suivant quelques auteurs, la longueur des bras étendus, Flamsteed pensa que ces *armilles* pouvoient avoir trois pieds de diamètre. *Historia cælestis, prolegomena*, p. 19, 21, 30; & il croit qu'on pouvoit observer à cinq minutes près avec ces *armilles*. Ptolémée s'en servit aussi pour observer les équinoxes, depuis l'an 132 de J. C. jusqu'à l'an 147, à l'exemple d'Hipparque, dont Ptolémée rapporte de semblables observations; mais celles de Ptolémée sont tout-à-fait défectueuses.

Tycho-Brabé avoit aussi des *armilles* ou des

cercles mobiles les uns dans les autres, pour observer les positions des astres. Voyez PLANCHES D'*ASTRONOMIE*, fig. 229, où ces *armilles* équatoriales sont représentées. Le cercle extérieur *NZ* représente le méridien, & il est supposé en effet placé dans le plan du méridien; en sorte que le point *N* regarde directement le midi, & que le point *H* soit au nord: ce cercle étoit de cuivre poli, & divisé de minute en minute. Les autres cercles étoient seulement couverts de lames de cuivre. Autour de l'axe *PA*, tournent les deux cercles *FI* & *QN*; le cercle *FI* n'est point divisé, parce qu'il ne sert qu'à soutenir & porter l'équateur *NMR* qui est mobile. L'axe *PA* est de cuivre, & porte un cylindre *D* au centre de cette sphère. Les pinnules *R* & *N* qui sont sur l'équateur, sont de cuivre; elles servent à mesurer les distances des astres au méridien ou les angles horaires, & les différences d'ascension droite. On a même cet avantage avec un équateur mobile, c'est que lorsqu'on met un astre sur le degré d'ascension droite qui lui convient, on voit dans le méridien même l'ascension droite du milieu du ciel, dont les astronomes ont souvent besoin; d'où l'on conclut l'heure qu'il est quand on fait l'ascension droite du soleil.

Le cercle intérieur *VQC* est un cercle horaire, un cercle de déclinaison, on un méridien qui tourne autour de l'axe *PA*, & dont le plan est toujours perpendiculaire à celui de l'équateur *RMN*. On dirige ce méridien mobile vers l'astre dont on veut mesurer la déclinaison; & au moyen des pinnules mobiles *Q* ou *C*, & du cylindre *D* qui est au centre de l'instrument porté sur l'axe même, on s'aligne vers l'étoile dont la déclinaison se trouve marquée par la pinnule.

Toute cette machine étoit placée sur un pied de cuivre très-solide, qu'il faut concevoir au-dessous de *T*. (*D. L.*)

A R P

ARPENTAGE, f. m. (*Géométrie*.) C'est proprement l'art ou l'action de mesurer les terrains, c'est-à-dire, de prendre les dimensions de quelques portions de terre, de les décrire ou de les tracer sur une carte, & d'en trouver l'aire. Voy. MESURE & CARTE, &c.

L'*arpentage* est un art très-ancien: on croit même que c'est lui qui a donné naissance à la *Géométrie*. Voyez GÉOMÉTRIE.

L'*arpentage* a trois parties; la première consiste à prendre les mesures & à faire les observations nécessaires sur le terrain même; la seconde, à mettre sur le papier ces mesures & ces observations; la troisième, à trouver l'aire du terrain.

La première partie est proprement ce qu'on appelle l'*arpentage*; la seconde est l'art de lever ou de faire un plan; la troisième est le calcul du toisé.

De plus, la première se divise en deux parties, qui consistent à faire les observations des angles & à prendre les mesures des distances. On fait les observations des angles avec quelqu'un des instrumens suivans : le graphomètre, le demi-cercle, la planchette, la boussole, &c. On peut voir la description & la manière de faire usage de ces instrumens, aux articles GRAPHOMETRE, PLANCHETTE, BOUSSOLE, CERCLE d'Arpenteur, &c.

On mesure les distances avec la chaîne ou l'odomètre. Voyez la description & la manière d'appliquer ces instrumens, aux articles CHAÎNE & ODOMÈTRE ou COMPTE-PAS.

La seconde partie de l'arpentage s'exécute par le moyen du rapporteur & de l'échelle d'arpenteur. Voyez-en les usages aux articles RAPPORTEUR, ÉCHELLE, &c. Voy. aussi CARTE.

La troisième partie de l'arpentage se fait en réduisant les différentes divisions, les différens enclos, &c. en triangles, en quatriers, en parallélogrammes, en trapèzes, &c. mais principalement en triangles; après quoi l'on détermine l'aire ou la surface de ces différentes figures, suivant les règles exposées aux articles AIRE, TRIANGLE, QUARRÉ, &c.

La croix d'arpentage ou le bâton d'arpenteur est un instrument peu connu & encore moins usité en Angleterre, quoiqu'en France, &c. l'on s'en serve au lieu de graphomètre ou de quelque autre instrument semblable. Il est composé d'un cercle de cuivre, ou plutôt d'un limbe circulaire gradué, & de plus divisé en quatre parties égales par deux lignes droites qui se coupent au centre à angles droits; à chacune des quatre extrémités de ces lignes & au centre sont attachées deux pinules ou des visières, & le tout est monté sur un bâton. Voyez BATON. (E)

* Il s'est élevé depuis quelque temps une question relative à la pratique de l'arpentage. Il s'agit de savoir si, dans la mesure d'un terrain incliné, on doit prendre ou la superficie réelle ou celle de sa base horizontale.

Nous remarquerons d'abord que cette question n'est pas directement du ressort de la Géométrie. En effet, quelque manière qu'on prenne, il faudra nécessairement déterminer les limites du terrain qu'on mesure & son inclinaison sur l'horizon, & après cela, soit qu'on mesure sa base horizontale, soit qu'on mesure sa superficie, on voit que le résultat final détermine également le même terrain.

Mais l'arpentage est encore plus l'art de reconnoître, de partager & d'évaluer un champ, que celui d'en marquer la position, de le mesurer & de le diviser; & c'est dans cette partie civile & économique de l'art, qu'il peut seulement y avoir quelques difficultés qu'on résoudra facilement dans tous les cas, à l'aide des principes suivans.

1.^o On peut proposer de mesurer un tel nombre d'arpens de terre, pris dans un champ dont la position est donnée. Dans ce cas, il faut examiner

d'abord si cette quantité à prendre n'a pas été déterminée par un arpentage antérieur; & si cela est, & qu'on connoisse la méthode qu'on a suivie, il faut encore la suivre. Si c'est le premier arpentage, nous remarquerons que le seul but qu'on puisse avoir, est de prendre la méthode qui donne en général un produit de culture proportionnel à la mesure; ainsi, si le produit d'un plan incliné étoit à celui de sa base horizontale comme la superficie de ces deux plans, ce seroit la superficie du terrain incliné qu'il faudroit mesurer; mais c'est ce qu'on ne peut assurer. Car si la difficulté de la culture, les ravines, la dégradation des terrains est plus que compensée par la facilité de placer les plantes à des distances horizontales moins grandes, il est aisé de voir que cet avantage n'est pas, à beaucoup près, dans la proportion dont je viens de parler; en effet, il faudroit pour cela qu'une superficie inclinée à 60 degrés, par exemple, produisît autant que la même superficie horizontale; ce que personne ne s'aviserait de soutenir. Ainsi, il sera en général plus commode de mesurer seulement la base horizontale, & de se conduire, par rapport à l'avantage des terrains inclinés, comme si dans le même champ on avoit des terrains de différentes valeurs.

2.^o Si on a un champ à diviser en raison donnée, il faut encore préférer la méthode de mesurer la base horizontale, & on auroit alors à partager un champ horizontal, mais dans les différentes parties sont inégales quant au produit. Ainsi, pour que le partage soit égal, il faut, au lieu de le diviser en parties égales, le diviser en parties qui soient entre elles en raison inverse de leur produit.

3.^o S'il est question d'évaluer un champ par la quantité de sa superficie, on voit que pour une évaluation exacte, il faut ou mesurer la base horizontale, & avoir égard aux avantages de l'inclinaison, ou mesurer la superficie inclinée, & avoir égard à son désavantage sur une superficie égale & horizontale. Or, puisque dans aucun des deux cas une simple mesure ne suffit, c'est la méthode de mesurer la base horizontale qu'il faut préférer.

Elle est, dans tous les cas, aussi exacte pour le but civil, qui est le rapport des produits plutôt que celui des surfaces, & l'autre ne peut être pratiquée avec exactitude sur des terrains de courbures souvent irrégulières, sans des attentions & des précautions qu'on ne doit pas attendre des arpenteurs.

Lorsqu'il est question de lever des plans & de désigner les terrains mesurés par leurs limites, la manière de prendre, pour leur superficie, celle du plan incliné, rend la confusion & l'usage de ces plans presque impraticable, & c'est une raison pour faire préférer l'autre méthode toutes les fois qu'un arpentage fait antérieurement, & qui doit servir de règle, n'oblige pas à prendre la première; je crois même qu'il seroit utile de faire une règle gé-
né-

rale qui atreignit à suivre la méthode qu'on vient de voir être la meilleure ; & dans les cas où l'autre auroit été employée d'avance, on détermineroit aisément qu'elle seroit, dans la méthode de mesurer la base horizontale, la mesure des terrains aux- quels on auroit assigné une mesure par l'autre méthode.

La méthode qui ne mesure que les hautes s'appelle, par les gens de l'art, *méthode de cullellation*, & celle qui mesure le plan incliné, *méthode de développement* ; les arpenteurs préfèrent long-temps cette dernière, quoique très-fautive entre leurs mains, parce que, de la manière dont ils l'emploient, elle est beaucoup plus aisée dans la pratique, & que sur des terrains peu inclinés & peu étendus, les inconvénients sont assez bornés. (M. D. C.)

ARPERTER, v. act. & neut. (Géom.) c'est l'action de mesurer un terrain, c'est-à-dire, de l'évaluer en arpens. Voyez ARPERT & ARPERTAGE.

ARPEUTEUR, f. m. (Géom.) On appelle ainsi celui qui mesure, ou dont l'office est de mesurer les terrains, c'est-à-dire, de les évaluer en arpens ou en toute autre mesure convenue dans le pays où il fait l'arpentage. Voyez ARPEVAGE. Il faut qu'un arpenteur sache bien l'Arithmétique & la Géométrie pratiques ; on ne devroit même jamais en recevoir à moins qu'ils ne fussent instruits de la théorie de leur art. Celui qui ne fait que la pratique est l'esclave de ses règles ; si la mémoire lui manque, ou s'il se présente quelque circonstance imprévue, son art l'abandonne, ou il s'expose à commettre de très-grandes erreurs ; mais quand on est muni d'une bonne théorie, c'est-à-dire, quand on est bien rempli des raisons & des principes de son art, on trouve alors des ressources ; on voit toujours clairement si la nouvelle route que l'on va suivre conduit droit au but, ou jusqu'à quel point elle peut en écarter. (E)

ARR

ARRÉRAGES f. m. (calcul des probabilités) se dit des paiements d'une rente ou redevance annuelle, pour raison desquels le débiteur est en retard. On ne peut pas demander au-delà de 29 années d'arrérages d'une rente foncière, ni plus de cinq d'une rente constituée. Tous les arrérages échus antérieurement aux 29 années ou aux cinq, sont prescrits par le laps de tems, à moins que la prescription n'en ait été interrompue par des commandemens ou demandes judiciaires. Voyez RENTE, INTÉRÊT, &c. (H)

Toute rente peut être regardée comme le denier d'une certaine somme prêtée ; soit donc a la somme prêtée, & m le denier, c'est-à-dire, la fraction qui désigne la partie de la somme qu'on doit payer pour la rente ; si l'intérêt est simple, la somme due au bout d'un nombre d'années g

pour les arrérages sera $a m g$; c'est-à-dire, l'intérêt dû à la fin de chaque année, multiplié par le nombre des années ; & si l'intérêt est composé, la somme due au bout de ce tems sera $a(1+m)^g - a$, c'est-à-dire, la somme totale due à la fin du nombre d'années exprimé par g ; de laquelle somme il faut retrancher le principal.

Pour avoir l'expression arithmétique de $a(1+m)^g - a$, supposons que la somme prêtée ou le principal soit 1,000,000 liv. que le nombre des années soit 10, & que le denier soit 20, il faudra chercher une fraction qui soit égale à $\frac{1}{10}$, multiplié par lui-même 10 fois moins une, c'est-à-dire, 9 fois ; ce qu'on peut trouver aisément par les secours des logarithmes (Voyez LOGARITHME), & cette fraction étant diminuée de l'unité & multipliée par 1,000,000, donnera la somme cherchée.

Ceux de nos lecteurs qui sont un peu algébristes, verront aisément par quoi ces deux formules sont fondées. Les autres en trouveront la raison à l'article INTÉRÊT, avec beaucoup d'autres remarques importantes sur cette matière.

On pourroit au reste se proposer ici une difficulté. Dans le cas où l'intérêt est simple, ce qui dépend de la convention entre le débiteur & le créancier, le débiteur ne doit en tout à la fin d'un nombre d'années g , que la somme totale $a + a m g$, composée du principal a , & du denier $a m$ répété autant de fois qu'il y a d'années ; ainsi, retranchant de la somme totale qui est due le principal a , il ne reste que $a m g$ d'arrérages à payer en argent comptant. Mais dans le cas où l'intérêt est composé, l'intérêt joint au principal devient chaque année un nouveau principal ; ainsi, à la fin de la g^{e} année, ou ce qui revient au même, au commencement de la g^{e} année, le débiteur est dans le même cas s'il recevoit du créancier la somme $a(1+m)^g$ de principal. Cette somme travaillant pendant l'année, le débiteur doit à la fin de cette année la somme totale $a(1+m)^g$, d'où retranchant le principal $a(1+m)^{g-1}$ qui est censé prêt à la fin de l'année précédente, il s'en suit, ou il paroît s'en suivre que le débiteur à la fin de la g^{e} année doit payer au créancier en argent comptant la somme $a(1+m)^g - a(1+m)^{g-1}$, & non pas $a(1+m)^g - a$. Pour rendre cette difficulté plus sensible, examinons en quoi consiste proprement le paiement d'une rente. Un particulier prête une somme à un autre, au bout de l'année le débiteur doit la somme totale $a + a m$, tant pour le principal que pour l'intérêt ; de cette somme totale il ne paie que la partie $a m$; ainsi, il reste débiteur de la partie a comme au commencement de la première année ; donc le débiteur qui paie exactement sa rente est dans le même cas que si chaque année il rendoit au créancier la somme $a + a m$, & qu'en même tems le créancier lui reprît la somme a ; donc tout ce que le débiteur

ne rend

ne rend point au créancier est censé au commencement de chaque année former un nouveau principal dont il doit à la fin de l'année les intérêts en argent comptant. Ainsi, à la fin de la $g-1^{\text{re}}$ année le débiteur est censé recevoir $a(1+m)^{g-1}$ de principal; donc, à la fin de l'année suivante, il doit payer $a(1+m)^g - a(1+m)^{g-1}$ d'argent comptant, par la même raison que s'il recevoit b en argent comptant il devrait payer à la fin de l'année $b(1+m) - b$.

La réponse à cette difficulté, est que la quantité d'argent que le débiteur doit payer dépend absolument de la convention qu'il fera avec le créancier, & que d'une manière ou d'une autre le créancier n'est nullement lésé; car si le débiteur paie à la fin de la g^{e} année la somme $a(1+m)^g - a$, il ne devra donc plus au créancier au commencement de l'année suivante que la somme a ; il se retrouvera dans le même cas ou il étoit avant le tems où il a cessé de payer, & à la fin de l'année $g+1$, il ne devra au créancier que la somme $a(1+m)^{g+1} - a(1+m)^g$, laquelle est moindre que $a(1+m)^g - a$, toutes les fois que g est plus grand que 1, comme on le suppose ici; alors le débiteur au commencement de la $g+1^{\text{e}}$ année se trouvera redevable d'une somme plus grande que a ; & s'il veut en faire la rente annuelle, il devra payer $a(1+m)^g \times m$ d'intérêt chaque année en argent comptant. Ainsi, le créancier recevra une somme moindre ou plus grande dans les années qui suivront celle du paiement des *arrérages*, selon que le débiteur aura donné pour le paiement de ces *arrérages* une somme plus ou moins grande. Il n'est donc lésé ni dans l'un ni dans l'autre cas, & tout dépend de la convention qu'il voudra faire avec le débiteur.

Autre question qu'on peut faire sur les *arrérages* dans le cas d'intérêt composé. Nous avons vu que le débiteur au commencement de la g^{e} année doit la somme totale $a(1+m)^{g-1}$; supposons qu'il veuille s'acquitter au milieu de l'année suivante, & non pas à la fin, que doit-il payer pour les *arrérages*? Il est visible que pour résoudre cette question il faut d'abord savoir ce que le débiteur doit au milieu de la g^{e} année. En premier lieu, le principal ou somme totale $a(1+m)^{g-1}$ étant multiplié par $1+m$, doit donner la somme qui sera due à la fin de la g^{e} année, savoir $a(1+m)^g$, ou, ce qui revient au même, le débiteur devra à la fin de cette année $a(1+m)^g$, plus l'intérêt de cette somme, c'est-à-dire, $a(1+m)^{g-1} \times m$. Dans le cours de l'année, il doit d'abord $a(1+m)^{g-1}$ qui est le principal; il doit de plus une portion de ce principal pour l'intérêt qui court depuis le commencement de l'année: cette portion doit certainement être moindre que $a(1+m)^{g-1} \times m$, qui est l'intérêt dû à la fin de l'année: mais quelle doit-elle

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

être? Bien des gens s'imaginent que pour l'intérêt de la demi-année il faut prendre la moitié de l'intérêt de l'année, c'est-à-dire, $a(1+m)^{g-1} \times \frac{m}{2}$, le tiers de l'intérêt pour le tiers de l'année, & ainsi du reste: mais ils sont dans l'erreur. En effet, qu'arrive-t-il dans le cas de l'intérêt composé? c'est que les sommes dues au bout de chaque année sont en progression géométrique, comme il est aisé de le voir. Or pourquoi cette loi n'auroit-elle pas lieu aussi pour les portions d'années, comme pour les années entières? J'avoue que je ne vois point quelle en pourroit être la raison. La somme due à la fin de la $g-1^{\text{e}}$ année est $a(1+m)^{g-1}$, celle qui est due à la fin de la g^{e} année est $a(1+m)^g$, celle qui seroit due à la fin de la $g+\frac{1}{2}$ seroit

$a(1+m)^{g+\frac{1}{2}}$; & ces trois sommes sont dans une proportion géométrique continue. Donc la somme due au milieu de la g^{e} année doit être moyenne proportionnelle géométrique entre les deux sommes dues au commencement & à la fin

de cette année; c'est-à-dire, entre $a(1+m)^{g-1}$ & $a(1+m)^g$; donc cette somme sera $a(1+m)^{g-\frac{1}{2}} = a(1+m)^{g-1} \times (1+m)^{\frac{1}{2}}$.

Or cette somme est moindre que $a(1+m)^{g-1} + a(1+m)^{g-1} \times \frac{m}{2}$, qui seroit due suivant l'hypothèse que nous combattons.

De même, si l'on est question de ce qui est dû au bout du tiers de la g^{e} année, on trouvera que la somme cherchée est la première de deux moyennes proportionnelles géométriques entre a

$(1+m)^{g-1}$, & $a(1+m)^g$, c'est-à-dire, a

$(1+m)^{g-\frac{1}{3}}$; & en général k étant un nombre quelconque d'années entier, rompu, ou en partie entier, & en partie fractionnaire, on aura $a(1+m)^k$ pour la somme due à la fin de ce nombre d'années.

Dans l'hypothèse que nous combattons, on suppose que l'intérêt est regardé comme composé d'une année à l'autre, mais que, dans le cours d'un seule & unique année, il est traité comme intérêt simple; supposition bizarre, qui ne peut être admise que dans le cas d'une convention formelle entre le créancier & le débiteur. En effet, dans cette supposition, le débiteur paieroit plus qu'il ne doit réellement payer, comme nous l'avons vu tout-à-l'heure. Nous traiterons cette manière plus à fond à l'article INTÉRÊT, & nous espérons la mettre dans tout son jour, & y joindre plusieurs autres remarques curieuses. Mais comme l'observation précédente peut être utile, & est assez peu connue, nous avons cru devoir la placer d'avance dans cet article,

T

Soit donc $\frac{1}{2}$ la portion d'année écoulée, il est visible, par ce que nous venons de dire, que le créancier doit, au bout de cette portion, la somme

$$\text{totale } a(1+m)^{g-1+\frac{1}{2}}; \text{ \& , pour avoir les } \frac{1}{2} \text{ \& , pour avoir les } \frac{1}{2}$$

arrérages, il faudra retrancher de cette somme ou le principal a , ou le principal $a(1+m)^{\frac{1}{2}}$; ce qui dépend, comme nous l'avons observé, de la convention mutuelle du débiteur & du créancier.

On peut proposer une autre question dans le cas de l'intérêt simple. Dans ce cas, il y a cette convention, du moins tacite, entre le créancier & le débiteur, que le principal seul, touché par le débiteur, & prêt par le créancier, produit chaque année $a m$ d'intérêt, & que l'intérêt (non payé chaque année) est un argenti mort, ou un principal qui ne produit point d'intérêt; ainsi, dans le cas où cette convention tacite seroit sans restriction, la somme totale due à la fin de la g^{e} année seroit $a + a m g$, & les *arrérages* seroient $a m g$. Mais si la convention entre le débiteur & le créancier étoit, par exemple, que le débiteur payât tous les cinq ans l'intérêt simple $a m$, & que le débiteur fût quinze ans sans payer, alors la somme $a + a m$ due à la fin de la cinquième année, est regardée comme un nouveau principal sur le paiement & les intérêts duquel le créancier peut faire au débiteur telles conditions qu'il lui plaît. Supposons, par exemple que, par leur convention, il doive porter intérêt simple durant cinq ans; en ce cas, au bout des cinq années qui suivent les cinq premières, la somme totale due par le débiteur sera $a + a m + a m + 25 a m m$; & à la fin de cinq années suivantes, c'est-à-dire, au bout des quinze années révolues, la somme due sera $a + a m + a m + 25 a m m + a m + 25 a m m + 25 a m m + 125 a m^2 = a + 15 a m + 75 a m m + 125 a m^2$. Voyez INTÉRÊT, ANNUITÉ, RENTE, TONTINE, &c. (O)

ARRIÈRE-MAIN, *terme de Paumier*; prendre une halle d'*arrière-main*, c'est la prendre à sa gauche. Pour cela, il faut avoir le bras plié, & l'élever en la chassant.

ARIOPH (*Astr.*), nom de la belle étoile à la queue du cygne.

ARTEMON, *f. m. (Mécan.)*: troisième molette qui est au tas du polybate ou plutôt du irispaste. Voyez POLYBATE.

ARTIFICIEL, se dit en *Astronomie* du globe par lequel on représente la concavité du ciel, ou la convexité de la terre. On appelle aussi *sphère artificielle* la sphère armillaire.

L'*horizon artificiel* est l'horizon rationnel ou mathématique, distingué de l'horizon sensible de chaque observateur, qui varie suivant le plus ou moins de hauteur.

Le jour *artificiel* est la durée du temps que le soleil reste sur l'horizon. *Clavius, dans son Commentaire sur la sphère de Sacro Bosco. (D. L.)*

ARTIFICIEL. On appelle en *Géométrie* lignes *artificielles* des lignes tracées sur un compas de proportion ou une échelle quelconque, lesquelles représentent les logarithmes des sinus & des tangentes, & peuvent servir, avec la ligne des nombres, à résoudre assez exactement tous les problèmes de trigonométrie, de navigation, &c. Les nombres *artificiels* sont les sécantes, les sinus & les tangentes. V. SÉCANTE, SINUS & TANGENTE. Voyez aussi LOGARITHME. (E).

A S

AS, au jeu de *Trièze*, se dit du seul point qui est marqué sur une des faces du dez que l'on joue; au jeu de cartes, de celles qui n'ont qu'une seule figure placée dans le milieu. L'*as* vaut aux cartes ou un, dix, ou même onze, selon le jeu qu'on joue.

ASANGUE (*Astr.*) nom de la lyre.

ASCENDANT (*Astron.*), se dit dans plusieurs circonstances pour indiquer le mouvement qui se fait en montant. Le *nœud ascendant* d'une planète est le point où elle traverse l'écliptique en passant du midi au nord, comme le *nœud descendant* est celui par lequel elle passe du nord au midi. Le *nœud ascendant* de la lune s'appelloit aussi *tête de dragon*; il se représentait ainsi ☊; le *nœud descendant* est celui qui lui est opposé ☋.

Les *signes ascendants* sont les trois premiers & les trois derniers de l'écliptique, c'est-à-dire, le bélier, le taureau, les gémeaux, le capricorne, le verseau & les poissons; ils ont été appelés ainsi, parce que le soleil, en parcourant ces signes, s'élève de jour à autre au-dessus de l'horizon dans nos régions septentrionales, & semble monter vers notre zénith. Malgré l'étymologie du mot de *signes ascendants*, le nom est resté affecté aux signes que nous venons de nommer, même pour le pays où le soleil ne monte pas lorsqu'il est dans ces signes-là; mais lorsqu'il arrive qu'un Astronome parle des *signes ascendants* uniquement à raison de ce que le soleil s'élève, en sorte que pour d'autres pays, ces signes soient sujets à changer, il doit en avertir; les six autres signes font appelés *descendants* par une raison contraire, parce que le soleil, en les décrivant, parait descendre & s'éloigner de notre zénith.

On appelle quelquefois *ascendant* le point de l'écliptique, situé dans l'horizon oriental, c'est-à-dire le point qui se lève; les astronomes en font le calcul pour trouver la situation de l'écliptique dans les éclipses de soleil, & en conclure les parallaxes. Voyez NONAGÉSIME. Les astrologues appelloient le même point *horoscope*, & le calculoient pour dresser le thème d'une nativité. La

division du ciel en douze maisons commençoit dans ce point ; & l'on disoit qu'une planète dominoit à l'*ascendant*, lorsqu'elle répondoit à ce point de l'écliptique situé dans l'horizon. C'est de-là peut-être qu'est venue l'expression avoir de l'*ascendant* sur quelqu'un, par comparaison avec l'influence considérable que l'on supposoit dans l'horoscope pour la conduite les inclinations & le sort des hommes. (D. L.)

A S C

ASCENDANTE (PROGRESSION), *Géométrie*. Quelques géomètres nomment *progression ascendante*, celle dont les termes vont en croissant : telle est la progression arithmétique des nombres naturels 1, 2, 3, &c. (J. D. C.)

ASCENSION, f. f. est proprement une *élévation* ou un *mouvement en haut*. Voyez *ÉLEVATION*.

C'est dans cesens qu'on dit l'*ascension* des liqueurs dans les pompes, dans les tuyaux capillaires. V. POMPE, TUYAUX CAPILLAIRES (O).

ASCENSION, en *Astronomie*, est l'arc compris entre le point équinoxial & le point de l'équateur qui se lève avec une étoile ; elle est droite ou oblique ; l'*ascension* droite du soleil ou d'une étoile est l'arc de l'équateur compris entre le degré de l'équateur qui se lève avec le soleil ou avec l'étoile dans la sphère droite, & le point équinoxial ou le commencement d'Aries. V. SPHERE. C'est le degré & la minute de l'équateur, à compter depuis le commencement d'Aries, qui passe par le méridien avec le soleil, une étoile ou quelqu'autre point du ciel. Voyez SOLEIL, ÉTOILE.

On rapporte l'*ascension droite* au méridien, parce qu'il fait toujours un angle droit avec l'équinoxial, au lieu qu'il n'en est ainsi de l'horizon que dans la sphère droite.

Deux étoiles fixes qui ont la même *ascension droite*, c'est-à-dire qui sont à la même distance du premier degré d'Aries, ou, ce qui revient au même, qui sont dans un même méridien, ou cercle de déclinaison, se lèvent en même tems dans la sphère droite, c'est-à-dire pour les peuples qui habitent l'équateur. Si elles ne sont pas dans le même méridien, l'intervalle qui s'écoule entre leurs passages au méridien, est la différence de leurs *ascensions* droites. Dans la sphère oblique, où l'horizon coupe tous les méridiens obliquement, différens points d'un méridien ne se lèvent ni ne se couchent jamais en même tems : ainsi, deux étoiles qui sont dans un même méridien, ne se lèvent ni ne se couchent jamais en même tems pour ceux qui ont la sphère oblique, c'est-à-dire qui habitent entre l'équateur & le pôle ; & plus la sphère est oblique, c'est-à-dire plus on est près du pôle, plus l'intervalle de tems qui est entre leur lever & leur coucher est grand. Voyez LEVER, COUCHER, &c.

Ainsi, l'arc de l'*ascension* droite d'une étoile est la portion de l'équateur, comprise entre le commencement d'Aries & le point de l'équateur qui passe au méridien avec elle.

L'*ASCENSION oblique* est un arc de l'équateur, compris entre le premier point d'Aries & le point de l'équateur, qui se lève en même tems qu'une étoile, dans la sphère oblique. V. SPHERE.

L'*ascension oblique* se prend d'occident en orient, & elle est plus ou moins grande, selon la différence obliquité de la sphère.

La différence entre l'*ascension droite* & l'*ascension oblique*, s'appelle *différence ascensionnelle*.

Pour trouver par la trigonométrie ou par le globe l'*ascension oblique* du soleil, voyez ASCENSIONNEL.

La détermination de l'*ascension droite* du soleil & de celle d'une étoile fixe est la base de toute l'astronomie ; aussi M. de la Caille a-t-il intitulé *Astronomie fondamentale*, le livre dans lequel il a donné toutes les observations qu'il avoit faites à ce sujet ; & comme l'*ascension droite* d'une seule étoile fixe donne facilement celle de toutes les autres, la principale difficulté consiste à s'assurer d'une étoile pour servir de terme de comparaison.

On ne peut déterminer l'*ascension droite* d'une étoile que par celle du soleil ; car, comme c'est le soleil qui parcourt & qui marque l'écliptique, de même que le point équinoxial quand il traverse l'équateur, on ne peut reconnoître les distances à ce point équinoxial que par le soleil qui en fournit l'indication.

D'un autre côté, l'on ne peut déterminer l'*ascension droite* du soleil que par le moyen de sa déclinaison, & celle-ci se conclut de la hauteur méridienne ; ainsi, la hauteur du soleil à midi est le point d'où il faut partir. Supposons qu'on ait observé à Paris la hauteur du soleil, & qu'après l'avoir corrigée par la réfraction & la parallaxe, on ait trouvé cette hauteur à midi de $51^{\circ} 10'$, on sait que la hauteur de l'équateur n'est que de $41^{\circ} 10'$ à Paris, on retranchera l'une de l'autre, & l'on aura 10° pour la déclinaison du soleil, ou la quantité dont il est éloigné de l'équateur. Alors dans le triangle formé par l'écliptique, l'équateur & le cercle de déclinaison, on connoît le petit côté qui est la déclinaison du soleil, & l'angle opposé qui est l'obliquité de l'écliptique $23^{\circ} 28'$, il est aisé de trouver l'autre côté qui est l'*ascension droite* du soleil, & l'hypothénuse qui est la longitude comptée sur l'écliptique.

Mais cette méthode dépend de la réfraction, de la parallaxe, de la hauteur de l'équateur & de l'obliquité de l'écliptique, car chacune des erreurs que l'on commettrait dans un de ces éléments, influeroit & en produiroit une deux ou trois fois plus grande sur l'*ascension droite* ; pour y remédier, il n'y a qu'à faire la même opération deux fois en six mois, à la même hauteur du soleil, avant

& après le solstice; l'erreur qui augmentoit l'ascension droite avant le solstice la diminue nécessairement après, & en prenant le milieu des deux résultats, on a la véritable ascension droite du soleil. C'est à cela que revient la méthode la plus parfaite, & celle qui est adoptée actuellement par les meilleurs astronomes, pour observer l'ascension droite du soleil; elle consiste à le comparer deux fois l'année avec la même étoile, lorsqu'il se trouve dans son parallèle avant & après le solstice; nous allons expliquer cette méthode qui a servi, soit à M. le Monnier pour son zodiaque, soit à M. de la Caille pour construire le nombreux catalogue d'étoiles que nous avons de lui. V. FLAMESTED, *Historia celestis*, in-fol. *Histoire céleste*, par M. le Monnier, 1741, in-4°; *Leçons d'Astronomie*, par M. de la Caille, 1761, in-8°, pag. 175.

Soit $E K Q E$, *planches d'Astr.*, fig. 42, l'équateur $E H Q R E$ l'écliptique, A une étoile & S le soleil, lorsqu'il passe dans le même parallèle que l'étoile A , c'est-à-dire, quand la déclinaison $D S$ est égale à la déclinaison $A C$ de l'étoile. Supposons que ce jour-là on ait observé la différence d'ascension droite $D C$ entre le soleil & l'étoile A ; le soleil ayant passé ensuite par le solstice H , reviendra quelques mois après au point G de l'écliptique, & il aura encore la même déclinaison $G B$ que l'étoile; la distance $B Q$ à l'équinoxe d'automne sera pour lors égale à la distance $E D$, où il se trouvoit dans la première observation par rapport à l'équinoxe du printemps; je suppose que ce jour-là on observe encore la différence $C B$ d'ascension droite entre le soleil & la même étoile, on ajoutera ensemble les deux différences observées, $D C$ & $C B$, l'on aura $D B$, qui est le mouvement total en ascension droite qu'a eu le soleil dans l'intervalle des deux observations; la moitié $D K$ on $B K$ de ce mouvement, sera la distance au colure des solstices, parce que le soleil étoit chaque fois à une égale distance, soit des équinoxes, soit des solstices; enfin le complément de $D K$ sera $E D$, ascension droite du soleil dans la première observation; d'où l'on conclura l'ascension droite $E C$ de l'étoile; en sorte que par cette observation l'on aura les ascensions droites du soleil & de l'étoile.

L'usage de cette méthode exige dans la pratique de l'Astronomie quelques attentions & quelques corrections que l'on peut voir, ainsi que l'exemple détaillé dans le quatrième livre de mon *Astronomie*.

C'est en appliquant cette méthode à des centaines d'observations, que la Caille a trouvé l'ascension droite de Sirius, le 1 janvier 1750 de $98^{\circ} 32' 2''$, & celle de la Lyre $277^{\circ} 7' 4''$; ces positions fondamentales ne diffèrent que de quelques secondes de celles que Bradley, Mayer & M. le Monnier ont assignées par des observations & des méthodes très-différentes; cela suffit pour montrer quel degré de certitude il y a dans la méthode & dans l'observation des ascensions droites.

J'ai dit qu'une seule ascension droite donnoit

assément toutes les autres; il ne faut qu'observer la différence des passages au méridien, ou par des hauteurs correspondantes, ou par une lunette méridienne, & convertir en degrés la différence des tems, on aura celle des ascensions droites des deux astres observés. On choisit pour terme de comparaison les étoiles les plus brillantes, telles Sirius & la Lyre, afin que l'on puisse les voir de jour & en tout tems de l'année pour y comparer toutes les étoiles observées dans une même nuit, & dont on veut avoir l'ascension droite. On trouvera au mot étoile un catalogue des ascensions droites des principales étoiles.

L'ascension droite du milieu du ciel, est une chose dont les astronomes se servent très-souvent, surtout pour calculer les éclipses par le moyen du nonagésime; c'est l'ascension droite du point de l'équateur qui se trouve dans le méridien; elle est égale à la somme de l'ascension droite du soleil & de l'angle horaire ou du tems vrai réduit en degrés, ou à la somme de la longitude moyenne du soleil & du tems moyen. (*D. L.*)

ASCENSIONNEL, adj. *différence ascensionnelle*, terme d'Astr. La différence ascensionnelle est la différence entre l'ascension oblique & l'ascension droite d'un même point de la surface de la sphère. Voyez ASCENSION.

Ainsi, de $27^{\circ} 54'$ qui est l'ascension droite du premier degré du taureau, étant $14^{\circ} 24'$ qui est l'ascension oblique du même degré sur l'horizon de Paris, le reste $13^{\circ} 30'$ en est la différence ascensionnelle. Si on réduit en heures & minutes, les degrés & minutes de la différence ascensionnelle, on connoît de combien les jours de l'année auxquels elle répond, diffèrent du jour de l'équinoxe; car ajoutant le double du tems de cette différence ascensionnelle aux 12 heures du jour de l'équinoxe on a la durée des longs jours, le soleil parcourant la moitié de l'écliptique, qui est du côté du pôle apparent; & si l'on ôte ce même tems de 12 heures, on aura la longueur des petits jours, qui arrivent quand le soleil parcourt la moitié de l'écliptique, qui est du côté du pôle invisible.

Ainsi, le double de $13^{\circ} 30'$ est 27° , lesquels réduits en tems, à raison de 4' d'heure pour chaque degré, on aura une heure & $48''$ ce qui fait connoître que le soleil étant le 20 Avril au premier degré du taureau, le jour est de 13 heures $48''$ sur l'horizon de Paris, ensuite de quoi l'on connoît facilement l'heure du lever & du coucher du soleil, en négligeant la réfraction. Dans les signes septentrionaux, les ascensions droites des degrés de l'écliptique sont plus grandes que leurs ascensions obliques; mais au contraire aux signes méridionaux, les ascensions droites des degrés de la même éclipse sont plus petites que leurs ascensions obliques.

Pour avoir la différence ascensionnelle, la latitude du lieu & la déclinaison du soleil étant données, on fait cette proportion: le rayon est à la tan-

gente de la latitude, comme la tangente de la déclinaison du soleil est au sinus de la *différence ascensionnelle*. Si le soleil est dans un des signes septentrionaux, & qu'on ôte la *différence ascensionnelle* de l'ascension droite, le reste sera l'ascension oblique. Si le soleil est dans un des signes méridionaux, il faudra ajouter la *différence ascensionnelle* à l'ascension droite, & la somme sera l'ascension oblique. C'est ainsi qu'on a construit des tables d'ascensions obliques pour les différents degrés de l'écliptique, sous différents élévations du pôle. Mais on y supplée aujourd'hui par les tables des arcs semi-diurnes.

ASCHEMIE, (*Astron.*) nom du petit chien Procyon.

ASCHÈRE, (*Astron.*) nom du grand chien Sirius.

ASCIENS, (*Astron.*) nom des peuples qui étant entre les tropiques, ont quelquefois le soleil au zénith, & n'ont point d'ombre à midi ce jour là, ce mot est composé de *en*, ombre, avec un *a* privatif. Voyez AMPHISCIENS.

ASCONE, nom que les Italiens ont quelquefois donné aux comètes.

A S P

ASPECT, f. m. *astronomie*, en *Astronomie*, se dit de la situation des étoiles ou des planètes, les unes par rapport aux autres; ou bien c'est une certaine configuration ou relation mutuelle entre les planètes, qui vient de leurs situations dans le zodiaque, en vertu desquelles les astrologues croient que leur puissance ou leurs forces croissent ou diminuent, selon que leurs qualités actives ou passives se conviennent ou se contraient. Voyez PLANÈTE, ASTROLOGIE.

Quoique ces configurations puissent être variées & combinées de mille manières, néanmoins on n'en considère qu'un petit nombre; c'est pourquoi on définit plus exactement l'*aspect*, la rencontre ou l'angle des rayons lumineux qui viennent de deux planètes à la terre. Voyez RAYON & ANGLE.

La doctrine des *aspects* a été introduite par les astrologues comme le fondement de leurs prédictions. Ainsi, l'*aspect* définit l'*aspect*, un angle formé par des rayons, qui partant de deux planètes, viennent se rencontrer sur la terre, & qui ont la propriété de produire quelque influence naturelle. Quoique toutes ces opinions soient des chimères, nous allons les rapporter ici en peu de mots.

Les anciens comptoient cinq *aspects*, à savoir, la conjonction marquée par le caractère σ , l'opposition par ρ , l'*aspect* trine par Δ , l'*aspect* quadrat par $\square$, & l'*aspect* sextile par $\ast$. La conjonction & l'opposition sont les deux *aspects* extrêmes, le premier étant le moindre de tous, & le second le plus grand ou le dernier. Voyez CONJONCTION & OPPOSITION.

L'*aspect* trigone ou trine est la troisième partie d'un cercle, ou l'angle mesuré par l'arc *AB*. Tab. *Astron.* fig. 234.

L'*aspect* tétragon ou quadrat est la quatrième partie d'un cercle, ou l'angle mesuré par le quart de cercle *AD*: l'*aspect* sextile, qui est la sixième partie d'un cercle ou d'un angle, est mesuré par le sextant *AG*. Voyez TRIGONE, TÉTRAGONE, QUADRAT & SEXTILE.

Par rapport aux influences qu'on suppose aux *aspects*, on les divise en *benins*, *malins* & *indifférents*.

L'*aspect* quadrat & l'opposition sont réputés *malins* ou *mal-faisans*; le trine & le sextile *benins* ou *propices*; & la conjonction un *aspect* indifférent. Voyez le livre de *judiciis*, attribué à Ptolémée.

Aux cinq *aspects* des anciens, les modernes en ont ajouté beaucoup d'autres, comme le *decile* qui contient la dixième partie d'un cercle; le *tridécile*, qui en contient trois dixièmes; & le *biquintile*, qui en contient quatre dixièmes ou deux cinquièmes. Kepler en ajoute d'autres, qu'il dit avoir reconnu efficaces par des observations météorologiques, tel que le *demi-sextile*, qui contient la douzième partie d'un cercle, & le *quincunce*, qui en contient cinq douzièmes. Enfin nous sommes redevables aux médecins astrologues d'un *aspect* octile, contenant un huitième de cercle, & d'un *aspect* triodile, qui en contient les trois huitièmes. Quelques médecins y ont encore mis l'*aspect* quintile, contenant un cinquième du cercle, & l'*aspect* biquintile, qui, comme on a déjà dit, en contient les deux cinquièmes.

Caractères des aspects.

σ Conjonction.	Δ Tridécile.
ρ Semi-sextile.	Δ Trine.
$\ast$ Sextile.	ρ Biquintile.
$\square$ Quintile.	ρ Quincunce.
$\square$ Quadrat ou Quartile.	ρ Opposition.

L'angle intercepté entre deux planètes dans l'*aspect* de la conjonction est 0° ; dans l'*aspect* semi-sextile, il contient 30° ; dans le *decile* 36° ; dans l'*octile* 45° ; dans le sextile 60° ; dans le quintile 72° ; dans le quartile 90° ; dans le tridécile 108° ; dans le trine 120° ; dans le triodile 135° ; dans le biquintile 144° ; dans le quincunce 150° ; dans l'opposition 180° .

Ces angles ou intervalles se comptent par les degrés de longitude des planètes, tellement que les *aspects* sont censés les mêmes, soit qu'une planète se trouve dans l'écliptique, ou qu'elle soit hors de ce cercle.

On divise ordinairement les *aspects* en *partils* & *platiqes*. Les *aspects* partils ont lieu quand les planètes sont distantes les unes des autres d'autant de degrés précisément qu'en contient quelqu'un

des divisions précédentes. Il n'y a que ceux-là qui soient proprement des *aspects*. Les *aspects* platiqes arrivent quand les planètes ne sont pas les unes par rapport aux autres précisément dans quelqueune des divisions dont nous venons de parler. (O)

ASPIRANT, adj. m. en *Hydraulique* : on appelle un tuyau *aspirant*, celui dont on se sert dans une pompe pour élever l'eau à une certaine hauteur. Il doit être d'un plomb moulé bien épais & reforgé, de crainte des soufflures qui empêcheraient l'eau de monter. (K)

ASPIRATION, f. f. est la même chose, en *Hydraulique*, qu'*asension*. L'eau dans les pompes ne peut guère être aspirée qu'à 25 ou 26 pieds de haut, quoique l'on puisse la pousser, suivant les règles, jusqu'à 42 pieds, pourvu que l'air extérieur comprime la surface de l'eau du puits ou de la rivière dans laquelle trempe le tuyau de l'*aspiration*; alors la colonne d'eau fait équilibre avec la colonne d'air. Voyez POMPE.

Si on n'aspire l'eau qu'à 20 ou 26 pieds de haut, c'est ainsi que le piston ait plus de vivacité & plus de force pour tirer l'eau. Voyez AIR, POMPE. (K)

A S S

ASSURANCES (*maritimes*). Nous nous bornerons dans cet article à donner, comme dans l'article *affaires*, les principes généraux d'après lesquels on peut appliquer le calcul aux différentes questions qui peuvent se présenter.

I. Le traité d'*assurance* consiste en général de la part du commerçant à payer à l'assureur une certaine partie de la valeur d'un bâtiment ou d'une cargaison, à condition que si la cargaison ou le bâtiment viennent à périr, l'assureur lui en paiera le prix total.

De quelque manière que les traités d'*assurance* soient formés, ils se réduisent nécessairement à des combinaisons de ce traité simple que nous venons de définir, & ils doivent être calculés d'après les mêmes principes.

Le motif qui fait former un de ces traités est de la part de chacun des contractans l'opinion que ce traité lui est avantageux. Nous examinerons donc dans quel sens un traité d'*assurance* peut être regardé comme étant avantageux à-la-fois à l'assureur & au commerçant.

Nous avertissons d'abord ici que dans toute la suite de ce 1^{er} article nous ferons abstraction de l'intérêt de l'argent considéré indépendamment du risque des entreprises, & par conséquent que nous supposons les paiements ou les recettes de part & d'autre réduits au même tems.

Supposons maintenant qu'un négociant risque, dans différentes entreprises, une somme a , en sorte que la mise dans n , entreprises soit na ; supposons que l'espérance de réussir dans chaque entre-

A S S

prise soit g , que la probabilité qu'il perdra ses fonds soit p , & qu'on ait $g + p = 1$. les termes

$$\text{de la série, } g^n + ngp + \left(\frac{n}{2}\right)g^{n-2}p^2 + \left(\frac{n}{3}\right)g^{n-3}p^3 + \dots + \left(\frac{n}{m}\right)g^{n-m}p^m \dots + p^n = g + p \left(\frac{n}{m}\right) \text{ étant } \frac{n, n-1, n-2, \dots, n-m+1}{1, 2, \dots, m}.$$

exprimeront les probabilités de réussir dans n , $n-1, \dots, m, \dots, 1, 0$ entreprises, & de perdre dans $0, 1, \dots, m, \dots, n-1$, n autres entreprises.

Soit maintenant b la somme qu'il gagnera dans chaque entreprise heureuse, & qui est ici la seule partie du profit, destinée à compenser le risque,

il est clair que, pour le terme $\left(\frac{n}{m}\right)g^{n-m}p^m$,

il perdra ma , & gagnera $n-mb$. Il sera donc en gain tant que $n-mb > ma$, & il commencera à être en perte lorsque $ma > n-mb$.

Un homme raisonnable ne doit se livrer au commerce que dans le cas où il trouve une probabilité assez grande qu'il retirera ses fonds, avec l'intérêt commun & le prix de son travail.

Il lui faudroit sans doute une probabilité à peine différente de la certitude de ne pas perdre la totalité de ses fonds, & même d'en conserver la partie qui est nécessaire à sa subsistance & à celle de sa famille; & une probabilité encore très-grande du ne pas les diminuer jusqu'à un certain point.

Mais nous ne considérons d'abord ici que la première condition, celle d'avoir une espérance assez grande de retirer, avec ses avances, leur intérêt & le salaire de son travail.

Il y a trois cas à considérer, celui où $\frac{b}{a} = \frac{p}{g}$, celui où $\frac{b}{a} > \frac{p}{g}$, celui où $\frac{b}{a} < \frac{p}{g}$, si $\frac{b}{a} = \frac{p}{g}$; il est clair que l'on aura du profit tant $n-m > p > mg$.

Cela posé, faisons $g = \frac{g'}{g' + p'}$, & $p = \frac{p'}{g' + p'}$, p' & g' étant des nombres entiers, & soit $n = p' + g'n$.

Il est clair, 1^o que, si $\frac{b}{a} = \frac{p}{g} = \frac{p'}{g'}$, lorsque $m = p'n$ & $n-m = g'n$, on aura $n-mb = ma$, & qu'il n'aura pas de gain. Le gain cessera donc au terme $\left(\frac{n}{p'n}\right)g^{n-p'n}p^{p'n}$. Or si $\frac{b}{a} > \frac{p}{g}$ la somme de tous les termes, jusqu'à celui-là inclusivement, tend toujours à s'approcher de la valeur $\frac{1}{g}$, après l'avoir d'abord surpassée. Ainsi, plus le Négociant continuera son commerce, plus il ap-

prochera d'avoir une probabilité de gagner égale à celle de perdre.

La même chose aura lieu, si $p > g$, excepté que la probabilité de perdre sera d'abord plus grande, & se rapprochera ensuite de l'égalité.

Supposons maintenant $\frac{b}{g} > \frac{p}{g}$ ou $\frac{p'}{g'}$, & égal à $\frac{p'+1}{g'+1}$; par exemple, il est clair que le gain du commerçant s'étendra jusqu'au terme $\left(\frac{n}{p+1 \cdot n'}\right)$

$$n - \frac{p+1}{p} + 1 \cdot n' - \frac{p'+1}{p'} + 1$$

Or, dans ce cas, soit que g soit plus grand, soit qu'il soit plus petit que p , la somme de tous ces termes, qui exprime la probabilité du gain pour le négociant, croîtra continuellement, jusqu'à se rapprocher indéfiniment de l'unité, à mesure que n' croîtra. Mais si $g > p$ elle pourra aller en décroissant, jusqu'à un certain terme.

On trouvera la conclusion précisément contraire, dans le cas où $\frac{b}{a} < \frac{p}{g}$ ou $\frac{p'}{g'}$.

Dans ce second cas, si $g < p$ la probabilité pourra aller d'abord en croissant & ensuite en décroissant.

Il suit de ce que nous venons de dire que pour qu'un négociant puisse avoir de l'avantage en continuant un commerce exposé à des risques, il faut que le rapport du profit à la mise soit plus grand que celui du risque au succès.

On peut aussi voir par cette formule que la règle de faire ces deux rapports égaux n'a pu être établie que parce que c'est le seul cas où les limites de la probabilité de la perte ou du gain sont également 1. Ces deux probabilités étant, l'une croissante, l'autre décroissante, à mesure que le nombre de risques courus augmente, selon que la probabilité du succès est inférieure ou supérieure à celle du gain.

Il suit de ce qu'on vient d'exposer, que, pourvu que $\frac{b}{a} > \frac{p}{g}$, on peut avoir une probabilité toujours de plus en plus grande de gagner ; que, si on suppose cette probabilité donnée, c'est-à-dire, qu'on fixe un *minimum* de probabilité en-deçà duquel on regarderoit comme imprudent de s'exposer au risque ; plus $\frac{b}{a}$ sera grand, moins il faudra répéter de fois la même entreprise pour obtenir cette probabilité, & réciproquement que plus le nombre des entreprises sera petit, plus il faudra que $\frac{b}{a}$ soit grand.

Supposons ici, pour plus de simplicité, que ces entreprises se fassent à-la-fois, si le bien d'un commerçant est n , il ne pourra faire que n entreprises & il faudra que son profit soit b ; mais si le bien d'un autre commerçant B est $n \cdot a$, n étant un

nombre entier, il pourra faire n entreprises, & par conséquent il pourra avoir la même probabilité de gagner, en se contentant d'un profit b' plus petit que b . Mais puisque $b' < b$ la concurrence entre les négociants fera tomber le profit au-dessous de b dont le négociant A ne pourra faire le commerce avec assez d'avantage.

Il est vrai que si A partageoit la somme n en m parties, il pourroit se contenter du même profit que B , & qu'ainsi il peut réparer son désavantage, pourvu qu'il divise les risques en plus petites parties ; mais cela n'est pas toujours possible dans la pratique & dans le cas, le négociant peut être intéressé à trouver un moyen de se mettre à l'abri du danger de perdre.

Les assurances sont ce moyen.

Le risque des assurances se déterminant sur un nombre d'objets beaucoup plus grands que celui du négociant ; ils peuvent, en conservant une très-grande probabilité de gagner, se contenter d'un profit beaucoup plus petit.

Le taux de l'assurance se détermine donc pour chaque espèce de risque par un certain milieu que la concurrence établit entre la partie du profit que le négociant peut abandonner, & celle qui est nécessaire à l'assureur pour avoir une très-grande probabilité de gagner ; & plus il y aura de concurrence entre les négociants & les assureurs, plus ce prix moyen approchera de ce dernier terme, & plus le prix des denrées baissera pour les acheteurs.

Nous allons chercher à déterminer les deux limites du taux d'assurance. Soit a la mise première d'un négociant dont il attend le retour au bout

de deux ans, par exemple ; $a \cdot i + c$ est ce qu'il doit recevoir au bout de deux ans, c étant le denier d'intérêt pour les entreprises, où il n'y a pas de risque, soit de plus e le profit qu'il doit tirer de cette entreprise comme salaire de son tems & de ses peines, & b le profit qui résulteroit du succès, il est clair que $b - (2c + c^2 + c^3) \cdot a$ est ce qu'il peut donner pour assurer cette somme au bout de deux années. Soit n le nombre de ses entreprises, g la probabilité du succès, p celle de

la perte, & soit pris $g + p$, développé suivant tous ses termes.

La perte du négociant pour chaque vaisseau qui périra, sera exprimée par $a(1 + c + c^2)$; son gain, pour chaque vaisseau qui arrivera, sera $b - 2c + c^2 + c^3 \cdot a$.

Ainsi, prenons un terme $\left(\frac{n}{m}\right) g^{n-m} p^m$ pour le dernier où le négociant seroit en gain, puisqu'il perd m fois, sa perte sera $m \cdot a \cdot (1 + c + c^2)$; & son gain $n - m (b - 2c + c^2 + c^3 \cdot a)$; il

commencera donc à perdre lorsque $\frac{m}{n-m} >$

$$\frac{b - 2c + c^2 + c'}{a(1 + c + c')}$$

Si donc l'on connaît b , on aura (connaissant m pour le dernier terme, où $\frac{m}{n-m}$ est plus petit que l'autre membre) la probabilité que le négociant ne fera pas en perte; & si on appelle P la probabilité nécessaire pour entreprendre le commerce avec prudence, en prenant la valeur de m qui y répond, on aura la valeur de b pour laquelle le négociant commence à avoir de l'avantage à faire assurer.

Soit maintenant n' le nombre de vaisseaux qu'un assureur doit assurer, il faudra qu'au bout de deux années, il perde $a + b$ pour chaque bâtiment qui aura péri, & qu'il touche b' pour chacun des vaisseaux.

Soit donc g la probabilité qu'un vaisseau se sauvera, & p la probabilité qu'il périra, nous prendrons $\frac{a'}{n' - 1} + \frac{b'}{n' - 1} = g' + n'g^{n'-1}p + \left(\frac{a'}{2}\right)$
 $g^{n'-1}p^{n'-1}$

Si maintenant on appelle P' la probabilité que l'assureur doit avoir de ne point perdre sur les n' vaisseaux, on poussera cette série jusqu'au terme où la somme est égale ou plus grande que P' ,

soit $\left(\frac{n'}{m}\right)g^{n'-m}p^m$ ce terme, il est clair que l'assureur perdrait alors $m'(a+b) + e$, e représentant ici le salaire de sa peine; mais il lui doit être payé $n'b'$: donc on aura $b' = \frac{m'}{n'}(a+b) + \frac{e}{n'}$. Supposons ensuite que $b' = b - 2c + c^2 + c'e$,

nous aurons $b = \left(\frac{n'}{n} + 2c + c^2 + c'e\right)\frac{a'}{n-m}a + \frac{e}{n-m}$, & ce sera la plus petite valeur possible de b , où la concurrence puisse faire tomber le commerce, en supposant qu'il reste encore avantageux.

Il est bon d'expliquer ici ce que nous entendons par le profit de l'assureur & par celui du négociant.

Le profit du négociant est la somme qu'il doit gagner chaque année pour avoir un motif suffisant de faire cet emploi de ses fonds, & de ne pas préférer un autre emploi qui demande moins de peine.

Le profit de l'assureur doit être, outre les dépenses de bureau & de correspondance dont il doit être remboursé, une somme suffisante pour lui faire préférer cette manière de faire valoir ses fonds.

Il arrive-souvent qu'un négociant n'ayant point fait assurer, parce que le risque étoit très-peut, se

trouve exposé à de nouveaux risques par des événements imprévus.

Cette circonstance change absolument son état. Supposons en effet qu'il ait mis sur quatre vaisseaux toute sa fortune, & que le danger soit de trois contre un, il aura le danger $\frac{3}{4}$ de tout perdre, le danger $\frac{1}{4}$ de perdre trois vaisseaux; & comme soit à cause des marchandises déjà emmagasinées, soit à cause de la diminution de consommation, l'augmentation du prix est bien loin d'être dans les premiers momens proportionnelle à celle du risque; il est évident qu'il sera exposé à un très-grand danger de perdre sa fortune, du moins en grande partie.

L'état de l'assureur n'est pas changé par cet événement; il en résulte seulement que g étant diminué, & p augmenté, il faut, pour parvenir à une probabilité égale, que l'assureur exige une plus grande différence entre $\frac{b'}{a+b}$ & p' .

Ce sera donc alors, avec ce qu'exige nécessairement l'assureur, qu'il faut comparer l'état du négociant; pour cela, soit a la mise avec les intérêts $a + b$ ce qu'il la vendra, b' le prix auquel l'assureur assure $a + b$, le négociant touchera $a + b - b'$; il se trouvera donc en perte toutes les fois que $b' > b$.

Jusqu'ici nous avons supposé que le négociant cherchoit à mettre absolument hors de risque, soit la totalité de ses fonds & de ses profits de commerce, soit dans le cas d'un risque extraordinaire, toute la partie de ses fonds, que les circonstances lui permettent de mettre en sûreté. Nous avons supposé également que l'assureur vouloit obtenir un certain degré de probabilité de ne rien perdre, & d'être remboursé de ses dépenses; mais cette supposition n'est pas rigoureuse.

Supposons en effet qu'un négociant risque une somme a , il sera possible qu'il se contente d'une probabilité P de retirer a , d'une probabilité plus grande P' de ne perdre que la partie de son profit, destinée à le dédommager de ses peines, d'une probabilité plus grande encore P'' de ne perdre que les intérêts de ses fonds, & qu'il ne cherche que la certitude de ne pas entamer ses fonds au-delà d'un certain terme.

De même dans le cas où des dangers imprévus exposeront le négociant à perdre tout, & où l'assurance ne lui sauvera qu'une partie de sa mise, il peut arriver qu'il se contente de la certitude de ne point perdre au-delà d'un certain terme, & qu'il préfère de risquer plus pour conserver l'espérance de quelque profit.

Il parviendra à ce but, en ne faisant assurer qu'une partie de ses marchandises, soit en faisant assurer en entier seulement une partie des navires, soit en ne faisant assurer sur chacun qu'une partie de leur valeur. Dans l'un & l'autre cas, son état n'est pas le même. Supposons, en effet, que n

soit

soit le nombre total des vaisseaux, n celui qu'il faudrait ne pas assurer, pour que n , vaisseaux non assurés, équivalissent à une valeur a' non assurée sur n vaisseaux; ce qui, a étant la valeur d'un vaisseau, donne $a' = \frac{a}{r}$.

Le terme où le négociant commencera à perdre sera $\left(\frac{r}{m}\right)^{n-m} g^{n-m} p^m$ dans un cas, & $\left(\frac{n}{m}\right)^{n-m} g^{n-m} p^m$ dans un autre. Cela posé, le rapport de la perte au profit peut être ici plus grand ou plus petit que $\frac{g}{p}$; si ce rapport est plus grand, le négociant trouvera du déavantage à répandre son risque sur un plus grand nombre de vaisseaux; si au contraire il est plus petit, il y trouvera de l'avantage; mais cependant cet avantage pourra, même dans ce cas, ne commencer à avoir lieu que lorsque le nombre des vaisseaux sera très-grand.

Quant à l'assureur, on trouvera d'une manière semblable, que plus il assurera de bâtimens, plus il aura de probabilité de ne pas perdre au-delà du terme pour lequel il a voulu acquiescer une grande probabilité; mais que s'il baisse le rapport du taux d'assurance à la somme assurée au-dessous du rapport de la probabilité de la perte du bâtiment à celle du nombre des bâtimens assurés, plus il assurera de bâtimens, moins il aura de probabilité de gagner, en sorte qu'il ne doit tomber au-dessous de ce taux que dans des cas rares, & où il ne s'agit que d'assurer un petit nombre de vaisseaux.

Nous avons supposé jusqu'ici que l'on connoissoit, 1.^o la probabilité de la perte de chaque bâtiment qu'on le propose d'assurer; 2.^o le degré de probabilité qu'un négociant ou un assureur s'expose à un risque, sans mériter qu'on l'accuse d'imprudence.

Il faut donc chercher à connoître ces deux données.

II. La probabilité du risque que court un vaisseau ne peut être connue que par l'observation du sort qu'ont éprouvé des vaisseaux dans des circonstances qu'on peut regarder comme semblables.

On trouvera, article *événemens* la méthode de déduire de la connoissance des événemens passés la probabilité des événemens futurs qu'on suppose assujettis aux mêmes loix.

Il en résulte, 1.^o que pour avoir quelque probabilité sur la loi des événemens futurs, il faut que le nombre des événemens passés soit très-grand, & surpassé de beaucoup celui des événemens futurs dont on calcule la probabilité.

2.^o Que, dans ce cas, si N est le nombre des vaisseaux perdus, par exemple, & M celui des vaisseaux qui n'ont point péri, on pourra sans une

Mathématique. Tome I, L.^{re} Partie.

grande erreur, supposer pour le nombre n de vaisseaux à assurer $g = \frac{M+1}{M+N+1}$, $p =$

$\frac{N+1}{M+N+1}$, pourvu que n soit beaucoup plus petit que $M+N$.

3.^o Que cette détermination de g & p n'est pas constante, mais doit varier pour chaque genre de commerce, à mesure qu'on est instruit d'événemens nouveaux; ainsi, lorsque l'on saura que, sur les n vaisseaux, M' ont été sauvés, & N' ont péri, il faudra, si on veut calculer de nouveau les assurances pour n nouveaux vaisseaux, faire $g = \frac{M+M'+1}{M+N+M'+N'+1}$, & $p = \frac{N+N'+1}{M+N+M'+N'+1}$.

4.^o Que; si on a $M > N$ la valeur de g , $\frac{M+1}{M+N+1}$ est trop grande, & celle de p trop petite, & que si au contraire $N > M$, la valeur de g ci-dessus est trop petite, & celle de p trop grande.

Mais lorsque $M+N$ est beaucoup plus grande que n , cette différence est très-petite; & dans les différens cas particuliers, on pourra en assigner les limites, & avoir une valeur de g & de p , qui représentera ces quantités assez exactement pour la pratique. Voyez l'article *ÉVÉNEMENTS*.

III. Nous avons supposé qu'il y avoit dans différentes circonstances un degré de probabilité de ne pas perdre, au-delà duquel un négociant ou un assureur ne doit pas s'exposer à risquer du moins une partie considérable de sa fortune.

On pourroit, d'après des principes généraux, chercher à déterminer ce degré pour les différens cas que peuvent se présenter dans la conduite de la vie. Voyez l'article *PROBABILITÉ*. Mais il peut être aussi très-utile de savoir comment dans la pratique les hommes qui passent pour sages, & dont les projets ont réussi, ont résolu le même problème; par exemple, quelle a été la probabilité de ne pas perdre que les assureurs ont su se procurer dans les différens bureaux d'assurances qui ont pu continuer le commerce avec avantage.

La solution de cette question peut être envisagée de deux manières. Supposons, par exemple, que l'on ait des tables pour différens taux d'assurance qui contiennent le nombre des vaisseaux assurés, le nombre des vaisseaux qui ont péri, celui des vaisseaux qui n'ont point éprouvé d'accidens, on aura par conséquent g & p par l'article précédent, & le taux d'assurance étant connu, on cherchera

dans $g + p$ le terme $g^{n-m} p^m$, tel que pour $g^{n-m-1} p^{m+1}$, l'assureur seroit en perte, &

par conséquent $g + n g^{n-1} p + \dots + \left(\frac{n}{m}\right) g^{n-m} p^m$ exprimera la probabilité qu'il avoit de ne pas perdre.

▼

Cette méthode auroit quelque inexactitude ; en effet, on détermine ici la probabilité que court chaque vaisseau, d'après ce qui est arrivé, après l'assurance, au lieu que c'est ce qui s'est passé avant le contrat d'assurance qui a décidé l'opinion de l'assureur ; ainsi, il seroit plus exact de prendre le moyen suivant. On déterminera g & p d'après les évènements d'un commerce semblable, antérieurs à l'époque qu'on voudroit considérer ; on chercheroit ensuite pour cette époque la probabilité que l'assureur a eu de ne pas perdre ; le taux d'assurance, étant celui que l'assureur a fixé à cette même époque. Mais il faut recommencer le calcul pour chaque époque, parce que l'assureur étant instruit des évènements arrivés aux bâtimens assurés peut former un jugement différent de celui qu'il avoit formé avant de les connaître.

On sent enfin qu'on ne peut employer pour élémens dans cette détermination que des taux d'assurance, choisis parmi ceux où le négociant faisant assurer avant que ses bâtimens soient exposés au risque, ce taux d'assurance est réglé entre l'assureur & lui au-dessous du terme où le négociant perdrait, en faisant assurer, & au-dessus de celui où l'assureur s'exposeroit trop à perdre en assurant. En effet, il est aisé de voir que dans le cas où le négociant est obligé de faire assurer pour sauver une partie de sa fortune, que des évènements imprévus ont exposée, il doit arriver souvent que cette circonstance l'oblige à faire assurer à un taux trop fort.

On a étendu les assurances à beaucoup d'autres risques que ceux des entreprises maritimes.

Nous nous bornerons à parler des assurances des édifices contre les incendies ; il est facile d'y appliquer les principes généraux que nous venons d'exposer, & même comme ici les risques pendant un long-tems, sont absolument semblables, & le taux des assurances constant, on pourroit, si l'on avoit un relevé exact des registres d'une chambre d'assurances pour cet objet, en tirer avec plus de facilité & d'exactitude, que dans toute autre circonstance, le degré de probabilité de ne point perdre, d'après lequel ce taux a été réglé par les assureurs.

A la vérité, cette détermination ne pourroit point s'appliquer rigoureusement aux autres cas, aux assurances maritimes, par exemple ; en effet, comme ici le taux est très-foible, & la perte des assureurs très-grande pour chaque évènement contraire, il est évident qu'ils doivent se procurer une très-grande probabilité de ne pas perdre : d'ailleurs, comme en ce genre il y a peu de concurrence entre les assureurs, & que l'intérêt d'assurer la maison est très-grand pour chaque particulier ; il est très-vraisemblable que le taux de ces assurances est, dans les pays où elles ont lieu, beaucoup plus fort qu'il ne devoit être ; mais ces tables donneroient du moins pour la probabilité de ne point perdre, qu'exige la prudence,

une limite exacte, au-dessous de laquelle cette probabilité ne doit descendre beaucoup dans aucun cas.

Nous avons supposé toujours ici le paiement de la chose assurée, lorsqu'elle périt, comme fe faisant à une époque fixe, ainsi que le paiement de la prime d'assurance. Lorsqu'au contraire le terme où l'assureur doit payer dépend du moment où l'accident arrive, ou il a connaissance de la perte, le problème devient plus compliqué, par exemple, si un homme s'assujettit à donner chaque année 100 liv. pendant 10 ans pour assurer une maison de 100,000 liv., à condition que l'assureur lui paiera cette somme un mois après que la maison aura été détruite par un incendie. On voit que la probabilité de l'incendie & la somme donnée, qu'on doit regarder comme produisant un intérêt variant continuellement ; & que si les principes pour résoudre cette question sont les mêmes que ci-dessus, leur application peut exiger des recherches de calcul très-difficiles.

Nous ne nous arrêterons pas plus long-tems sur cet objet. Il nous suffit d'avoir exposé les principes généraux sur lesquels le calcul doit s'appuyer. L'application à la pratique demanderoit des recherches trop étendues, & il seroit peut-être même assez difficile de se procurer les données nécessaires pour rendre cette application assez exacte pour pouvoir être utile. Il s'est formé à Londres un établissement, sous le titre de Société, pour l'équitable assurance des vies & survivances. Nous en parlerons en détail, art. SOCIÉTÉ. (M.D.C.)

ASSURER, v. a. en Mécanique, signifie rendre ferme.

ASTACUS, Voyez CANCER.

ASTAROTII, nom de la planète de vénus.

ASTEREOMETRE, (*Astron.*) Instrument destiné à calculer le lever & le coucher des astres, dont on connoît la déclinaison & l'heure du passage au méridien. M. Jeurat en a donné la description & la figure dans les Mémoires de l'Académie pour 1779. Un plateau circulaire mobile, divisé en 24 heures & en minutes, tourne autour de son centre ; une règle mobile entre deux coulisses fe meut parallèlement à elle-même, de manière à intercepter sur la circonférence du cercle, un arc égal à la durée du jour. Les coulisses entre lesquelles fe meut la règle, sont divisées, suivant les degrés de déclinaison, par le moyen de la table des arcs semi-diurnes, de manière qu'en plaçant la règle sur la déclinaison, elle intercepte sur le cercle une quantité double de l'arc semi-diurne ; alors mettant à la partie supérieure de l'instrument le nombre qui marque le passage d'un astre au méridien, la règle marque sur le cercle d'un côté le lever, de l'autre le coucher de l'astre. (D. L.)

ASTERIO Voyez CHIENS DE CHASSE.

ASTERISME, *asterismus*, l. m. signifie en Astronomie la même chose que constellation. Voyez

CONSTELLATION. Ce mot vient du grec *ἀστὴρ*, *stellā*, étoile. Voyez ETOILE. (O)

ASTEROPE, (*Astron.*) l'une des filles d'Atlas, & l'une des sept étoiles principales qui composent les Pleiades. Ovide, *Fast.* IV, 170. (D. L.)

ASTRAL; ce mot vient du latin *astrum*, qui lui-même vient du mot grec *ἀστὴρ*, étoile. Il est peu en usage; mais on s'en sert quelquefois pour signifier ce qui a rapport aux étoiles, ou qui dépend des étoiles & des astres. Voyez ETOILE.

Année *astrale* ou *fidérale*, c'est le tems que la terre emploie à faire la révolution autour du soleil; c'est-à-dire, à revenir d'un point de son orbite au même point. Elle est différente de l'année tropique, qui est le tems qui s'écoule entre deux équinoxes de printemps ou d'automne; & cette année est plus courte de 20' 24"; quel'année fidérale qui est de 365, 6^h 9' 11" & $\frac{1}{10}$, tandis que l'année tropique est de 365, 5^h 48' 48".

ASTRE, *astrum*, f. m. est un mot général qui s'applique aux étoiles, tant fixes qu'étranges; c'est-à-dire aux étoiles proprement dites, aux planètes & aux comètes. Voyez ETOILE, PLANETE, &c.

ASTRÉE. Voyez VIERGE.

ASTROCYNOLIE, *astrocinologia*, mot composé du grec *ἀστρον*, *astre*, *αστρον*, *chien*, & *κύων*, *disours*, traité. C'est le nom d'un ouvrage de Florentin sur les jours caniculaires, cité dans les actes de Lucipile, *acta eruditiorum* 1702. *Dét.* 614. Voyez CANICULAIRE.

ASTROKYON; nom de la belle étoile appelée aussi SIRIUS.

ASTROLABE, f. m. (*Astronomie*); instrument d'Astronomie dont les anciens se servoient pour les observations; il y en a eu de plusieurs espèces, ou plutôt le même nom a été donné à plusieurs espèces d'instruments très-différens. Celui de Ptolémée, décrit dans son *Almageste* (*liv. v, ch. 1, l. 11, g. 4. de l'astre*), avoit deux cercles exactement tournés, placés l'un dans l'autre à angles droits; l'un représentoit l'écliptique, & l'autre le colure des solstices, sur lequel on marquoit les poles de l'équateur. Un troisième cercle tournoit autour des poles de l'écliptique sur deux cylindres, qui y étoient fixés; il servoit à marquer les longitudes. Un quatrième cercle au-dessus des trois autres portoit deux pinnules ou deux trous qui servoient à viser à la lune, ou à un autre astre, pour mesurer leur longitude & leur latitude. *L'astrolabe* dont parle Copernic, étoit composé de six cercles, tant fixes que mobiles (*l. ij, c. 14*); à-peu-près dans le goût des *Armilles*, fig. 219. V. EQUATORIAL.

Mais ce que l'on a appelé *astrolabe* dans les siècles postérieurs, n'est proprement que le planisphère de Ptolémée, sur lequel il y avoit seulement une règle avec deux pinnules pour mesurer la hauteur d'un astre; c'est celui qui

a été décrit dans une foule de livres du 16^e siècle. On appella aussi *météroscope* cet *astrolabe* planisphère; le *Torquetum* imaginé par les arabes, & qu'on a même attribué aux anciens Caldéens, avoit aussi des surfaces planes au lieu d'armilles, suivant Tycho (*Astronomie instrumentarum mecenica*, p. 39). Enfin on a appelé *astrolabe* de mer un simple cercle avec une alidade pour prendre hauteur en mer; c'est ainsi que ce mot est employé dans Bion, *Traité de la construction des instruments de Mathématiques*, 1752, p. 268.

L'*astrolabe* planisphère, sur lequel on a fait tant d'ouvrages, est une projection des cercles de la sphère sur un plan, par le moyen de laquelle on résout les problèmes de la sphère, comme de trouver les ascensions droites, les déclinaisons, les amplitudes, les hauteurs, les levers & les couchers d'étoiles, même les maisons ecclésiastiques; car quand l'*astrolabe* étoit à la mode, on faisoit beaucoup d'usage de l'Astrologie judiciaire, & par conséquent des douze maisons.

Dans l'*astrolabe* de Ptolémée, l'œil étoit supposé au pôle; l'équateur étoit le plan de projection, & tous les méridiens étoient des lignes droites.

Dans l'*astrolabe* de Gemma Frisius, l'œil est supposé au point d'orient ou d'occident, en même tems que le point équinoxial; ainsi, l'équateur & l'écliptique y sont représentés par des lignes droites, ainsi que le colure des équinoxes & le cercle horaire de six heures; mais ces lignes droites sont divisées inégalement, les degrés sont plus petits vers le centre que vers les bords, comme dans la projection stéréographique. Le plan de projection est un méridien, & l'œil est supposé au point d'orient ou au pôle du méridien.

Dans l'*astrolabe* de Roias, auteur espagnol, l'œil est supposé à une distance infinie comme dans la projection orthographique, & les degrés sont beaucoup plus petits sur les bords & plus grands vers le centre; cet *astrolabe* peut s'appeler aussi *analemma*. Melicalla donna assez bien la construction & l'usage de l'*astrolabe* planisphère; mais il s'étendit peu sur la théorie. Celle de Ptolémée, dans son *Planisphère*, est pleine de calculs fatigans, & peu propre à instruire; ce que les grecs Nicephore & Proclus en ont donnée est si obscur & si incomplet, que l'on pourroit croire qu'ils n'ont pas entendu cette théorie, du moins ils n'ont pas su la rendre intelligible. Jordanus fut le premier qui rendit cette théorie d'une manière satisfaisante. Stosler expliqua très-bien ensuite la construction & l'usage de l'*astrolabe*; & Maurolycus dans ses opuscules, publiés en 1575, en donna une théorie lumineuse fondée sur les sections coniques d'Apollonius.

Dans les grands *astrolabes* en cuivre qui ont un pied de diamètre, qu'on exécutoit, sur-tout en Flandre vers 1565, on trouve celui que Gemma Frisius nommoit universel, *Planisphærium ratho-*

lucum, Astrolabium catholicum, & de l'autre côté, *l'astrolabe* de Ptolémée, *Planisphaerium particulare*. On peut voir pour la théorie & les usages de celui-ci Clavius (*Operum*, t. 3), & pour *l'astrolabe* universel, l'ouvrage d'Adrien Metius (*Primum mobile*, Amst. 1637) : celui-ci étoit professeur de mathématiques en Frise, & il a fait graver les figures de *l'astrolabe* de Ptolémée & de celui du Gemma. Voyez aussi Bion, usage des *astrolabes*, 1702. La pièce la plus apparente de *l'astrolabe* universel, ou planisphère, est ce qu'on appelle *l'araignée*. Planches d'*Astronomie*, fig. 230. On l'appelle aussi *réseau*, *rete*; c'est un chassis évidé où il y a des crochets qui marquent par leurs pointes les positions des principaux étoiles; *A* pour l'aigle, *B* pour échurus, *C* pour la couronne, *S* pour sirius, *O* pour le pied d'orion.

Ce chassis porte une éclipse, & tourne sur une autre plaque fixe où sont marqués l'équateur, les tropiques, l'horizon *HH* & ses parallèles, les verticaux, suivant *l'astrolabe* de Ptolémée, pour trouver les situations des astres par rapport à tous ces cercles, & résoudre ainsi la plupart des problèmes de la sphère. La plaque du fond se retourne & se change pour présenter les horizons de différens pays, & résoudre différens problèmes. L'alidade, qui tourne sur le tout, marque les déclinaisons & les durées du jour; nous l'avons représenté séparément à côté de *l'astrolabe*.

Le pôle est supposé au centre de l'araignée; le cercle extérieur de la plaque située au-dessous, représente le tropique du capricorne projeté sur l'équateur; le petit cercle intérieur est le tropique du cancer; celui du milieu *EQ* est l'équateur: on y met aussi l'écliptique.

Une alidade mobile autour du centre, divisée en degrés de déclinaisons, se place sur les degrés d'ascension droite marqués autour du limbe, & sert à indiquer sur *l'astrolabe* la position des étoiles. Les plus brillantes sont chacune désignées par une des pointes du chassis mobile. Ce sont ces différens bras qui donnent à ce plan une figure d'araignée.

L'horizon est aussi tracé sous l'araignée avec les verticaux. Quand on amène sur l'horizon oriental une étoile, & qu'on place l'alidade sur cette étoile, elle marque sur la circonférence la différence ascensionnelle. L'alidade étant menée ensuite sur le lien du soleil pour ce jour-là, on a la différence des heures sur le bord du cercle, & c'est l'heure du lever de l'étoile.

On trace encore sur *l'astrolabe* des verticaux des cercles de hauteur, & l'on s'en sert pour trouver la hauteur du soleil à une heure quelconque. On place l'alidade sur l'heure; on tourne l'araignée, jusqu'à ce que le point du zodiaque où est le soleil vienne sous l'alidade; & ce point marque, parmi les cercles de hauteur, le degré de hauteur du soleil, en même tems qu'il mar-

que, entre les cercles verticaux, l'azimut du soleil.

La partie postérieure de *l'astrolabe*, qu'on appelle spécialement le *planisphère universel*, contient un grand nombre de cercles, comme les méridiens d'une mappemonde, & les parallèles à l'équateur; en conséquence, nous n'en avons pas donné ici de figure particulière. Ces cercles y sont tracés suivant les règles de la projection stéréographique, l'œil étant supposé à la partie de la circonférence directement opposée au centre du *planisphère*. On y voit des heures le long de l'équateur, des étoiles marquées suivant leurs ascensions droites & leurs déclinaisons, & une ligne droite passant par le centre pour représenter l'écliptique. Ces mêmes cercles représentent aussi, quand on le veut, les cercles de latitude & les parallèles à l'écliptique, ou bien les verticaux & les almucantars, suivant que les deux points de concours de ces cercles se prennent pour les poles de l'équateur, de l'écliptique ou de l'horizon. Sur un cercle d'un pied de diamètre, il y a autant de méridiens que de degrés, du moins jusqu'à ce qu'on soit assez près des poles pour être forcé à ne les tirer que de 2 en 2, de 10 en 10, & même de 30 en 30 dans le dernier degré.

La règle qui tourne autour du centre de ce *planisphère*, s'appelle la *ligne horizontale*, parce qu'en effet elle représente communément l'horizon; mais on y marque aussi le degré de l'écliptique, & toujours par des divisions inégales plus grandes, à mesure qu'on s'éloigne du centre, comme dans la projection stéréographique. Avec cette alidade on trouve sur le *planisphère* l'ascension droite & la déclinaison d'un astre dont on connoît la longitude & la latitude, & l'on résout tous les autres problèmes de la sphère comme avec un globe, & même avec plus de commodité, parce qu'un *planisphère* est moins embarrassant, & plus d'exactitude, parce qu'un globe n'est jamais bien rond.

Lorsque l'alidade qui tourne sur ce plan représente l'horizon; si on la place à 49° du pôle, elle coupera le tropique du cancer sur le méridien de 8 heures; ce qui fait voir que le soleil se couche à 8 heures le jour du solstice d'été, & ainsi des autres cas.

Si l'on veut connoître l'ascension & la déclinaison d'un astre, comme d'Arcturus, dont on connoît la longitude 6° 21', & la latitude 31°, on considère les cercles convergens comme des cercles de latitude, & les petits cercles comme des parallèles à l'écliptique; l'on y marque la position de l'étoile, & on y fait venir le bras ou l'index, ou une équerre qui puisse être fixée à la règle. On fait mouvoir la règle jusqu'à 23° $\frac{1}{2}$ de l'écliptique, & la pointe du même index montre 31° pour les cercles convergens, & 20° pour le parallèle, c'est-à-dire, que l'étoile est à 31° du

point équinoxial, ou à 211° d'ascension droite ; & à 20° de déclinaison.

On demande la hauteur & l'azimut du soleil à deux heures pour Paris, lorsqu'il a 15° de déclinaison boréale : à l'endroit où le cercle de 30 degrés coupe le parallèle de 15° , on marque la place du soleil ; on met la règle à 49° du pôle, & l'index sur la place du soleil ; on ramène ensuite la règle sur l'équateur, & la considérant comme horizon, l'index marque sur les parallèles celui de 48° , qui est la hauteur du soleil, & sur les cercles convergens celui de 46 degrés, à compter du cercle extérieur, & ce sera l'azimut du soleil, à compter du méridien.

Cette opération est fondée sur ce que dans la projection stéréographique tous les cercles qui passent par le centre font des lignes droites, divisées de la même manière, & que les cercles qui leur sont perpendiculaires ou parallèles ont la même configuration. Ainsi, dès que l'écliptique, par exemple, & l'équateur sont placés entr'eux convenablement, une étoile rapportée à l'équateur par l'index est également bien rapportée à l'écliptique, & il ne s'agit, pour en compter les degrés de longitude & de latitude, que de transporter la règle avec l'index sur le cercle qui est tout divisé avec les parallèles & ses cercles perpendiculaires convergens.

Il seroit bien inutile de s'étendre sur les usages de cet *astrolabe* dont on ne fait plus d'usage ; mais il falloit en dire quelque chose, parce qu'on en trouve encore fréquemment chez les ouvriers d'instrumens, quoique la plupart aient été fondus comme mitraille, pour en employer le cuivre à d'autres choses.

Dans les trois espèces d'*astrolabes* dont nous avons parlé, il y avoit un défaut commun, celui d'altérer tellement les figures des constellations, qu'elles n'étoient pas faciles à comparer avec le ciel, & d'avoir en quelques endroits des degrés si serrés, qu'ils ne laissoient pas d'espace suffisant pour les opérations. Comme ces deux défauts ont le même principe, la Hire voulut y remédier en même tems, en trouvant une position de l'œil d'où les divisions des cercles projetés fussent moins inégales dans toute l'étendue de l'instrument. Les deux premiers *astrolabes* plaçoient l'œil au pôle du cercle & du plan de projection, le troisième à une distance infinie, & ils rendoient les divisions inégales dans un ordre contraire. La Hire trouva un point moyen d'où elles font suffisamment égales. Il prend pour son point de projection celui d'un individu, & par conséquent fait un *astrolabe universel* ; & il place l'œil sur l'axe de ce méridien prolongé de la valeur du sinus de 45 degrés ; c'est-à-dire que si le diamètre du méridien est supposé de 200 parties, il le fait prolonger de 70 à-peu-près. De ce point où l'œil est placé, une ligne tirée au milieu du quart de cercle, passe précisément par le milieu du rayon qui lui

répond ; & puisque de cette manière les deux moitiés égales du quart de cercle répondent aux deux moitiés égales du rayon, il n'est pas possible que les autres parties égales du quart de cercle répondent à des parties du rayon qui soient fort inégales. La Hire fit exécuter par cette méthode des planisphères ou des *astrolabes* plus commodes ; mais comme il n'étoit pas absolument démontré que le point de vue d'où les divisions de la moitié du quart de cercle & de la moitié du rayon sont égales, fût celui d'où les autres divisions sont les plus égales qu'il se puisse, Parent chercha en général quel étoit ce point, & s'il n'y en avoit pas quelqu'un d'où les divisions des autres parties fussent moins inégales, quoique celles des moitiés ne soient pas égales. En se servant donc de la géométrie des infiniment petits, Parent déterminait le point d'où un diamètre étant divisé, les inégalités ou différences de toutes ses parties prises ensemble sont la moindre quantité qu'il se puisse ; mais il seroit encore à désirer que la démonstration s'étendit à prouver que cette somme d'inégalités, la moindre de toutes, est distribuée entre toutes les parties dont elle résolve, le plus également qu'il se puisse : car ce n'est précisément que cette condition qui rend les parties les plus égales entr'elles qu'elles puissent l'être ; & il seroit possible que des grandeurs dont la somme des différences seroit moindre, seroient plus inégales, parce que cette somme totale seroit répandue plus inégalement. Parent chercha aussi le point où doit être placé l'œil pour voir les zones égales d'un hémisphère les plus égales qu'il se puisse, par exemple, les zones d'un hémisphère de la terre partagée de 10 en 10 degrés. Ce point est à l'extrémité d'un diamètre de 200 parties, qui est l'axe des zones prolongé de 110 *li*. Voyez l'hist. de l'Acad. des Sciences, 1701, pag. 100, & 1702, pag. 70. Mais alors on commençoit à abandonner l'usage des *astrolabes*, en sorte qu'on en a exécuté fort peu dans les nouvelles constructions. Ceux que l'on trouve encore de tems en tems sont des *astrolabes* de Gemma Frisius. Au reste, comme on résout les mêmes problèmes par le moyen du globe, on ne fait plus usage des *astrolabes*. (D. L.)

ASTROLOGIE, mot dérivé de *astris*, étoile, & de *logos*, discours : ainsi l'*Astrologie* seroit, en suivant le sens de ce terme, la connoissance du ciel & des astres, & c'est aussi ce qu'il exprimoit dans son origine ; mais la signification de ce mot a changé, & nous appelons maintenant *Astrologie* ce que les anciens appelloient *Astrologie*.

L'*Astrologie* judiciaire est l'art de prédire les événemens futurs par les aspects, les positions & les influences des corps célestes.

L'*Astrologie* passe pour avoir pris naissance dans la Chaldée, d'où elle pénétra en Egypte, en Grèce & en Italie. Il y a des auteurs qui la font Egyptienne d'origine, & qui en attribuent l'invention à

Cham : quant nous, c'est des Arabes que nous la tenons. Le peuple Romain en fut tellement insatiable, que les astrologues ou les mathématiciens, car c'est ainsi qu'on les appelloit alors, se fournirent dans Rome malgré les édités des empereurs qui les en bannissoient.

L'*Astrologie*, étant aussi analogue à la superstition & à la crédulité des peuples qu'elle étoit favorable au crédit de ceux qui l'avoient l'employer, fut aussi de tout temps cultivée, autant & plus que l'*Astronomie* : celle-ci eut même les plus grandes obligations à l'*Astrologie*. (M. Goguet, I, 215, III, 115; *Keppler*, Tab. Rud. præf. pag. 4.) Aujourd'hui les livres d'*Astrologie* sont aussi méprisés qu'ils font méprisables.

Les règles de l'*Astrologie*, que l'on prétendoit tirer de la nature des choses, étoient dans le fond absolument arbitraires : ainsi, la partie du ciel qui étoit à l'orient ou qui se levait, formoit la maison de jeunesse ou la maison de vie, & celle qui alloit se coucher étoit la maison de la mort. Voyez MAISON.

Les influences des planètes étoient également arbitraires. Saturne, étant très-éloigné, étoit supposé une planète de nature froide. Jupiter, Vénus & la Lune étoient des planètes tempérées & bienfaisantes ; Saturne & Mars des planètes fangeuses. Le Soleil & Mercure participoient aux propriétés des unes & des autres, suivant les circonstances. (Ptolemée de judicis.) Chaque planète avoit parmi les signes du Zodiaque une maison d'exaltation, où elle étoit censée exercer son pouvoir ; mais les règles de l'*Astrologie* n'étoient pas par-tout les mêmes, & l'on a beaucoup varié dans les principes comme dans les applications.

Actuellement ce n'est que dans les pays d'ignorance, en Asie, au Japon, dans les îles Maldives, où l'*Astrologie* est recherchée. Nous ne pouvons lire les anciens livres des astrologues Européens, sans déplorer l'ignorance & l'aveuglement du vulgaire, qui s'est laissé si long-temps abuser par de si fortes prédictions, & de faire observer combien il étoit utile pour le genre humain de pénétrer & d'approfondir les sciences qui ont su enfin guérir les hommes d'une si métable imbécillité & d'une stupidité si stérilisante.

Ce n'est pas sans peine qu'enfin l'esprit philosophique a dissipé ces erreurs ; on venoit encore quelquefois, au commencement de ce siècle, consulter, sur l'avenir, des astronomes de l'Académie, & en 1705, M. Licutaud crut devoir mettre à la tête de la *Connaissance des Temps* : « On ne trouve ici aucune prédiction, parce que l'Académie n'a jamais reconnu de solidité dans les règles que les anciens ont données pour prévoir l'avenir par les configurations des astres. » En lisant dans le *Mercur* (1763, Janvier, 11 vol. pag. 35), une lettre où je racontais la curiosité que le Grand-Seigneur eut, en 1762, de recevoir sous les ouvrages publiés par les astro-

nomes de l'Académie, on remarquera qu'il demandoit sur-tout les prédictions qui se faisoient sur l'avenir par la science des astres. Peut-être Sa Majesté ne desiroit nos livres d'*Astronomie*, que dans l'espérance d'y voir le sort des puissances qui sembloient alors acharnées à se détruire.

Voy. MAISONS, THÈME, HOROSCOPE, DIRECTON, PROMISSEUR, SIGNIFICATEUR. (D. L.)

ASTROMETRE. Voy. HÉLIOMETRE.

ASTRONOMIE, *Astronomia*, science des mouvements célestes, des phénomènes qu'on observe dans le ciel, & de tout ce qui a rapport aux astres. C'est une partie des Mathématiques mixtes, dans laquelle on apprend à connoître les grandeurs, les mouvements & les distances des étoiles, des planètes & des comètes, autant que l'industrie humaine, aidée de l'observation & du calcul, peut nous y faire pénétrer. Le mot d'*Astronomie* vient des mots grecs *ἀστρον*, astre, *νόμος*, loi. Les grecs appelloient cette science *Astrologie* ; mais ce dernier terme est réservé aujourd'hui à la science conjecturale dont nous avons parlé au mot ASTROLOGIE.

L'*Astronomie* est de toutes les sciences, celle qui nous présente le tableau le plus grand, le plus sublime, le plus digne d'occuper l'esprit humain, par la noblesse & l'immensité de ses objets. Aussi les plus grands philosophes de l'antiquité parlèrent de l'*Astronomie* avec admiration. Lactance raconte qu'on demandoit à Anaxagore pour quel objet il étoit né ; il répondit que c'étoit pour contempler les astres. S'il y a dans cette réponse de l'exagération en faveur de l'*Astronomie*, on y voit au moins l'enthousiasme avec lequel un homme de génie contemplant le spectacle du ciel.

Pythagore disoit que les hommes ne devoient avoir que deux études, celle de la nature pour éclairer l'esprit, celle de la vertu pour régler le cœur. On regarde avec raison l'étude de la morale comme la plus nécessaire & la plus digne de l'homme. *The proper study of mankind is man*, dit Pope ; mais on s'écarteroit en croyant qu'on peut être véritablement philosophe sans l'étude des sciences naturelles : pour être sage, non par subtilité, mais par principe ; il faut savoir réfléchir & penser fortement, il faut, à force d'étude, s'être affranchi des préjugés qui trompent la raison, & qui s'opposent au développement de l'esprit. Voilà pourquoi Pythagore ne vouloit point recevoir de disciple qui n'eût étudié les Mathématiques.

Platon faisoit aussi le plus grand cas de l'*Astronomie*. Voyez ce qu'il en dit dans son 35^e livre, intitulé *Epinomis vel philosophus*, que Marcile-Figu appelle le *Trefois* de Platon. Noli te ignorare *Astronomiam sapientissimum quiddam esse*. Il va jusqu'à dire dans un autre endroit que les yeux ont

été donné à l'homme à cause de l'Astronomie : c'étoit peut-être l'idée d'Ovide lorsqu'il disoit :

*Finxit in effigiem moderantum cuncta decorum ,
Ponaque cum spectent animalia cetera terram ,
Os homini sublime dedit cœlumque tueri
Jussit , & creâos ad sidera tollere vultus.*

Métam. l. 8.

Peut-on envisager sans un mouvement de compassion & de honte, la stupidité des peuples qui croyoient autrefois qu'en faisant un grand bruit dans une éclipse de lune, on apportoit du remède aux souffrances de cette déesse, ou que ces éclipses étoient produites par des enchantemens ?

• Cum frustra resonant æra auxiliaria lunæ.

Mét. l. 17. 333.

*Cantus & à curra lunam deducere tentat ,
Et faceret , si non æra repulsa sonent.*

Tib. l. 8.

Indépendamment de ces terreurs qui dégradent le peuple , on trouve dans l'histoire plusieurs traits qui montrent le désavantage que l'ignorance de l'Astronomie donna à des généraux , à des nations entières. Nicias, général des athéniens, avoit résolu de quitter la Sicile avec son armée, une éclipse de lune dont il fut frappé lui fit perdre le moment favorable, & fut cause de la mort du général & de la ruine de son armée, suivent Flutarque; perte si funeste aux athéniens, qu'elle fut l'époque de la décadence de leur patrie. Alexandre même, avant la bataille d'Arbelle, fut obligé de faire rassurer son armée effrayée par une éclipse de lune; il fit venir des astronomes égyptiens, & ordonna des sacrifices. Paul Émile, la veille de la bataille contre Persée, fit aussi des sacrifices à la lune & à la terre, comme aux divinités qui causoient les éclipses.

On voit au contraire d'autres généraux, à qui leurs connoissances en Astronomie ne furent pas inutiles. Périclès conduisoit la flotte des Athéniens, il arriva une éclipse de soleil qui causa une épouvante générale; le pilote même trembloit. Périclès le rassura par une comparaison familière: il prit le bout de son phanéc, & lui en couvrait les yeux, il lui dit: crois-tu que ce que je fais-là soit un signe de malheur? non, sans doute, dit le Pilote; cependant c'est aussi une éclipse pour toi, & elle ne diffère de celle que tu as vue, qu'en ce que la lune étant plus grande que mon manec, elle cache le soleil à un plus grand nombre de personnes.

Agatocle, Roi de Syracuse, dans une guerre d'Afrique vit aussi, dans un jour d'écitil, la terreur se répandre dans son armée, à la vue d'une éclipse; il se présenta devant ses soldats, leur en expliqua

les causes & dissipa leurs craintes. Tacite parle d'une éclipse dont Drusus se servit pour apaiser une sédition. On raconte les choses de cette espèce à l'occasion de Sulpitius Gallus, lieutenant de Paul Émile dans la guerre contre Persée, & de Dion, Roi de Sicile.

Nous lisons on fait également honorable à l'Astronomie, dans l'épître que Roiss. adresse à Charles-Quint, en lui dédiant ses commentaires sur la planisphère.

Christophe Colomb, en commandant l'armée que Ferdinand, Roi d'Espagne, avoit envoyée à la Jamaïque, dans les premiers tems de la découverte de cette île, se trouva dans une disette de vivres si générale, qu'il ne lui restoit aucune espérance de sauver son armée, & il alloit être à la discrétion des Sauvages: l'approche d'une éclipse de lune fournit à cet habile homme un moyen de sortir d'embarras. Il fit dire aux chefs des Sauvages que si dans quelques heures on ne lui envoyoit pas toutes les choses qu'il demandoit, il alloit les livrer aux derniers malheurs, & qu'il commenceroit par priver la lune de sa lumière. Les Sauvages méprisèrent d'abord ses menaces; mais aussitôt qu'ils virent que la lune commençoit en effet à disparaître, ils furent frappés de terreur; ils apportèrent tout ce qu'ils avoient aux pieds du Général, & vinrent eux-mêmes demander grâce.

Combien les hommes ne doivent-ils pas s'applaudir d'avoir perfectionné l'Astronomie assez pour s'affranchir de cette misérable imbecillité, dont ils furent si long-tems dupes; l'aventure de l'année 1186 dut couvrir de honte les astrologues de toute l'Europe. Chrétiens, Juifs ou Arabes, ils s'étoient tous réunis pour annoncer sept ans auparavant, par des lettres qui furent publiées par toute l'Europe, une conjonction de toutes les planètes, qui devoit être accompagnée de si terribles ravages, qu'il y avoit à craindre un bouleversement universel. On s'attendoit à voir la fin du monde; cette année se passa néanmoins comme à l'ordinaire, mais cent autres mensonges aussi bien avérés n'auroient pas suffi pour détacher des hommes ignorants & crédules des préjugés de leur enfance; il a fallu qu'un esprit de philosophie & de recherche se répandit parmi les hommes, leur développa l'étendue & les bornes de la nature, & les accoutuma à ne plus s'effrayer sans examen & sans preuve.

Les comètes furent tout-suit, comme on le fit, un de ces grands objets de terreur que l'Astronomie a enfin dissipés, même parmi le peuple. On est fâché de trouver encore des préjugés aussi étrangers dans le plus beau poëme du seizième siècle.

*Qual con le chiome sanguinoso orrende
Splender cometa suol per l'aria adusta
Ch'è regni mata ei fieri morti adduce
E a purpurei tiranni in fusta luce.*

Gerus. liber. VII. 52.

Les charmes de la poésie font actuellement employés d'une manière bien plus philosophique & plus utiles. Témoin ce beau passage de Voltaire au sujet des comètes, dans son épître à la Marquise du Châtelet.

*Comètes que l'on craint à l'égal du tonnerre,
Cessez d'épouvanter les peuples de la terre;
Dans une ellipse immense achevez votre cours,
Remontez descendez près de l'astre du jour;
Lancez vos feux, volez & revenant sans cesse,
Des mondes épuisés ranimez la vieillesse.*

C'est ainsi que l'étude approfondie & les progrès de la véritable astronomie ont dissipé des préjugés absurdes & rétabli notre raison dans tous ses droits. Mais ce n'est point à cela seul que se réduit l'utilité de cette science, elle contribue au bien général de plus d'une manière.

On fait assez que la Cosmographie & la Géographie ne peuvent se passer de l'Astronomie: Les observations de la hauteur du pôle, apprirent aux hommes que la terre étoit ronde; les éclipses de lune servirent à connoître les longitudes des différens pays de la terre, ou leurs distances mutuelles d'occident en orient. La découverte des sautelles de jupiter a donné une plus grande perfection à nos cartes géographiques & marines, que n'auroient pu faire mille ans de navigations & de voyages, & quand leur théorie sera encore mieux connue, la méthode des longitudes sera encore plus exacte & plus facile. L'écendue de la méditerranée étoit presque inconnue vers l'an 1600; on la croyoit de 53 degrés, au lieu de 35 qu'il y a réellement, on connoît aujourd'hui cette étendue aussi exactement que celle de France.

C'est à l'Astronomie qu'on fut redevable des premières navigations des Phéniciens, & c'est encore à elle que nous devons la découverte du nouveau monde. Christophe Colomb avoit une connoissance intime de la sphère, peut-être plus que personne de son tems, puisqu'elle lui donna cette certitude & lui inspira cette confiance avec laquelle il dirigea sa route vers l'occident, certain de rejoindre par l'orient le continent de l'Asie, ou d'en trouver un nouveau.

S'il reste actuellement quelque chose à désirer pour la perfection & la sûreté de la navigation, c'est de trouver aisément les longitudes en mer; on les a quand on veut par le moyen de la lune, comme on le fera voir au mot Longitude, & si les navigateurs étoient un peu astronomes, leur estime ne les tromperoit jamais de dix lieues, tandis qu'ils sont à deux cents lieues d'incertitude dans des voyages ordinaires. L'usage que l'on fait de l'Astronomie pour le Calendrier, pour la Chronologie, pour la Gnomonique, sont des objets sur lesquels nous aurons occasion de nous étendre dans d'autres articles de cet ouvrage. Enfin M. Dupuis a fait

voir que toute la Mythologie de l'antiquité se réduit à des symboles & des allégories astronomiques; il est évident qu'il faut connoître très-bien le ciel pour pouvoir les entendre; c'est par-là que M. Dupuis est parvenu à cette singularité découverte dont j'ai rendu compte dans le quatrième volume de mon *Astronomie*.

La Météorologie, c'est-à-dire, la connoissance des changemens de l'air, des vents, des pluies, des sécheresses, des mouvemens du thermomètre & du baromètre, a certainement un rapport bien essentiel & bien immédiat avec la santé du corps humain; il est probable que l'*Astronomie* seroit d'une utilité sensible, si l'on étoit parvenu, à force d'observations, à trouver les influences physiques du soleil & de la lune sur l'atmosphère & les révolutions qui en résultent. M. Toaldo a cru reconnoître que la période de 19 ans de la lune ramène les années pluvieuses; *Della vera influenza degli astri, delle stagioni fu mutazioni di tempo, saggio antecorologico in Padova 1781, in-4.* & le saros météorologique 1781. Sur la Météorologie appliquée à la médecine, Voyez la dissertation de M. Retz, Anniens 1780, in-8. Gallien avoit les médecins d'avoir égard au cours des astres; je ne doute pas qu'il ne vult parler des principes de l'Astrologie judiciaire & des influences qu'on imaginoit alors d'après une ignorante superstition. Mais en réduisant tout à fa juste valeur, il paroît que les attractions qui soulevent deux fois le jour les eaux de l'océan, peuvent bien influencer sur l'état de l'atmosphère. On peut consulter, à ce sujet, Hoffmann, Méad & autres qui en ont parlé assez au long; il faudroit que les médecins consultaient au moins l'expérience à cet égard, & qu'ils examinaient si ces écorées & les paroxysmes des maladies n'ont pas quelque correspondance avec les situations de la lune, par rapport à l'équateur, aux syzygies & aux apogées; plusieurs médecins habiles m'en ont persuadé.

Ces différens avantages que se rassemblent en faveur de l'*Astronomie*, l'ont fait rechercher de tous les tems & chez tous les peuples du monde. Joseph dans des antiquités judaïques, fait remonter jusqu'à Adam l'étude de l'*Astronomie* & les découvertes qu'on y fit. Il nous dit que les descendants de Seth y firent des progrès considérables, & que voulant en conserver la mémoire, ils gravèrent sur des colonnes de pierre & de brique leurs observations astronomiques. Joseph attribue à Abraham les premières connoissances des Egyptiens.

On voit plusieurs passages dans le livre de Job, où Dieu même parle d'*Astronomie*: *numquid conjungere valebis micantes stellas pleyadas, aut gyrum ardui poteris dissipare? numquid producis luciferum in tempore suo & vespertinum super filios terrae confurgere facis?*

On attribue aussi à Moïse des connoissances de même espèce; du moins S. Etienne dit de lui dans

dans les actes des Apôtres, qu'il étoit versé *in omni sapientia Egyptiorum*; ce qu'on doit entendre principalement de la connoissance des astres, qui avoit rendu les Egyptiens si célèbres.

C'est ce qui a fait dire à quelques favans, que les Patriarches avoient été les premiers inventeurs de l'*Astronomie*; M. l'abbé Renaudot, dans son Mémoire sur l'origine de la sphère, *Acad. des inscript. T. 1.*, semble incliner pour cette opinion; il en apporte plusieurs raisons, mais nous osons croire avec Balaage qu'elles ne méritent pas d'être réfutées. Il en seroit peut-être de même de l'origine mythologique, rapportée par les Grecs, si la célébrité des noms que la fable nous a conservés, ne méritoit du moins des citations. En lisant les Auteurs qui ont parlé de l'origine de l'*Astronomie*, on trouve une discordance & une obscurité dont on ne pourroit le tirer, si l'on ne distinguoit exactement les époques, ainsi que les différentes parties de l'*Astronomie*, & les degrés des connoissances dont on prétend parler; nous distinguerons donc avec soin la Mythologie, qui remonte tout au plus à 2400 ans avant l'ère chrétienne, tems auquel on a accouru de supposer le déluge: les observations Caldéennes, qui ne vont guère qu'à 720 ans avant Jésus-Christ, & les recherches de détails qui ne commencent que 400 ans avant l'ère chrétienne.

M. Bailly, dans son Histoire de l'*Astronomie*, remonte encore plus haut, & jusqu'à un peuple antediluvien, dont la mémoire s'est perdue; M. Dupuis fait aussi remonter l'*Astronomie* des Egyptiens, à plusieurs milliers d'années avant l'époque ordinaire du déluge. On peut voir le Mémoire que j'ai cité.

Quoi qu'il en soit, on voit assez que cette *Astronomie* ancienne ne comprenoit autre chose que la connoissance du mouvement diurne, celle des révolutions apparentes de la lune & du soleil, la situation & les noms des étoiles & des constellations les plus remarquables, & les tems de l'année où elles étoient cachées par le soleil. V. HÉLIAQUE. Les Caldéens y ajoutèrent des observations plus exactes sur les éclipses de la lune, avec une légère connoissance des planètes; mais ce ne fut enfin que 400 ans avant Jésus-Christ, qu'on rechercha les inégalités de la lune & des autres planètes, la durée de leurs révolutions, la situation de leurs orbites, la grandeur de la terre & la forme du système planétaire, & qu'on entreprit de prédire les éclipses.

Pline le naturaliste se plaint vivement de la négligence des anciens à écrire l'histoire de l'*Astronomie*: c'est une ingratitude, dit-il, & une dépravation de l'esprit; on aime à remplir ses annales de guerres & de carnages pour faire connoître les crimes des humains, tandis qu'on leur laisse ignorer la structure de l'univers, & les bienfaits de ceux qui les ont éclairés. Liv. 2, c. 9. Diodore de Sicile parlant des Atlantes, raconte assez au long

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

ce qu'ils disoient de la naissance des Dieux, & il ajoute que leur sentiment n'étoit pas en cela fort éloigné de celui des Grecs; ainsi, nous le rapporterons comme une des sources de la Mythologie grecque. Les Atlantes étoient le peuple le plus polie de l'Afrique: leur pays étoit riche & rempli de grandes villes. Ils prétendoient que les Dieux avoient pris naissance sur les côtes maritimes de leur pays, & cela s'accorde assez, ajoute Diodore, avec ce que les Grecs en racontent. Leur premier Roi fut Uranus. Ce Prince rassembla dans les villes des hommes qui, avant lui, étoient répandus dans les campagnes; il régla leurs usages & les retira de la vie grossière qu'ils menaient. Comme il étoit soigneux observateur des astres, il détermina plusieurs circonstances de leurs révolutions; il mesura l'année par le cours du soleil, & les mois par celui de la lune, & il désigna le commencement & la fin des saisons. Ces peuples qui ne savoient pas encore combien le mouvement des astres est égal & constant, étonnés de la justesse de ses prédications, crurent qu'il étoit d'une nature plus qu'humaine, & après la mort ils lui rendirent des honneurs divins à cause de son habileté dans l'*Astronomie*, & des bienfaits qu'ils avoient reçus de lui. Diodore L. III, T. 1, pag. 444 de la trad. françoise de Terrasson.

Parmi les fils d'Uranus, les deux plus célèbres furent Atlas & Saturne, qui se partagèrent le royaume d'Uranus. Atlas eut en partage les côtes maritimes; on dit qu'il excelloit dans l'*Astronomie*, & que ce fut lui qui représenta l'univers par une sphère. C'est pour cette raison qu'on a prétendu qu'Atlas portoit le monde sur ses épaules. Diod. pag. 453. Mais probablement la constellation du bouvier, dont la tête étoit autrefois près du pôle & de l'axe du monde, a donné lieu à cette fable d'Atlas.

Cicéron l'expliquoit de la même manière que Diodore: *nec verò Atlas calum suspirare traderetur, nisi caelestium divina cognitio nomen eorum ad errorem fabulae traduxisset.* Tutcl. liv. 5, c. 8. Presque tous les auteurs attribuent à Atlas l'invention de la sphère & les premières connoissances des mouvements célestes. Voyez, au sujet d'Atlas, Homère dans l'Odyssée, liv. 1, v. 52. Vitruve liv. 5, c. 10. Virgile, *Enéide* 1, 745. Diodore, liv. 4, tom. 2, pag. 62 de l'édition françoise. Plin. liv. 2, c. 8. Weidler, *hist. astronomia*, pag. 3 & 11. Atlas donna son nom aux peuples qui habitoient les côtes, & à l'une des plus grandes chaînes de montagnes qu'il y ait en Afrique.

Diodore de Sicile ajoute, qu'Atlas fit part de ses lumières à Hercule, pour reconnoître le service que ce héros lui avoit rendu, en délivrant ses filles qui avoient été enlevées par des voleurs. Hercule transmit aux Grecs ces connoissances qu'il avoit reçues d'Atlas, & passa dans la suite pour l'inventeur de l'*Astronomie*. Sophocles en *palamede*, Vossius de *natura artium*.

X

Le P. Pétau esime qu'Atlas a vécu vers l'an 1638 avant Jésus-Christ, & Hercule 400 ans plus tard. Ceux qui rapportent le siècle d'Atlas à 2400 ans avant Jésus-Christ, le placent au tems où vécut Noé, suivant les commentateurs de l'Écriture; c'est aussi le siècle d'Yao, suivant les Chinois, & c'est la plus haute antiquité qu'on ait coutume de donner aux élémens de la plus simple *Astronomie*, en admettant même la tradition des Grecs sur l'ancienneté d'Atlas.

Aux fables d'Uranus, d'Atlas & d'Hercule, on doit ajouter celle de tous les hommes illustres qui s'étoient distingués dans l'*Astronomie* & qui pèssent pour inventeurs; Lucien dans son petit ouvrage sur l'Astrologie, explique par-là les fables d'Orphée, Tirésias, Atreï, Thésée, Bellerophon, Phryxus, Dardale, Pasiphaë, Endimion, Phaëton: tous, au jugement même des anciens, durent leur célérité à leurs connoissances dans l'*Astronomie*: les hommes étonnés, admistrés avec un saint respect ceux qui leur avoient appris des choses aussi sublimes. Cicéron, *Tuscul. quest. liv. 5, c. 8*. Plin. 2. 9.

Enfin l'on fait assez que la Mythologie des Grecs & l'histoire de ses héros est mêlée avec les noms des signes, des constellations & des planètes, on en peut voir les détails dans Aratus, Hyginus, Manilius, Lucien. Voyez aussi Jof. Scaliger dans ses notes sur Manilius. Riccioli dans son *Almageste*, tom. 1, pag. 398 & Blæw ou Phil. Cæsius, *caelum astronomicum poeticum*, 1662. Enfin le mémoire de M. Dupuis, qui explique la Mythologie par les levers & les aspects des constellations, & il cite en témoignage Porphyre, Syncellus, Jamblique, Athénagore, &c.

Jusqu'ici ce n'est qu'une tradition obscure & fabuleuse; mais vers le tems de l'expédition des argonautes, 1300 ou 1400 ans avant Jésus-Christ, l'*Astronomie* fit quelques progrès. Le centaure Chiron, Théséus, qui d'autres ont dit être fils de Saturne, apparut le premier aux hommes la justice & le culte des dieux, & les figures du ciel, suivant l'auteur de la *Titanomachie*, cité par Clément d'Alexandrie, *Strom. liv. 1, ch. 15*; il en dit aussi parlé dans Aulone, *Edyllum 5, v. 20*, comme ayant été élevé & instruit par Achille. *Mém. Acad. des Inscriptions & Belles-Lettres, tome xiv, 361, xvij. 46*.

L'expédition des argonautes paroît liée avec l'établissement des constellations dans la Grèce, suivant Neuton dans la chronologie, & Fréret dans la descente de la chronologie, publiée en 1758. Cela semble prouver que ces noms furent donnés par les grecs aux constellations, peu après le voyage des argonautes. C'est aussi ce que pensoit Socrate quand il disoit, il n'y a pas encore 1500 ans que la grèce a compté & nommé les étoiles *Nat. quest. liv. 7, 25*. Sénèque écrivoit vers l'an 65; ainsi, il supposoit que ces noms étoient plus anciens de 1400 ans tout au plus que notre ère vulgaire.

ASTRONOMIE CALDÉENNE. Les habitans des vastes plaines de Sennaar, où fut bâtie la ville de Babylone, sont les plus anciens astronomes, & les premiers de tous les observateurs dont les observations nous soient parvenues. Tout concouroit à porter leur attention vers le ciel; la garde des troupes faisoit leur principale occupation; mais la chaleur du jour leur faisoit choisir le tems de la nuit pour leurs travaux, leurs exercices & leurs voyages; en sorte que le spectacle des astres les devoit occuper, pour ainsi dire, malgré eux. Ajoutons à cela, que dans ces plaines, dont quelques-unes étoient couvertes souvent d'un bled léger que le vent dispersoit facilement, les astres devoient servir à reconnoître les chemins (*Voyages des Indes orientales*, Carré, chap. 1, pag. 230), & à se conduire dans les voyages; enfin la curiosité, la superstition, & peut-être le goût de l'Astrologie, ajoutés dans la suite à des motifs plus raisonnables, achevèrent de porter les caldéens vers l'*Astronomie*. Ils furent, peut-être, les premiers à y faire des progrès distingués. Les égyptiens devoient peut-être les précéder dans l'histoire de l'*Astronomie*, & quelques auteurs ont donné la préférence aux égyptiens, sur-tout Lucien & Mar-ham; l'un parmi les anciens; l'autre parmi les modernes, & enfin M. Dupuis, qui trouve les noms de tous les signes du zodiaque, d'accord avec le calendrier rural des égyptiens.

L'Astronomie des babyloniens est citée dans divers endroits de l'écriture. Plusieurs auteurs ont regardé Abraham comme un astronome caldéen qui avoit appris l'Aritmétique & l'*Astronomie* aux égyptiens, Philo de nobilitate, pag. 702, édit. de Cologne, 1613; Josèphe, Alexandre Polyhistor & Araparnus, cités par Eusebe, *præp. ev. liv. 12, ch. 16, 17 & 18*; Vossius, *ch. 30, §. 6*, il est parlé de plusieurs constellations dans le livre de Job, *ch. 9*, & Job étoit arabe de nation, c'est-à-dire, voisin de la Babylone. On trouve dans le tems d'Achaz, 750 ans avant Jésus-Christ, l'usage des cadrans solaires à Jérusalem, & il paroît qu'on les avoit reçus des babyloniens, à qui Hérodote en attribue l'invention (II. 109); d'ailleurs, on voit que ce prince avoit des liaisons avec Teglat-Phalassar, roi d'Assyrie, *Reg. iv, 16, v. 8*. Les babyloniens envoyèrent à Ezechias, pour s'informer de ce qui étoit arrivé au cadran d'Achaz, dont ils avoient entendu parler. *Paralip. I. 2, c. 32*.

Il y a dans la Babylone, dit Strabon, des philosophes très-occupés de l'Astronomie, & qu'on appelle caldéens. Quelques-uns, ajoutant-à, croient pouvoir annoncer aux hommes, des leur assistance, ce qui doit leur arriver; mais ils sont déçus par les autres. La nation des caldéens, & la Babylone qu'ils habitent, est voisine de l'Arabie & de la mer qu'on appelle Persique. Strabon, I. 16, p. 739, édit. de Paris, 1620: il dit ailleurs que les grecs avoient appris cette

science des égyptiens & des caldéens, *lib. 17, p. 806.*

Cicéron raconte aussi que les assyriens, qui habitoient de vastes plaines, ou rien ne pouvoit borner la vue, & empêcher la contemplation du ciel, avoient donné tout leur soin à la connoissance des astres, de *Divinatione, l. 1, n.º 2 & 93.* Diodore de Sicile, quoique prévenu en faveur des égyptiens, dit précisément que les caldéens sont les plus habiles astrologues qu'il y ait au monde, comme ayant cultivé la science des astres avec plus de soin qu'aucune autre nation, *l. 2, t. 1, p. 280.* Virgile en parle à-peu-près de même, *l. 9, c. 7.*

Platon les joint aux égyptiens sous le nom des syriens, *Epin. pag. 622, édit. de 1548*, comme nous le dirons bientôt; ils sont également cités comme inventeurs de l'Astrologie dans Aristote, de *carlo (II. 12)*, & dans son commentateur Simplicius, *fol. 77, verso, édit. lat. de Venise, 1540*; dans Plin., *vij. 56*; dans la vie de Pythagore, par Jamblique, *c. 29, fécl. 158*; dans le commentaire grec de Théon sur Aratus, *pag. 80, édit. de Paris, 1559*; dans Achille Tatinus, au commencement de son *Isagoge, Petavii uranologion, pag. 73, édit. d'Amers, 1705*; dans Solinus *Asia, cap. 65, p. 168*; dans Martianus Capella, *l. 6, de Babyl. p. 225, édit. de 1599.* S. Clément d'Alexandrie, après avoir dit que les égyptiens furent les premiers qui apprissent aux hommes l'Astrologie, ajoute aussi-tôt, & de même aussi les caldéens, *Stromatum, l. 1, art. 16. p. 361* de l'édition grecque & latine faite à Oxford en 1715, & il les cite toujours ensemble. (*pag. 354, Gr.*)

Parmi les modernes, Vossius a été sur-tout persuadé que les babyloniens avoient été les premiers inventeurs de l'Astronomie, de *nat. et art. l. III, cap. 30, p. 105.* Voyez aussi M. Goguet, de l'origine des loix, des arts & des sciences, *t. 1, p. 215, in-4.º*, & M. l'abbé Renaudot dans le premier volume des *Mémoires de l'Académie des Inscriptions.*

Les caldéens prétendoient avoir des observations de 470 mille ans; mais il y a lieu de croire que c'étoient des jours. Voyez ANKÉE. Ptolémée, dans son *Almageste*, le plus ancien ouvrage d'Astronomie que ayons, emploie trois éclipses de la lune, dont la première avoit été observée à Babylone, 720 ans avant J. C. il paroît donc que c'est vers cette date qu'il faut placer les plus anciennes observations qui eussent mérité d'être conservées. Tout ce qui avoit précédé n'étoit qu'un commencement grossier de connoissances astronomiques; il se réduisoit à l'observation du zodiaque, des tems du lever & du coucher héliaque des constellations, du retour des phases de la lune. Il n'y a point d'apparence que la période des 18 ans & 10 jours, qui ramène à-peu-près les éclipses dans le même ordre, ait

été connue de ces premiers caldéens, quoiqu'on l'ait appelée *période caldaïque.*

Le temple de Jupiter Bélus, que Semiramis avoit fait bâtir à Babylone, renfermoit une tour immense, qui, suivant Hérodote, *l. 1, n.º 181*, avoit un flanc de hauteur, environ 200 toises, & autant de largeur, bâtie avec des briques & de l'asphalte, au-dessus de laquelle il y avoit encore sept grandes tours les unes sur les autres; elles subsistoient même du tems d'Hérodote, 440 ans avant Jésus-Christ. Diodore de Sicile dit qu'on convient que ce temple étoit d'une hauteur excessive, & que les caldéens y avoient parfaitement observé les levers & les couchers des astres. *L. II, t. 1, p. 233.*

Diodore de Sicile nous apprend aussi que les caldéens n'avoient qu'une théorie imparfaite des éclipses; qu'ils n'oloient les déterminer, ni en prédire le tems. *L. II, t. 1, p. 279.* Ils connoissoient bien les planètes, mercure, vénus, mars, jupiter & saturne; mais il paroît qu'ils connoissoient mal la durée de leurs révolutions, puisque Ptolémée, long-tems après, ne se flattoit pas encore de les connoître bien; & ils faisoient leur année de 365 jours, & il ne paroît pas qu'ils connussent encore l'erreur de six heures.

Hérodote nous dit expressément que les grecs avoient appris des babyloniens l'usage du pôle, du gnomon & de la division du jour en douze parties; le pôle étoit un instrument fait pour montrer l'heure du jour; le gnomon servoit à montrer les longueurs de l'ombre en différentes saisons, & par conséquent la longueur de l'année. Phérécides, vers l'an 540, fit un cadran solaire dans l'île de Scyros, l'une des Cyclades, comme nous l'apprend Diogène Laërce; mais Anaximandre, mort l'an 547, en avoit fait un à Lacédémone, & l'horloge d'Achaz paroît devoir faire remonter cette découverte au moins jusqu'à l'an 727. Il ne seroit pas étonnant qu'elle eût passé des babyloniens aux syriens, & de Damas à la Judée. Il n'y eut à Rome de cadran solaire que l'an 306 avant Jésus-Christ; ce fut Papirius Cursor qui le fit faire. *Censor. lib. 23; Plin., vij. 60.*

Geminus parle beaucoup des observations des caldéens; mais il ne distingue pas celles qui avoient été faites sous les rois de Babylone, & sous les princes Météopcrsians; on ne sait pas s'il y en eut beaucoup depuis la prise de Babylone par Cyrus jusqu'à la conquête d'Alexandre. Celles dont parle Ptolémée se terminent à l'an 492 avant J. C. à la réserve de deux éclipses de lune des années 384 & 383, & de quelques observations de mercure, que je crois avoir été faites à Babylone; les rois de Perse n'y résidant point, négligèrent probablement d'y encourager les sciences. La révolte arrivée vers l'an 510, avoit déjà préparé la décadence de cette ville. La réputation des caldéens en Astronomie occasionna encore long-

tems après les impostures des avanturiers, qui, sous le nom de caldéens, alloient prédire l'avenir à la crédule populace :

Caldæis sed major eris fiducia.

Juven. 6. 553.

mais alors la superbe Babylone étoit en ruine, & ne ressembloit plus qu'à un désert; les sciences avoient passé en Grèce & en Egypte.

Les égyptiens s'attribuèrent l'invention de l'Astronomie; ils sont cités conjointement avec les caldéens, dans le plus grand nombre des auteurs grecs. Hérodote attribue par-tout aux égyptiens la plus grande partie des connoissances des grecs: Aristote, Plin, Macrobe (*Somm. scip. 22*), attribuent la première invention de l'Astronomie aux égyptiens & aux caldéens, conjointement, Voisius, de *natur. artem.* l. III, c. 30, §. 13, p. 106.

Marshall étoit persuadé que l'Astronomie avoit pris naissance en Egypte, & non pas en Caldée. *Canon chronicus*, p. 143, 475, 481, édit. de 1696; mais il accorde aux babyloniens le rétablissement des sciences en Egypte, après la destruction de l'empire de Perse; car, dit-il, pendant le tems où l'Egypte fut gouvernée par les perses, les arts y furent négligés, & passèrent à Babylone. (p. 475-505) Marshall parle des deux mercures, dont l'un surnommé Thorh, fut regardé comme l'inventeur de l'Astronomie, peu de tems après le déluge, & le second surnommé Trismégiste, vécut peu après Moïse, 1500 ans avant Jésus-Christ (p. 34 & 241). Il cite Syncelle, Eusebe & Jamblique. Les égyptiens se vantoient d'avoir envoyé des colonies par toute la terre: selon eux, Belus en avoit conduit une dans la Babylonie; il y avoit instruit les prêtres caldéens, qui s'adonnèrent à l'étude des astres, à l'imitation des prêtres, des naturalistes & des astrologues égyptiens. *Diod. Sic. l. 1, pag. 56 & 173*. Pausanias dit aussi que Babylone tiroit son nom de Belus, égyptien.

Cependant la manière mystérieuse & énigmatique dont s'expliquoient les prêtres égyptiens, en enveloppant leurs connoissances sous des hiéroglyphes & des emblèmes, fait qu'on n'a rien su de positif sur la date & l'origine de leur première Astronomie; elle étoit peut-être plus ancienne, mais plus bornée.

Diodore de Sicile, quoique très-favorable aux prétentions des égyptiens, dit peu de chose de leurs connoissances en ce genre, si ce n'est qu'ils marquoient au juste les révolutions des planètes & leurs mouvemens directs, stationnaires & rétrogrades. *Diod. l. 2, p. 172*.

Diodore, en parlant des habitans de Thèbes ou Diospolis, ville de la haute Egypte, qui se prétendoient les plus anciens habitans de la terre, & les premiers inventeurs de l'Astronomie, dit seulement, il paroît qu'ils avoient observé soi-

gnement les éclipses, & qu'ils faisoient des prédictions à ce sujet; mais Diodore ne dit pas précisément & clairement, comme M. Terrafon le lui fait dire, qu'ils prédisoient des éclipses, l. 2, t. 1, p. 119.

Diodore Laërce, dit aussi que depuis le tems de Nilus, 1200 ans avant J. C. jusqu'à celui d'Alexandre, les égyptiens avoient observé 373 éclipses du soleil, & 832 de la lune; mais il ne dit point où & comment on avoit fait ces observations.

Il ne paroît pas qu'Hipparque ait fait aucun usage des éclipses observées en Egypte, dont probablement le tems & la mesure n'avoient pas été assez bien déterminés; il ne se servit que de celles de Babylone.

On est incertain si les égyptiens ont connu plus de 400 ans avant J. C. l'erreur d'environ six heures qu'il y a dans les années communes de 365 jours; il semble qu'ils l'ignoreroient alors, comme le croient M. Goguet & M. Dupuy. *Mém. de l'Acad. des Inscriptions*, tom. 29, pag. 116. Voyez ANNÉE.

Hérodote n'en parle pas; mais Platon & Eudoxe, 80 ans après Hérodote, apprirent des égyptiens, comme une chose mystérieuse & secrète, la circonstance des six heures. Strabon, l. 17, p. 206; ce qui semble prouver que la découverte étoit récente en Egypte. Goguet, t. 3, pag. 98.

C'est alors probablement qu'on distingua l'année astronomique & l'année civile; celle-ci continua cependant à être de 365 jours. (*Geminus*, c. 6.) Voyez l'histoire du calendrier égyptien, par M. de la Nauze, dans les *Mém. de l'Acad. des Inscriptions*, t. 14, p. 334. M. Dupuy, t. 29. M. des Vignoles, *Miscell. Berolin.* t. 4, p. 1. Théod. Gaza, *de mensibus*, apud Petav. in *Uranol. Cenfor.* c. 18, p. 93.

Diodore Laërce attribue beaucoup de connoissances aux égyptiens; mais il paroît, par ce que nous venons de dire, que c'est environ à l'an 400 avant J. C. qu'il faut rapporter ce qu'il en dit. Suivant cet auteur, on savoit en Egypte que les étoiles étoient des feux; que le monde étoit rond comme une boule; que la lune s'éclipsait en entrant dans l'ombre de la terre, & que le mouvement des planètes étoit fort inégal. (*In proemio*, p. 3.) Diodore de Sicile dit à-peu-près la même chose, *liv. 1, tom. 1, pag. 149, édit. française*.

Il est probablement de même de ce que rapporte Macrobe (*Somm. scip. l. 1, c. 19*), quand il dit: les égyptiens ont découvert que le cercle décrit par le soleil est environné par un cercle extérieur que mercure décrit, & que le cercle de vénus renferme encore celui de mercure, de manière que ces deux astres font au-delà du soleil lorsqu'ils sont à la partie supérieure de leurs orbites. Vitruve, l. 9, c. 4, en parle assez au long, comme nous le dirons à l'occasion du syst-

tème de Copernic, qui étendit cette belle idée à toutes les autres planètes; ils eurent la première idée de la pluralité des mondes, & Orphée la répandit parmi les grecs. Voyez PLURALITÉ.

La période ou semaine de sept jours, dont chacun est consacré à une des sept planètes, suivant Hérodote, *l. II, c. 82*, & Dion Cassius, *liv. 37*, fut un établissement des égyptiens, adopté ensuite par les grecs & par les romains.

Le lever & le coucher des étoiles en divers tems de l'année a dû être un des premiers objets de l'attention des peuples observateurs; aussi les égyptiens en avoient dressé des tables, comme il paroît par un passage de Diodore de Sicile, *l. 1, p. 46 de l'édit. de 1604*, où il s'agit du tombeau d'Osymandias, roi d'Héliopolis. On y voyoit un cercle d'or de 365 coudées (chacune répond à 20 $\frac{1}{2}$ pouces). On voyoit un jour de l'année à chaque coudée, avec le lever & le coucher des étoiles, qui répondoient à chaque jour, & les propriétés qu'on leur attribuoit. Ce cercle fut enlevé sous le règne de Cambyse, roi de Perse, lors de la conquête de l'Égypte, 524 ans avant J. C.

Le lever héliaque de sirius ou de la canicule, fut sur-tout observé soigneusement en Égypte. Ce genre d'observations avoit précédé, selon les apparences, tous les autres, & remonte peut-être à 4 mille ans avant J. C., ou même beaucoup plus haut, suivant quelques auteurs.

Strabon, qui voyagea en Égypte vers le tems d'Auguste, ne trouva presque plus de vestiges de ces sciences parmi les prêtres d'Égypte, & les égyptiens n'avoient brillé long-tems auparavant qu'à raison de l'ignorance des grecs; mais au tems de Strabon, leurs sciences & leur célébrité avoient passé aux habitans de la Grèce, comme la plupart des grands établissemens de la Grèce avoient été formés par des colonies venues d'Égypte.

Les grecs instruits à l'école des égyptiens, les ont regardé comme les inventeurs de toutes les sciences, & leurs écrivains en ont parlé sur ce ton; de sorte qu'il devient très-difficile pour nous de démêler le mérite des autres nations, sur-tout des caldéens. Nous croyons cependant que les caldéens étoient presque aussi ignorans en *Astronomie* 800 ans avant J. C.; que les péruviens & les mexicains se sont trouvés l'être dans le 15^e siècle.

ASTRONOMIE des Grecs. Platon attribue aux barbares, c'est-à-dire, aux étrangers, toute la philosophie des grecs, comme l'observe S. Clément d'Alexandrie, *Stromatum, l. 1, c. 15, p. 355*. Il remarque encore que Pythagore étoit tyrrénien; Aristhètes, phrygien; Thalès, phénicien; qu'Orphée étoit de Thrace; & Homère, égyptien, suivant le plus grand nombre. Tout annonce l'antériorité des africains & des asiatiques sur les grecs.

Thalès de Milet, que plusieurs ont dit être phénicien, parut dans un tems où les grecs n'avoient encore aucune *Astronomie* planétaire, environ 600 ans avant J. C. Diogène Laërce (*l. 1, p. 6, édit. de 1594*), d'après Eudème, qui avoit fait l'histoire de l'*Astronomie*, nous apprend que Thalès fut le premier des grecs qui déterminât le cours du soleil d'un solstice à l'autre, & qui régla la division de l'année. Il voyagea en Égypte étant déjà avancé en âge: Thalès fut le premier qui apprit aux grecs la cause des éclipses, de Placid. *phil. l. II, ch. 24*; il connoissoit la rondeur de la terre, & la divisait en zones par le moyen des tropiques & des cercles polaires; il parloit du cercle oblique du zodiaque, du méridien, qui coupe tous les cercles en s'étendant du nord au sud, & de la grandeur du diamètre apparent du soleil.

Hérodote, *l. 1, n° 74*; Cicéron, *de divin. 1*; Plin. *II. 12*, assurent que Thalès avoit prédit aux joniciens une éclipse totale de soleil, qui arriva pendant la guerre des lydiens & des médés. Riccioli & Newton croient que cette éclipse fut celle du mois de mai, 585 ans avant J. C. Suivant Bayer dans les mémoires de Pétersbourg, & M. Costard dans les Transactions philosophiques de 1753, ce fut celle qui arriva le 18 mai 603, à huit heures du matin; M. Chassebœuf la met à 621. Au reste, la manière dont Hérodote raconte cette prédiction est si vague, qu'on a peine à croire qu'elle ait réellement été faite; mais s'il étoit vrai que Thalès eût prédit une éclipse de soleil, ce ne pourroit être que par le moyen de la période générale de 18 ans & 11 jours, dont il auroit eu connoissance par les égyptiens ou caldéens; car on n'étoit pas encore au point de pouvoir prédire les éclipses par un calcul exact des mouvemens de la lune.

L'année des grecs, aussi bien que celle des égyptiens, avoit été originairement de 354 jours; elle étoit encore de 360 au tems de Solon. (*Marsham, pag. 360.*)

À l'égard des planètes, vécus est la seule dont il soit parlé dans Hésiode & dans Homère, comme dans l'Écriture. Démocrite soupçonnoit qu'il y avoit plusieurs étoiles errantes; mais il n'avoit pas osé en déterminer le nombre. *Scr. quæst. nat. l. 7, cap. 3*, & les grecs ne connoissoient point encore les mouvemens des cinq planètes, lorsque Eudoxe en apporta d'Égypte la première connoissance, 380 ans avant J. C. Les grecs en voyant vécus briller, tantôt le soir & tantôt le matin, en avoient fait deux planètes différentes, *céperos* & *céphoros*. On prétend que Pythagore fut le premier qui fit connoître aux grecs que ces deux astres n'en faisoient qu'un. Stobée, *Ecl. phys. l. 1, p. 55*; Plin. *liv. II, cap. 8*; Diog. Laërce, *l. 8, scd. 14*.

Anaximandre, né 610 ans avant Jésus-Christ; ensuite Anaximène, Anaxagore, Démocrite, Pla-

loans de Crotone, sont célébrés par les auteurs grecs comme ayant continué au progrès de l'Astronomie. Eudoxe naquit 421 ans avant J. C. Cicéron dit qu'on peut le regarder comme le prince des astronomes ; & cela au jugement des hommes les plus sages, de *Divinat. II. 17*. Sextus Empiricus cite Eudoxe avec Hipparque, c'est-à-dire, avec le plus grand astronome de la Grèce. *Advers. Mathem. lib. 1. initio*. Cependant en voyant combien la sphère d'Eudoxe, ou la situation des cercles de la sphère par rapport aux étoiles, qu'on lui attribue, est différente de celle qui devoit avoir lieu de son tems, on a sù se fier de croire qu'Eudoxe n'observa presque point lui-même, & n'écrivit que d'après les égyptiens, chez lesquels il avoit été pour apprendre l'Astronomie, comme le racontent Cicéron, Strabon, Diogène Laërce. Sincère dit aussi qu'Eudoxe rapporta le premier de l'Egypte la connoissance des mouvemens planétaires. *Quæst. nat. 19. 3*.

Virure lui attribue l'invention de l'araignée, espèce de cadran solaire. *Arachnen Eudoxus astrologus, non nulli dicunt Apollonium*. (IX. 9. *initio*). Hipparque, l'un des plus grands astronomes dont les observations nous soient parvenues, cite quelquefois Eudoxe avec éloge. On peut encore citer Pythas parmi les astronomes grecs ; cependant leurs progrès furent lents & médiocres jusqu'au tems où Ptolémée Philadelphe ranima les sciences à Alexandrie, en se déclarant le protecteur des sages, vers l'an 180 avant J. C. Les observations de Timochares, d'Arifstille, d'Eratosthène & d'Hipparque, donnèrent à l'Astronomie une nouvelle face. Ces observations firent connoître la grandeur de la terre, la précession des équinoxes, la durée & les inégalités des mouvemens planétaires ; mais les connoissances que l'on eut sur cette partie étoient encore bien imparfaites : aussi Ptolémée faisoit-il cette remarque à l'occasion d'Hipparque ; le tems depuis lequel nous avons des observations des planètes rédigées par écrit, est si court en comparaison de la grandeur d'une telle entreprise, qu'on ne peut être assuré des prédictions qu'on en feroit pour un long espace de tems. Ainsi je pense qu'Hipparque, amateur du vrai, entreprit à la vérité ce travail pour les mouvemens du soleil & de la lune, en démontrant, autant qu'il étoit possible, que ces mouvemens étoient réellement circulaires ; mais il ne l'entreprit pas pour les autres cinq planètes, du moins autant qu'il paroit par les ouvrages que nous avons pu avoir de lui. *Almageste, liv. ix, chap. 2*.

Possidonius doit être aussi compté au nombre des astronomes grecs ; c'est lui dont Plin. a adopté les opinions sur les distances des planètes, & ces étoient fort exactes ; il vivoit 80 ans avant J. C.

Pour avoir sur les astronomes grecs tous les détails possibles de la plus vaste érudition ; il

faut consulter Fabricius, *Biblioth. græcæ, t. 11*. On a l'histoire de l'Astronomie de Weidler, qui a fait très-grand usage du livre de Fabricius ; on peut aussi consulter Scaliger dans ses prolégomènes sur Manilius, Voisius, de *Sci. mat.* le P. Pétau, *Uranologion*, & sur-tout l'histoire de l'Astronomie par M. Bailly.

Les romains, occupés de l'art militaire, cultivèrent peu les sciences. Le Sénatus-Consulte, de l'an 52 de J. C., par lequel les mathématiciens furent chassés d'Italie, renouvelé par Domitien, en 83, dut éloigner encore le goût des Mathématiques. Nous n'y voyons d'autre astronome connu que Menelaüs, qui vivoit à Rome au commencement du règne de Trajan, l'an de Jésus-Christ 98. (*Pétau, l. xj, cap. 23*). Il détermina les longitudes de plusieurs étoiles, par le moyen des conjonctions de la lune : il en est parlé dans Ptolémée, *vij. 3*.

Ptolémée est le seul de tous les anciens astronomes dont il nous soit resté un ouvrage important : c'est à lui que nous sommes obligés d'avoir recours pour l'histoire de cette science ; on en peut voir la notice dans Weidler, *pag. 184, 202*, & ci-devant au mot ALMAGESTE.

Théon d'Alexandrie est le seul successeur de Ptolémée dont il nous reste un livre utile, qui est un commentaire sur l'*Almageste* de Ptolémée ; il y a une éclipse de soleil observée à Alexandrie l'an 365. Il eut une fille nommée Hypatia, dont les connoissances en Astronomie excitèrent une si grande jalousie parmi les concitoyens, qu'elle fut assassinée, déchirée & traînée dans les rues par la populace d'Alexandrie. Boulliaud, *Astron. phil. p. 15*. Il cite Suidas & Hefychius, *in vitis Phil.*

L'éclipse observée par Théon, avec celle que Thius observa l'an 500 à Athènes, sont presque les seules observations qui aient été faites dans la Grèce depuis Ptolémée ; si cependant l'on cherchoit avec soin dans les manuscrits des grandes bibliothèques, il seroit possible qu'il s'en trouvât encore quelques-unes.

On ne voit pas précisément dans quel tems les sciences s'éteignirent dans la Grèce ; nous savons seulement que dans la division de l'Empire, l'Egypte resta aux Empereurs d'Orient jusqu'à l'an 614 qu'elle fut ôtée à l'Empereur Héraclius par les Perses, sous la conduite de Colocès (*Abulfaragius, Hist. Dynast.*) ; sous Omar, second Calife ou second successeur de Mahomet, à Alexandrie fut prise par Amrou Ebnol-Aas, & la fameuse bibliothèque fut brûlée l'an 641. Ce fut-là le terme du progrès des sciences en Egypte & en Grèce ; car les Arabes n'eurent d'abord ni le goût ni le loisir de s'en occuper.

ASTRONOMIE des Arabes. Il se passa près de 200 ans de guerres & de révolutions avant que les Arabes fissent rien pour les sciences. Mais enfin, les Califes de Babylone ayant étendu leur domination jusqu'aux Indes, le loisir les dirigea vers l'étude ; le second Calife de la famille des Abbassides

fut Almanfor ou Almanfour, Prince rempli de connoissances, & qui commença de répandre dans son Empire le goût de l'étude. *Historia compendiosa Diaphanum, autore Georgio Abulpharagio, &c., 1763, 2 vol in-4., pag. 160. Voyez aussi le Dictionnaire de Bayle, au mot ABULPHARAGIO.*

Almanon, fils de Harun Al-Rashid, & petit-fils d'Almanfor, parvint à l'Empire en 814; ayant été élevé avec soin & dans l'amour des sciences, il s'appliqua à les cultiver & à les faire fleurir dans les états; il demanda aux Empereurs Grecs les livres de Philosophie qu'il y avoit chez eux. Si c'est à Michel le Begue, qu'il avoit vaincu plusieurs fois, cet Empereur, qui ne savoit ni lire ni écrire, ne dut pas le rendre fort difficile à cet égard; Almanon rassembla des interprètes habiles tels que Melus ou Méccin, pour en faire des traductions; il encourageoit ses sujets à les étudier; il fréquentoit les savans & assisloit à leurs exercices (*Abulpharage, page 160*). Il fit traduire l'Almageste; il décrimina l'obliquité de l'écliptique; il fit mesurer un degré de la terre sur les bords de la mer rouge, comme on le voit dans les *Éléments d'Astronomie d'Almagani*, qui vivoit dans le même tems, c'est-à-dire vers l'an 830.

Alhotegeius, Prince Arabe, qui vivoit l'an 912, fit aussi des observations à Aracle en Mésopotamie, & à Antioche. Il rectifia les tables de Ptolémée, & ses observations servirent encore dans la suite pour les tables Alphonsines. Nous avons aussi des observations de Tabeth & de Ibn-Iounis.

On trouve dans les transactions philosophiques de la Société royale de Londres un Mémoire d'Edouard-Bernard, où il est parlé d'un très-grand nombre d'Astronomes Arabes, dont les ouvrages n'existent qu'en manuscrit; une seule bibliothèque d'Oxford en renferme plus de quarante qui contiennent des traités ou des observations astronomiques; il y en a plusieurs dans la bibliothèque du Roi à Paris, & dans la bibliothèque de l'Écurial, dont on a publié le catalogue il y a quelques années. Il seroit bien à souhaiter que nos savans Interprètes voulussent tourner leurs vues sur ces objets, qui seroient plus utiles que les romans qu'ils ont traduits, & qui illustreroient la Littérature orientale dont ils s'occupent.

Les Arabes, dans le VIII^e siècle, s'emparèrent de l'Espagne; ils y portèrent leur *Astronomie* & la Philosophie péripatéticienne; & il y eut plusieurs hommes célèbres qui firent long-tems la réputation de l'Espagne. Parmi les Astronomes on compte sur-tout Arzachel & Albaren.

Les sciences pénétrèrent avec le Musulmanisme jusques dans la Perse, & de-là dans la Tartarie & dans les Indes. Il nous en reste un monument précieux dans les ouvrages d'Ulug-Beg ou Ulug-Beigh, qui étoit petit-fils du grand Tamerlan, & qui, vers l'an 1430, régnoit dans la Eschiane: la capitale de son Empire étoit Samarkande,

située à 39 degrés 37' 23" de latitude, & 6 degrés à l'orient de la mer caspienne. La domination de ce Prince s'étendoit sur les deux rives du fleuve Oxus ou Gihon, qu'on appelle aussi Gilhus. Nous avons de lui un catalogue célèbre des longitudes & des latitudes des étoiles. Ulug-Beg composa aussi des tables astronomiques pour le méridien de Samarkande, tant sur les observations que sur celles de Salaheddin Al-Roumi, qui en avoit formé l'entreprise. On dit que ces tables étoient si exactes, qu'elles différoient peu de celles de Tycho-Brahé. *D'Herbelot, page 235.*

ASTRONOMIE des Chinois. Quoique l'*Astronomie* ait été cultivée très-anciennement à la Chine, elle y avoit fait peu de progrès, & il sembleroit l'on voie les Chinois suivre pas à pas les autres nations dans leurs progrès. Le P. Gaubil a composé une histoire de l'*Astronomie* chinoise, publiée par le P. Soucier en 1729 & 1732, dans laquelle on trouve d'assez grands détails historiques; mais on n'y trouve, pour ainsi dire, qu'une seule observation de l'an 1278, des Astronomes aient profité.

Dans les premiers siècles de l'Histoire de la Chine il n'est fait mention que d'une seule éclipse, que les uns rapportent à l'année 1948 av. J. C. d'autres à 2159; le P. Gaubil la fixe au 12 Octobre 2155, tome II, pag. 115, en comptant à la manière des chronologistes ordinaires. M. Fréret, émyé des calculs de M. Cassini, la place au 23 Septembre 2007. (*Acad. des Inscrip. XVIII, 251*); mais ces différences prouvent que l'éclipse est très-douteuse.

Dans les siècles postérieurs, jusqu'à l'an 721, il n'y a de même qu'une seule éclipse dont il soit fait mention; elle arriva le 6 septembre 776 avant J. C. (II. 154); la suite des 32 éclipses rapportées par Confucius dans le Tchun-Tsou, ne commence qu'à l'an 721, & va jusqu'à l'an 483; mais les Caldéens observoient alors avec assiduité & avec précision, en sorte qu'on seroit tenté de croire que les Chinois avoient emprunté des Caldéens les observations dont ils ont enrichi leur histoire; on y trouve d'ailleurs de fausses éclipses, suivant le P. Couplet. (*M. Cassini, Règles de l'Astronomie indienne*).

Vers l'an 66 avant J. C., Lieou-Hin écrivit un cours entier d'*Astronomie*. Il supposoit l'obliquité de l'écliptique de 24 degrés chinois, ou 23°, 39 minutes 18 secondes. Il ignoroit le mouvement propre des étoiles, aussi-bien que toutes les équations & les inégalités de la lune, du soleil & des planètes. Il rapportoit à l'équateur la situation de tous les astres. Ainsi, l'on voit que l'*Astronomie* étoit moins avancée à la Chine qu'à Alexandrie, où Hipparque venoit de découvrir la précession des équinoxes.

L'an 126 de J. C., Lieou-Hong & Tlay-Yong parlèrent les premiers des inégalités de la lune qu'ils faisoient de cinq degrés chinois; ils reconnoissent que la longueur de l'année n'étoit pas tout-à-fait de 365 jours six heures, mais l'*Astronomie* de Ptolémée étoit alors connue dans tout l'orient, & il

n'est pas possible qu'on n'en eut connoissance à la Chine.

Les observations de Co-Cheou-King faites à Pekin avec un gnomon de 40 piés de hauteur, l'an 1273, sont de beaucoup postérieures à celle que les Arabes avoient faite au tems d'Almamoun & d'Albatagnius. Enfin l'*Astronomie* étoit extrêmement négligée, lorsque les Missionnaires Jésuites y portèrent celle des Européens, qui fut bientôt adoptée par ordre des Empereurs.

Renouvellement de l'Astronomie. Depuis l'an 800 jusqu'à l'année 1300, l'Europe étant plongée dans la plus profonde ignorance, il n'y eut de bons ouvrages & de gens habiles que parmi les Arabes. L'Empereur Frédéric II, vers l'an 1230, prépara le renouvellement des sciences, en se déclarant protecteur des Savans. Il rétablit l'Université de Naples; il fonda celle de Vienne en Autriche en 1273; il donna une nouvelle vigueur aux écoles de Bologne & de Palerme; il fit traduire de l'arabe plusieurs anciens livres de Médecine & de Philosophie, en particulier l'Almageste de Ptolémée qui fit la première époque du renouvellement de l'*Astronomie* en Europe.

Sacro-Bosco, mort en 1256, fut un des premiers qui acquit de la réputation dans l'*Astronomie*: Alphonse, Roi de Castille, fit consigner des tables nommées *Alphonsines*, en 1252. Purbachius publia en 1460 ses *Théoriques*, sur lesquelles il y a eu plusieurs commentaires; il mourut en 1461. Gassendi a composé la vie de Purbachius, tome V, aussi bien que Melchior Adam *vita germ. philosop. Heidelberga*, 1615, in-8°. Tannstetter, dans la préface qu'il a mise dans les tables des éclipses de cet auteur, & Weidler, page 301, ont donné le catalogue de tous ses ouvrages. Quoiqu'il fut très-peu observateur, l'on trouve cependant quelques observations de lui, avec celles de Regiomontanus & de Waltherus, publiées par Schoner.

Mais c'est à Regiomontanus que commence la liste des véritables observateurs, & le renouvellement de l'*Astronomie*. Ses observations & celles de son disciple Waltherus sont encore aujourd'hui d'un très-grand secours aux astronomes.

Copernic commença vers l'an 1507 à méditer sur l'*Astronomie*, à faire de nouvelles recherches & de nouvelles tables des mouvemens célestes, & il finit en 1543 son fameux livre de *revolutionibus orbium coelestium*, qui fait époque dans l'histoire de l'*Astronomie*. V. **SYSTÈME DE COPERNIC.**

Pierre Apian publia en 1540 son *Astronomicum Cosmæum*; Erasmé Reinhold composa en 1551 des tables astronomiques, dédiées à Albert de Brandebourg, Duc de Prusse, qui étoit son bienfaiteur, & intitulées par cette raison: *Tabula prutenica*; elles étoient faites sur les observations de Copernic & de Ptolémée; mais elles étoient plus exactes que celles de Copernic, parce que celui-ci, à qui les longueurs des calculs déplaçoient, avoit mis peu de soin dans la construction de ses tables as-

tronomiques; souvent même elles ne représentent pas exactement les observations. Sur lesquelles l'auteur les avoit établies. Les tables de Reinhold sont pour le méridien de Königsberg, capitale du royaume de Prusse sur la mer baltique. Reinhold publia encore plusieurs ouvrages, & il en préparoit beaucoup d'autres, lorsqu'il mourut en 1553.

Oronce Finé, Gemma Rihius, Leovinus, Jean Fernel, Pierre Cardan, Rheticus, Nonius, Stadius, Mæstlinus se distinguèrent aussi dans le XVI^e siècle, les uns par des éphémérides, les autres par des tables, des traités ou des inventions d'*Astronomie*. Le Landgrave de Hesse-Cassel, Guillaume IV, fut le Souverain qui contribua le plus par sa protection, les dépenses & ses travaux personnels au rétablissement de l'*Astronomie* depuis 1561 jusqu'en 1592: il s'appliqua lui-même aux observations astronomiques; il s'attacha Rothmann & Birgius, le premier qui étoit grand astronome, & le second qui excelloit à faire les instrumens connus de son tems; ses observations sont les meilleures qui aient été faites avant Tycho: la plupart ont été publiées à Leyde en 1618; on les trouve encore avec le catalogue des étoiles tiré des observations de ce Prince dans l'histoire céleste de Tycho, publiée en 1666; les autres sont en manuscrits; il y en a une copie dans la bibliothèque de l'Académie des Sciences de Paris.

Enfin parut TYCHO-BRAME, le plus grand observateur qu'il y ait eu; il fut le premier qui, par l'exactitude & le nombre de ses observations, donna lieu à la perfection de l'*Astronomie*; toutes les théories & les tables & les découvertes de Kepler sont fondées sur ses observations, & leurs noms, à la suite d'Hipparque & de Ptolémée, doivent aller à l'immortalité.

Depuis l'an 1582 jusqu'en 1597, Tycho fit à Uranibourg une si grande quantité d'observations sur toutes les parties de l'*Astronomie*, que non-seulement il perfectionna toutes les théories & tous les calculs dont on faisoit usage avant lui, mais il donna lieu à Kepler de découvrir ses fameuses loix des mouvemens planétaires qui ont conduit Newton à la découverte de l'attraction, & qui par conséquent ont amené l'*Astronomie* au degré de perfection où nous la possédons actuellement. Tycho mourut le 24 octobre 1601.

KEPLER, né en 1571, mort en 1631, donna, en 1616, les meilleures tables qu'on eût eu jusqu'alors sous le nom de *Tables rudolphines*; il découvrit les véritables loix des mouvemens planétaires, & à cet égard on peut le regarder comme le premier de tous les astronomes qui aient jamais paru.

Voici maintenant les astronomes du XVII^e siècle qui ont précédé l'établissement des Académies. Jean Bayer publia en 1603 des cartes célestes où toutes les étoiles étoient marquées par des lettres grecques dont on se sert encore aujourd'hui. Le P. Clavius, Jésuite, donna un vaste traité du calendrier; Pitiſcius publia des tables de sinus beaucoup plus

étendues

étendues qu'on ne les avoit avant lui. Fabricius découvrit la changante de la Balaine : Magini calcula d'amples éphémérides, ainsi que David Origan. Simon Marius découvrit la nébuleuse d'Andromède, & disputa à Galilée la découverte des satellites de jupiter. Snellius publia une mesure de la terre en 1617. Nicolaus Muler donna, en 1611, de bonnes tables astronomiques, intitulées : *tabulae friskeae*.

Neper, baron écossais, mérite d'être célébré dans l'histoire de l'Astronomie, pour l'invention des logarithmes qu'il publia à Edimbourg, en 1614. *V. LOGARITHMES.*

Lansberg ou Lansbergius, né à Gand en 1560, donna en 1632 des tables astronomiques dont on s'est servi long-tems, quoique peu exactes ; il y a plusieurs ouvrages de lui, qu'on a imprimés, en 1663, à Middelbourg en un vol. in-fol. Il mourut en 1632 en Zélande où il étoit ministre de la religion protestante.

Henri Briggs, professeur de Géométrie à Oxford, commença le calcul des grandes tables de logarithmes dont nous nous servons encore. Il mourut le 26 janvier 1630, à l'âge de 74 ans.

Justus Byrgius, né en Suisse en 1552, travailloit aux observations & aux instrumens mathématiques à Cassel, comme nous l'avons dit en parlant du Landgrave de Hesse. Il avoit beaucoup de talent : on dit qu'il eut avant Neper l'idée des logarithmes, & avant Huygens, celle du pendule dans les horloges. Il mourut en 1633.

Laurent Eichstadius composoit ses éphémérides à Dantzick en 1633 ; il donna, en 1644, ses tables astronomiques. On a de lui quelques observations. Jérémie Horroccius ou Horrockes s'occupoit d'Astronomie en Angleterre dès 1635 ; il mourut le 3 janvier 1641 à l'âge de 22 ou 23 ans. Le recueil de ses ouvrages a été imprimé à Londres en 1678, in-4°, avec des additions de Flamsteed.

Guillaume Crabtree, drapier de Broughton, près de Manchester dans la province de Lancastre, observa le passage de vénus en 1639 ; il fit beaucoup d'observations astronomiques, comme on le voit par celles que Wallis fit imprimer avec les œuvres d'Horroccius. Crabtree mourut, comme son ami Horroccius, en 1641. Voyez *Sterburn* dans son *Atenilus*, où il y a une chronologie des astronomes.

Galilée, né à Florence en 1564, mort en 1642, est célèbre par la découverte des satellites de jupiter, des lois d'accélération, de la libration de la lune, de taches du soleil ; il fut un des premiers restaurateurs de la Physique & de l'Astronomie. Il fit le premier des lunettes d'approche, & s'éleva par-là un nouveau ciel ; il mit hors de doute le système de Copernic. Voyez son *Eloge* par le P. Frail.

Longomontanus, ou Christian Severini, fils d'un laboureur de Danemarck, naquit en 1562 ; il vécut pendant huit ans chez Tycho ; il lui servoit d'assistant. Tome I, 1.^{re} Partie.

beaucoup pour ses observations & ses calculs. Il mourut à Copenhague en 1647. Nous avons de lui des tables, & l'*Astronomia danica*, qui est un très-bon ouvrage. Voyez *Bartholinus de Scriptis Danorum* ; le Dictionnaire de Bayle, au mot LONGOMONTANUS ; M. Lenoble, au tome II d'*Uriani ou des Tableaux de Philosophes*. Longomontanus est appelé mal-à-propos Chilon dans Voisius, dans Morci, dans le Catalogue d'Oxford, & dans le *Diarium* de White.

Christophe Schœner, jésuite, né dans la Souabe en 1575, mort à Neiss en 1650 ; nous en parlerons à l'occasion des taches du soleil, qu'il découvrit, ou du moins qu'il observa le premier d'une manière complète.

Denis Petau, jésuite, un des plus habiles chronologistes qu'il y ait eu, & l'un des plus grands calculateurs en matière d'Astronomie ancienne ; il étoit encore historien, poète, orateur, & critique plein de sagacité ; il naquit à Orléans en 1583, & mourut à Paris en 1652. Son grand ouvrage de *Doctrina temporum*, & surtout le troisième volume, intitulé *Uranologion*, renferme beaucoup de choses importantes en Astronomie.

Pierre Gallendi, né en 1592 près de Digne, mourut à Paris en 1655. Voyez le Mémoire de M. l'abbé Goujet sur le Collège royal, tom. II, pag. 157, in-12. Dans le recueil de ses ouvrages en cinq volumes in-folio, il y a beaucoup d'observations & de dissertations astronomiques.

Jean-Baptiste Morin, né à Villefranche en Beaujolais le 23 février 1583, fut professeur de Mathématique au Collège royal de France ; il devint célèbre par son livre sur la science des longitudes, dont la première partie parut en 1634. Nous avons de lui beaucoup de bons ouvrages ; il mourut en 1666. Voyez le Mém. historique sur le Collège royal, par M. l'abbé Goujet, tom. II, p. 137, édit. in-12.

Thomas Smeat, publiâ en 1661 à Londres, des tables carolines, dont les astronomes ont fait long-tems usage, & qui ont été réimprimées en 1705 & en 1710 ; ce fut Halley lui-même qui prit soin de l'édition de 1710.

Cornelius, marquis de Malvasia, composa ses éphémérides à Bologne en 1672. Domin. Cassini observoit avec lui, & il fut un des plus illustres amateurs de cette science ; il étoit sénateur de Bologne, & général des troupes du duc de Modène.

Adrien Auzout observoit à Paris en 1666 & 1668. Ses observations sont dans l'histoire céleste de M. le Monnier ; il est regardé comme l'inventeur du Micromètre à curseur ou à fil mobile, & il a partagé avec M. Picard le mérite d'avoir fait appliquer les lunettes au quart de cercle, invention que M. de l'Isle attribue à Roberval ; Auzout mourut en 1697.

Stanislas Lubienietzki, gentilhomme polonois, fut l'auteur du grand ouvrage, intitulé : *Theatrum Comae*.

ticum, en deux volumes in-folio. Aufl. 1667, réimprimé à Leyde en 1681, & il fut empoisonné en 1674. Voyez le Dictionnaire de Bayle.

Gabriel Mouton, né à Lyon, étoit docteur en Théologie, & maître de chœur à l'église collégiale de Saint-Paul de la même ville; il publia en 1670 un ouvrage, intitulé: *Observations du-metrum*, où il y a des observations, des tables, & des remarques très-intéressantes. L'auteur avoit beaucoup de talent pour l'*Astronomie*; ce fut lui qui calcula les logarithmes des sinus & des tangentes, de secondes en secondes, avec onze chiffres pour les quatre premiers degrés: le manuscrit est à la bibliothèque de l'Académie; M. Maraldi & M. Guérin en ont des copies: le P. Pezenas, à qui je l'avois communiqué, l'a fait imprimer, du moins les huit premiers chiffres dans son édition des logarithmes, à Avignon. Mouton proposa le premier l'usage d'une mesure fixe, & l'usage des interpolations astronomiques pour les secondes & troisièmes différences. Voyez INTERPOLATION.

Jean-Baptiste Riccioli, jésuite, étoit né à Ferrare en 1598: nous citons souvent son *Almageste*, son *Astronomie réformée*, la *Giographie réformée*, qui sont les ouvrages les plus utiles aux astronomes, non-seulement comme de vastes collections, mais comme des traités complets pour leur temps; il mourut en 1671: le P. Grimaldi travailla avec lui, & il le cite souvent dans ses ouvrages.

Nicolas Mercator étoit né dans le Holstein, province de Danemarck; il donna une cosmographie, en 1641, des institutions astronomiques en 1676: sa logarithmotechnie en 1678, & quelques pièces dans les *Transactions philosophiques*, n.º 13 & 57. Voyez le nouveau Dictionnaire historique & critique pour servir de supplément ou de continuation au Dictionnaire de Bayle, par Jacques-George de Chauffepied, à Amsterdam, 1750, 1756, quatre vol. in-folio.

Jean Hévélius (Hewelke), naquit à Danzig le 28 janvier 1611; il mourut le 28 janvier 1687. Ses observations, faites depuis 1641 jusqu'à 1678, sont un immense trésor pour l'*Astronomie*; d'après lequel on calcule encore les mouvements des planètes: mais ce ne fut pas le seul mérite d'Hévélius; il perfectionna l'art des instrumens d'*Astronomie*, & il fit pour ses progrès des dépenses si considérables, qu'elles étoient dignes d'exciter l'émulation des souverains.

L'Académie des Sciences de Paris, établie en 1666, forme une des époques les plus mémorables dans l'histoire de l'*Astronomie*, comme dans celle des autres sciences qu'elle embrasse. Toute les parties de l'*Astronomie* ont été découvertes ou perfectionnées dans le sein de cette compagnie, comme on peut le voir dans le recueil des mémoires faits avant 1699, en onze volumes, dans

l'histoire de l'Académie, par Duhamel, & l'histoire céleste, par M. le Monnier, publiée en 1741. ce dernier ouvrage est un recueil des anciennes observations de l'Académie. Voyez aussi l'histoire de l'*Astronomie*, par Weidler, page 518 & suiv. Parmi les découvertes essentielles de l'*Astronomie*, qui y ont été faites, nous devons compter les satellites de Saturne, la grandeur & la figure de la terre, l'application du pendule aux horloges, celle des lunettes aux quarts de cercle, faite en 1668, & celle des micromètres aux lunettes, la propagation successive de la lumière, &c. Les principaux points de l'*Astronomie* y furent tous discutés & établis, spécialement la théorie du soleil & de la lune, leurs inégalités, leurs diamètres, leurs parallaxes, les réfractions, l'obliquité de l'écliptique, les inégalités des satellites de Jupiter.

La société royale de Londres fut formée vers le même tems, & comme l'Académie des sciences, par des assemblées de curieux & de savans, qui se réunirent à Oxford & à Londres. Les plus célèbres étoient Boyle, Ward, Wallis, Wilkins, Petry, Willis, Goddard, Mathieu Wren, Christophe Wren. Wallis fait remonter l'établissement de cette société à l'an 1645, dans la préface de *Peter Lingio's chronicle*, édition de Thomas Hearne. M. Birch dit que Théodore Haak, qui étoit du Palaisnat, donna le premier l'idée de ces assemblées philosophiques. Voyez l'histoire de la société royale, par Thomas Sprat, in-8.º, édition française de 1669, page 72, & sur-tout le grand ouvrage, intitulé: *The history of the royal society of London, for improving of natural knowledge, from its first rise; By Thomas Birch, D.D. Secretary to the royal society, 1756 & 1757, 4 vol. in-4.º* Cette histoire ne va que jusqu'en 1687, & il n'y a point de table de manières; mais on y trouve beaucoup d'anecdotes curieuses pour l'histoire des sciences, & un détail jour par jour de tout ce qui se passa dans les assemblées de la société royale, depuis le 28 novembre 1660, tems où l'on convint de tenir des séances réglées au collège de Gresham, dans l'appartement de Rooke, & de former un corps d'académie, according to the manner in other countries, comme on le faisoit dans d'autres pays; en effet, l'établissement des académies en France, qui datoit de 1323, époque des jeux floraux de Toulouse, avoit eu lieu à Paris même, pour les sciences, & le chancelier Bacon parle de ces assemblées d'une manière brillante, dans un passage remarquable, dont j'ai donné la traduction dans le mercure de janvier 1759. L'ouvrage est intitulé: *Francisci Baconi de Verulamio, scripta in naturali & universali philosophia. Amstel. 1653, p. 318.*

Les astronomes de Paris étoient Cassendi, Auzout, Roberval; ceux d'Angleterre étoient Rooke, Hooke, Wren, Ward: mais l'Académie des sciences fut bientôt l'acquisition de Picard,

Cassini, Huygens; & la Société royale eut bienôt Flamsteed & Newton.

Christian Huygens, de Zuylichem en Hollande, fils d'un conseiller du prince d'Orange, naquit en 1619; le premier ouvrage par lequel il acquit de la célébrité, fut le *Systéma Saturnium*, 1659, où il expliqua les apparences singulières de l'anneau de saturne, sur lesquelles Galilée & Hévélius s'étoient totalement abusés; il annonça dans le même ouvrage la découverte d'un satellite de saturne, qu'il avoit découvert en 1655.

L'application du pendule aux horloges, qu'il avoit annoncée dès l'année 1658, fut détaillée en 1673 dans l'ouvrage, intitulé: *Horlogium oscilatorium*. Il mourut en Hollande le 8 juillet 1695.

Jean-Dominique Cassini, naquit à Perinaldo, dans le comté de Nice, le 8 juin 1625. Il fut un de ces hommes rares, qui semblent formés par la nature pour donner aux sciences une nouvelle face: l'*Astronomie*, accrue & perfectionnée dans toutes les parties par les découvertes de Cassini, éprouva entre les mains une des plus étonnantes révolutions. A l'âge de 25 ans, il fut fait professeur de Mathématiques à Bologne; il traça la méridienne de S. Petrone, qui devint le plus grand & le meilleur instrument d'*Astronomie*; il observa les comètes de 1664 & 1665, sur lesquelles il composa des ouvrages; il observa la rotation de jupiter & celle de mars; il donna des tables des facilités de jupiter en 1666: il fut appelé à Paris en 1669; là il détermina la parallaxe du soleil; il observa la comète de 1680, sur laquelle il composa un traité; il découvrit la lumière zodiacale en 1683, & quatre satellites de saturne en 1684: le roi fit frapper une médaille à cette occasion. En 1700, il continua de tracer dans les provinces méridionales de la France la grande méridienne, qui avoit été commencée par Picard; il observa la libration de la lune; enfin, après un grand nombre d'autres ouvrages, devenu aveugle, ainsi que Galilée, il mourut comblé de gloire le 14 Septembre 1712, laissant pour successeur Jean-Jacques Cassini son fils, que l'Académie a perdu en 1756, mais dont le fils & petit-fils continuent à enrichir l'*Astronomie* par leurs travaux.

Jean Picard, né à la Flèche en Anjou, l'un des plus anciens & des plus célèbres astronomes qu'ait eu l'Académie des sciences dans le tems de son établissement, observoit déjà à Paris dès 1645 avec Gassendi. Il entreprit en 1669 la mesure de la terre; il fut envoyé en 1671 à Uranibourg, où avoit observé Tycho-Brahé, pour en déterminer plus exactement la longitude & la latitude, afin de pouvoir comparer sans aucune erreur les observations de Paris avec celles de l'île d'Huenné.

Picard employa le premier des lunettes sur les quarts de cercle: Morin avoit eu cette idée dès 1640; il s'établit en 1673 à l'observatoire royal.

Le roi y étant venu le premier mai 1682, fut charmé de l'activité, du zèle & des progrès des astronomes qui y observoient. Il envoya ses ordres pour la continuation de la méridienne de France; mais Picard, qui devoit y travailler, mourut le 12 octobre 1682.

Jean Flamsteed a été le plus célèbre observateur d'Angleterre. L'histoire céleste qu'il nous a laissée en trois volumes *in-folio*, contient un recueil prodigieux d'observations faites pendant 33 ans, avec un catalogue fameux de près de trois mille étoiles. Il naquit à Derby le 19 août 1646. Dès l'an 1670, on voit de lui des calculs astronomiques dans les Transactions philosophiques. Dans les œuvres d'Horocciut, publiées en 1672, on trouve des observations & des tables du soleil qu'il avoit faites. En 1676, il entra en possession de l'observatoire royal, que Charles II, par les soins du chevalier Moor, venoit de faire construire à Greenwich, près de Londres: c'est-là qu'il exécuta le grand Catalogue dont nous avons parlé, ouvrage immortel, que les astronomes ont entre les mains, & que je viens de faire réimprimer dans mon huitième volume des éphémérides: c'est sur les observations de Flamsteed que sont fondées les tables de Halley. Flamsteed mourut le 31 octobre 1719.

Isaac Newton, naquit le 25 décembre 1642: le nom seul de ce génie étonnant tient lieu d'éloges. La découverte de l'attraction suffit pour le rendre immortel dans l'histoire de l'*Astronomie*. Il mourut le 30 mars 1727: son éloge est dans l'histoire de l'Académie pour la même année.

Nous allons rappeler aussi en abrégé les astronomes, qui, ayant eu moins de célébrité, ont cependant contribué sensiblement aux progrès de l'*Astronomie*. Le recueil des *Transactions philosophiques* de la société royale de Londres, composé des mémoires de cette illustre Académie, ne commença qu'en 1665, comme le journal des sçavans de Paris, qui parut le 5 janvier 1665, & dont l'auteur étoit M. de Sallo, conseiller au Parlement. Voyez le Journal des Sçavans de janvier 1764. On rendit compte des Transactions philosophiques dans le journal du 30 mars. Ces deux ouvrages se ressembloient un peu, & formèrent dès-lors un commerce réciproque des sçavans de Paris & de Londres avec ceux du reste de l'Europe.

Laurent Rook, premier professeur d'*Astronomie*, & ensuite de Géométrie au collège de Greenwich à Londres, fut un des premiers qui observèrent exactement les immersions & les émersions des facilités de jupiter; il contribua beaucoup à l'établissement de la Société royale de Londres, & mourut le 27 juin 1662 à l'âge de 40 ans. Son épitaphe, faite par l'évêque Seth-Ward, est imprimée dans le catalogue de Sherburn à la tête de son *Manilius* anglais.

Ismaël Boulliaud, né à Loudun en 1605, fu

beaucoup d'observations astronomiques : le manuscrit est dans la bibliothèque du roi ; il y en a une copie au dépôt de la marine. Son *Astronomie philolaïque* est un des meilleurs livres que l'on ait fait pour déterminer les orbites de toutes les planètes : on y trouve de bonnes tables astronomiques. Boulliaud mourut à Paris en 1694.

Parmi les observations de Boulliaud, on en trouve d'un jardinier de Vézille en Dauphiné, nommé Feronce ; cela rappelle les noms de plusieurs paysans qui se sont fait remarquer dans l'*Astronomie*.

Pierre Anich, dont le P. Hell a parlé dans ses éphémérides pour 1767. Chrét. Gartner, marchand de fer à Dolkenitz, qui découvrit les petites comètes de l'automne 1757 & de l'été 1758. Jean-Gomès Falitsch, paysan à Prohlis, entre Dréide & Pirna, qui découvrit le premier la fameuse comète de 1759 ; il est très-instruit, & cependant il ne néglige point son métier. Bernoulli, *Nouv. litt.* t. 5, p. 51.

Robert Hooke, né en 1635, fut un des plus savans hommes de l'Angleterre ; il fut, pour ainsi dire, l'occasion de la découverte de l'attraction & de celle de l'aberration ; il découvrit une tache dans jupiter en 1664. *Philos. trans.* n.° 1. Il fit beaucoup d'ouvrages astronomiques ; il mourut à Londres le 3 mars 1702.

David Gregori, étoit neveu de Jacques Gregori, mathématicien célèbre ; il fut fait, en 1691, professeur d'*Astronomie* à Oxford. En 1702, il publia ses *Elémens d'Astronomie*, in-folio, qui ont eu de la réputation, & qu'on a réimprimés à Genève en 1726, in-4. L'auteur étoit mort dès l'an 1708.

Guillaume Whiston publia sa Théorie de la Terre en 1696, ses Leçons d'Astronomie à Cambridge en 1707, & quelques autres ouvrages très-bien faits, où il y a des dissertations intéressantes.

Mathieu de Chazelles, né à Lyon le 25 Juillet 1657, fut à Marseille & dans ses voyages du Levant, beaucoup d'observations importantes. Il mourut le 16 Janvier 1710. Son éloge est dans l'histoire de l'Académie des Sciences pour la même année. La collection de ses observations est dans les manuscrits de M. de l'Isle, de même que celles du P. Feuillée, ministre, qui fit plusieurs voyages pour la Géographie, celles du P. Sigalloux, qui lui succéda, & celles du P. Laval, jésuite, faites à Marseille, à Toulon, & dans des voyages semblables à ceux de M. de Chazelles.

Godefroi Kirch, né en 1640, à Guhen dans la basse Luface, avoit demeuré chez Hévelius. Il publia des Ephémérides en 1681. Il s'établit à Berlin en 1700 ; il y fit un grand nombre d'observations, & il mourut le 25 Juillet 1710, à l'âge de 71 ans. Ses observations sont rassemblées dans les manuscrits de M. de l'Isle, de même que celles de MM. Wagner, Hoffman, Eimmart, Wurzelbau, Rosl, Zumbach de Neesfeld, &c.

Olaus Romer, ou Roemer, né en 1644 en Danemark, vint en France en 1672, avec Picard ; ce fut lui qui découvrit la propagation faccélée de la lumière en 1673. Il retourna, en 1681, à Copenhague, où il fit diverses observations. Il mourut le 19 Septembre 1710. L'incendie du 20 Octobre 1728, qui arriva à Copenhague, a consumé ce qui restoit de ses manuscrits. M. Horrtchow a publié une partie de ses observations.

Philippe de la Hire, né à Paris le 18 Mars 1640, publia les premières Tables Astronomiques en 1687 ; il fit un très-grand nombre d'observations, de tables, de recherches astronomiques. Il y a eu deux de ses fils dans l'Académie des Sciences. Il mourut à Paris le 21 Avril 1718. Voy. son éloge dans l'histoire de l'Académie. Ses observations depuis 1685 jusqu'en 1718, sont dans les manuscrits de M. de l'Isle, qui avoit en communication de tous ses papiers.

François Bianchini, né à Vérone le 13 Décembre 1662, mort à Rome le 2 Mars 1729, fit beaucoup d'observations, principalement sur la rotation de Vénus, *hæperiæ & phœphori nova phenomena*, 1728. Il est appelé *Blancinus* dans tous les ouvrages Latins ; mais en Italien, l'on dit *Bianchini*. Ses observations ont paru à Vérone en 1737, in-folio.

Jacques-Philippe Maraldi, né à Perinaldo dans le Comté de Nice, le 21 Août 1665, est mort à Paris le premier Décembre 1729 ; il avoit antérieurement de lui, en 1728, M. Jean-Dominique Maraldi son neveu, aujourd'hui de l'Académie des Sciences, retiré à Perinaldo. *Histoire de l'Acad.* 1729. Ils ont perfectionné l'un & l'autre, la théorie des satellites de Jupiter, & plusieurs autres branches de l'Astronomie.

Eugène de Louville, né le 14 Juillet 1671, observoit à Paris dès l'année 1704 ; il mourut à Carré près d'Orléans, le 10 Octobre 1731. Il y a une copie de toutes ses observations dans les manuscrits de M. de l'Isle au dépôt de la Marine. Il travailla principalement sur l'obliquité de l'écliptique. Ce fut lui qui le premier appliqua le micromètre au quart de cercle, invention très-utile.

Eulache Manfredi, né à Bologne le 20 Septembre 1694, mort le 15 Février 1739. (Voyez *Histoire de l'Académie*, 1739.)

Christfried Kirch, né en 1694, a fait de très-bonnes observations à Danzig, & ensuite à Berlin où il vivoit, & calculoit des éphémérides avec ses trois sœurs ; il publia, en 1740, des observations choisies. Il mourut le 9 Mars 1740. Voyez *Miscellanea Berolinensia*.

Parmi les astronomes morts depuis quelques années, & qui ont contribué aux progrès de l'Astronomie, on compte sur-tout Halley, & Bradley célèbre par la découverte de l'aberration & de la nutation ; la Caille, qui a travaillé lui seul autant que tous les autres astronomes de son temps pris ensemble ; Joseph-Nicolas de l'Isle, frère du célèbre géographe de ce nom ; Bouguer, connu par un

un beau traité de la figure de la terre; enfin Tobie Mayer, mort en 1762, à l'âge de 39 ans, à qui nous devons les meilleures tables de la lune que l'on ait faites.

Après avoir fait en abrégé l'histoire de l'Astronomie, je vais indiquer l'ordre que l'on doit suivre pour l'étudier, en observant de mettre en lettres CAPITALES les mots qu'il faudra chercher dans ce Dictionnaire, pour suivre une méthode régulière & facile.

LA MÉTHODE la plus naturelle pour traiter de l'Astronomie & pour l'étudier, consiste à suivre l'ordre des phénomènes qu'on observe, & des conséquences que l'on peut en tirer. Le premier de tous les phénomènes célestes, le plus simple de tous, le plus frappant & le plus facile à observer, est le MOUVEMENT DIURNE, c'est-à-dire, celui que paroît avoir tout le ciel; il s'achève dans l'espace d'environ 24^h. Nous voyons chaque jour le soleil se lever & se coucher: si nous faisons attention aux autres qui ne paroissent que la nuit, nous les verrons de même, pour la plupart, se lever & se coucher tous les jours, c'est-à-dire, paroître sur l'horizon du côté de l'orient, & se cacher sous l'horizon du côté de l'occident.

En considérant d'une manière plus attentive & plus suivie ce mouvement général des astres, pendant l'espace d'une nuit ou de plusieurs, on remarque bientôt que chaque étoile décrit un cercle dans l'espace d'environ 24^h. Les étoiles qui sont plus au nord décrivent de plus petits cercles que les autres; & l'on voit tous ces cercles décrits par différentes étoiles, diminuer de plus en plus, aller enfin se perdre & se confondre en un point élevé de la rondeur du ciel, que nous appelons le *Pôle du monde*. Celui que nous voyons en Europe est le pôle boréal, septentrional ou arctique. Ainsi, pour se former une idée de l'Astronomie, il faut d'abord apprendre à connoître le pôle du monde, c'est-à-dire, l'endroit du ciel étoilé vers lequel il se trouve placé. On remarque dans le ciel une étoile qui en est fort proche, & qu'on nomme pour cette raison l'*ÉTOILE POLAIRE*. On reconnoît cette étoile par le moyen de la constellation de la grande ourse appelée communément le *chariot de David* (*planètes d'Astrol. fig. 2.*), dont les deux dernières étoiles indiquent une direction qui tend à l'étoile polaire, & cette seule constellation peut nous faire connoître toutes les autres. Voy. CONSTELLATION.

Lorsqu'on a reconnu le pôle du monde autour duquel se fait le mouvement diurne, il est naturel de concevoir le pôle qui lui est opposé, c'est-à-dire, le pôle austral & antarctique, & l'*ÉQUATEUR* qui est un cercle placé à égales distances des deux pôles. On rapporte à l'équateur les situations des différentes étoiles par ASCENSIONS DROITES & par DÉCLINAISONS, & l'on a un nouveau moyen de distinguer & de reconnoître en tout temps les différentes constellations.

Parmi les astres dont on avoit observé le mouvement diurne, on aperçut bientôt qu'il y en avoit dont la situation n'étoit pas toujours la même, & qui changeoient de place par rapport aux autres; on les appella *PLANÈTES*, & c'est l'observation de leurs mouvemens, comme de ceux du soleil & de la lune, qui a fait le premier objet de curiosité & de difficulté dans l'Astronomie.

Le plus simple & le plus sensible de tous ces mouvemens propres, celui qui dut frapper le plus tous les yeux, fut le mouvement de la lune qui s'achève en un mois.

Après le mouvement propre de la lune, le plus remarquable est le MOUVEMENT ANNUEL du soleil: si l'on remarque le soir du côté de l'occident quelque étoile fixe après le coucher du soleil, & qu'on la considère attentivement plusieurs jours de suite à la même heure, on la verra de jour en jour plus près du soleil, en sorte qu'elle disparaîtra & sera effacée par les rayons du soleil dont elle étoit assez loin quelques jours auparavant. Il sera aisé en même-temps de reconnoître que c'est le soleil qui s'est approché de l'étoile, & que ce n'est pas l'étoile qui s'est approchée du soleil. En effet, on verra que tous les jours les étoiles se lèvent & se couchent aux mêmes points de l'horizon vis-à-vis des mêmes objets terrestres, qu'elles sont toujours aux mêmes distances les uns des autres, tandis que le soleil change continuellement les points de son lever & de son coucher, & la distance aux étoiles: on verra d'ailleurs chaque étoile se lever tous les jours environ 4 minutes plutôt que le jour précédent relativement au soleil; on ne doutera pas que le soleil seul n'ait changé de place par rapport à l'étoile, & ne se soit rapproché d'elle. Cette observation peut se faire en tout temps; mais il faut prendre garde à ne pas confondre une étoile fixe avec une planète; nous apprendrons ci-après à les distinguer.

Le premier phénomène qui présente le mouvement propre du soleil, est donc celui-ci. Le soleil se rapproche de jour en jour des étoiles qui sont plus orientales que lui, c'est-à-dire qu'il s'avance chaque jour vers l'orient; ainsi, le mouvement propre du soleil se fait d'occident en orient: tous les jours il est d'environ un degré, & au bout de 365 jours, on reçoit l'étoile vers le couchant à la même heure & au même endroit où elle paroît-*soit* l'année précédente à pareil jour, c'est-à-dire, que le soleil est venu se placer au même point par rapport à l'étoile; ainsi, le soleil a fait une révolution: c'est ce que nous appelons le mouvement annuel. En l'observant pendant plusieurs années, on a reconnu que la durée de chacun de ces retours du soleil, par rapport à une étoile, étoit de 365 jours, 6^h 9^m 11^s; c'est ce qu'on appelle l'année *sylvestre*.

Après avoir considéré attentivement les étoiles, on reconnoît bientôt qu'il y avoit cinq autres espèces semblables aux étoiles, mais qui changeoient

de position par rapport aux autres, & ce sont les PLANÈTES. On en remarqua une dont le changement est très-lent, & qui, pour faire le tour du ciel & répondre successivement aux différentes étoiles fixes, emploie 29 ans 177 jours; c'est Saturne; une autre qui faisoit la même révolution dans l'espace d'environ 12 ans, c'est Jupiter; une troisième qui parcourait toute la circonférence du ciel en un an & 312 jours, c'est Mars. La quatrième, qui paroîtroit la plus brillante de toutes, & que nous appelons *Vénus*, accompagne le soleil qu'elle précède quelquefois le matin, ou qu'elle suit après son coucher; elle revient à-peu-près à la même position dans l'espace de 584 jours. Cette circonstance peut la faire reconnoître au défaut de sa révolution, qu'on ne peut suivre, par rapport aux étoiles fixes, comme celles des trois précédentes; enfin la cinquième planète, & la plus difficile à voir, parce qu'elle fut toujours le soleil de très-près, est Mercure, que nous voyons revenir à la même position par rapport au soleil, dans l'espace de 116 jours.

Après avoir ainsi reconnu les planètes, on vit que la trace de leur mouvement s'écartoit peu de celle du soleil, & l'on voulut rapporter tout à celle-ci qu'on appella l'ÉCLIPTIQUE, & dont l'obliquité, par rapport à l'équateur, est de $23^{\circ} 28'$. On rapporte à l'écliptique les positions de, des autres par le moyen des LONGITUDES & des LATITUDES; celles-ci s'observent par le moyen des ascensions & des déclinaisons qui supposent la détermination des équinoxes & l'observation de la HAUTEUR DU PÔLE.

La nécessité de rapporter les astres à l'équateur, à l'écliptique, à l'horizon & au méridien, a fait imaginer la trigonométrie sphérique, par le moyen de laquelle on assigne les mouvements & les positions des astres dans tous les sens, lorsqu'on en a déterminé les circonstances dans deux directions différentes.

Les révolutions des planètes étant inégales, on a cherché à reconnoître leurs ÉQUATIONS ou inégalités, leurs EXCENTRICITÉS, leurs APHÉLIES. Les plans des orbites étant tous différens les uns des autres, il a été nécessaire de déterminer leurs INCLINAISONS & leurs NŒUDS. Les lois de Kepler ont fait connoître les rapports des révolutions avec les distances & la règle des principales inégalités des planètes, des sautelles & des comètes; elles ont conduit à la découverte de l'ATTRACTION, & celle-ci a fait trouver les petites inégalités qui avoient échappé à l'observation.

Les distances absolues des planètes, par rapport à nous, étoient une des plus grandes difficultés de l'Astronomie: on est parvenu à les découvrir par le moyen des PARALLAXES, & celles-ci ont fait connoître plus exactement les circonstances des ÉCLIPSES de soleil qui étoient les plus difficiles à calculer. Indépendamment des révolutions des planètes, on observe aussi leurs ROTATIONS & la

figure de leurs taches ou de leurs bandes, qui conduisent à la détermination de leurs équateurs ou de leurs axes de rotation.

Les observations qui ont servi à toutes ces découvertes, se font par le moyen d'un grand nombre d'instrumens, tels sont les LUNETTES, QUARTS DE CERCLES, MICROMÈTRES, Héliomètres, LUNETTES MÉRIDiennes, LUNETTES PARALLATIQUES, HORLOGES à pendules, &c. Les observations se font principalement par le moyen des HAUTEURS, des distances entre différens astres, de leurs PASSAGES au méridien, de leurs conjonctions, de leurs OPPOSITIONS. Les observations exigent des corrections à raison de la RÉFRACTION qui change les hauteurs, les levers & les couchers des astres, de même que la parallaxe.

Entin les usages & les applications de cette science se trouvent dans la prédiction des éclipses, dans l'observation des LONGITUDES EN MER, dans la Géographie, la chronologie, le calendrier, la gnomonique; c'est en consultant tous les arrièrres que nous venons d'indiquer, qu'on parviendra à trouver dans ce *Dictionnaire*, malgré les inconvéniens de l'ordre alphabétique, un cours complet d'Astronomie.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article que par un catalogue des meilleurs livres d'Astronomie.

On en trouvera un recueil immense dans l'ouvrage qui a pour titre: *Joannis Fridrici Weidleri Bibliographia astronomica, temporis, quo libri vel compositi vel editi sunt ordine servato. Wittenbergæ 1755, 126 pag. in-8.* Cette bibliographie est comme la suite d'un excellent ouvrage du même auteur, intitulé: *Joannis Fridrici Weidleri Historia Astronomiae, sive de ortu & progressu Astronomiae, Wittenbergæ 1741, 624 pages in-4.* dans laquelle on trouvera de très-grands détails sur tous les astronomes connus par quelque ouvrage que ce puisse être. Nous ne mettrons dans notre catalogue que les livres modernes que tout le monde peut avoir à Paris. Les ouvrages de Ptolémée, de Tycho, de Kepler, d'Hévélius, de Riccioli, Boulliaud &c., devroient être à la tête du catalogue; mais ils sont si rares, qu'il seroit inutile de les indiquer à ceux qui veulent actuellement se former une bibliothèque; d'ailleurs nous aurons occasion de les citer presque tous.

Je commencerai par avertir ici que la collection des *Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris* renferme la plus riche trésor que nous ayons en Astronomie; toutes les parties de cette vaste science y sont traitées dans le plus grand détail & de la manière la plus complète. Il y en a actuellement 81 volumes in-4. depuis 1699 inclusivement, jusqu'au volume de 1779, publié en 1782. Il y a aussi onze volumes de *Mémoires* faits avant 1699, neuf volumes de pièces qui ont remporté les prix proposés par l'Académie, & neuf des *Mémoires présentés par des savans étrangers*. Les *Traductions*

philosophiques de la société royale de Londres, depuis 1665 jusqu'à présent, renferment aussi une riche collection de *Mémoires d'Astronomie*. Les *Mémoires de l'Académie de Berlin*, depuis 1747, contiennent encore beaucoup d'excellentes choses sur l'Astronomie physique; les *Mémoires de Pétersbourg*, de Bologne, & de plusieurs autres Académies, méritent aussi d'être cités avec éloges.

Il y a quelques ouvrages élémentaires d'Astronomie en Angleterre, qui sont très-bons, tels que ceux de Street, Mercator, Whiston, Keill, Long, Ferguson, Leadbetter, Dunthorn, Hodgson, Costard, &c. Nous n'en dirons rien, parce que nous écrivons sur-tout pour les lecteurs français, & parce qu'ils ne contiennent guère autre chose que ce qui est contenu dans ceux qui sont imprimés à Paris. Nous ne citerons les livres étrangers que lorsqu'ils seront absolument nécessaires à un astronome, tels que les ouvrages de Flamsteed & l'optique de Smith, dont il y a deux éditions françaises imprimées à Avignon & à Brest en 1767, avec les tables des logarithmes de Gardiner.

Traité généraux d'Astronomie.

Histoire de l'Astronomie, par M. Bailly 1775—1782, 4 vol. in-4.^e, chez les frères de Bure. *Gregori Astronomia Elementa*, 2 vol. in-4.^e. *Wolffii Elementa mathematica. Elementa d'Astronomie*, par M. Cassini, avec les tables astronomiques du même auteur. Paris, 1740, 2 vol. in-4.^e de l'imprimerie royale: ce livre contient sur-tout la détermination des orbites planétaires.

Institutiones astronomiques, par M. le Monnier, in-4.^e 1746, chez la veuve Desaint, rue du Foin. C'est une traduction du livre de Keill, augmentée considérablement; on y trouve les tables de la lune de Flamsteed.

Leçons élémentaires d'Astronomie géométrique & Physique, par M. de la Caille, 1780, in-8.^e, chez la veuve Desaint. C'est un excellent abrégé de toute l'Astronomie.

Tables astronomiques de M. Halley pour le soleil, la lune les planètes & les comètes, augmentées de plusieurs tables nouvelles pour les satellites, les étoiles fixes, Chappe & de la Lande 1759, in-8.^e, chez Bailly, rue Saint-Honoré.

Astronomie, divisée en vingt-quatre livres, de la Lande, 2 vol. in-4.^e, 1764, seconde édition en 3 vol., 1771; le quatrième a paru en 1781, chez la veuve Desaint, rue du Foin. Cet ouvrage renferme un abrégé de tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans la théorie & la pratique de l'Astronomie, la connoissance des mouvements du soleil, de la lune, des planètes, des comètes, des satellites & des étoiles fixes; la description de tous les instrumens; la manière de les vérifier & de s'en servir; l'histoire des astronomes célèbres, celle de leurs ouvrages & de leurs découvertes, suivant l'ordre naturel qui les a dû produire; le

calcul intégral appliqué aux attractions célestes; la manière de connoître les constellations; un recueil d'observations choisies; des tables nouvelles pour le soleil, la lune, les planètes & les satellites; enfin tout ce qui est nécessaire pour bien connoître l'Astronomie, & l'indication constante de toutes les sources où l'on peut trouver de plus amples détails sur chaque branche de cette science. On n'a rien oublié pour rendre ce livre le plus complet qu'il puisse être, dans l'état actuel de l'Astronomie.

Historia cælestis, Flamsteed, 1725, 3 vol. in-fol. Ce grand ouvrage comprend une collection prodigieuse d'observations astronomiques, avec le grand catalogue d'étoiles du même auteur, que nous citerons plus d'une fois.

Tables of logarithms. London, 1742, in-4.^e, par Gardiner. Le P. Pezenas les fit réimprimer à Avignon en 1770, avec une augmentation des quatre premiers degrés en secondes, & M. Jombert s'occupait à en faire une seconde édition in-8.^e; ces tables sont les plus étendues & les plus commodes qu'on puisse trouver actuellement, celles d'Ulaque étant devenues très-rare.

On trouve à Paris chez la veuve Desaint, de petites tables abrégées extrêmement commodes pour de moindres opérations; mais dans les grands calculs astronomiques, il est indispensable d'avoir des logarithmes de sinus de 10 en 10 f., & ceux des nombres jusqu'à cent mille tels qu'on les trouve dans les tables d'Ulaque, *Trigonometria artificialis*, &c. Goudé, 1633, on dans les tables que nous venons de citer.

A Compleat System of optics by Robert Smith, 1738, Cambridge, 2 vol. in-4.^e Cet excellent ouvrage contient toutes les théories de l'optique avec une ample description des instrumens d'Astronomie & d'optique. Il en a paru deux traductions françaises en 1767, avec des augmentations, l'une du P. Pezenas, l'autre de M. le Roy.

Traité particuliers d'Astronomie.

La Figure de la terre, par M. Bouguer, 1749, in-4.^e, 374 pages, chez Jombert, rue Dauphine. Ce livre renferme les meilleures recherches pour la pratique & la théorie des observations délicates.

Mesure des trois premiers degrés du méridien, par M. de la Condamine 1751, in-4.^e, de l'imprimerie royale. *Journal du voyage*; &c. avec plusieurs suppléments. Cet ouvrage est très-méthodique, très-clair, très-bien écrit, également curieux pour la partie historique, & pour la partie astronomique.

La Méridienne de Paris vérifiée, &c. par M. Cassini de Thury, 1744, in-4.^e On y trouve une multitude d'observations faites par M. de Thury & M. de la Caille pour la figure de la terre.

De litteraria expeditione, &c. PP. Boscovich & Maire, in-4.^e, 1796; traduit en français &

imprimé à Paris en 1770 : ce livre est de même nature que celui de M. Bouguer.

Histoire céleste ou recueil d'observations faites dans le dernier siècle ; par M. Picard, la Hire, &c. avec un discours préliminaire, par M. le Monnier 1741, in-4.^o

Observations astronomiques de M. le Monnier, in-folio, 1751-1771, de l'imprimerie royale. Il y a déjà quatre livres d'imprimés d'environ 60 pages chacun : M. Maskelyne a donné en Angleterre un semblable recueil.

La figure de la terre, déterminée par les observations faites au cercle polaire, &c. par M. de Maupertuis, 1738, in-8.^o

Degré du méridien entre Paris & Amiens, déterminé par la mesure de M. Picard, & par les observations de MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier, 1740, in-8.^o

Dimensio graduum meridiana Viennensis & Hungarici, à J. L. Lefebvre. Vindobonæ 1770.

Connaissance des tems ou connoissance des mouvemens célestes, depuis 1760 jusqu'en 1784. Chez Montard, rue des Mathurins. On trouve dans ce livre, grand nombre d'observations & de tables nouvelles pour l'usage des astronomes.

Ephémérides de la Caille, depuis 1745 jusqu'en 1774, 6 vol. in-4.^o chez Hérisson, rue de la Parcheminerie. Tous ces volumes, sur-tout le dernier, sont enrichis de mémoires intéressans sur l'Astronomie : le septième & le huitième volume son de moi.

Il y a de semblables éphémérides publiées à Bologne, par M. Zanotti.

Ephemerides astronomicae, par Hell, depuis 1757 jusqu'à 1783. Vienna, in-8.^o Tous ces volumes renferment aussi beaucoup de tables & d'observations intéressantes, de même que les éphémérides de Berlin (en allemand), & de Milan en latin.

On a commencé à publier à Londres, en 1767, un ouvrage encore plus considérable, intitulé : *The Nautical Almanac*, dont il a déjà paru 20 volumes : ils contiennent un détail prodigieux sur les distances & les mouvemens de la lune, relativement à la manière de trouver les longitudes en mer. Guide du navigateur par M. Leveque, à Nantes.

Livres d'Astronomie physique, fondés sur les calculs de l'attraction.

Théorie de la figure de la terre, par M. Clairaut, 1743, in-8.^o

Recherches sur la précession des équinoxes, par M. d'Alembert, 1749, in-4.^o chez Barbou, rue Mathurins.

Theoria motus lunæ, L. Euler, 1771 in-4.^o à Pétersbourg.

Théorie du mouvement des comètes, par M. Clairaut,

rant, 1760 in-8.^o chez Panckoucke ; rue des Poitevins.

Recherches sur différens points importans du système du monde, par M. d'Alembert, 1754 & suiv. 3 vol. in-4.^o chez David.

Opusculs mathématiques, 8 vol. in-4.^o 1768, &c. chez Barbou.

Pièce sur la théorie de la lune, par M. Clairaut, avec de nouvelles tables de la lune, seconde édition, 1765, chez Dufour & Saillant.

Pièce sur les inégalités de Saturne, qui a remporté le prix de l'Académie en 1748, par M. Euler. Cette pièce est la première où l'on ait traité le problème des trois corps par une méthode analytique & nouvelle. T. Simpson a donné, en 1740, 1743 & 1757, trois volumes de différens mémoires ou opusculs en anglais, parmi lesquels on en trouve plusieurs sur l'Astronomie physique, faits de main de maître : l'auteur est mort en 1760. Connaissance des mouvemens célestes pour 1767. On trouvera l'indication de tous les livres nouveaux d'Astronomie dans le Recueil pour les astronomes, & les nouvelles littéraires de M. Jean Bernoulli, à Berlin 1771 & suiv. On les trouve à Paris chez la veuve Desaint.

Sur les cartes célestes qui représentent les différens constellations. Voyez CARTES CÉLESTES.

ASTRONOMIE sphérique, c'est celle qui traite de la situation & des rapports des cercles de la sphère entrecus, du mouvement diurne, & des apparences des mouvemens planétaires.

ASTRONOMIE théorique, c'est celle qui considère les mouvemens réels, inégalités, distances & grandeurs des astres.

ASTRONOMIE physique ; elle a pour objet les causes de ces mouvemens, telles que l'attraction, dont les calculs ont éclairé cette science au point de lui donner une nouvelle face.

ASTRONOMIE nautique ; elle enseigne à trouver l'heure en mer, la longitude & la latitude d'un vaisseau, sa route & les autres circonstances utiles à la navigation. Elle a été traitée spécialement par Maupertuis, Bouguer, la Caille, Perrenet, M. le Monnier, M. l'Evêque.

ASTRONOMIE comparée, est celle où l'on examine les phénomènes qui ont lieu pour les habitans des autres planètes, s'il y en a ; Kepler en a traité dans son *Astronomia lunaris*, & l'on en trouvera un exemple au mot JUPITER. (D. L.)

ASTRONOMIQUE, adj. *astronomicus*, on entend par ce mot tout ce qui a rapport à l'Astronomie. Voyez ASTRONOMIE.

Calendrier astronomique. Voyez CALENDRIER.

Heures astronomiques. Voyez HEURES.

Observations astronomiques. Voyez OBSERVATIONS CÉLESTES.

Fractions Astronomiques, nom que quelques auteurs ont donné aux fractions sexagésimales, à cause

cause de l'usage qu'on en fait dans les calculs astronomiques. Voyez SEXAGESIMAL, CALCUL.

Tables astronomiques. Voyez TABLE.

Théologie astronomique, c'est le titre d'un ouvrage de M. Derham, chanoine de Windsor, de la Société royale de Londres, dans lequel l'auteur se propose de démontrer l'existence de Dieu par les phénomènes admirables des corps célestes. Voyez THÉOLOGIE. (O)

ASTROPHANOMETRE, nom que M. Jéaurat avoit donné à l'instrument appelé ci-dessus astromètre.

ASTROSTATE. Voyez HÉLIOSTATE.

ASUGIA, nom de la constellation d'Orion.

A S Y

ASYMÉTRIE, f. f. composé de *a* privatif, de *mesure*, avec, & de *mesure*, mesure, c'est-à-dire, sans mesure. On entend par ce mot un défaut de proportion ou de correspondance entre les parties d'une chose. Voyez SYMMÉTRIE.

Ce mot déligne en Mathématique, ce qu'on entend plus ordinairement par *incommensurabilité*. Il y a un incommensurable entre deux quantités, lorsqu'elles n'ont aucune mesure: tels sont le côté du carré & sa diagonale; en nombres les racines fourdes comme $\sqrt{2}$, &c. sont aussi incommensurables aux nombres rationnels. Voyez INCOMMENSURABLE, SOUD, QUARRÉ, &c. (E)

ASYMPTOTE, f. f. *asymptotus*, terme de Géométrie. Quelques auteurs définissent l'*asymptote* une ligne indéfiniment prolongée, qui va en s'approchant de plus en plus d'une autre ligne qu'elle ne rencontrera jamais. Voyez LIGNE. Mais cette définition générale de l'*asymptote* n'est pas exacte, car elle peut être appliquée à des lignes qui ne font pas des *asymptotes*. En effet, soit (fig. 20, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) l'hyperbole KSL ; son axe SM ; son axe conjugué AB . On sait que si du centre C , on mène les droites indéfinies CD , CE , parallèles aux lignes BS , AS , tirées du sommet S de l'hyperbole, aux extrémités de son axe conjugué: ces lignes CD , CE , seront les *asymptotes* de l'hyperbole KSL .

Maintenant, soient tirées les parallèles fg , hi , &c. à l'*asymptote* CD : il est évident que ces parallèles indéfiniment prolongées, vont en s'approchant continuellement de l'hyperbole qu'elles ne rencontreront jamais. La définition précédente de l'*asymptote* convient donc à ces lignes; elle n'est donc pas exacte.

Quelles donc qu'une *asymptote* en général? C'est une ligne, qui étant indéfiniment prolongée, s'approche continuellement d'une autre ligne aussi indéfiniment prolongée, de manière que la distance à cette ligne ne devient jamais zéro absolu, mais peut toujours être trouvée plus petite qu'une grandeur donnée.

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie

Soit tirée la ligne $Nopq$ perpendiculairement à l'*asymptote* CD , & à ses parallèles fg , hi , &c.: il est évident que l'*asymptote* CD peut approcher de l'hyperbole plus près que d'aucune grandeur donnée; car la propriété de l'*asymptote* CD consiste en ce que le produit de Cp par qg est toujours constant; d'où il s'ensuit que Cp augmentant à l'infini, qg diminue aussi à l'infini: mais la distance des parallèles fg , hi , à cette courbe sera toujours au moins de Np , de op , &c.; & par conséquent ne sera pas plus petite qu'une grandeur donnée. Voyez HIPERBOLE.

Le mot *asymptote* est composé de *a* privatif, de *mesure*, avec, & de *mesure*, je tombe, c'est-à-dire, qui n'est pas co-incident, on qui ne rencontre point. Quelques auteurs latins ont nommé les *asymptotes*, *lineæ intæctæ*.

Certains géomètres distinguent plusieurs espèces d'*asymptotes*; il y en a, selon ces auteurs, de droites, de courbes, &c. Ils distribuent les courbes en *concaves*, *convexes*, &c. & ils proposent un instrument pour les tracer toutes: le mot d'*asymptote* tout court ne déligne qu'une *asymptote* droite.

L'*asymptote* se définit encore plus exactement une ligne droite, qui étant indéfiniment prolongée, s'approche continuellement d'une courbe ou d'une portion de courbe aussi prolongée indéfiniment, de manière que la distance à cette courbe ou portion de courbe ne devient jamais zéro absolu, mais peut toujours être trouvée plus petite qu'une grandeur donnée.

Je dis, 1.^{re} d'une courbe ou d'une portion de courbe, afin que la définition convienne, tant aux courbes serpentantes qu'aux autres.

Car la ligne fh (fig. 20, n. 3) ne peut être considérée comme l'*asymptote* de la courbe serpentante $mno prs$, que quand cette courbe a pris un cours réglé relativement à elle, c'est-à-dire, un cours par lequel elle a été toujours en s'en approchant.

Je dis, 2.^{re} que la distance de l'*asymptote* à la courbe peut toujours être trouvée moindre qu'une grandeur donnée; car, sans cette condition, la définition conviendrait à l'*asymptote* & à ses parallèles. Or une définition ne doit convenir qu'à la chose définie.

On dit quelquefois que deux courbes sont *asymptotes* l'une à l'autre, lorsqu'indéfiniment prolongées elles vont en s'approchant continuellement, sans pouvoir jamais se rencontrer. Ainsi, deux paraboles de même paramètre, qui ont pour axe une même ligne droite, sont *asymptotes* l'une à l'autre.

Entre les courbes du second degré, c'est-à-dire, entre les sections coniques, il n'y a que l'hyperbole qui ait des *asymptotes*.

Toutes les courbes du troisième ordre ont toujours quelques branches infinies, mais ces branches infinies n'ont pas toujours des *asymptotes*; témoin

les paroles cubiques, & celles de M. Newton a nommées *paraboles divergentes du troisième ordre*. Quant aux courbes du quatrième, il y en a une infinité, qui non-seulement n'ont pas quatre asymptotes, mais qui n'en ont point du tout, & qui n'ont pas même de branches infinies, comme l'ellipse de M. Cassini. Voyez COURBE, BRANCHE, ELLIPSE, &c.

La conchoïde, la cissoïde, & la logarithmique qu'on ne met point au nombre des courbes géométriques, ont chacune une asymptote. Voyez COURBE.

L'asymptote de la conchoïde est très-propre pour donner des notions claires de la nature des asymptotes en général. Soit (Planche de l'Analyse, fig. 1) MAM une portion de conchoïde, C le pôle de cette courbe, & BD une ligne droite au-delà de laquelle les parties QM , & A , Q , &c. des droites tirées du pôle C , sont toutes égales entr'elles. Cela posé, la droite BD sera l'asymptote de la courbe. Car la perpendiculaire MI étant plus courte que MO , & MR plus courte que MQ , &c., il s'ensuit que la droite BD va en s'approchant continuellement de la courbe MAM ; de sorte que la distance MR va toujours en diminuant, & peut être aussi petite qu'on voudra, sans cependant être jamais absolument nulle. Voyez DIVISIBILITÉ, INFINI, &c. Voyez aussi CONCHOÏDE.

On trace de la manière suivante les asymptotes de l'hyperbole. Soit (Planche des scd. cony. fig. 20) une droite DE tirée par le sommet A de l'hyperbole, parallèle aux ordonnées Mm , & égale à l'axe conjugué b ; en sorte que la partie AE soit égale à la moitié de cet axe, & l'autre partie DA égale à l'autre moitié. Les deux lignes tirées du centre C de l'hyperbole par les points D & E , savoir CF & CG , seront les asymptotes de cette courbe.

Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, qu'une courbe peut avoir dans certains cas pour asymptote une droite, & dans d'autres cas une courbe. Toutes les courbes qui ont des branches infinies, ont toujours l'une ou l'autre de ces asymptotes, & quelquefois toutes les deux; l'asymptote est droite, quand la branche infinie est hyperbolique; l'asymptote est courbe, lorsque la branche infinie est parabolique, & alors l'asymptote courbe est une parabole d'un degré plus ou moins élevé. Ainsi, la théorie des asymptotes des courbes dépend de celle de leurs branches infinies. Voyez BRANCHE.

Une courbe géométrique ne peut avoir plus d'asymptotes droites, qu'il n'y a d'unités dans l'exposant de son ordre. Voyez Stirling, *Enum. lin. 2. ord. prop. vj. cor. 7*, & l'Introduction à l'Analyse des lignes courbes, par M. Cramer, page 344, art. 147. Ce dernier ouvrage contient une excellente théorie des asymptotes des courbes géométriques & de leurs branches, chap. viij.

Si l'hyperbole GMR (fig. 12) est une des courbes, dont la nature exprimée par l'équation aux asymptotes, soit renfermée dans l'équation générale $x^m y^n = a^{m+n}$; tirez la droite PM , par-tout où vous voudrez, parallèle à l'asymptote CS ; achèvez le parallélogramme $PCOM$. Ce parallélogramme sera à l'espace hyperbolique $PMGB$, terminé par la ligne PM , par l'hyperbole indéfiniment continue vers G , & par la partie PB de l'asymptote indéfiniment prolongée du même côté, comme $m-n$ est à n . Ainsi, lorsque m sera plus grand que n , l'espace hyperbolique sera quarrable. Si $m = n$, comme dans l'hyperbole ordinaire, le parallélogramme $PCOM$ sera à l'espace hyperbolique comme zéro, c'est-à-dire, que cet espace sera infini relativement au parallélogramme, & par conséquent non quarrable. Enfin si m est moindre que n , le parallélogramme sera à l'espace hyperbolique comme un nombre négatif à un nombre positif, l'espace $PMGB$ sera infini, & l'espace $MPCB$ sera quarrable. Voyez la fin du cinquième livre des sections coniques de M. le marquis de l'Hôpital. Voy. aussi un mémoire de M. Varignon, imprimé en 1705, parmi ceux de l'Académie royale des Sciences, & qui a pour titre *Reflexions sur les espaces plus qu'infinis* de M. Wallis. Ce dernier géomètre prétendoit que l'espace $PMGB$, étant au parallélogramme comme un nombre positif à un nombre négatif, l'espace $PMGB$ étoit plus qu'infini. M. Varignon censure cette expression, qui n'est pas sans doute trop exacte. Ce qu'on peut assurer avec certitude, c'est que l'espace $PMGB$ est un espace plus grand qu'aucun espace fini, & par conséquent qu'il est infini.

Pour le prouver, & pour rendre la démonstration plus simple, faisons $x=1$, & nous aurons l'équation

$$x^m y^n = 1 \text{ ou } y = x^{-\frac{m}{n}} \text{ (Voyez EXPOSANT)}$$

Donc $y dx$, élément de l'aire $PMGB = x^{-\frac{m}{n}} dx$,

$$\text{dont l'intégrale (voyez INTÉGRAL) est } \frac{x^{-\frac{m}{n}+1}}{-\frac{m}{n}+1}$$

pour compléter cette intégrale, il faut qu'elle soit $=0$, lorsque $x=0$; d'où il s'ensuit que l'intégrale

$$\text{complète est } \frac{0^{-\frac{m}{n}+1}}{-\frac{m}{n}+1} + \frac{x^{-\frac{m}{n}+1}}{-\frac{m}{n}+1}. \text{ Donc,}$$

1.^o si $m < n$, on a $1 - \frac{m}{n}$ égal à une quantité

$$1 - \frac{m}{n}$$

positive. Ainsi, l'intégrale se réduit à $\frac{x}{1 - \frac{m}{n}}$ qui

représente l'espace $ECPM$; d'où l'on voit que cet espace est fini tant que x est fini, & que quand x devient infini, l'espace devient infini aussi. Donc l'espace total renfermé par la courbe & ses deux asymptotes, est infini; & comme l'espace $ECPM$ est fini, il s'ensuit que l'espace restant $PMGB$ est infini.

Il n'y a que l'hyperbole ordinaire où les espaces $PMGB$, $ECPM$, soient tous deux finis; dans toutes les autres hyperboles l'un des espaces est infini, & l'autre fini; l'espace infini est $PMGB$ dans le cas de $m < n$, & dans le cas de $m > n$ c'est $PMCE$. Mais il faut observer de plus que dans le cas de $m < n$, l'espace infini $PMGB$ est plus grand en quelque manière que celui de l'hyperbole ordinaire, quoique l'un & l'autre espaces soient tous deux finis; c'est-là sans doute ce qui a donné lieu au terme *plus qu'infini* de M. Wallis. Pour éclaircir cette question, supposons $CP = 1$ & $PM = 1$, & imaginons par le point M une hyperbole équilatère entre les deux asymptotes CB , CE , que je suppose faire ici un angle droit; ensuite par le même point M décrivons une hyperbole, dont l'équation soit $x^m y^n = 1$, m étant $< n$: il est évident que dans l'hyperbole ordinaire $y = x^{-1}$, & que, dans celle-ci, $y = x^{-\frac{m}{n}}$; d'où l'on voit que x étant plus grand que 1, c'est-à-dire, que CP , l'ordonnée correspondante de l'hyperbole ordinaire sera plus petit que celle de l'autre hyperbole. En effet, si x est plus grand que 1, & que $\frac{m}{n}$ soit < 1 , il suit que $x^{-\frac{m}{n}} > x^{-1}$, puis-que m étant $< n$, on a $x^m > x^n$, lorsque x est plus grand que 1. D'où il s'ensuit que $x > x^n$ & $\frac{1}{x} > \frac{1}{x^n}$ ou $x^{-1} > \frac{1}{x^n}$ ou $x^{-\frac{m}{n}}$. Donc l'espace $PMGB$

de l'hyperbole représentée par $x^m y^n = 1$, renfermera l'espace de l'hyperbole ordinaire représentée par l'équation $xy = 1$, & auant la même ordonnée PM . Ainsi, quoique ce dernier espace soit infini, on peut dire que l'autre, qui est infini à plus forte raison, est en quelque manière un infini plus grand. Voy. à l'article INFINI, la notion claire & nette que l'on doit se former de ces prétendus infinis plus grands que d'autres.

Soit MS (fig. 33.) une logarithmique, $P R$ son asymptote, $P T$ sa tangente, & RM une de ses ordonnées. L'espace indéterminé $RPMS$ sera égal à $PM \times PT$; & le solide engendré par la révolution de la courbe autour de son asymptote $P V$, sera égal à la moitié du cylindre, qui auroit pour hauteur une ligne égale à la tangente, & pour demi-diamètre de sa base une ligne égale à l'ordonnée $Q V$. Voyez LOGARITHMIQUE. (O)

ASYMPTOTIQUE, *asymptoticus*, ad, m. espace

asymptotique, est l'espace renfermé entre une hyperbole & son asymptote, ou en général entre une courbe & son asymptote; cet espace est quelquefois fini, & quelquefois infini. Voyez ASYMPTOTE. (O)

A T A

ATAIR, nom de la belle étoile de l'aigle.

ATAUR, nom de la constellation du taureau.

ATIN, ATIR ou ATYR, nom de l'étoile appelée aussi aldebaran.

ATLAS, nom que doit avoir eu la constellation du bouvier, suivant M. Dupuis, qui explique, par cette constellation, toutes les fables d'Atlas.

ATLANTIDES, nom des pleiades dans Ovide.

ATMOSPHERE, f. f. (Hyd.) nom qu'on donne à l'air qui environne la terre. Voy. ci-dessus le mot AIR, & le Dictionnaire de Physique.

Sur l'atmosphère de la lune & des planètes, voy. les mots LUNE, PLANÈTE.

ATELIER DU SCULPTEUR, (Astron.) nom d'une constellation méridionale introduite par l'abbé de la Caille, dans son *Planisphere des étoiles australes*; il l'appelle *Apparatus sculptoris*. Elle est située sur le colure des solstices, au-dessus de la grue & du phénix. La plus belle étoile de cette constellation est de la cinquième grandeur; son ascension droite au commencement de 1750, étoit de $11^h 38' 58''$, & sa déclinaison $30^\circ 43' 3''$ australe. Voy. *Calculus Astralis Bellicerum* 1763. (D. L.)

ATTOUCHEMENT, f. m. (Géom.) point d'atouchement, qu'on appelle aussi point de contact ou de contingence; est le point dans lequel une ligne droite touche une ligne courbe, ou dans lequel deux courbes se touchent. Voyez CONTINGENCE.

On dit ordinairement en Géométrie, que le point d'atouchement vaut deux points d'intersection, parce que la tangente peut être regardée comme une sécante qui coupe la courbe en deux points infiniment proches. En effet, disent les géomètres, concevons, par exemple, une ligne droite infinie qui coupe un cercle en deux points; imaginons ensuite que cette ligne droite se meuve parallèlement à elle-même vers le sommet du cercle; les deux points d'intersection se rapprocheront insensiblement, & enfin se confondront, ou ne seront plus qu'un point, lorsque par ce mouvement la sécante sera devenue tangente, c'est-à-dire ne sera plus que toucher le cercle.

Comme il n'y a point réellement de quantités infiniment petites, & que par conséquent l'on ne sauroit concevoir deux points infiniment proches (voy. INFINI & INFINIMENT PETIT), il est très-important de se former une idée nette de cette façon de parler, que le point d'atouchement vaut deux points d'intersection infiniment proches. Elle signifie seulement que le point d'atouchement est la limite

Z ij

en le terme de tous les doubles points d'interfection des sécantes parallèles à la tangente, c'est-à-dire que si on mène parallèlement à la tangente une ligne qui coupe en deux points la courbe, par exemple le cercle, on peut toujours imaginer cette ligne à une telle distance de la tangente, que la distance des deux points d'interfection soit aussi petite qu'on voudra; mais que cette distance ne deviendra pourtant jamais absolument nulle, à moins que la sécante ne se confonde absolument avec la tangente. Cette idée des *limites* est très-utile pour réduire la Géométrie des infiniment petits à des notions claires. Voyez LIMITE, &c.

Au reste, il n'est question jusqu'ici que du point d'attouchement simple; car il y a des points d'attouchement qui équivalent à trois points d'interfection, comme dans l'attouchement au point d'inflexion; d'autres équivalent à quatre points d'interfection, comme dans l'attouchement au point de serpentement infiniment petit, & ainsi à l'infini; voyez INFLEXION, SERPENTEMENT: ce qui, en réduisant la chose à des notions claires, signifie simplement que la valeur de la sécante devenue touchante, a dans ce cas trois ou quatre, &c. racines égales dans l'équation de la courbe; je dis de la sécante devenue touchante, car il y a des cas où une sécante a plusieurs racines égales, sans être touchante, comme dans les points doubles & dans les points conjugués. Ce qui distingue ces points des points d'attouchement, c'est que si vous donnez une autre direction à la ligne qui étoit tangente, en la faisant toujours passer par le point d'attouchement, alors elle ne coupe plus la courbe qu'en un point, & l'équation, qui représente son interfection, cesse d'avoir des racines égales; au lieu que, dans les points multiples & conjugués, la sécante a toujours plusieurs racines égales, quelque position qu'on lui donne, pourvu qu'elle passe toujours par le point multiple ou conjugué. Voyez RACINE, INTERSECTION, POINT MULTIPLE, POINT CONJUGUÉ, &c. (O).

ATTRACTIF, adj. m. se dit de ce qui a le pouvoir ou la propriété d'attirer. Voy. ATTRACTION, &c. Ainsi on dit *force attractive*, vis *attractiva*, &c.

La vertu attractive de l'aimant se communique au fer, en faisant toucher le fer à l'aimant. Voy. le Dictionnaire de Physique. (O).

ATTRACTION, f. f. *attradio* ou *tradio*, composé de *ad* & de *traho*, je tire, signifie, en Méchanique, l'action d'une force motrice, par laquelle un mobile est tiré ou rapproché de la puissance qui le meut. Voyez PUISSANCE & MOUVEMENT.

Comme la réaction est toujours égale & contraire à l'action, il s'ensuit que, dans toute attraction, le moteur est attiré vers le mobile autant que le mobile vers le moteur. Voyez ACTION & RÉACTION.

Dans l'usage ordinaire, on dit qu'un corps A

est attiré vers un autre corps B, lorsque A est lié ou attaché avec B par le moyen d'une corde, d'une courroie ou d'un bâton: c'est de cette manière qu'un cheval tire un chariot ou une barque; & en général, on dit qu'un corps en attire un autre, lorsqu'il communique du mouvement à cet autre par le moyen de quelque corps placé entre eux, & que le corps moteur précède celui qui est mu.

De plus, lorsqu'on voit deux corps libres éloignés l'un de l'autre s'approcher mutuellement sans que l'on aperçoive de cause, on donne encore à ce phénomène le nom d'*attraction*; & c'est principalement dans ce dernier sens qu'il a été employé par les philosophes anciens & modernes. L'*attraction* prise dans le premier sens, se nomme plus communément *traction*. Voyez TRACTION.

Attraction ou force attractive, dans l'ancienne Physique, signifie une force naturelle qu'on suppose inhérente à certains corps, & en vertu de laquelle ils agissent sur d'autres corps éloignés, & les tirent à eux. Voyez FORCE.

Le mouvement que ces prétendues forces produisent, est appelé, par les péripatéticiens, *mouvement d'attraction*, & en plusieurs occasions, *suction*; & ils rapportent différents exemples où, selon eux, ce mouvement se remarque; ainsi, nous respirons l'air, disent-ils, par *attraction* ou *suction*; de même nous suçons par *attraction* une pipe de tabac: c'est encore par *attraction* qu'un enfant tette: c'est par *attraction* que le sang monte dans les ventouses, que l'eau s'élève dans les pompes, & la fumée dans les cheminées, les vapeurs & les exhalaisons sont attirées par le soleil, le fer par l'aimant, les pailles & la poussière par l'aimant & les autres corps électriques. Voyez SUCCTION.

Si ces philosophes avoient fait un plus grand nombre d'expériences, ils auroient bientôt reconnu que ces différents phénomènes venoient de l'impulsion d'un fluide insensible. Ainsi, la plupart des effets que les anciens attribuoient à l'*attraction*, sont aujourd'hui attribués à des causes plus naturelles & plus sensibles, principalement à la pression de l'air. Voyez AIR & PRESSION.

C'est la pression de l'air, par exemple, qui produit les phénomènes de l'inspiration des ventouses, de la suction des pompes, des vapeurs, des exhalaisons, &c. Voy. RESPIRATION, SUCCTION, POMPE, VENTOUSE, VAPEUR, FUMÉE, EXHALAISON, &c. (Diction. de Phys.)

Sur les phénomènes de l'*attraction* électrique & magnétique, voyez MAGNÉTISME & ÉLECTRICITÉ. *Ibid.*

La puissance opposée à l'*attraction* est appelée *répulsion*; & on observe que la répulsion a lieu dans quelques effets naturels. Voy. RÉPULSION.

Attraction ou puissance attractive, se dit plus particulièrement, dans la philosophie Newtonienne, d'une puissance ou principe, en vertu duquel toutes les parties, soit d'un même corps, soit de corps différents, tendent les unes vers les autres;

on pour parler plus exactement, l'attraction est l'effet d'une puissance par laquelle chaque particule de matière tend vers une autre particule. Voyez MATIÈRE & PARTICULE. Les lois & les phénomènes de l'attraction sont un des points principaux de la philosophie Newtonienne. Voy. PHILOSOPHIE NEWTONIENNE.

Quoique ce grand philosophe se serve du mot d'attraction, comme les philosophes de l'école, cependant, selon la plupart de ses disciples, il y a une idée bien différente. Nous disons *selon la plupart de ses disciples*, car nous ne faisons que détailler ici ce qui a été dit sur l'attraction, nous réservant à exposer à la fin de cet article notre sentiment particulier.

L'attraction dans la Philosophie ancienne étoit, selon eux, une espèce de qualité inhérente à certains corps, & qui résultoit de leurs formes particulières & spécifiques; & l'idée que les anciens philosophes attachoient à ce mot de *forme*, étoit fort obscure.

L'attraction newtonienne, au contraire, est un principe incliné, c'est-à-dire, par lequel on ne veut désigner ni aucune espèce ou manière d'action particulière, ni aucune cause physique d'une pareille action, mais seulement une tendance en général, un *constans accedendi ou effort pour s'approcher*, quelle qu'en soit la cause physique ou métaphysique; c'est-à-dire, soit que la puissance qui le produit soit inhérente aux corps même, soit qu'elle consiste dans l'impulsion d'un agent extérieur.

Aussi Newton dit-il expressément dans ses principes, qu'il se sert indifféremment des mots d'attraction, d'impulsion & de propulsion; & avertit le lecteur de ne pas croire que par le mot d'attraction il veuille désigner une manière d'action ou sa cause efficiente, & supposer qu'il y a réellement une force attractive dans des centres qui ne sont que des points mathématiques, liv. 1, pag. 5. Et, dans un autre endroit, il dit qu'il considère les forces centripètes comme des attractions, quoique peut-être elles ne soient, physiquement parlant, que de véritables impulsions, ib. pag. 147. Il dit aussi dans son Optique, pag. 322, que ce qu'il appelle attraction, est peut-être l'effet de quelque impulsion qui agit suivant les lois différentes de l'impulsion ordinaire, ou peut-être aussi l'effet de quelque cause qui nous est inconnue.

Si on considère l'attraction, continue les newtoniens, comme une qualité qui résulte des formes particulières de certains corps, on doit la proscrire avec les sympathies, antipathies & qualités occultes. Mais, quand on a une fois écarté cette idée, on remarque dans la nature un grand nombre de phénomènes, entre autres la pesanteur des corps ou leur tendance vers un centre, qui semblent n'être point l'effet d'une impulsion, ou dans lesquels au moins l'impulsion n'est pas sensible: de plus, ajoutent-ils, cette ac-

tion paroît différer à quelques égards de l'impulsion que nous connoissons; car l'impulsion est toujours proportionnelle à la surface des corps, au lieu que la gravité agit sur les parties solides & intérieures, & est toujours proportionnelle à la masse, & par conséquent doit être l'effet d'une cause qui pénètre toute leur substance.

D'ailleurs les observations nous ont appris qu'il y a divers cas où les corps s'approchent les uns des autres, quoiqu'on ne puisse découvrir en aucune manière qu'il y ait quelque cause extérieure qui agisse pour les mettre en mouvement. Quoique attribue ce mouvement à une impulsion extérieure, suppose donc un peu trop légèrement cette cause. Ainsi, quand on voit que deux corps éloignés s'approchent l'un de l'autre, on ne doit pas se presser de conclure que ces corps sont poussés l'un vers l'autre par l'action d'un fluide ou d'un autre corps invisible, jusqu'à ce que l'expérience l'ait démontré, comme il est arrivé dans les phénomènes que les anciens attribuoient à l'horreur du vuide, & qu'on a reconnus être l'effet de la pression de l'air. Encore moins doit-on attribuer ces phénomènes à l'impulsion, lorsqu'il paroît impossible, ou au moins très-difficile, de le expliquer par ce principe, comme il est prouvé à l'égard de la pesanteur. Musch. *Essai de Physique*.

Le principe inconnu de l'attraction, c'est-à-dire; inconnu par la cause (car les effets font sous les yeux de tout le monde) est ce que l'on appelle attraction; & sous ce nom général, on comprend toutes les tendances mutuelles dans lesquelles l'impulsion ne se manifeste pas, & qui par conséquent ne peuvent s'expliquer par le secours d'aucunes lois connues de la nature.

C'est de-là que sont venues les différentes sortes d'attractions; savoir la pesanteur, l'ascension des liqueurs dans les tuyaux capillaires, la rondeur des gouttes de fluide, &c., qui sont l'effet d'autant de différens principes agissant par des lois différentes; attractions qui n'ont rien de commun, sinon qu'elles ne sont peut-être point l'effet d'une cause physique, & qu'elles paroissent résulter d'une force inhérente aux corps, par laquelle ils agissent sur des corps éloignés, quoique notre raison ait beaucoup de difficulté à admettre une pareille force.

L'attraction peut se diviser, eu égard aux lois qu'elle observe, en deux espèces. La première s'étend à une distance sensible: telles sont l'attraction de la pesanteur qui s'observe dans tous les corps, & l'attraction du magnétisme, de l'électricité, &c. qui n'a lieu que dans certains corps particuliers. Voyez les lois de chacune de ces attractions, aux mots GRAVITÉ, MAGNÉTISME, &c.

L'attraction de la gravité, que les mathématiciens appellent aussi *force centripète*, est un des plus grands principes & des plus universels de la nature. Nous la voyons & nous la sentons dans les corps qui sont proches de la surface de la terre, (Voyez

PRÉSENTEUR ; & nous trouvons par observation, que la même force (c'est-à-dire, cette force qui est toujours proportionnelle à la quantité de matière, & qui agit en raison inverse du carré de la distance), que cette force, dis-je, s'étend jusqu'à la lune & jusqu'aux autres planètes premières & secondaires, aussi-bien que jusqu'aux comètes, & que c'est par elle que les corps célestes sont retenus dans leurs orbites. Or comme nous trouvons la pesanteur dans tous les corps qui sont le sujet de nos observations, nous sommes en droit d'en conclure par une des règles regnantes en Philosophie, qu'elle se trouve aussi dans tous les autres : de plus, comme nous remarquons qu'elle est proportionnelle à la quantité de matière de chaque corps, elle doit exister dans chacune de leurs parties ; & c'est par conséquent une loi de la nature, que chaque particule de matière tende vers chaque autre particule. Voyez la preuve plus étendue de cette vérité, & l'application de ce principe aux mouvements des corps célestes, sous les articles PHILOSOPHIE NEWTONIENNE, SOLEIL, LUNE, PLANÈTE, COMÈTE, SATELLITE, CENTRIFÈTE, CENTRIFUGE.

C'est donc de l'attraction, suivant M. Newton, que proviennent la plupart des mouvements, & par conséquent des changemens qui se font dans l'univers : c'est par elle que les corps pesans descendent, & que les corps légers montent ; c'est par elle que les projectiles sont dirigés dans leur course, que les vapeurs montent, & que la pluie tombe ; c'est par elle que les fleuves coulent, que l'air presse, que l'océan a un flux & reflux. Voyez MOUVEMENT, DESCENTE, ASCENSION, PROJECTILE, VAPEUR, PLUIE, FLEUVE, FLUX & REFLUX, AIR, ATMOSPHERE, &c. Les mouvements qui résultent de ce principe, sont l'objet de cette partie si étendue des Mathématiques, qu'on appelle Mécanique ou Statique, comme aussi de l'Hydrostatique, de l'Hydraulique, &c. &c. qui en font comme les branches & la suite, &c. Voyez MÉCANIQUE, STATIQUE, HYDROSTATIQUE, PNEUMATIQUE ; voyez aussi MATHÉMATIQUE, PHILOSOPHIE, &c.

La seconde espèce d'attraction est celle qui ne s'étend qu'à des distances insensibles. Telle est l'attraction mutuelle qu'on remarque dans les petites parties dont les corps sont composés ; car ces parties s'attirent les unes les autres au point de contact, ou extrêmement près de ce point, avec une force très-supérieure à celle de la pesanteur, mais qui décroît ensuite à une très-petite distance, jusqu'à devenir beaucoup moindre que la pesanteur. Un auteur moderne a appelé cette force attraction de cohésion, supposant que c'est elle qui unit les particules élémentaires des corps pour en faire des masses sensibles.

Toutes les parties des fluides s'attirent mutuellement, comme il paroît par la ténacité & par

la rondceur de leurs gouttes, si on en excepte l'air ; le feu & la lumière, qu'on n'a jamais vus sous la forme de gouttes. Ces mêmes fluides se forment en gouttes dans le vuide comme dans l'air, ils attirent les corps solides, & en sont réciproquement attirés ; d'où il paroît que la vertu attractive se trouve répandue par-tout. Qu'on mette l'une sur l'autre deux glaces de miroir bien unies, bien nettes & bien sèches, on trouvera alors qu'elles tiennent ensemble avec beaucoup de force, de sorte qu'on ne peut les séparer l'une de l'autre qu'avec peine. La même chose arrive dans le vuide, lorsqu'on retranche une petite portion de deux balles de plomb, en sorte que leurs surfaces deviennent unies à l'endroit de la section, & qu'on les presse ensuite l'une contre l'autre avec la main, en leur faisant faire en même tems la quatrième partie d'un tour ; on remarque que ces balles tiennent ensemble avec une force de 40 ou 50 livres. En général, tous les corps dont les surfaces sont unies, sèches & nettes, principalement les métaux, se collent & s'attachent mutuellement l'un à l'autre quand on les approche ; de sorte qu'il faut quelque force pour les séparer. Muffsch. *essai de Phys.*

Les corps s'attirent réciproquement, non-seulement lorsqu'ils se touchent, mais aussi lorsqu'ils sont à une certaine distance les uns des autres : car mettez entre les deux glaces de miroir dont nous venons de parler, un fil de soie fort fin, alors ces deux glaces ne pourront pas se toucher, puisqu'elles seront éloignées l'une de l'autre de toute l'épaisseur du fil ; cependant on ne laissera pas de voir que ces deux glaces s'attirent mutuellement, quoiqu'avec moins de force que lorsqu'il n'y avoit rien entre elles. Mettez entre les glaces deux fils que vous aurez tordus ensemble, ensuite trois fils ; tors de même ; & vous verrez que l'attraction diminuera à mesure que les glaces s'éloigneront l'une de l'autre. Muffsch. *ibid.*

On peut encore faire voir d'une manière bien sensible cette vertu attractive par une expérience curieuse. Prenez un corps solide & opaque, qui finisse en pointe, soit de métal, soit de pierre, ou même de verre ; si des rayons de lumière parallèles passent tout près de la pointe on du tranchant de ce corps dans une chambre obscure, alors le rayon qui se trouvera tout près de la pointe, sera attiré avec beaucoup de force vers le corps ; & après s'être détourné de son chemin, il en prendra un autre, étant brisé par l'attraction que ce corps exerce sur lui. Le rayon un peu plus éloigné de la pointe est aussi attiré, mais moins que le précédent, & ainsi il sera moins rompu, & s'écartera moins de son chemin. Le rayon suivant qui est encore plus éloigné, sera aussi moins attiré & moins détourné de sa première route. Enfin, à une certaine distance fort petite, il y aura un rayon qui ne sera plus attiré du tout, ou du moins si faiblement, qu'il conservera sans se rompre sa direction primitive. Muffsch. *ibid.*

C'est à M. Newton que nous devons la découverte de cette dernière espèce d'attraction, qui n'agit qu'à de très-petites distances; comme c'est à lui que nous devons la connoissance plus parfaite de l'autre, qui agit à des distances considérables. En effet, les loix du mouvement & de la percussion des corps sensibles dans les différentes circonstances où nous pouvons les supposer, ne paroissent pas suffisantes pour expliquer les mouvemens intérieurement des particules des corps, d'où dépendent les différens changemens qu'ils subissent dans leurs contextures, leurs couleurs, leurs propriétés; ainsi, notre philosophie seroit nécessairement en défaut, si elle étoit fondée sur le principe seul de la gravitation, porté même aussi loin qu'il est possible. Voyez LUMIÈRE, COULEUR, &c.

Mais outre les loix ordinaires du mouvement dans les corps sensibles, les particules dont ces corps sont composés, en observent d'autres, qu'on n'a commencé à remarquer que depuis peu de tems, & dont on n'a encore qu'une connoissance fort imparfaite. M. Newton, à la pénétration duquel nous en devons la première idée, s'est prêté contenté d'en établir l'existence; & après avoir prouvé qu'il y a des mouvemens dans les petites parties du corps, il ajoute que ces mouvemens proviennent de certaines puissances ou forces, qui paroissent différentes de toutes les forces que nous connoissons. « C'est en vertu de ces forces, selon lui, que les petites particules des corps agissent les unes sur les autres, même à une certaine distance, & produisent par-là plusieurs phénomènes de la nature. Les corps sensibles, comme nous avons déjà remarqué, agissent mutuellement les uns sur les autres; & comme la nature agit d'une manière toujours constante & uniforme, il est fort vraisemblable qu'il y a beaucoup de forces de la même espèce; celles dont nous venons de parler s'étendent à des distances assez sensibles, pour pouvoir être remarquées par des yeux vulgaires; mais il peut y en avoir d'autres qui agissent à des distances trop petites, pour qu'on ait pu les observer jusqu'ici; & l'électricité, par exemple, agit peut-être à de telles distances, même sans être excitée par le frottement. »

Cet illustre auteur confirme cette opinion par un grand nombre de phénomènes & d'expériences, qui prouvent clairement, selon lui, qu'il y a une puissance & une action attractive entre les particules, par exemple, du sel & de l'eau; entre celles du vitriol & de l'eau, du fer & de l'eau forte, de l'esprit de vitriol & du salpêtre. Il ajoute que cette puissance n'est pas d'une égale force dans tous les corps; qu'elle est plus forte, par exemple, entre les particules du sel de tartre & celles de l'eau-forte, qu'entre les particules du sel de tartre & celles de l'argent; entre l'eau forte & la pierre calaminaire, qu'entre l'eau-forte & le fer; entre l'eau forte & le fer, qu'entre l'eau forte & le cuivre; encore moindre entre l'eau forte & l'argent, ou

entre l'eau-forte & le mercure. De même l'esprit de vitriol agit sur l'eau, mais il agit encore davantage sur le fer & sur le cuivre.

Il est facile d'expliquer par l'attraction mutuelle la rondeur que les gouttes d'eau affectent; car comme ces parties doivent s'attirer toutes également & en tout sens, elles doivent tendre à former un corps, dont tous les points de la surface soient à distances égales de son centre. Ce corps seroit parfaitement sphérique, & les parties qui les composent étoient sans pesanteur; mais cette force qui les fait descendre en embas, oblige la goutte de s'allonger un peu; & c'est pour cette raison, que les gouttes de fluide attachées à la surface inférieure des corps, dont le grand axe est vertical, prennent une figure un peu ovale. On remarque aussi cette même figure dans les gouttes d'eau qui sont placées sur la surface supérieure d'un plan horizontal; mais alors le petit axe de cette figure est vertical, & sa surface inférieure, c'est-à-dire celle qui touche le plan, est plane; ce qui vient tant de la pesanteur des particules de l'eau, que de l'attraction du corps sur lequel elles sont placées, & qui altère l'effet de leur attraction mutuelle. Aussi, moins la surface sur laquelle la goutte est placée, a de force pour attirer ses parties, plus la goutte reste ronde; c'est pour cette raison, que les gouttes d'eau qu'on voit sur quelques feuilles de plantes, sont parfaitement rondes, au lieu que celles qui se trouvent sur du verre, sur des métaux ou sur des pierres, ne sont qu'à demi-rondes, ou quelquefois encore moins. Il en est de même du mercure, qui se partage sur le papier en petites boules parfaitement rondes, au lieu qu'il prend une figure aplatie lorsqu'il est mis sur du verre ou sur quelqu'autre métal. Plus les gouttes sont petites, moins elles ont de pesanteur; & par conséquent lorsqu'elles viendront à s'attirer, elles formeront un globe beaucoup plus rond que celui qui sera formé par les grosses gouttes, comme on pourroit le démontrer plus au long, & comme l'expérience le confirme. Il est à remarquer que tous ces phénomènes s'observent également dans l'air & dans le vuide. *Aluffch.*

On peut s'assurer encore de la force avec laquelle les particules d'eau s'attirent, en prenant une phiole dont le cou soit fort étroit, & n'ait pas plus de deux lignes de diamètre, & en renversant cette phiole, après l'avoir remplie d'eau; car on remarquera alors qu'il n'en sort pas une seule goutte.

Comme dans une goutte d'eau, les parties qui s'attirent réciproquement ne restent pas en repos avant que d'avoir formé une petite boule, de même aussi deux gouttes d'eau situées l'une proche de l'autre, & légèrement attirées par la surface sur laquelle elles se trouvent, se précipiteront l'une vers l'autre par leur attraction mutuelle; & dans l'instant même de leur premier contact, elles se réuniront & formeront une boule, comme on l'observe en effet; la même chose arrive à deux gouttes de mercure.

Lorsqu'on verse ensemble les parties de divers liquides, elles s'attirent mutuellement; celles qui se touchent alors, tiennent l'une à l'autre par la force avec laquelle elles agissent; c'est pourquoi les liquides pourroient en ce cas se changer en un corps solide, qui sera d'autant plus dur, que l'attraction aura été plus forte; ainsi ces liquides se coaguleront. *Musich.*

Lorsqu'on a fait dissoudre des parties de sel dans une grande quantité d'eau, elles sont attirées par l'eau avec plus de force qu'elles ne peuvent s'attirer mutuellement, & elles restent séparées assez loin les unes des autres: mais lorsqu'on fait évaporer une grande quantité de cette même eau, soit par la chaleur du soleil, soit par celle du feu, soit par le moyen du vent, il s'élève sur la surface de l'eau une pellicule fort mince, formée par les particules de sel qui se tiennent en haut, & dont l'eau s'est évaporée. Cette pellicule, qui n'est composée que des parties de sel, peut alors attirer & séparer de l'eau qui est au-dessous, différentes parties salines, avec plus de force que ne pourroit faire auparavant cette même eau déjà diminuée de volume; car, par l'évaporation d'une grande quantité d'eau, les parties salines se rapprochent davantage, & s'unissent beaucoup plus qu'auparavant; & l'eau se trouvant en moindre quantité, elle a aussi moins de force pour pouvoir agir sur les parties salines qui sont alors attirées en-haut vers la pellicule de sel à laquelle elles se joignent. Cette pellicule devient par conséquent plus épaisse & plus pesante que le liquide qui est au-dessous, puisque la pesanteur spécifique des parties salines est beaucoup plus grande que celle de l'eau; ainsi, dès que cette peau est devenue fort pesante, elle se brise en pièces; ces morceaux tombent au fond, & continuent d'attirer d'autres parties salines; d'où il arrive qu'augmentant encore de volume, ils se forment en grosses masses de différentes grandeurs appelées *crystaux*. *Musich.*

L'air, quoiqu'il doive furnager tous les liquides que nous connoissons, & qui sont beaucoup moins pesans que lui, ne laisse pas d'en être attiré, & de se mêler avec eux; & M. Petit a fait voir par plusieurs expériences, de quelle manière il est attiré aux corps fluides, & de quelle façon, pour ainsi dire, aux corps solides. *Mém. Acad. 1731.*

Les efforts que nous arrivons lorsqu'on mêle ensemble différens liquides, nous donnent un exemple remarquable de ces sortes d'attractions entre les petites parties des corps fluides; on en verra ci-dessous une explication un peu plus détaillée.

Il n'est pas non plus fort difficile de prouver que les liquides sont attirés par les corps solides. En effet, qu'on verse de l'eau dans un verre bien net, on remarquera qu'elle est attirée sur les côtés contre lesquels elle monte & auxquels elle s'attache, de sorte que la surface de la liqueur est plus basse au milieu que celle qui touche les parois du verre, &

qui devient concave; au contraire, lorsqu'on verse du mercure dans un verre, sa surface devient convexe, étant plus haute au milieu que proche les parois du verre; ce qui vient de ce que les parties du mercure s'attirent réciproquement avec plus de force, qu'elles ne sont attirées par le verre.

Si on prend un corps solide bien net, & qui ne soit pas gras, & qu'on le plonge dans un liquide, & qu'ensuite on le leve fort doucement & qu'on l'en retire, la liqueur y restera attachée, même quelquefois à une hauteur assez considérable; en sorte qu'il reste entre le corps & la surface du liquide, une petite colonne qui y demeure suspendue: cette colonne se détache & retombe lorsqu'on a élevé le corps assez haut, pour que la pesanteur de la colonne l'emporte sur la force attractive. *Musich.*

La force avec laquelle le verre attire les fluides, se manifeste principalement dans les expériences sur les tuyaux capillaires. Voyez TUYAUX CAPILLAIRES.

Il y a une infinité d'autres expériences qui confirment l'existence de ce principe d'attraction entre les particules des corps.

Toutes ces actions en vertu desquels les particules des corps tendent les unes vers les autres, sont appelées en général par Newton du nom indéfini d'attraction, qui est également applicable à toutes les actions par lesquels les corps sensibles agissent les uns sur les autres, soit par impulsion, ou par quelque autre force moins connue; & par là cet auteur explique une infinité de phénomènes, qui seroient inexplicables par le seul principe de la gravité: tels sont la cohésion, la dissolution, la coagulation, la cristallisation, l'ascension des fluides dans les tuyaux capillaires, les sécrétions animales; la fluidité, la fixité, la fermentation, &c. Voyez dans les Dictionnaires de Physique & de Chimie, les articles COHÉSION, DISSOLUTION, COAGULATION, CRISTALLISATION, ASCENSION, SÉCRÉTION, FERMENTATION, &c.

« En admettant ce principe, ajoute cet illustre auteur, on trouvera que la nature est par-tout conforme à elle-même, & très-simple dans ses opérations; qu'elle produit tous les grands mouvements des corps célestes par l'attraction de la gravité qui agit sur les corps, & presque tous les petits mouvements de leurs parties, par le moyen de quelque autre puissance attractive répandue dans ces parties. Sans ce principe il n'y auroit point de mouvement dans le monde; & sans la continuation de l'action d'une parcelle cause, le mouvement périroit peu-à-peu, puisqu'il devroit continuellement décroître & diminuer, si ces puissances actives n'en reproduisoient sans cesse de nouveaux. » *Optique, page 272.*

Il est facile de juger après cela combien sont injustes ceux des philosophes modernes qui se déclarent hautement contre le principe de l'attraction, sans en apporter d'autre raison, sinon qu'ils ne conçoivent

neçoivent pas comment un corps peut agir sur un autre qui en est éloigné. Il est certain que, dans un grand nombre de phénomènes, les philosophes ne reconnoissent point d'autre action, que celle qui est produite par l'impulsion & le contact immédiat : mais nous voyons dans la nature plusieurs effets, sans y remarquer d'impulsion : souvent même nous sommes en état de prouver, que toutes les explications qu'on peut donner de ces effets, par le moyen des loix connues de l'impulsion, sont chimeriques & contraires aux principes de la mécanique la plus simple. Rien n'est donc plus sage & plus conforme à la vraie Philosophie, que de suspendre notre jugement sur la nature de la force qui produit ces effets. Par-tout où il y a un effet, nous pouvons conclure qu'il y a une cause, soit que nous la voyions ou que nous ne la voyions pas. Mais quand la cause est inconnue, nous pouvons considérer simplement l'effet, sans avoir égard à la cause, & c'est même à quoi il semble qu'un philosophe doit se borner en pareil cas : car, d'un côté, ce seroit laisser un grand vuide dans l'histoire de la nature, que de nous dispenser d'examiner un grand nombre de phénomènes sous prétexte que nous en ignorons la cause ; & de l'autre, ce seroit nous exposer à faire un roman, que de vouloir raisonner sur des causes qui nous sont inconnues. Les phénomènes de l'*attraction* font donc la matière des recherches physiques ; & en cette qualité ils doivent faire partie d'un système de physique : mais la cause de ces phénomènes n'est du ressort du physicien, que quand elle est sensible, c'est-à-dire, quand elle paroît elle-même être l'effet de quelque cause plus relevée (car la cause immédiate d'un effet ne paroît elle-même qu'un effet, la première cause étant invisible). Ainsi, nous pouvons supposer autant de causes d'*attraction* qu'il nous plaira, sans que cela puisse nuire aux effets. L'illustre Newton semble même être incertain sur la nature de ces causes : car il paroît quelquefois regarder la gravité, comme l'effet d'une cause immatérielle (*Optiq. page 343, &c.*) ; & quelquefois il paroît la regarder comme l'effet d'une cause matérielle. *Ibid. page 325.*

Dans la philosophie newtonienne, la recherche de la cause est le dernier objet qu'on a en vue : jamais on ne pense à la trouver que quand les loix de l'effet & les phénomènes sont bien établis, parce que c'est par les effets seuls qu'on peut remonter jusqu'à la cause : les actions mêmes les plus palpables & les plus sensibles n'ont point une cause entièrement connue : les plus profonds philosophes ne sauroient concevoir comment l'impulsion produit le mouvement, c'est-à-dire, comment le mouvement d'un corps passe dans un autre par le choc : cependant la communication du mouvement par l'impulsion est un principe admis, non-seulement en Philosophie, mais encore en Mathématique ; & même une grande partie de la Mécanique élémentaire, a pour objet les

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

loix & les effets de cette communication. Voyez PERCUSSION & COMMUNICATION de mouvement.

Concluons donc que quand les phénomènes sont suffisamment établis, les autres espèces d'effets, où on ne remarque point d'impulsion, ont le même droit de passer de la Physique dans les Mathématiques, sans qu'on s'embarrasse d'en approfondir les causes qui sont peut-être au-dessus de notre portée : il est permis de les regarder comme causes occultes (car toutes les causes le sont, à parler exactement), & de s'en tenir aux effets, qui sont la seule chose immédiatement à notre portée.

Newton a donc éloigné avec raison de sa philosophie cette discussion étrangère & métaphysique ; & malgré tous les reproches qu'on a cherché à lui faire là-dessus, il a la gloire d'avoir découvert dans la mécanique un nouveau principe, qui étant bien approfondi, doit être infiniment plus étendu que ceux de la mécanique ordinaire : c'est de ce principe seulement que nous pouvons attendre l'explication d'un grand nombre de changemens qui arrivent dans les corps, comme productions, générations, corruptions, &c. en un mot, de toutes les opérations surprenantes de la Chimie. Voyez GÉNÉRATION, CORRUPTION, OPÉRATION, CHIMIE, &c. (*Dict. de Phys. & de Ch.*)

Quelques philosophes anglois ont approfondi les principes de l'*attraction*. M. Kéil en particulier a tâché de déterminer quelques-unes des loix de cette nouvelle cause, & d'expliquer par ce moyen plusieurs phénomènes généraux de la nature, comme la cohésion, la fluidité, l'élasticité, la fermentation, la mollesse, la coagulation. M. Freind, marchant sur ces traces, a encore fait une application plus étendue de ces mêmes principes aux phénomènes de la Chymie. Aussi quelques philosophes ont été tentés de regarder cette nouvelle mécanique comme une science complète, & de penser qu'il n'y a presque aucun effet physique dont la force attractive ne fournisse une explication immédiate.

Cependant en tirant cette conséquence, il y y auroit lieu de craindre qu'on ne se hâtât un peu trop : un principe si second a besoin d'être examiné encore plus à fond ; & il semble qu'avant d'en faire l'application générale à tous les phénomènes, il faudroit examiner plus exactement ses loix & ses limites. L'*attraction* en général est un principe si complexe, qu'on peut par son moyen expliquer une infinité de phénomènes différens les uns des autres : mais, jusqu'à ce que nous en connoissions mieux les propriétés, il seroit peut-être bon de l'appliquer à moins d'effets, & de l'approfondir davantage. Il se peut faire que toutes les *attractions* ne se ressemblent pas, & que quelques-unes dépendent de certaines causes particulières, dont nous n'avons pu nous former jusqu'à présent aucune

idée, parce que nous n'avons pas assez d'observations exactes, ou parce que les phénomènes sont si peu sensibles qu'ils échappent à nos sens. Ceux qui viendront après nous, découvriront peut-être ces diverses sortes de phénomènes : c'est pourquoi nous devons rencontrer un grand nombre de phénomènes qu'il nous est impossible de bien expliquer, ou de démontrer avant que ces causes aient été découvertes. Quant au mot d'*attraction*, on peut se servir de ce terme jusqu'à ce que la cause soit mieux connue.

Pour donner un essai du principe d'*attraction*, & de la manière dont quelques philosophes l'ont appliqué, nous joindrons ici les principales loix qui ont été données par M. Newton, M. Keil, M. Freind, &c.

THÉOR. I. Outre la force *attractive* qui retient les planètes & les comètes dans leurs orbites, il y en a une autre par laquelle les différentes parties dont les corps sont composés, s'attirent mutuellement les unes les autres; & cette force décroît plus qu'en raison inverse du carré de la distance.

Ce théorème, comme nous l'avons déjà remarqué, peut se démontrer par un grand nombre de phénomènes. Nous ne rappellerons ici que les plus simples & les plus communs : par exemple, la figure sphérique que les gouttes d'eau prennent, ne peut provenir que d'une pareille force : c'est par la même raison que deux boules de mercure s'unissent & s'incorporent en une seule dès qu'elles viennent à se toucher, ou qu'elles sont fort près l'une de l'autre : c'est encore en vertu de cette force que l'eau s'élève dans les tuyaux capillaires, &c.

A l'égard de la loi précise de cette *attraction*, on ne l'a point encore déterminée : tout ce que l'on sait certainement, c'est qu'en s'éloignant du point de contact, elle décroît plus que dans la raison inverse du carré de la distance, & que par conséquent elle suit une autre loi que la gravité. En effet, si cette force suivoit la loi de la raison inverse du carré de la distance, elle ne seroit guère plus grande au point de contact que fort proche de ce point; car M. Newton a démontré dans ses *Principes mathématiques*, que si l'*attraction* d'un corps est en raison inverse du carré de la distance, cette *attraction* est finie au point de contact, & qu'ainsi elle n'est guère plus grande au point de contact, qu'à une petite distance de ce point; au contraire, lorsque l'*attraction* décroît plus qu'en raison inverse du carré de la distance, par exemple, en raison inverse du cube, ou d'une autre puissance plus grande que le carré; alors, selon les démonstrations de M. Newton, l'*attraction* est infinie au point de contact, & finie à une très-petite distance de ce point. Ainsi, l'*attraction* au point de contact est beaucoup plus grande, qu'elle n'est à une très-petite distance de ce même point. Or il est certain par toutes les expériences, que l'*attraction*

qui est très-grande au point de contact, devient presque insensible à une très-petite distance de ce point. D'où il s'ensuit que l'*attraction* dont il s'agit, décroît en raison inverse d'une puissance plus grande que le carré de la distance : mais l'expérience ne nous a point encore appris, si la diminution de cette force suit la raison inverse du cube, ou d'une autre puissance plus élevée.

II. La quantité de l'*attraction* dans tous les corps très-petits, est proportionnelle, toutes choses d'ailleurs égales, à la quantité de matière du corps *attirant*, parce qu'elle est en effet, ou du moins à très-peu près, la somme ou le résultat des *attractions* de toutes les parties dont le corps est composé; ou, ce qui revient au même, l'*attraction* dans tous les corps fort petits, est comme leurs solidités, toutes choses d'ailleurs égales.

Donc, 1.^e à distances égales, les *attractions* de deux corps très-petits seront comme leurs masses, quelque différence qu'il y ait d'ailleurs entre leur figure & leur volume.

2.^e A quelque distance que ce soit, l'*attraction* d'un corps très-petit est comme sa masse divisée par le carré de la distance.

Il faut observer que cette loi, prise rigoureusement, n'a lieu qu'à l'égard des atomes, ou des plus petites parties composantes des corps, que quelques-uns appellent *particules de la dernière composition*, & non pas à l'égard des corpuscules faits de ces atomes.

Car lorsqu'un corps est d'une grandeur finie, l'*attraction* qu'il exerce sur un point placé à une certaine distance, n'est autre chose que le résultat des *attractions*, que toutes les parties du corps *attirant* exercent sur ce point, & qui, en se combinant toutes ensemble, produisent sur ce point une force ou une tendance unique dans une certaine direction. Or, comme toutes les particules dont le corps *attirant* est composé, sont différemment situées par rapport au point qu'elles attirent, toutes les forces que ces particules exercent ont chacune une valeur & une direction différentes; & ce n'est que par le calcul qu'on peut savoir si la force unique qui en résulte est comme la masse totale du corps *attirant* divisée par le carré de la distance. Aussi cette propriété n'a-t-elle lieu que dans un très-petit nombre de corps, par exemple dans les sphères, de quelque grandeur qu'elles puissent être. M. Newton a démontré que l'*attraction* qu'elles exercent sur un point placé à une distance quelconque, est la même que si toute la matière étoit concentrée & réunie au centre de la sphère; d'où il s'ensuit que l'*attraction* d'une sphère est en général comme sa masse divisée par le carré de la distance qu'il y a du point *attiré* au centre de la sphère. Lorsque le corps *attirant* est fort petit, toutes les parties sont censées être à la même distance du point *attiré*, & sont censées agir à-peu-près dans le même sens; c'est pour cela que dans

les petits corps, l'attraction est confée proportionnelle à la masse divisée par le carré de la distance.

Au reste, c'est toujours à la masse, & non à la grosseur ou au volume, que l'attraction est proportionnelle; car l'attraction totale est la somme des attractions particulières des atomes dont un corps est composé. Or ces atomes peuvent être tellement unis ensemble, que les corpuscules les plus solides forment les particules les plus légères, c'est-à-dire, que leurs surfaces n'étant point propres pour se toucher intimement, elles seront séparées par de si grands interstices, que la grosseur ne sera point proportionnelle à la quantité de matière.

III. Si un corps est composé de particules, dont chacune ait une force attractive décroissante en raison triplée ou plus que triplée des distances, la force avec laquelle une particule de matière sera attirée par ce corps au point de contact, sera infiniment plus grande que si cette particule étoit placée à une distance donnée du corps. M. Newton a démontré cette proposition dans ses principes, comme nous l'avons déjà remarqué. Voyez *Princ. math. scd. xij. liv. I. proposition première*.

IV. Dans la même supposition, si la force attractive qui agit à une distance assignable, a un rapport fini avec la gravité, la force attractive au point de contact, ou infiniment près de ce point, sera infiniment plus grande que la force de la gravité.

V. Mais si, dans le point de contact, la force attractive a un rapport fini à la gravité, la force à une distance assignable sera infiniment moindre que la force de la gravité, & par conséquent sera nulle.

VI. La force attractive de chaque particule de matière au point de contact, surpasse presque infiniment la force de la gravité, mais cependant n'est pas infiniment plus grande. De ce théorème & du précédent, il s'ensuit que la force attractive qui agit à une distance donnée quelconque, sera presque égale à zéro.

Par conséquent cette force attractive des corps terrestres ne s'étend que dans un espace extrêmement petit, & s'évanouit à une grande distance. C'est ce qui fait qu'elle ne peut rien déranger dans le mouvement des corps célestes qui en sont fort éloignés, & que toutes les planètes continuent sensiblement leur cours, comme s'il n'y avoit point de force attractive dans les corps terrestres.

Où la force attractive cesse, la force répulsive commence, selon M. Newton, ou plutôt la force attractive se change en force répulsive. Voy. *RÉPULSION*.

VII. Supposons un corpuscule qui touche un corps : la force par laquelle le corpuscule est poussé, c'est-à-dire, la force avec laquelle il est adhérent au corps qu'il touche, sera proportion-

nelle à la quantité du contact ; car les parties un peu éloignées du point de contact ne contribuent en rien à la cohésion.

Il y a donc différents degrés de cohésion, selon la différence qui peut se trouver dans le contact des particules ; la force de la cohésion est la plus grande qu'il est possible, lorsque la surface touchante est plane : en ce cas, toutes choses d'ailleurs égales, la force par laquelle le corpuscule est adhérent, sera comme les parties des surfaces touchantes.

C'est pour cette raison que deux marbres parfaitement polis, qui se touchent par leurs surfaces planes, sont si difficiles à séparer, & ne peuvent l'être que par un poids fort supérieur à celui de l'air qui les presse.

VIII. La force de l'attraction croît dans les petites particules à mesure que le poids & la grosseur de ces particules diminue, ou, pour s'expliquer plus clairement, la force de l'attraction décroît moins à proportion que la masse, toutes choses d'ailleurs égales.

Car, comme la force attractive n'agit qu'au point de contact, ou fort près de ce point, le moment de cette force doit être comme la quantité de contact, c'est-à-dire, comme la densité des parties & la grandeur de leurs surfaces : or les surfaces des corps croissent ou décroissent comme les carrés des diamètres, & les solidités comme les cubes de ces mêmes diamètres ; par conséquent, les plus petites particules ayant plus de surface à proportion de leur solidité, sont capables d'un contact plus fort, &c. Les corpuscules dont le contact est le plus petit & le moins étendu qu'il est possible, comme les sphères infiniment petites, sont ceux qu'on peut séparer le plus aisément l'un de l'autre.

On peut tirer de ce principe la cause de la fluidité ; car, regardant les parties des fluides comme de petites sphères ou globules très-polis, on voit que leur attraction & cohésion mutuelle doit être très-peu considérable, & qu'elles doivent être fort faciles à séparer & à glisser les unes sur les autres ; ce qui constitue la fluidité.

IX. La force par laquelle un corpuscule est attiré par un autre corps qui en est proche, ne reçoit aucun changement dans la quantité, soit que la manière du corps attirant croisse ou diminue, pourvu que le corps attirant conserve toujours la même densité, & que le corpuscule demeure toujours à la même distance.

Car, puisque la puissance attractive n'est répandue que dans un fort petit espace, il s'ensuit que les corpuscules qui sont éloignés d'un autre, ne contribuent en rien pour attirer celui-ci ; par conséquent le corpuscule sera attiré vers celui qui en est proche, avec la même force, soit que les autres corpuscules y soient ou n'y soient pas, & par conséquent aussi, soit qu'on en ajoute d'autres ou non.

Donc les particules auront différentes forces attractives, selon la différence de leur structure: par exemple, une particule percée dans la longueur n'attirera pas si fort qu'une particule qui l'étoit entière; de même aussi la différence dans la figure en produira une dans la force attractive. Ainsi une sphère attirera plus qu'un cône, qu'un cylindre, &c.

X. Supposons que la contexture d'un corps soit telle, que les dernières particules élémentaires dont il est composé soient un peu éloignées de leur premier contact par l'action de quelque force extérieure, comme par le poids ou l'impulsion d'un autre corps, mais sans acquiescer en vertu de cette force un nouveau contact; dès que l'action de cette force aura cessé, ces particules tendant les unes vers les autres par leur force attractive, retourneront aussitôt à leur premier contact. Or, quand les parties d'un corps, après avoir été déplacées, retournent dans leur première situation, la figure du corps, qui avoit été changée par le dérangement des parties, se rétablit aussi dans son premier état: donc les corps qui ont perdu leur figure primitive, peuvent la recouvrer par l'attraction.

Par-là on peut expliquer la cause de l'élasticité; car quand les particules d'un corps ont été un peu dérangées de leur situation par l'action de quelque force extérieure, si-tôt que cette force cesse d'agir, les parties séparées doivent retourner à leur première place, & par conséquent le corps doit reprendre sa figure, &c.

XI. Mais si la contexture d'un corps est telle que ses parties, lorsqu'elles perdent leur contact par l'action de quelque cause extérieure, en reçoivent un autre du même degré de force, ce corps ne pourra reprendre la première figure.

Par-là on peut expliquer en quoi consiste la mollesse des corps.

XII. Un corps plus pesant que l'eau peut diminuer de grosseur à un tel point, que ce corps demeure suspendu dans l'eau sans descendre, comme il le devoit faire par sa propre pesanteur.

Par-là on peut expliquer pourquoi les particules salines, métalliques, & les autres petits corps semblables, demeurent suspendus dans les fluides qui les dissolvent.

XIII. Les grands corps s'approchent l'un de l'autre avec moins de vitesse que les petits corps. En effet, la force avec laquelle deux corps *AB* s'attirent (fig. 32, méch. n.º 2.), réside seulement dans les particules de ces corps les plus proches; car les parties plus éloignées n'y contribuent en rien: par conséquent la force qui tend à mouvoir les corps *A* & *B*, n'est pas plus grande que celle qui tendroit à mouvoir les seules particules *c* & *d*. Or les vitesses des différents corps mis par une

même force sont en raison inverse des masses de ces corps; car plus la masse à mouvoir est grande, moins cette force doit lui imprimer de vitesse; donc la vitesse avec laquelle le corps *A* tend à s'approcher de *B*, est à la vitesse avec laquelle la particule *c* tendroit à se mouvoir vers *B*, si elle étoit détachée du corps *A*, comme la particule *c* est au corps *A*; donc la vitesse du corps *A* est beaucoup moindre que celle qu'auroit la particule *c*, si elle étoit détachée du corps *A*.

C'est pour cela que la vitesse avec laquelle deux petits corpuscules tendent à s'approcher l'un de l'autre, est en raison inverse de leurs masses; c'est aussi pour cette même raison que le mouvement des grands corps est naturellement si lent, que le fluide environnant est naturellement si lent, que le retardement & le diminution considérable; au lieu que les petits corps sont capables d'un mouvement beaucoup plus grand, & sont en état par ce moyen de produire un très-grand nombre d'effets, tant il est vrai que la force ou l'énergie de l'attraction est beaucoup plus considérable dans les petits corps que dans les grands. On peut aussi déduire du même principe la raison de cet axiome de Chimie: *Les sels s'agissent que quand ils sont dissous*.

XIV. Si un corpuscule placé dans un fluide est également attiré en tout sens par les particules environnantes, il ne doit recevoir aucun mouvement; mais s'il est attiré par quelques particules plus fortement que par d'autres, il doit se mouvoir vers le côté où l'attraction est la plus grande, & le mouvement qu'il aura sera proportionné à l'inégalité d'attraction, c'est-à-dire, que plus cette inégalité sera grande, plus aussi le mouvement sera grand: & au contraire.

XV. Si des corpuscules nagent dans un fluide, & qu'ils s'attirent les uns les autres avec plus de force qu'ils n'attirent les particules intermédiaires du fluide, & qu'ils n'en sont attirés, ces corpuscules doivent s'ouvrir un passage à travers les particules du fluide, & s'approcher les uns des autres avec une force égale à l'excès de leur force attractive sur celle des parties du fluide.

XVI. Si un corps est plongé dans un fluide dont les particules soient attirées plus fortement par les parties du corps, que les parties de ce corps ne s'attirent mutuellement, & qu'il y ait dans ce corps un nombre considérable de pores ou d'interstices à travers lesquels les particules du fluide puissent passer, le fluide traversera ces pores. De plus, si la cohésion des parties du corps n'est pas assez forte pour résister à l'effort que le fluide fera pour les séparer, ce corps se dissoudra.

Donc pour qu'un menstrue soit capable de dissoudre un corps donné, il faut trois conditions; 1.º que les parties du corps attirent les particules du menstrue plus fortement qu'elles ne s'attirent elles-mêmes les unes les autres; 2.º que les pores

du corps soient perméables aux particules du menstrue; & que la cohésion des parties du corps ne soit pas assez forte pour résister à l'effort & à l'irruption des particules du menstrue.

XVII. Les sels ont une grande force attractive, même lorsqu'ils sont séparés par beaucoup d'interstices qui laissent un libre passage à l'eau; par conséquent les particules de l'eau sont fortement attirées par les particules salines; de sorte qu'elles se précipitent dans les pores des parties salines, se partent ces parties & dissolvent le sel.

XVIII. Si les corpuscules sont plus attirés par les parties du fluide qu'elles ne s'attirent les unes les autres, ces corpuscules doivent s'éloigner les uns des autres, & se répandre çà & là dans le fluide.

Par exemple, si on dissout un peu de sel dans une grande quantité d'eau, les particules du sel, quoique d'une pesanteur spécifique plus grande que celle de l'eau, se répandront & se disperseront dans toute la masse de l'eau, de manière que l'eau sera aussi salée au fond qu'à sa partie supérieure. Cela ne prouve-t-il pas que les parties du sel ont une force centrifuge ou répulsive, par laquelle elles tendent à s'éloigner les unes des autres, ou plutôt qu'elles sont attirées par l'eau plus fortement qu'elles ne s'attirent les unes des autres? En effet, comme tout corps monte dans l'eau lorsqu'il est moins attiré par la gravité terrestre que les parties de l'eau, de même toutes les parties de sel qui flottent dans l'eau, & qui sont moins attirées par une partie quelconque de sel que les parties de l'eau ne le sont; toutes ces parties, dis-je, doivent s'éloigner de la partie de sel dont il s'agit, & laisser leur place à l'eau qui en est plus attirée. Newton, *Opt.* p. 363.

XIX. Si des corpuscules qui nagent dans un fluide tendent les uns vers les autres, & que ces corpuscules soient élastiques, ils doivent, après s'être rencontrés, s'éloigner de nouveau, jusqu'à ce qu'ils rencontrent d'autres corpuscules qui les réfléchissent; ce qui doit produire une grande quantité d'impulsions, de répercussions, & pour ainsi dire de conflits entre ces corpuscules. Or, en vertu de la force attractive, la vitesse de ces corps augmentera continuellement; de manière que le mouvement incessant des particules deviendra enfin sensible aux yeux.

De plus, ces mouvements seront différents, & seront plus ou moins sensibles & plus ou moins prompts, selon que les corpuscules attireront l'un l'autre avec plus ou moins de force, & que leur élasticité sera plus ou moins grande.

XX. Si les corpuscules qui s'attirent l'un l'autre viennent à se toucher mutuellement, ils n'auront plus de mouvement, parce qu'ils ne peuvent s'approcher de plus près. S'ils sont placés à une très-petite distance l'un de l'autre, ils se mouvront;

mais si on les place à une distance plus grande, de manière que la force avec laquelle ils s'attirent, l'un l'autre, ne surpasse point la force avec laquelle ils attirent les particules intermédiaires du fluide; alors ils n'auront plus de mouvement.

De ce principe dépend l'explication de tous les phénomènes de la fermentation & de l'ébullition. Voyez FERMENTATION & EBULLITION. (*Did.* de Phys. & de Ch.)

Ainsi, on peut expliquer par-là pourquoi l'huile de vitriol fortement s'échauffe quand on verse un peu d'eau dessus; car les particules salines qui se touchent sont un peu défunies par l'effusion de l'eau; or, comme ces particules s'attirent l'une l'autre plus fortement qu'elles n'attirent les particules de l'eau, & qu'elles ne sont pas également attirées en tous sens, elles doivent nécessairement se mouvoir & fermenter. Voyez VITRIOL. (*Did.* de Ch.)

C'est aussi pour cette raison qu'il se fait une si violente ébullition, lorsqu'on ajoute à ce mélange de la limaille d'acier; car les particules de l'acier sont fort élastiques, & par conséquent sont réfléchies avec beaucoup de force.

On voit aussi pourquoi certains menstrues agissent plus fortement, & dissolvent plus promptement le corps lorsque ces menstrues ont été mêlés avec l'eau. Cela s'observe lorsqu'on verse sur le plomb ou sur quelques autres métaux de l'huile de vitriol, de l'eau-forte, de l'esprit-de-nitre rectifiés; car ces métaux ne se dissolvent qu'après qu'on y aura versé de l'eau.

XXI. Si les corpuscules qui s'attirent mutuellement l'un l'autre n'ont point de force élastique, ils ne seront point réfléchis; mais ils se joindront en petites masses, d'où naîtra la coagulation.

Si la pesanteur des particules ainsi réunies surpasse la pesanteur du fluide, la précipitation s'en suivra. Voyez PRÉCIPITATION. (*Did.* de Ch.)

XXII. Si des corpuscules nagent dans un fluide s'attirent mutuellement, & si la figure de ces corpuscules est telle, que quelques-unes de leurs parties aient plus de force attractive que les autres, & que le contact soit aussi plus fort dans certaines parties que dans d'autres, ces corpuscules s'uniront en prenant de certaines figures; ce qui produira la cristallisation. Voy. CRYSTALLISATION. (*Ibid.*)

Des corpuscules qui sont plongés dans un fluide dont les parties ont un mouvement progressif égal & uniforme, s'attirent mutuellement de la même manière que si le fluide étoit en repos; mais si toutes les parties du fluide ne se meuvent point également, l'attraction des corpuscules ne sera plus la même.

C'est pour cette raison que les sels ne cristallisent point, à moins que l'eau où on les met ne soit froide.

XXIII. Si entre deux particules de fluide se trouve placé un corpuscule dont les deux côtés opposés aient une grande force *attractive*, ce corpuscule forcera les particules du fluide de s'unir & de se conglutiner avec lui; & s'il y a plusieurs corpuscules de cette sorte répandus dans le fluide, ils fixeront toutes les particules du fluide, & en feront un corps solide, & le fluide sera gelé ou changé en glace.

XXIV. Si un corps envoie hors de lui une grande quantité de corpuscules dont l'*attraction* soit très-forte, ces corpuscules, lorsqu'ils approcheront d'un corps fort léger, surmonteront par leur *attraction* la pesanteur de ce corps, & l'attireront à eux; & comme les corpuscules sont en plus grande abondance à de petites distances du corps qu'à de plus grandes, le corps léger sera continuellement tiré vers l'endroit où l'émanation est la plus dense, jusqu'à ce qu'enfin il vienne s'attacher au corps même d'où les émanations partent.

Par-là on peut expliquer plusieurs phénomènes de l'électricité. Voyez ÉLECTRICITÉ. (*Idé. de Phys.*)

Nous avons cru devoir rapporter ici ces différents théorèmes sur l'*attraction*, pour faire voir comment on a tâché d'expliquer, à l'aide de ce principe, plusieurs phénomènes de Chine; nous ne prétendons point cependant garantir aucune de ces explications; & nous avouons même que la plupart d'entr'elles ne paroissent point avoir cette précision & cette clarté qui est nécessaire dans l'exposition des causes des phénomènes de la nature. Il est pourtant permis de croire que l'*attraction* peut avoir beaucoup de part aux effets dont il s'agit; & la manière dont on croit qu'elle peut y satisfaire, est encore moins vague que celle dont on prétend les expliquer dans d'autres systèmes. Quoi qu'il en soit, le parti le plus sage est sans doute de suspendre encore son jugement sur ces choses de détail, jusqu'à ce que nous ayons une connoissance plus parfaite des corps & de leurs propriétés.

Voici donc, pour satisfaire à ce que nous avons promis au commencement de cet article, ce qu'il nous semble qu'on doit penser sur l'*attraction*.

Tous les philosophes conviennent qu'il y a une force qui fait tendre les planètes premières vers le soleil, & les planètes secondaires vers leurs planètes principales. Comme il ne faut point multiplier les principes sans nécessité, & que l'impulsion est le principe le plus connu & le moins contesté du mouvement des corps, il est clair que la première idée d'un philosophe doit être d'attribuer cette force à l'impulsion d'un fluide. C'est à cette idée que les tourbillons de Descartes doivent leur naissance; & elle paroîtroit d'autant plus heureuse, qu'elle expliquoit à-la-fois le mouvement de translation des planètes par le mouvement circulaire de la matière du tourbillon, & leur tendance vers le soleil par la force centrifuge de

cette matière. Mais ce n'est pas assez pour une hypothèse de satisfaire aux phénomènes en gros, pour ainsi dire, & d'une manière vague; les détails en font la pierre de touche, & ces détails ont été la ruine du système cartésien. Voy. PRÉSANTEUR, TOURBILLON, &c.

Il faut donc renoncer aux tourbillons, quelque agréable que le spectacle en paroisse. Il y a plus; on est presque forcé de convenir que les planètes ne se meuvent point en vertu de l'action d'un fluide; car de quelque manière qu'on suppose que ce fluide agisse, on se trouve exposé de tous côtés à des difficultés insurmontables: le seul moyen de s'en tirer, seroit de supposer un fluide qui fût capable de pousser dans un sens, & qui ne résistât pas dans un autre; mais le remède, comme on voit, seroit pire que le mal. On est donc réduit à dire, que la force qui fait tendre les planètes vers le soleil vient d'un principe inconnu, & si l'on veut, d'une *qualité occulte*; pourvu qu'on n'attache point à ce mot d'autre idée que celle qu'il présente naturellement, c'est à-dire d'une cause qui nous est cachée. C'est vraisemblablement le sens qu'Aristote y attachoit, en quoi il a été plus sage que ses sectateurs, & que bien des philosophes modernes.

Nous ne dirons donc point, si l'on veut, que l'*attraction* est une propriété primordiale de la matière, mais nous nous garderons bien aussi d'affirmer, que l'impulsion soit le principe nécessaire des mouvements des planètes. Nous avouons même que si nous étions forcés de prendre un parti, nous pancherions bien plutôt pour le premier que pour le second; puisqu'il n'a pas encore été possible d'expliquer par le principe de l'impulsion, les phénomènes célestes; & que l'impossibilité même de les expliquer par ce principe, est appuyée sur des preuves très-fortes, pour ne pas dire sur des démonstrations. Si M. Newton paroît indécis, en quelques endroits de ses ouvrages, sur la nature de la force *attractive*; s'il avoue même qu'elle peut venir d'une impulsion, il y a lieu de croire que c'étoit une espèce de tribut qu'il vouloit bien payer au préjugé, ou, si l'on veut, à l'opinion générale de son siècle; & on peut croire qu'il avoit pour l'autre sentiment une sorte de prédilection; puisqu'il a souffert que M. Côtes son disciple adoptât ce sentiment sans aucune réserve, dans la préface qu'il a mise à la tête de la seconde édition des *Principes*; préface faite sous les yeux de l'auteur, & qu'il paroît avoir approuvée. D'ailleurs M. Newton admet entre les corps célestes une *attraction* réciproque; & cette opinion semble supposer que l'*attraction* est une vertu inhérente aux corps. Quoi qu'il en soit, la force *attractive*, selon M. Newton, décroît en raison inverse des carrés des distances: ce grand philosophe a expliqué par ce seul principe une grande partie des phénomènes célestes; & tous ceux qu'on a tenté d'expliquer depuis par ce même principe, l'ont été

avec une facilité & une exactitude qui tiennent du prodige. Le seul mouvement des aphides de la lune a paru durant quelque tems se refuser à ce système ; mais ce point a été enfin décidé , & le système Newtonien en est sorti à son honneur. Voyez L. V. n. n. Toutes les autres inégalités du mouvement de la lune, qui, comme l'on fait, sont très-considérables & en grand nombre, s'expliquent très-heureusement dans le système de l'attraction. Je m'en suis aussi assuré par le calcul, & j'ai publié mon travail.

Tous les phénomènes nous démontrent donc qu'il y a une force qui fait tendre les planètes les unes vers les autres. Ainsi, nous ne pouvons nous dispenser de l'admettre ; & quand nous serions forcés de la reconnoître comme primordiale & inhérente à la matière, j'ôte dire que la difficulté de concevoir une pareille cause seroit un argument bien foible contre son existence. Personne ne doute qu'un corps qui en rencontre un autre ne lui communique du mouvement : mais avons-nous une idée de la vertu par laquelle se fait cette communication ? Les philosophes ont avec le vulgaire bien plus de ressemblance qu'ils ne s'imaginent. Le peuple ne s'tonne point de voir une pierre tomber, parce qu'il l'a toujours vu ; de même les philosophes, parce qu'ils ont vu dès l'enfance les effets de l'impulsion, n'ont aucune inquiétude sur la cause qui les produit. Cependant si tous les corps qui en rencontrent une autre s'arrêtoient sans leur communiquer du mouvement, un philosophe qui verroit, pour la première fois, un corps en pousser un autre, seroit aussi surpris qu'un homme qui verroit un corps pesant se soutenir en l'air sans retomber. Quand nous saurions en quoi consiste l'impenétrabilité des corps, nous n'en serions peut-être guère plus éclairés sur la nature de la force impulsive. Nous voyons seulement, qu'en conséquence de cette impenétrabilité, le choc d'un corps contre un autre doit être suivi de quelque changement, ou dans l'état des deux corps, ou dans l'état de l'un des deux : mais nous ignorons, & apparemment nous ignorerons toujours, par quelle vertu ce changement s'exécute, & pourquoi, par exemple, un corps qui en choque une autre ne reste pas toujours en repos après le choc, sans communiquer une partie de son mouvement au corps choqué. Nous croyons que l'attraction répugne à l'idée que nous avons de la matière : mais approfondissons cette idée, nous serons effrayés de voir combien peu elle est distincte, & combien nous devons être réservés dans les conséquences que nous en tirons. L'univers est caché pour nous derrière une épée de voile, à-travers lequel nous entrevoyons confusément quelques points. Si ce voile se déchiroit tout-à-coup, peut-être serions-nous bien surpris de ce qui se passe derrière. D'ailleurs la prétendue incompréhensibilité de l'attraction avec la matière, n'a plus lieu dès qu'on admet un être intelligent & ordonnateur de tout, à qui il a

été aussi libre de vouloir que les corps agissent les uns sur les autres à distance, que dans le contact.

Mais autant que nous devons être portés à croire l'existence de la force d'attraction dans les corps célestes, autant, ce me semble, nous devons être réservés à aller plus avant. 1.^o Nous ne dirons point que l'attraction est une propriété *essentielle* de la matière, c'est beaucoup de la regarder comme une propriété *primordiale* ; & il y a une grande différence entre une propriété *primordiale* & une propriété *essentielle*. L'impenétrabilité, la divisibilité, la mobilité, sont du premier genre ; la vertu impulsive est du second. Dès que nous concevons un corps, nous le concevons nécessairement divisible, étendu, impenétrable ; mais nous ne concevons pas nécessairement qu'il mette en mouvement un autre corps. 2.^o Si on croit que l'attraction soit une propriété inhérente à la matière, on pourroit en conclure que la loi du carré s'observe dans toutes ses parties. Peut-être néanmoins seroit-il plus sage de n'admettre l'attraction qu'entre les parties des planètes, sans prendre notre parti sur la nature ni sur la cause de cette force, jusqu'à ce que de nouveaux phénomènes nous éclaircissent sur ce sujet. Mais du moins faut-il bien nous garder d'assurer que quelques parties de la matière s'attirent suivant d'autres loix que celles du carré. Cette proposition ne paroît point suffisamment démontrée. Les faits sont l'unique boussole qui doit nous guider. Ici, & je ne crois pas que nous en ayons encore un assez grand nombre pour nous élever à une assertion si hardie : on peut en juger par les différents théorèmes que nous venons de rapporter d'après M. Keil & d'autres philosophes. Le système du monde est en droit de nous faire soupçonner que les mouvements des corps n'ont peut-être pas l'impulsion seule pour cause ; que ce soupçon nous rende sages, & ne nous pressions pas de conclure que l'attraction soit un principe universel, jusqu'à ce que nous y soyons forcés par les phénomènes. Nous aimons, il est vrai, à généraliser nos découvertes ; l'analogie nous plaît, parce qu'elle flatte notre vanité & soulage notre paresse ; mais la nature n'est pas obligée de se conformer à nos idées. Nous voyons si peu avant dans les ouvrages, & nous les voyons par de si petites parties, que les principaux ressorts nous en échappent. Tâchons de bien apercevoir ce qui est autour de nous ; & si nous voulons nous élever plus haut, que ce soit avec beaucoup de circonspection ; autrement nous n'en verrions que plus mal, en croyant voir plus loin ; les objets éloignés seroient toujours confus, & ceux qui étoient à nos pieds nous échapperoient.

Après ces réflexions, je crois qu'on pourroit se dispenser de prendre aucun parti sur la dispute qui a partagé deux académiciens célèbres, savoir si la loi d'attraction doit nécessairement être comme une puissance de la distance, ou si elle peut être en général comme une fonction de cette même

distance; (*Voyez* PUISSANCE & FONCTION) question purement métaphysique, & sur laquelle il est peut-être bien hardi de prononcer, après ce que nous venons de dire; aussi n'avons-nous pas cette prétention, sur-tout dans un ouvrage de la nature de celui-ci. Nous croyons cependant que si on regarde l'attraction comme une propriété de la matière, ou une loi primitive de la nature, il est assez naturel de ne laire dépendre cette attraction que de la seule distance; & en ce cas, sa loi ne pourra être représentée que par une puissance; car toute autre fonction contiendrait un paramètre ou quantité constante qui ne dépendroit point de la distance, & qui paroitroit se trouver là sans aucune raison suffisante. Il est du moins certain qu'une loi exprimée par une telle fonction, seroit moins simple qu'une loi exprimée par une seule puissance.

Nous ne voyons pas d'ailleurs quel avantage il y auroit à exprimer l'attraction par une fonction. On prétend qu'on pourroit expliquer par-là, comment l'attraction à de grandes distances est en raison inverse du quarré, & suit une autre loi à de petites distances; mais il n'est pas encore bien certain que cette loi d'attraction à de petites distances, soit aussi générale qu'on veut le supposer. D'ailleurs, si on veut faire de cette fonction une loi générale qui devienne fort différente du quarré à de très-petites distances, & qui puisse servir à rendre raison des attractions qu'on observe ou qu'on suppose dans les corps terrestres; il nous paroit difficile d'expliquer dans cette hypothèse comment la pesanteur des corps qui sont immédiatement contigus à la terre, est à la pesanteur de la lune à-peu-près en raison inverse du quarré de la distance. Ajoutons qu'on devroit être fort circonspect à changer la loi du quarré des distances, quand même, ce qui n'est pas encore arrivé, on trouveroit quelque phénomène céleste, pour l'explication duquel cette loi du quarré ne suffiroit pas. Les différens points du système du monde, au moins ceux que nous avons examinés jusqu'ici, s'accordent avec la loi du quarré des distances: cependant comme cet accord n'est qu'à-peu-près, il est clair qu'ils s'accorderoient de même avec une loi qui seroit un peu différente de celle du quarré des distances: mais on sent bien qu'il seroit ridicule d'admettre une pareille loi par ce seul motif.

Reste donc à savoir si un seul phénomène qui ne s'accorderoit point avec la loi du quarré, seroit une raison suffisante pour nous obliger à changer cette loi dans tous les autres; & s'il ne seroit pas plus sage d'attribuer ce phénomène à quelque cause ou loi particulière. M. Newton a reconnu lui-même d'autres forces que celles-là, puisqu'il paroit supposer que la force magnétique de la terre agit sur la lune, & on sait combien cette force est différente de la force générale d'attraction, tant par son intensité, que par les loix suivant lesquelles elle agit.

M. de Maupertuis, un des plus célèbres partisans

du Newtonianisme, a donné dans son discours sur les figures des astres, une idée du système de l'attraction, & des réflexions sur ce système, auxquelles nous croyons devoir renvoyer nos lecteurs, comme au meilleur précis que nous connoissions de tout ce qu'on peut dire sur cette matière. Le même auteur observe dans les *Mém. acad. 1734*, que M. de Roberval, de Fermat & Pascal ont cru long-tems avant M. Newton, que la pesanteur étoit une vertu attractive & inhérente aux corps, en quoi on voit qu'ils se font expliqués d'une manière bien plus choquante pour les Cartésiens, que M. Newton ne l'a fait. Nous ajouterons que M. Kook avoit eu la même idée, & avoit prédit qu'on expliqueroit un jour très-heureusement par ce principe, les mouvements des planètes. Ces réflexions, en augmentant le nombre des partisans de M. Newton, ne diminuoient rien de sa gloire, puisqu'étant le premier qui ait fait voir l'usage du principe, il en est proprement l'auteur & le créateur. (O)

ATTRACTION. Histoire de la découverte de la loi de l'attraction. Quoique l'attraction universelle se manifeste dans toute la nature, & qu'elle influé dans tous les phénomènes de la Physique; c'est sur-tout dans le ciel qu'elle est évidente & essentielle.

La loi de l'attraction a été découverte par Newton; mais l'idée de cette force générale est très-ancienne.

Anaxagore, Démocrite, Epicure, admettoient déjà cette tendance de la matière vers les centres communs, soit sur la terre, soit ailleurs; Plutarque en parle d'une manière bien claire dans l'ouvrage sur la cessation des oracles (pag. 471, édition de Francfort, 1600); il y explique comment chaque monde a son centre particulier, ses terres, ses mers, & la force nécessaire pour assembler les corps, & les retenir autour du centre.

Copernic avoit la même idée de l'attraction générale; car il attribuoit la rondcur des corps célestes à la tendance qu'ont leurs différentes parties à se réunir (*de Revolution. c. 9*): d'où il suivroit que cette tendance avoit lieu dans chaque planète aussi bien que sur la terre. Tycho lui-même admettoit une force centrale dans le soleil pour retenir les planètes dans leurs orbites autour de lui, quoique cette attraction fût difficile à concilier avec son système. Kepler, génie plus vaste & plus hardi que tous ceux qui l'avoient précédé, porta ses idées plus loin; il sentit que l'attraction étoit générale & réciproque, & que l'attraction du soleil devoit s'étendre aussi à la terre (*de Stella Maris, 1609, épist. Alton. Cop. 1618, pag. 555, hist. des Math. par M. Montucla, 1758, tom. II, pag. 213 & 527, 538*). Dans la préface de ce livre fameux, où Kepler démontra le premier que les orbites des planètes n'étoient point circulaires, il dit précisément que, si la lune & la terre n'étoient pas en mouvement, elles s'approcheroient

procheroient l'une de l'autre, & se rémoroient à leur centre de gravité commun; il dit ailleurs que l'action du soleil produit les inégalités de la lune, que l'action de la lune produit le flux & reflux de la mer, que le soleil attire les planètes, & en est attiré par une espèce de magnétisme.

Le Traité de l'aimant, publié par Gilbert, lui faisoit comparer à cette force de l'aimant celle des planètes entr'elles.

Galilée, Bacon, Fermat, Roberval & le docteur Hook, en parlèrent d'une manière assez positive; celui-ci, disoit sur-tout ces paroles remarquables: « que les forces attractives sont d'autant plus puissantes dans leurs opérations, que le corps sur lequel elles agissent est plus près de leur centre. Pour ce qui est de la proportion, » suivant laquelle ces forces diminuent à mesure que la distance augmente, j'avoue que je ne l'ai pas encore vérifiée.... Je donne cette ouverture à ceux qui ont assez de loisir & de connoissances pour cette recherche. » Cette loi, qu'il proposoit de trouver, fut précisément celle que chercha Newton. Pemberton nous raconte que les premières idées de Newton sur cette matière lui vinrent en 1666; il se promenoit seul dans un jardin, méditant sur la pesanteur & sur ses propriétés: cette force, disoit-il, ne diminue pas insensiblement, quoiqu'on s'élève au sommet des plus hautes montagnes; il est donc naturel d'en conclure que cette puissance doit s'étendre plus loin. Pourquoi ne s'étendrait-elle pas jusqu'à la lune? Mais si cela est, il faut que cette pesanteur influe sur le mouvement de la lune; peut-être sert-elle à retenir la lune dans son orbite? & quoique la force de la gravité ne soit pas sensiblement affoiblie par un petit changement de distance, tel que nous pouvons l'éprouver ici-bas, il est très-possible que dans l'éloignement où le trouve la lune cette force soit fort diminuée. Pour parvenir à estimer quelle pouvoit être la quantité de cette diminution, Newton songea que si la lune étoit retenue dans son orbite par la force de la gravité, il n'y avoit pas de doute que les planètes principales ne tournassent autour du soleil, en vertu de la même puissance. En comparant les périodes des différentes planètes avec leur distance au soleil, il trouva que si une puissance semblable à la gravité les retenoit dans leurs orbites, sa force devoit diminuer en raison inverse du carré de la distance: nous en donnâmes le calcul ci-après. Il supposâ donc que le pouvoir de la gravité s'étendrait jusqu'à la lune, & diminuoit dans le même rapport, & il calcula si cette force seroit suffisante pour retenir la lune dans son orbite; il faisoit ces calculs dans un temps où il n'avoit point sous la main les livres qui lui auroient été nécessaires, & il supposoit, suivant l'estime commune employée par les géographes & les marins avant la mesure faite par Picard, que 60 milles d'Angleterre faisoient un degré de latitude sur la

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

terre; mais comme cette supposition étoit très-défectueuse (puisque chaque degré doit contenir 69 $\frac{1}{2}$ milles), le calcul ne répondit point à son attente; il crut alors qu'il y avoit au moins quelque autre chose jointe à la pesanteur, qui agit sur la lune, & il abandonna ses recherches sur cette matière. Quelques années après, une lettre du docteur Hook lui fit rechercher quelle étoit la vraie courbe décrite par un corps grave qui tombe, & qui est entraîné par le mouvement de la terre sur son axe; ce fut une occasion pour Newton de reprendre ses premières idées sur la pesanteur de la lune. Picard venoit de mesurer en France le degré de la terre; & en se servant de ces mesures Newton vit que la lune étoit retenue dans son orbite par le seul pouvoir de la gravité; d'où il suivoit que cette gravité diminuoit en s'éloignant du centre de la terre, de la même manière que notre auteur l'avoit d'abord conjecturé. D'après ce principe, Newton trouva que la ligne décrite par la chute d'un corps étoit une ellipse, dont le centre de la terre occupoit un foyer: or les planètes principales décrivent aussi des ellipses autour du soleil; il eut donc la satisfaction de voir que cette solution, qu'il s'oit entreprise d'abord par pure curiosité, pourroit s'appliquer aux plus grandes recherches. En conséquence, il composa une douzaine de propositions, relatives au mouvement des planètes principales autour du soleil. Plusieurs années après, le docteur Halley étant allé voir Newton à Cambridge, l'engagea dans la conservation à reprendre ses méditations à ce sujet, & fut l'occasion du grand ouvrage des *Principes* qui parut en 1687, & dont la dernière édition a paru en 1726 (*a View of Sir Isaac Newton's philosophy, London, 1728, in-4.^o Préface.*)

La loi de Kepler, suivant laquelle les carrés des tems sont, comme les cubes, des distances, suffisoit pour reconnoître que l'attraction du soleil, qui retenoit des planètes sous cette loi, étoit en raison inverse du carré de la distance. Soient deux orbites circulaires & concentriques PB , TV (fig. *Astron.* 171), dans lesquelles tournent deux planètes, dont les tems périodiques sont dans l'une t , & dans l'autre l'unité; par exemple, l'année: & la terre; supposons les arcs PB & TV infiniment petits & semblables, c'est-à-dire, compris entre les rayons STP , SVB ; ce arc PB & TV seroient parcourus en tems égaux, si les révolutions des deux planètes étoient égales; mais la planète supérieure P ayant une révolution plus lente que la terre, ne décrira qu'un arc PE , tandis que la terre décrira l'arc TV , alors PD sera l'effet, la mesure & l'expression de la force centrale, que le soleil exerce sur cette planète, tandis que TR est l'effet de la force centrale qu'il exerce sur la terre T ; & nous aurons à chercher que le rapport des petits sinus versés PD & TR . Suivant la propriété connue des petits arcs, on a cette proportion $PD : PC :: PE^3 : PB^3$;

Bb

mais la planète supérieure auroit parcoureu PB , si la durée de la révolution, que j'appelle t , étoit égale à l'unité ou à la durée de la révolution de la terre; donc $PE : PB :: 1 : t$; ainsi, $PD :$

$$PC :: 1 : t; \text{ donc } PD = \frac{PC}{t}. \text{ Or } PC : TR ::$$

$$PS : TS :: r : 1, \text{ puisque les arcs } PB \text{ \& } TV \text{ sont semblables; donc } PC = r \cdot TR; \text{ \& puisque}$$

$$PD = \frac{PC}{t}, \text{ on a aussi } PD = \frac{r \cdot TR}{t}; \text{ donc } \frac{PD}{TR} =$$

$$\frac{r}{t}. \text{ Mais suivant la loi Kepler } t^2 :: 1 : r^2; \text{ \& } 1 :$$

$$\text{ou } r^2 :: t^2; \text{ donc } \frac{PD}{TR} \left(= \frac{r}{t} \right) \text{ fera égale à } \frac{r}{r^2}$$

$$\text{ou } \frac{1}{r}; \text{ donc } PD : TR :: 1 : r; \text{ c'est-à-dire,}$$

que l'effet de la force centrale est en raison inverse du carré de la distance.

Il étoit donc facile à Newton de reconnaître cette loi de l'attraction, par le moyen de la loi de Kepler.

Mais il ne s'en tint pas à cette belle découverte; il en fit des applications immenses au moyen de la Géométrie des infimement petits, qu'il venoit lui-même de découvrir; les inégalités de la lune, le flux & le reflux de la mer, la figure de la terre, la précession des équinoxes, le mouvement des apsidés, &c. tout fut soumis au calcul dans son livre des *Principes*; les applications qu'en ont fait successivement les plus grands géomètres, se trouvent dans les ouvrages dont nous avons donné le catalogue au mot ASTRONOMIE. (D. L.)

Attraction des montagnes. Il est certain, d'après le principe de l'attraction mutuelle de toutes les parties de la terre, qu'il peut y avoir des montagnes dont la masse soit assez considérable pour que leur attraction soit sensible. En effet, supposons pour un moment que la terre soit un globe d'une densité uniforme, & dont le rayon ait 1500 lieues, & imaginons sur quelque endroit de la surface du globe une montagne de la même densité que le globe, laquelle soit faite en demi-sphère & ait une lieue de hauteur; il est aisé de prouver qu'un poids placé au bas de cette montagne sera attiré dans le sens horizontal par la montagne, avec une force qui sera la 3000^e partie de la pesanteur, de manière qu'un pendule ou fil à plomb placé au bas de cette montagne, doit s'écarter d'environ une minute de la situation verticale; le calcul n'en est pas difficile à faire.

Il peut donc arriver que quand on observe la hauteur d'un astre au pied d'une fort grosse montagne, le fil à plomb, dont la direction sert à faire connaître la hauteur de l'astre, ne soit point verticale. Mais comment s'assurer qu'un fil à plomb n'est pas exactement vertical, puisque la direction même de ce fil est le seul moyen qu'on

puisse employer pour déterminer la situation verticale? Voici le moyen de résoudre cette difficulté.

Imaginons une étoile au nord de la montagne, & que l'observateur soit placé au sud. Si l'attraction de la montagne agit sensiblement sur le fil à plomb, il sera écarté de la situation verticale vers le nord, & par conséquent le zénith apparent reculera, pour ainsi dire, d'autant vers le sud; ainsi, la distance de l'étoile observée au zénith, doit être plus grande que s'il n'y avoit point d'attraction.

Donc, si après avoir observé au pied de la montagne la distance de cette étoile au zénith, on se transporte loin de la montagne sur le même parallèle, & sans changer de latitude, à l'est ou à l'ouest, en sorte que l'attraction ne puisse plus avoir d'effet, la distance de l'étoile observée dans cette nouvelle station doit être moindre que la première, au cas que l'attraction de la montagne produise un effet sensible. Mais si le fil à plomb au sud de la montagne est écarté vers le nord, ce même fil à plomb au nord de la montagne sera écarté vers le sud; ainsi le zénith, qui dans le premier cas étoit pour ainsi dire reculé en arrière vers le sud, sera, dans le second cas, rapproché en avant vers le nord; donc dans le second cas la distance de l'étoile au zénith sera moindre que s'il n'y avoit point d'attraction, au lieu que dans le premier cas elle étoit plus grande. Prenant donc la différence de ces deux distances & la divisant par la moitié, on aura la quantité dont le pendule est écarté de la situation verticale par l'attraction de la montagne.

On peut voir toute cette théorie fort clairement exposée avec plusieurs remarques qui y ont rapport, dans un excellent mémoire de Bouguer, imprimé en 1749, à la fin de son livre de la figure de la terre. Il donne dans ce mémoire le détail des observations qu'il fit, conjointement avec la Condamine, au sud & au nord, d'une grosse montagne du Pérou appelée *Chimborazo*; il résulte de ces observations, que l'attraction de cette grosse montagne écarte le fil à plomb d'environ 7^e & demi de la situation verticale.

Au reste, M. Bouguer fait à cette occasion une remarque judicieuse, que la plus grosse montagne pourroit avoir très-peu de densité par rapport au globe terrestre, tant par la nature de la matière qu'elle peut contenir, que par les vides qui peuvent s'y rencontrer, &c. qu'ainsi cent observations où on ne trouveroit point d'attraction sensible, ne prouveroient rien contre le système newtonien; au lieu qu'une seule, qui lui est favorable, comme celle de *Chimborazo*, mérite de la part des philosophes la plus grande attention. (D.)

Depuis les observations de Bouguer, on a reconnu dans plusieurs endroits cet effet de l'attraction des montagnes; il se remarque sur-tout dans les opérations par lesquelles on détermine la gran-

deux des degrés de la terre, parce qu'on y fait usage du fil-à-plomb, pour mesurer avec une grande précision la distance des étoiles au zénit.

Le P. Boskovich ayant trouvé le degré du méridien en Italie de 56979 toises, tandis qu'il auroit dû être de 57110, en le réglant sur ceux du nord & du Pérou, a pensé que les termes de la mesure étant placés l'un au nord & l'autre au midi de la grande chaîne des montagnes de l'Appennin, les observations faites par le moyen du fil-à-plomb auroient pu être troublées par l'attraction de cette masse de montagnes, & donner un moindre nombre de toises pour chaque degré.

L'abbé de la Caille pensoit aussi qu'à Perpignan, lors des observations faites pour la méridienne de France, le voisinage des Pyrénées avoit pu faire dévier le fil-à-plomb vers le sud, faire paroltre le zénit plus au nord qu'il ne l'est réellement, & rendre plus petits les arcs compris entre Perpignan & les autres villes de la France; aussi voyons-nous qu'il abandonne, pour ainsi dire, les observations faites à Perpignan, pour conclure la longueur du degré, dont le milieu passe à 45° de latitude 57028 toises. *Mém. Acad. 1758, page 244.*

Le P. Beccaria a trouvé en Piémont une différence encore plus grande; entre Turin & Andra, l'arc mesuré s'est trouvé de 16' plus petit qu'en France sur une égale longueur, & le degré qu'on en auroit voulu conclure auroit été trop grand de 900 toises; mais Andra est situé sur le penchant de Monte-Barone, qui va toujours en s'élevant sur une longueur de plus de sept lieues jusqu'au sommet de Monte-Rosa, qui a 1340' de hauteur & qui est par conséquent une des plus hautes montagnes de l'Europe. *Gradus Taurinensis, 1774.*

En Angleterre, M. Cavendish croit que le degré qui a été mesuré dans l'Amérique septentrionale, pourroit bien avoir été diminué de 60 ou 100 toises par le défaut d'attraction du côté de la mer; & il pense que les degrés mesurés en Italie & au cap de Bonne-Espérance pourroient bien être sensiblement affectés de la même cause. *Philos. Trans. 1763, pag. 318.* Le P. Boskovich estime qu'on pourroit s'en assurer en faisant des opérations à S. Malo, lorsque la mer est très-basse; & lorsqu'en suite s'élevant de 45 pieds par l'effet des grandes marées, son attraction devient considérablement plus forte.

Enfin nous avons eu depuis quelques années une confirmation bien positive de cette attraction des montagnes; M. Maskelyne, astronome royal d'Angleterre, étant allé exprès en Ecoffe pour faire des observations au nord & au sud de la montagne de Schellallien dans la province de Perth, & il trouva une déviation de près de six secondes. *Philosophical Transactions, 1775, Journal de Physique, mai 1776. (D. L.)*

ATTRACTIONNAIRE, adj. pris subst., est

le nom que l'on donne aux partisans de l'attraction. Voyez ATTRACTION. (O)

ATTRITION, f. f. Ce mot vient du verbe *atterere*, froter, user, & se forme de la préposition *ad*, à, unie au verbe *tero*, j'use. Il signifie un frottement réciproque de deux corps, au moyen duquel se détachent les particules brisées de leurs surfaces. Voyez MOUVEMENT & FROTTEMENT.

C'est par ce mouvement que l'on aiguise & que l'on polit. Voyez aux articles CHALEUR, LUMIÈRE, FEU, ELECTRICITÉ, les effets de l'attrition.

M. Gray a trouvé qu'une plume frottée avec les doigts, acquit par cela seul un tel degré d'électricité, qu'un doigt, auprès duquel on la tenoit, devenoit pour elle un aimant; qu'un cheveu qu'il avoit trois fois ou quatre fois ainsi frotté, voloit à ses doigts, n'en étant éloigné que d'un demi-pouce; qu'un poil & des fils de soie étoient par ce même moyen rendus électriques. L'expérience fait voir la même chose sur des rubans de diverses couleurs & de quelques pieds de long, la main les attire quand ils sont frottés: imprégnés de l'air humide, ils perdent leur électricité; mais le feu la leur redonne.

Le même philosophe dit que les étoffes de laine, le papier, le cuir, les coupeaux, le parchemin, sont rendus électriques par l'attrition.

Il y a même quelques-uns de ces corps que l'attrition seule rend lumineux. Voyez PHOSPHORE. (*Diâ. de Phys.*)

ATTRITION se prend aussi quelquefois pour le frottement de deux corps qui, sans user leurs surfaces, ne font que mettre en mouvement les fluides qu'ils contiennent: ainsi, on dit que les sensations de la faim, de la douleur, du plaisir, sont causées par l'attrition des organes qui sont formés pour ces effets. (O)

A V A

AVANT-MAIN, terme de Paumier; prendre une balle d'avant-main, c'est la chasser devant soi avec la raquette, après l'avoir prise du côté de la main dont on tient la raquette. En prenant une balle d'avant-main, il faut avoir le bras tendu & le raccourcir un peu en chassant la balle.

AVANTAGE, f. m. en termes de jeu: on dit qu'un joueur a de l'avantage, lorsqu'il y a plus à parier pour son gain que pour sa perte; c'est-à-dire, lorsque son espérance surpasse la mise. Pour éclaircir cette définition par un exemple très-simple, je suppose qu'un joueur A parie contre un autre B, d'amener deux du premier coup avec un dez, & que la mise de chaque joueur soit d'un écu: il est évident que le joueur B a un grand avantage dans ce pari; car le dez ayant six faces

Bb ij

peut amener six chiffres différents, dont il n'y en a qu'un qui fasse gagner le joueur *A* : ainsi, la mise totale étant deux écus, il y a cinq contre un à parier que le joueur *B* gagnera. Donc l'espérance de ce joueur est égale à $\frac{1}{6}$ de la mise totale, c'est-à-dire, à $\frac{1}{6}$ d'écu, puisque la mise totale est deux écus. Or, $\frac{1}{6}$ d'écu valent un écu & deux tiers d'écu : donc, puisque la mise du joueur *B* est un écu, son avantage, c'est-à-dire, l'excès de ce qu'il espère gagner sur la somme qu'il met au jeu, est $\frac{1}{6}$ d'écu ; de façon que si le joueur *A*, après avoir fait le pari, vouloit renoncer au jeu, & n'osoit tenter la fortune, il faudroit qu'il rendit au joueur *B* son écu, & outre cela deux tiers, c'est-à-dire, $\frac{1}{6}$ d'écu. Voyez *PARI, JEU, DEZ, PROBABILITÉ, &c. (O)*

AVANTAGE, en termes de jeu, se dit encore d'un moyen d'égaliser la partie entre deux joueurs de force inégale. On donne la main au piquet, le pion & le trait aux échecs, le dez au tréfiler, &c.

Le même terme se prend dans un autre sens à la *Poëme*. Lorsque les deux joueurs ont trente sous les deux, au lieu de dire de celui qui gagne le quinze suivant, qu'il a quarante-cinq, on dit qu'il a l'avantage.

AUBE, f. f. (Hydr.) veut dire la même chose qu'*aile* ou *aïlleron*. Voyez *AILE*. Le mot *aube* étant le plus usité, j'ai renvoyé ici ce que j'avois à dire sur ce sujet.

L. Soit (pl. Hydr. fig. 7.) A H L K une roue plongée dans un fluide *X Y T Z* en mouvement, & garnie d'aubes *A B, D E, K S, &c.*, que le fluide frappe successivement. Il est clair que le fluide, en frappant la partie *V E* d'une aube quelconque *D E*, perd une partie de sa vitesse, & que s'il avoit la liberté de s'échapper par les côtés, il n'atteindroit pas la partie *A O* de l'aube antécédente ; mais étant retenu par le fluide environnant, il a encore de la vitesse dans l'espace *V A O E*. Je suppose que cette vitesse soit la même, du moins à-peu-près, que celle avec laquelle le plan *A O* tend à presser le fluide antécédent : par-là l'impulsion du fluide contre *V E* ne le fait point sentir contre la partie analogue *A O* de l'aube antécédente ; ce qui simplifie la question, & ce qui ne peut pas s'écarter beaucoup de la vérité dans la pratique.

II. La roue, en tournant, communique le mouvement, ou à des meules de moulins, ou à des pistons de pompes, &c. Je représente en général la résistance qu'elle est obligée de combattre ainsi continuellement, par un poids *Q* attaché à l'extrémité d'une corde *Q g h* qui passe sur la poulie de renvoi *g*, & qui s'enveloppe autour du cylindre ou tambour *f b d*. Dans les premiers instans du choc de l'eau, le mouvement du poids *Q* s'accélère ; mais, après trois ou quatre tours, il parvient à l'uniformité, & demeure ensuite toujours en cet

état. Alors l'impulsion du fluide est à chaque instant en équilibre avec le poids *Q* & avec la résistance du frottement. On voit donc que la vitesse uniforme du poids *Q* étant représentée par *v*, le produit *Q v* représente l'effet réel de la machine, & l'abstraction faite des résistances étrangères qui absorbent continuellement une partie de la force mouvante.

*III. On a agité long-temps la question si une aube a plus de force pour tourner quand elle est frappée perpendiculairement, que quand elle est frappée obliquement. Pour savoir à quoi nous en tenir sur ce point, supposons que l'aube *A B* soit placée dans la verticale, & que par conséquent l'aube suivante *D E* soit inclinée au courant. Ayant pris sur *A B* les deux points infiniment voisins *R, r*, soient menées les horizontales *R M, r m* qui déterminent sur *D E* l'élément *M m* correspondant à *R r*. Comparons entre eux le moment de l'impulsion que recevront l'élément *R r* s'il étoit frappé librement, ou que l'aube *D E* par laquelle il est couvert fût enlevée, & le moment de l'impulsion qui résulte perpendiculairement contre l'élément *M m*. Le choc contre chaque point de *R r* est plus grand que le choc contre chaque point de *M m*. Mais, d'un autre côté, *R r < M m*, & le bras de levier *C R*, de *R r*, est plus petit que le bras de levier *C M*, de *M m*. L'évaluation exacte des deux moments dont il s'agit, peut seule décider lequel des deux est le plus grand.*

*IV. Supposons que $M x$ représente l'espace parcouru en un instant par le fluide, & que $R t, M y$ représentent les espaces parcourus durant le même instant, par les points *R* & *M* des aubes *A B, D E*. En prenant *C M* pour sinus total, & nommant *V* la vitesse $M x$ du fluide, *v* la vitesse *R t* du point *R*, l'impulsion contre *R r* sera représentée (Voyez au mot *PERCUSSION la Théorie de la Percussion des Fluides*) par $R r \times (V - v)^2 \times \overline{C M}$; & le moment de cette impulsion, relativement au centre *C* de la roue, sera représenté par $R r \times \overline{C M} \times (V - v)^2$.*

*$\times \overline{C M}^2 \times C R$. Pour connaître le moment de l'impulsion contre *M m*, je décompose la vitesse $M x$ du fluide en deux autres *M y, M t*, dont la première est la même que celle du point *M*, & ne produit par conséquent aucun effet sur l'élément *M m*, la seconde est la seule à laquelle il faille avoir égard. En vertu de cette dernière vitesse, il résulte perpendiculairement contre *M m**

*une impulsion représentée par $M m \times \overline{M t} \times (\sin. D M t)^2$, & dont le moment, par rapport au centre *C*, est par conséquent $M m \times \overline{M t} \times (\sin. D M t) \times C M$. Or, puisque *M y* est perpendiculaire à *C M*, & que *x t n* est parallèle à *M y*, il est clair que le triangle $M n x$ est rectangle en *n*, & semblable au triangle *M R C*. On a donc*

$$CM : CR :: Mx : xn = Mx \times \frac{CR}{CM} = Vx$$

$$\frac{CR}{CM}; \& \text{ comme } x = My = R \times \frac{CM}{CR} = u$$

$$\times \frac{CM}{CR} : \text{ on aura } nx = nx - x = V \times \frac{CR}{CM}$$

$$- u \times \frac{CM}{CR} = \left(V - u \times \frac{CM}{CR} \right) \times \frac{CR}{CM}$$

$$\text{Donc à cause de fin, } DMx = n \times \frac{CM}{Mx}$$

$$(CM \text{ étant toujours le fin. tot.}) \text{ le moment } Mm$$

$$\times Mx \times (\sin. DMx) \times CM \text{ deviendra } Mm$$

$$\times \left(V - u \times \frac{CM}{CR} \right) \times CR \times CM. \text{ Ainsi,}$$

$$\text{le moment de l'impulsion contre } Rr, \text{ est au mo-}$$

$$\text{ment de l'impulsion contre } Mm, \text{ comme } Rr \times$$

$$(V - u) \times \frac{CM}{CR} \times CR, \text{ est à } Mm \times$$

$$\left(V - u \times \frac{CM}{CR} \right) \times CR \times CM; \text{ ou comme}$$

$$Rr \times (V - u) \times \frac{CM}{CR} \times CM, \text{ est à } Mm \times$$

$$\left(V - u \times \frac{CM}{CR} \right) \times CR. \text{ Or à cause des pa-}$$

$$\text{ralèles } MR, m r, \text{ on a } Rr : Mm :: CR : CM,$$

$$\& \text{ par conséquent } Rr \times CM = Mm \times CR.$$

$$\text{Donc le premier moment est au second, comme}$$

$$(V - u) \text{ est à } \left(V - u \times \frac{CM}{CR} \right).$$

$$\text{Mais on a}$$

$$\text{toujours } \frac{CM}{CR} > 1, \& \text{ par conséquent } V - u >$$

$$V - u \times \frac{CM}{CR}. \text{ Donc enfin le premier moment}$$

est toujours plus grand que le second. Le même raisonnement ayant lieu pour tous les autres éléments correspondants dont les parties finies AO, VE des aubes AB, DE sont composées, on doit conclure que le moment de l'impulsion de l'eau contre l'aube verticale est plus grand que le moment de l'impulsion contre l'aube inclinée au courant, & que par conséquent la première aube est à cet égard plus avantageuse que la seconde.

V. Lorsque les aubes sont en repos au moment qu'elles sont choquées par le fluide, ou $u = 0$; & le moment de l'impulsion contre chaque élément Rr devient égal au moment de l'impulsion contre chaque élément correspondant Mm . Il est donc alors indifférent que le fluide frappe la partie AO de l'aube verticale ou la partie correspondante de l'aube inclinée. Mais comme la partie

OB de l'aube verticale est encore frappée par le fluide, il s'ensuit que même en ce cas il est plus avantageux que l'aube choquée soit posée verticalement, que d'être inclinée au courant.

VI. Des auteurs ont établi en général l'avantage de l'aube verticale sur l'aube inclinée, d'une manière erronée. Voici leur raisonnement. Il est certain, disent-ils, que si l'aube DE trempe dans l'eau, tandis que l'aube AB est encore dans la verticale, la partie VE de la première couvrira la seconde sur toute la hauteur AO qui ne sera point frappée, & qu'ainsi l'aube AB sera seulement frappée dans la partie OB . Il est vrai, pour-
suivent-ils, que cette diminution de choc semble réparée par l'impulsion que reçoit la partie VE , qui est plus grande que la partie AO ; mais la compensation n'est pas complète : car la percussion directe contre AO ou VI est à la percussion qui résulte perpendiculairement contre VE , comme $VI \times (\sin. \text{tot.})$, est à $VE \times (\sin. VEI)$, ou comme $VI \times \overline{VE}$, est à VE

$\times \overline{VI}$, ou enfin comme VE est à VI . De là, concluent-ils, il suit que l'extrémité E de l'aube DE (fig. 8) ne saurait que rencontrer la surface XY du fluide, au moment que l'aube AB cesse d'être verticale. Alors il est facile de déterminer le nombre des aubes dont une roue doit être garnie; car dans le triangle rectangle EAC , on connoît le côté CA qui est le rayon de la roue $AHLK$ & l'hypothénuse CE , puisque la hauteur DE de l'aube est donnée; ainsi, on connoît l'arc DA . Divisant la circonférence entière par la valeur de l'arc DA , le quotient exprimera le nombre des aubes de la roue. Les auteurs dont il s'agit, ont ainsi calculé laborieusement des tables du nombre des aubes d'une roue, relativement au rayon de cette roue & à la hauteur des aubes.

VII. Tout cet échafaudage de calcul tombe, 1.^o parce qu'on n'y tient pas compte des différents bras de levier de l'aube verticale & de l'aube inclinée; 2.^o parce que, si dans le cas de la fig. 8, le moment de l'impulsion de l'eau contre l'aube verticale AB est le plus grand qu'il est possible, d'un autre côté, lorsque l'aube DE a pris une position telle que l'angle ECB est divisé en deux parties égales par la verticale, le moment de l'impulsion est moindre alors qu'il ne seroit, si la roue avoit un plus grand nombre d'aubes, & qu'on est incertain si le moment moyen ne sera pas plus grand dans le second cas que dans le premier.

VIII. Le même paradoxe a déjà été relevé dans un mémoire sur les machines hydrauliques, imprimé il y a quelques années. Mais l'auteur de ce mémoire a lui-même employé un faux principe, d'après lequel il conclut que le moment de l'impulsion contre la partie VE de l'aube inclinée DE (fig. 7), est toujours égal au moment de l'impulsion contre la partie correspondante AO de l'aube

verticale, soit que la roue soit en repos, ou qu'elle tourne déjà à l'instant du choc. La chose n'est vraie que pour le premier cas (IV & V). La manière dont cet auteur mesure la percussion d'un fluide contre un plan mobile, est fautive. Il décompose la vitesse du plan en deux autres, l'une parallèle, l'autre perpendiculaire à la direction du fluide; & il affirme que le fluide n'agit sur le plan qu'en vertu de l'excès de la propre vitesse sur la première des deux vitesses dont on vient de parler. Or il est évident qu'en vertu de la vitesse que le plan a perpendiculairement à la direction du fluide, ce plan est repoussé par l'eau de la même manière que s'il étoit en repos, & que l'eau vint le frapper avec cette même vitesse; d'où résulte une nouvelle impulsion qui se combine avec la première, & que l'auteur a négligée mal-à-propos. Son mémoire contient d'ailleurs plusieurs choses vraies & utiles.

IX. Puisque dans le cas où la roue est en repos lorsqu'elle est frappée par le fluide, le moment de l'impulsion contre la partie *VE* de l'aube inclinée, est égal au moment de l'impulsion contre la partie *AO* de l'aube verticale (*V*); il s'ensuit qu'alors plus on multipliera le nombre des aubes, plus le fluide imprimera de force à la roue: car en augmentant le nombre des aubes, on fait diminuer l'angle *ECB* compris entre deux aubes voisines, & on augmente par conséquent le moment de l'impulsion que reçoit la roue lorsque les aubes se trouvent, relativement au choc, dans la position la plus défavorable, position qui arrive quand l'angle compris entre deux aubes contiguës est divisé en deux parties égales par la verticale. Comme la loi de continuité s'observe constamment dans les différents états d'accroissement ou de décroissement que peuvent subir les quantités de même espèce, concluons encore de-là que si une roue tourne avec une vitesse fort lente par rapport à celle du fluide, on augmentera la force en lui donnant un grand nombre d'aubes.

X. Il se présente à ce sujet une difficulté qui pourroit embarrasser quelques lecteurs, & qu'il est à propos d'éclaircir. En supposant la roue immobile à l'instant du choc, il est clair que dans la rigueur géométrique, le nombre le plus avantageux d'aubes doit être infini. Or, dira-t-on, si le nombre des aubes devient infini, leurs extrémités formeront une circonférence de cercle *FBGO* (fig. 9); & l'impulsion qui résultera perpendiculairement contre chaque élément *KN* de l'arc *FBG*, étant dirigée au centre, ne tendra à produire aucun mouvement de rotation; d'où il paroît s'ensuivre que, bien loin que la roue reçoive alors le plus grand moment possible d'impulsion, elle n'en recevra point du tout. Mais il faut remarquer que dans notre calcul, les aubes sont regardées comme une suite de plans différemment inclinés, tous dirigés au centre, & frappés par le fluide sous différentes obliques; que si par conséquent on déduit cette

hypothèse, on détruit nécessairement les conséquences qu'en résultent. Or la supposition que *FBG* est un arc de cercle, continu & composé d'éléments *KN* qui, loin d'être dirigés au centre *C*, sont perpendiculaires aux rayons *CK*, est entièrement contraire à la précédente. Il n'est donc pas surprenant qu'on arrive à des résultats très-différens dans les deux cas.

Concluons cependant de-là que, comme les filets d'eau sont composés de molécules physiques, ou qui ont des grosseurs finies, & que de plus ces filets se gênent les uns les autres dans leurs mouvements, les extrémités des aubes doivent toujours laisser entre elles un certain intervalle qui permette au fluide d'exercer son action autant qu'il est possible. Le nombre d'aubes qui convient de donner à une roue en repos, & à plus forte raison à une roue en mouvement, pour se procurer la plus grande force qu'il est possible de la part du fluide, est donc toujours fini & limité: à quoi on peut ajouter qu'en multipliant le nombre des aubes, on rend la roue plus pesante, & par-là sujette à un plus grand frottement.

XI. Lorsque le mouvement de la roue est devenu uniforme & permanent, sa vitesse est ordinairement très-comparable à celle du fluide; elle en est la moitié, ou le tiers, ou le quart, &c. Alors il est difficile de déterminer en général, pour un instant quelconque, le moment de l'impulsion de l'eau contre toutes les aubes à-la-fois, & d'en conclure la combinaison la plus avantageuse des éléments de la question. J'ai donné la solution générale de ce problème, dans le tome II de mon *Hydrodynamique*, & dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, pour l'année 1769. On me permettra d'y renvoyer le lecteur.

XII. Ici je me borne à la solution d'un problème très-utile dans la pratique. Il consiste à déterminer la vitesse que la roue doit prendre par rapport à celle du fluide, pour que l'effet de la machine soit un maximum.

Ce problème fait partie de celui que je viens d'indiquer; mais pour parvenir ici à des résultats simples & facilement applicables à la pratique, je supposerai, suivant l'usage ordinaire, qu'à la place des aubes plongées dans l'eau, on substitue une surface plane & verticale qui soit frappée perpendiculairement par le fluide, & qui avant ce choc ait déjà une vitesse uniforme & permanente. Nommons *A* cette surface, *v* la vitesse primitive & uniforme de son centre d'impression, *b* la distance de ce centre à celui de la roue, *V* la vitesse du fluide, *Q* le fardeau élevé, *v* sa vitesse, *e* son bras de levier; & de plus, supposons que l'impulsion perpendiculaire du fluide contre une surface *B* en repos, soit égale à un poids connu *P*. L'impulsion reçue par la surface *A* sera représentée par $P \times \frac{A \times (V - v)^2}{B \times V^2}$. Donc, à cause

de l'équilibre qu'il y a à chaque instant entre cette impulsion & l'action que le pesanteur exerce sur le poids Q , on aura $F \times \frac{A \times (V-u)^2}{B \times V^2}$

$\times b = Q \times c$. Multipliant le second membre par v , & le premier par $\frac{c \times u}{b}$ quantité qui est égale

à v , on trouvera $Q \times v = \frac{F \times A \times (V-u)^2 \times u}{B \times V^2}$.

Or le produit $Q \times v$, qui représente l'effet de la machine, doit être un maximum. Par conséquent

$\frac{F \times A \times (V-u)^2 \times u}{B \times V^2}$ en sera aussi un; &

comme le facteur $\frac{F \times A}{B \times V^2}$ est constant & donné,

il est clair que $\frac{F \times A \times (V-u)^2 \times u}{B \times V^2}$ sera un maximum, lorsque $(V-u)^2 \times u$ en sera un.

La méthode ordinaire de *maximis & minimis*, donne $u = \frac{V}{3}$. Ainsi, pour que l'effet de la machine soit un maximum, il faut que la vitesse du centre d'impulsion de chaque aube, soit le tiers de la vitesse du fluide.

XIII. Pour connaître la valeur absolue du maximum, il faut substituer dans l'équation $Q \times v =$

$\frac{F \times A \times (V-u)^2 \times u}{B \times V^2}$, à la place de u la valeur

$\frac{V}{3}$ que nous venons de trouver. Alors on aura

$Q \times v = \frac{4}{27} \frac{F \times A \times V^3}{B}$, ou, (en faisant la surface

donnée $B = A$), $Q \times v = \frac{4}{27} F \times V$. Soient H la

hauteur due à la vitesse V du fluide; $F = n \times A \times H$,

n étant un coefficient donné: on aura $Q \times v =$

$\frac{4}{27} n \times A \times H \times V$.

Pour les roues plongées dans des fluides indé-

finis, comme les roues qui trempent dans des rivières, on a sensiblement $n = 1$; &

pour les roues qui tournent dans des courriers étroits, on a sensiblement $n = 2$. Ainsi, dans le premier cas, le

plus grand effet de la machine est d'imprimer à un poids d'eau représenté par $\frac{4}{27} A \times H$ la vitesse V

du courant, ou à un poids d'eau exprimé par $A \times H$ les $\frac{4}{27}$ de la vitesse du fluide; &

dans le second cas, le plus grand effet de la machine est double du précédent.

On trouvera aux articles *moulin*, *roue*, la théo-

rie des ailes des moulins à vent & celle des roues horizontales.

XIV. Nous avons supposé, dans tout ce qui précède, que les aubes étoient dirigées au centre de la roue; mais l'expérience a fait connaître qu'il étoit avantageux de les incliner un peu par rapport à la direction du courant. Voy. mon *Hydrodynamique*, tom. II, pag. 383 & suiv. (L. B.)

AVELLAN ou AVELLAR, nom de l'étoile appelée aussi *pollux*.

AUGE, en *Hydraulique & Jardinage*. On appelle ainsi la rigole de pierre ou de plomb sur laquelle coule l'eau d'un aqueduc ou d'une scure; pour se rendre dans un regard de prise ou dans un réservoir. (K)

AUGES, f. m. (*Astron.*) $\hat{\nu}$. APSIDES, APHÉLIE, APOGÉE.

AUGMENT, vieux mot qui veut dire la même chose qu'accroissement, augmentation.

AURIGA. Voyez COCHER.

AVRIL, f. m. quatrième mois de l'année, suivant notre calendrier. C'étoit le second mois de l'ancienne année romaine, c'est-à-dire de l'année de Romulus, qui commençoit par le mois de mars, & qui avoit dix mois. Numa ajouta à cette année les deux mois de janvier & février, & le mois d'avril se trouva alors le quatrième. Voyez Mois.

Ce mot vient du latin *aprilis*, & celui-ci d'*aperio*, j'ouvre, à cause que dans ce mois la terre commence à ouvrir son sein pour la production des végétaux.

Dans ce mois le soleil parcourt le signe du taureau, ou, pour parler plus exactement, le soleil entre au signe du taureau vers le 20 d'avril, & paroît parcourir ce signe jusqu'au 21 de mai; c'est-à-dire que la terre parcourt alors réellement le signe du scorpion, opposé à celui du taureau. (O)

AUORE, f. f. (*Astron. physiq.*) est le crépuscule du matin, cette lumière faible qui commence à paroître quand le soleil est à 18 degrés de l'horizon, & qui continue en augmentant jusqu'au lever du soleil. Voyez CRÉPUSCULE.

Nicod fait venir ce mot du verbe *auresco*, dérivé d'*aureum*, qui a *oriente sole aer aurescit*, parce que le soleil levant dore, pour ainsi dire, l'atmosphère.

AUSTRAL, *australis*, méridional, ce mot vient d'*auster*, vent du midi.

Les signes *austraux* sont les six derniers du zodiaque; on les nomme ainsi, parce qu'ils sont au midi de la ligne équinoxiale. Voyez SIGNES.

On dit de même *pole austral*, *hémisphère austral*, pour *pole méridional*, *hémisphère méridional*, &c.

AUTEL (*Astron.*) $\alpha\gamma$, constellation méridionale, appelée aussi *altare*, *thymele*, (qui signifie autel) *vesta* à cause de la déesse du feu, *pharus*, (c'est-

à dire élévation) *sacrum*, *templum*, *puteus*, *focus*, *lar*, *tharibulum*, *acerra*; (vase à mettre de l'encens) *prunarum conceptaculum*, *ignisbulum*, *batillas*, (Rechaud) *ara thymiamatis*, (autel de l'encens) *ara censausti*. Les Dieux, disent les poëtes, étant en guerre contre les Titans, firent construire par Vulcain un autel sur lequel ils se lièrent par un serment mutuel; & cet autel fut placé parmi les constellations: on a dit aussi que cet autel étoit celui sur lequel Chiron sacrifia un loup.

La principale étoile de l'autel est de 3.^e grandeur, elle avoit, en 1750, 258° 8' 25" d'ascension droite, & 49° 38' 31" de déclinaison australe. (D. L.)

AUTOMATE, sub. m. (Mécaniq.) engin qui se meut de lui-même, ou machine qui porte en elle le principe de son mouvement.

Ce mot est grec *automatos*, & composé de *auto*, *ipse*, & *ma*, je suis excité ou prêt, ou bien de *proton*, facilement, d'où vient *protonisme*, spontanée, volontaire. Tel étoit le pigeon volant d'Architas, dont Aulugelle fait mention au liv. X, ch. xij des *faits antiques*, supposé que ce pigeon volant ne soit point une fable.

Quelques auteurs mettent au rang des *automates* les instrumens de mécanique, mis en mouvement par des ressorts, des poids internes, &c, comme les horloges, les montres, &c. Voyez *Joan. Bapt. Porta* *mag. nat. chap. xij. Scapiger* *subtil. 326.*

Le fameux *automate* de M. de l'Académie, membre de l'Académie royale des Sciences, le canard, quelques autres machines du même auteur, sont au nombre des plus célèbres ouvrages qu'on ait vus en ce genre depuis fort long-temps.

Voyez à l'article **ANDROÏDE** ce que c'est que le *silicium*.

L'auteur encouragé par le succès, exposa, en 1741, d'autres *automates*, qui ne furent pas moins bien reçus. C'étoit;

1.^o Un canard, dans lequel il représente le mécanisme des viscères destinés aux fonctions du boire, du manger & de la digestion; le jeu de toutes les parties nécessaires à ces fonctions; y est exactement imité: il allonge son cou pour aller prendre du grain dans la main, il l'avale, le digère, & le rend par les voies ordinaires tout digéré, tous les gestes d'un canard qui avale avec précipitation, & qui redouble de vitesse dans le mouvement de son gosier, pour faire passer son manger jusque dans l'estomac, y sont copiés d'après nature; l'aliment y est digéré comme dans les vrais animaux, par dissolution, & non par trituration; la matière digérée dans l'estomac est conduite par des tuyaux, comme dans l'animal par ses boyaux, jusqu'à l'anus, où il y a un sphincter qui en permet la sortie.

L'auteur ne donne pas cette digestion pour une digestion parfaite, capable de faire du sang & des sucs nourriciers pour l'entretien de l'animal; on auroit mauvaise grâce de lui faire ce reproche,

Il ne prétend qu'imiter la mécanique de cette action en trois chefs, qui sont: 1.^o d'avaler le grain; 2.^o de le macérer, cuire ou dissoudre; 3.^o de le faire sortir dans un changement sensible.

Il a cependant fallu des moyens pour les trois actions, & ces moyens méritent peut-être quelque attention de la part de ceux qui demanderoient davantage. Il a fallu employer différents expédiens pour faire prendre le grain au canard artificiel, le lui faire aspirer jusque dans son estomac, & là dans un petit espace, construire un laboratoire chimique, pour en décomposer les principales parties intégrantes, & le faire sortir à volonté, par des circonvolutions de tuyaux, à une extrémité de son corps toute opposée.

On ne croit pas que les anatomistes aient rien à décrire sur la construction de ses ailes. On a imité os par os, toutes les éminences qu'ils appellent *apophyses*. Elles y sont régulièrement observées, comme les différentes charnières, les cavités, les courbes. Les trois os qui composent l'aile, y sont très-distincts: le premier qui est l'*humerus*, a son mouvement de rotation en tout sens, avec l'os qui fait l'osicle d'omoplate; le second qui est le *cubitus* de l'aile, a son mouvement avec l'*humerus* par une charnière, que les anatomistes appellent *par gyngime*; le troisième qui est le *radius*, tourne dans une cavité de l'*humerus*, & est attaché par ses autres bouts aux petits os du bout de l'aile, de même que dans l'animal.

Pour faire connoître que les mouvemens de ces ailes ne ressemblent point à ceux que l'on voit dans les grands chef-d'œuvres du coq de l'horloge de Lyon & de Strasbourg, toute la mécanique du canard artificiel a été vue à découvert, le dessin de l'auteur étant plutôt de démontrer, que de montrer simplement une machine.

On croit que les personnes attentives sentiront la difficulté qu'il y a eu de faire faire à cet *automate* tant de mouvemens différens; comme lorsqu'il s'élève sur ses pattes, & qu'il porte son cou à droite & à gauche. Ils connoîtront tous les changemens des différens points d'appui: ils verront même que ce qui seroit de point d'appui à une partie mobile, devient à son tour mobile sur cette partie, qui devient fixe à son tour; enfin ils découvriront une infinité de combinaisons mécaniques.

Toute cette machine joue sans qu'on y touche, quand on l'a montée une fois.

On oublieroit de dire que l'animal boit, barbote dans l'eau, croasse comme le canard naturel. Enfin l'auteur a tâché de lui faire faire tous les gestes d'après ceux de l'animal vivant, qu'il a considéré avec attention.

2.^o Le second *automate* est le joueur de tambourin, planté tout droit sur son piedestal, habillé en berger dansant, qui joue une vingtaine d'ans, menues, rigolons ou comédies.

On croiroit d'abord que les difficultés ont été moindres

moindres qu'un sifteur *automate* : mais sans vouloir élever l'un pour rabaisser l'autre, il faut faire réflexion qu'il s'agit de l'instrument le plus ingrat, & le plus faux par lui-même; qu'il a fallu faire articuler une flûte à trois trous, où tous les tons dépendent du plus ou moins de force de vent, & de trous bouchés à moitié; qu'il a fallu donner tous les vents différents, avec une vitesse que l'oreille ne de la peine à suivre; donner des coups de langue à chaque note, jusque dans les doubles croches, parce que cet instrument n'est point agréable autrement. L'*automate* surpassa en cela tous nos joueurs de tambourin, qui ne peuvent remuer la langue avec assez de légèreté, pour faire une mesure entière de doubles croches toutes articulées; ils en coulent la moitié; & ce tambourin *automate* joue un air entier avec des coups de langue à chaque note.

Quelle combinaison de vents n'a-t-il pas fallu trouver pour cet effet? L'auteur a fait aussi des découvertes dont on ne se seroit jamais douté; auroit-on cru que cette petite flûte est un des instruments à vent qui fatigue le plus la poitrine des joueurs?

Les muscles de leur poitrine font un effort équivalent à un poids de 56 livres, puisqu'il faut cette même force de vent, c'est-à-dire, un vent poussé par cette force ou cette puissance, pour former le si d'en-haut, qui est la dernière note ou cet instrument puisse s'étendre. Une once seule fait parler la première note, qui est le mi; que l'on juge quelle division de vent il a fallu faire pour parcourir toute l'étendue du flageolet provençal.

Ayant si peu de positions de doigts différentes, on croiroit peut-être qu'il n'a fallu de différents vents, qu'autant qu'il y a de différentes notes; point du tout. Le vent qui fait parler, par exemple, le ré à la suite de l'ut, le manque absolument quand le même ré est à la suite du mi au-dessus, & ainsi des autres notes. Qu'on calcule, on verra qu'il a fallu le double de différents vents, sans compter les dièses pour lesquels il faut toujours un vent particulier. L'auteur a été lui-même étonné de voir cet instrument avoir besoin d'une combinaison si variée, & il a été plus d'une fois prêt à désespérer de la réussite; mais le courage & la patience l'ont enfin emporté.

Ce n'est pas tout: ce flageolet n'occupe qu'une main; l'*automate* tient de l'autre une baguette, avec laquelle il bat du tambour de Matille; il donne des coups simples & doubles; fait des roulements variés à tous les airs; & accompagne en mesure les mêmes airs qu'il joue avec son flageolet de l'autre main. Ce mouvement n'est pas un des plus aisés de la machine. Il est question de frapper tantôt plus fort, tantôt plus vite, & de donner toujours un coup sec, pour tirer du son du tambour. Cette mécanique consiste dans une combinaison infinie de leviers & de ressorts différents, tous mus avec assez de justesse pour suivre l'air;

Mathématiques. Tome 1, 1^{re} Partie.

ce qui seroit trop long à détailler. Enfin cette machine a quelque ressemblance avec celle du sifteur; mais elle a été construite par des moyens bien différents. Voyez *Obser. sur les écrits mod. 1741.* (O)

AUTOMNE, f. m. (*Astron.*) troisième saison de l'année, tems de la récolte des fruits de l'été.

Quelques-uns le font venir d'*augro*, j'accrois, *quod annuum frugibus augrat.*

L'*automne* commence le 23 septembre; la hauteur méridienne du soleil le trouve moyenne entre la plus grande & la plus petite. La fin de l'*automne* se rencontre avec le commencement de l'hiver, le 21 Décembre. Durant l'*automne* les jours vont en décroissant, & sont toujours plus courts que les nuits, excepté le premier jour d'*automne*, qui est le jour de l'équinoxe, ou le lendemain à cause de la réfraction.

Diverses nations ont compté les années par les *automnes*, comme les Anglois ont par les hivers. Tacite nous dit que les anciens Germains connoissoient toutes les saisons de l'année, excepté l'*automne*, dont ils n'avoient nulle idée.

On a toujours perdu que l'*automne* étoit une saison mal fautive. Tertulien l'appelle, *tempus valetudinum*. Horace dit aussi, *gravis autumnus, autumnus libitinae questus acerbus.*

Equinoxe d'automne, est le tems où le soleil entre dans la balance vers le 23 septembre. Voyez **AUTOMNAL**. (O)

AUVERGNE, (*jeu de l'homme* d') : ce jeu a un grand rapport à celui de la triomphe; on peut y jouer depuis deux jusqu'à six. Le jeu de cartes en contient jusqu'à trente-deux; mais si l'on ne joue que deux ou trois, il ne sera que de vingt-huit, parce qu'on lèvera les sept. Les cartes conservent leur valeur ordinaire : après que l'on a vu à qui sera, celui qui est à n'aler pas couper le joueur de sa gauche, & donne à chacun cinq cartes par deux ou trois, & en prend autant pour lui; il tourne la carte qui est dessus le talon, & qui sert de triomphe; alors chacun voit s'il peut jouer avec son jeu, sinon il passe, comme à la bête. Si personne n'a assez beau jeu pour jouer dans la couleur retournée, on se réjouit en ce cas, & jusqu'à trois fois, si les deux premières cartes retournées n'ont pu accommoder les joueurs. Il faut faire trois nuits pour gagner, & deux premières, quand elles sont partagées entre les joueurs. L'origine le jeu de carte est reconnu faux, on résist, & les coups pré-sens sont bons, & même celui où on l'auroit reconnu tel, s'il étoit fini. Celui qui donne mal perd un jeu & remède : si en mêlant il se trouve quelque carte retournée, on résist. Celui qui retourne un roi pour triomphe, gagne un jeu pour ce roi, & autant pour tous ceux qu'il a dans la main; tous les joueurs ont le même avantage. Celui qui joue avant son tour perd un jeu

Cc

au profit du jeu : celui qui renonce perd la partie ; le fens de ce terme, en ce cas, est qu'il n'y peut plus prétendre. Celui qui fait jouer & perd, démarque un jeu au profit de celui qui gagne : celui qui a en main le roi de la couleur retournée en réjouissance, à le même droit que celui qui l'a de la première tourne, & marque un jeu pour ce roi, & un jeu pour chaque autre qu'il auroit encore, pourvu néanmoins qu'il n'eût pas eu dans son jeu le roi de la triomphe précédente dans le même coup, pour lequel il auroit déjà marqué.

S'il arrive que l'un des joueurs, après s'être réjoui, vienne à perdre en jouant le roi de la première triomphe, soit que l'on lui coupât ou autrement, celui qui feroit cette levée gagneroit une marque sur celui qui l'auroit jeté, & ainsi des autres rois pour lesquels on gagne des jeux.

A X E

AXE, f. m. (*Mécanique*). Un *axe* ou *essieu* est proprement une ligne ou un long morceau de fer ou de bois qui passe par le centre d'un corps, & qui sert à le faire tourner sur lui-même. Voyez **ESSIEU**.

C'est en ce sens que nous disons l'*axe* d'une sphère ou d'un globe, l'*axe* ou l'*essieu* d'une roue. Voyez **GLOBE**, **ROUE**, &c.

L'*axe* d'une balance est une ligne droite sur laquelle elle se tourne & se meut. Voyez **BALANCE**.

L'*axe* d'oscillation d'un pendule est une ligne droite parallèle à l'horizon, qui passe par le centre autour duquel un pendule fait ses vibrations. Voyez **OSCILLATION** & **PENDULE**.

Axe en Géométrie. L'*axe* de rotation ou de circonvolution est une ligne droite autour de laquelle on imagine qu'une figure plane se meut, pour engendrer dans ce mouvement un solide, ou qu'une ligne se meut pour engendrer une surface. Voyez **SOLIDE**, **GÉNÉRATION**, &c.

Ainsi, pour engendrer une sphère, on imagine qu'un demi-cercle tourne sur son diamètre. Pour avoir un cône droit, on imagine qu'un triangle rectangle tourne sur un des côtés qui forment l'angle droit, comme sur un *axe*.

L'*axe* d'un cercle ou d'une sphère est une ligne droite qui passe par le centre du cercle ou de la sphère, & qui se termine par l'une & l'autre de ses extrémités à la circonférence du cercle, ou à la surface de la sphère. Voyez **CERCLE**, **SPHÈRE**. L'*axe* du cercle s'appelle autrement son *diamètre*. Voyez **DIAMÈTRE**. Un cercle a donc une infinité d'*axes*.

On entend encore plus généralement par *axe*, une ligne droite tirée du sommet d'une figure sur le milieu de sa base. Voyez **FIGURE**, **SOMMET**, **BASE**, &c.

A X E

L'*axe* d'un cylindre droit ou rectangle, est proprement cette ligne immobile autour de laquelle tourne le parallélogramme rectangle, qui dans ce mouvement engendre le cylindre droit. Voyez **CYLINDRE**.

En général, la ligne droite qui passe par le centre des bases opposées des cylindres, en est l'*axe*, soit que ces cylindres soient droits ou qu'ils soient obliques.

L'*axe* d'un cône droit est la ligne droite, ou le côté sur lequel on a fait mouvoir le triangle rectangle qui a engendré le cône. Voyez **CÔNE**.

Il suit de-là qu'il n'y a proprement que le cône droit qui ait un *axe*; car il n'y a point de manière d'engendrer le cône oblique, en faisant mouvoir triangle autour d'un de ses côtés immobiles. Mais par analogie, tous les auteurs qui ont traité des cônes, ont dit que la ligne tirée du sommet du cône oblique au centre de sa base, en étoit l'*axe*.

L'*axe* d'une section conique est une ligne droite qui passe par le milieu de la figure, & qui coupe à angles droits & en deux parties égales toutes les ordonnées.

Ainsi (*Señ. coniques*, fig. 31), si *AP* est perpendiculaire à *FE*, passant par le centre *C*, & qu'elle divise la section en deux parties égales, semblables & semblablement finies par rapport à cette ligne *AP*, elle sera l'*axe* de cette section. Voyez **CONIQUE**.

L'*axe* transverse ou le grand *axe* d'une ellipse; c'est la même chose : on l'appelle ainsi pour le distinguer de son conjugué, ou du petit *axe*. Voyez **TRANSVERSE**.

Dans l'ellipse, l'*axe* transverse est le plus long; & dans l'hyperbole, il coupe cette courbe aux points *A* & *P* (fig. 32.)

Axe conjugué, ou second *axe* de l'ellipse, c'est, (fig. 31) la ligne *FE* qui passe par le centre *C* de la figure, parallèlement à l'ordonnée *MN*, & perpendiculairement à l'*axe* transverse *AP*, & qui se termine par l'une & l'autre de ses extrémités à la courbe. Voyez **ELLIPSE** & **CONJUGUÉ**.

L'*axe* conjugué est le plus court dans l'ellipse : cette courbe n'est pas la seule où l'*axe* transverse ait son conjugué, cela lui est commun avec l'hyperbole.

L'*axe* conjugué, ou le second *axe* d'une hyperbole, est une droite *EF* (fig. 32) qui passe par le centre parallèlement aux ordonnées *MN*, *MN*, & perpendiculairement à l'*axe* transverse *AP*. Voyez **HYPERBOLE**.

L'*axe* de la parabole est d'une longueur indéterminée, c'est-à-dire, indéfini. L'*axe* de l'ellipse est d'une longueur déterminée. La parabole n'a qu'un *axe*; l'ellipse & l'hyperbole en ont deux. Voyez **CURVE**.

Suivant les définitions précédentes, l'axe d'une courbe est en général une ligne tirée dans le plan de cette courbe, & qui divise la courbe en deux parties égales, semblables & semblablement posées de part & d'autre de cette ligne. Ainsi, il y a un grand nombre de courbes qui n'ont point d'axe possible; cependant pour la facilité des dénominations, on est convenu d'appeler généralement axe d'une courbe, une ligne quelconque tirée où l'on voudra dans le plan de cette courbe, sur laquelle on prend les abscisses, & à laquelle les ordonnées de la courbe sont perpendiculaires. Ainsi, toute courbe en ce sens peut avoir un axe placé où l'on voudra. Si les ordonnées ne sont pas perpendiculaires, l'axe s'appelle *diamètre*. Voyez *ASCESSE*, *DIAMÈTRE*, *ORDONNÉE*.

Une courbe ne rencontre son axe que dans les points où l'ordonnée est égale à zéro.

En général, l'on appelle la ligne des abscisses *axe des abscisses*, ou simplement *axe*; & la ligne des ordonnées, *axe des ordonnées*; (toujours avec cette condition que les deux axes soient perpendiculaires l'un à l'autre, sinon ce sont deux diamètres). Cependant plusieurs auteurs, entr'autres M. Cramer, nomment ces deux lignes *axes*, quelquefois qu'elles fassent entr'elles.

Pour savoir les points où la courbe coupe l'axe des abscisses, il n'y a qu'à faire $y=0$ dans l'équation de la courbe; l'équation restante ne contiendra plus que x , & la courbe coupera l'axe des abscisses en autant de points que cette équation aura de racines.

Au contraire, pour trouver les points où la courbe coupe l'axe des ordonnées, il faut faire $x=0$. Voyez *l'introduction à l'analyse des lignes courbes* de M. Cramer, Genève, 1750.

Axe, en Optique. L'axe optique ou visuel est un rayon qui passe par le centre de l'œil; ou c'est le rayon qui, passant par le milieu du cône lumineux, tombe perpendiculairement sur le cristallin, & conséquemment passe aussi par le centre de l'œil. Voyez *OPTIQUE*, *RAYON*, *CÔNE*, *VISION*, &c.

L'axe moyen ou commun est une droite tirée du point de concours des deux nerfs optiques, sur le milieu de la ligne droite qui joint les extrémités des mêmes nerfs. Voyez *NERF OPTIQUE*.

L'axe d'une lentille ou d'un verre, est une ligne droite qui fait partie de l'axe du solide dont la lentille est un segment. Voyez *LENTILLE* & *VERRE*.

Ainsi, une lentille sphérique convexe étant un segment de sphère, l'axe de cette lentille sera l'axe même de la sphère, ou une ligne droite qui passe par le centre de la sphère. Voyez *CONVEXE*.

On peut encore définir l'axe d'un verre une ligne droite qui joint les points de milieu de deux surfaces de ce verre. Voyez *VERRE*.

L'axe d'incidence, en Dioptrique, est une ligne droite qui passe par le point d'incidence, perpen-

dicairement à la surface rompante. Voyez *INCIDENCE*.

L'axe de réfraction est une ligne droite tirée du point d'incidence on de réfraction, perpendiculairement à la surface rompante. Voyez *RÉFRACTION*.

L'axe de l'aimant, ou l'axe magnétique, est une ligne droite dont les extrémités sont des poles de l'aimant. Voyez *MAGNÉTISME*.

Axe dans le tambour, ou *essieu* dans le tour, *axis* in *peritrochio*; c'est une des cinq machines simples inventées pour élever des poids. Voyez *MÉCANIQUE*, *PUISSANCE*, &c.

Cette machine est composée d'une espèce de tambour représenté par *AB* (Méch. fig. 44) mobile avec un cylindre qui lui est concentrique, autour de l'axe *E F*. Ce cylindre s'appelle l'axe ou l'essieu; & le tambour le nomme tour. Les leviers adaptés au cylindre, sans quelquefois qu'il y ait de tambour, portent le nom de *rayons*. Voyez *TOUR*.

Dans le mouvement du tour, une corde se roule sur le cylindre, & fait monter le poids.

On rapporte à l'essieu dans le tour, toutes les machines où l'on peut concevoir que l'effort se fait par le moyen d'une circonférence ou tambour fixé sur un cylindre, dont la base est dans le même plan que cette circonférence; comme dans les grues, les moulins, les cabestans, &c. Voyez *ROUE*.

Propositions sur l'essieu dans le tour, 1.^e Si la puissance appliquée à l'essieu dans le tour suivant la direction *AL* (fig. 10) est perpendiculaire au rayon, & si cette puissance est au poids *G*, comme le rayon *CE* de l'axe ou du cylindre est au rayon *CA* du tour; la puissance suffira pour soutenir le poids, ou la puissance & le poids seront en équilibre.

2.^e Si la puissance appliquée en *F* agit selon la direction *FD*, oblique au rayon du tour, mais parallèle à *AL*, cette puissance sera à une puissance qui lui seroit équilibre, & qui agiroit suivant *AL*, comme le sinus total est au sinus de l'angle de la direction *CFD*.

3.^e Les puissances appliquées au tour en différents points *F*, *K*, &c. selon les directions *FD*, *KI*, &c. parallèles à la direction perpendiculaire *AL*, & faisant équilibre avec le même poids *G*, sont entr'elles réciproquement comme les distances au centre du mouvement *CD*, *CI*, &c. Voyez *LEVIER*.

Ainsi, à mesure que la distance au centre du mouvement augmente, la puissance diminue en même proportion, & vice versa.

D'où il s'ensuit encore que puisque le rayon *AC* est la plus grande distance possible, & que la puissance qui agit dans la direction *AL* lui est toute perpendiculaire, cette puissance perpendiculaire

fera la plus petite de toutes celles qui seront capables de faire équilibre avec le poids G .

4.^e Si une puissance qui agit dans la direction perpendiculaire AL , fait monter le poids G ; l'espace parcouru par la puissance sera à l'espace parcouru en même-temps par le poids, comme le poids à la puissance.

Car à chaque révolution du tour, la puissance aura parcouru la circonférence entière du tour, & le poids aura monté dans le même tems d'une quantité égale à la circonférence du cylindre; donc l'espace parcouru par la puissance est à l'espace parcouru par le poids, comme la circonférence du tour est à la circonférence de l'axe: mais la puissance est au poids, comme le rayon de l'axe est à celui du tour; donc, &c.

5.^e Une puissance A & un poids G étant donnés, voici la manière de construire un effieu dans le tour où la puissance soit en équilibre avec le poids.

Soit le rayon de l'axe ou effieu tel, que le poids puisse être soutenu, sans que cet axe ou effieu rompe; faites ensuite, comme la puissance est au poids, ainsi le rayon de l'axe au rayon du tour.

Lors donc que la puissance sera fort petite relativement au poids, il faudra que le rayon du tour soit extrêmement grand; soit par exemple le poids = 5000 & la puissance 50; le rayon du tour doit être à celui de l'axe, pour qu'il y ait équilibre, comme 60 est à 1.

On remédie à cet inconvénient en augmentant le nombre des roues & des effieus, & en les faisant tourner les uns sur les autres par le moyen des dents & des pignons. Voyez ROUE & PIGNON. (O)

AXE d'un CADRAN, c'est le style qui marque l'heure. Voyez CADRAN.

A X I

AXIFUGE, adj. on appelle, en Méchanique, force *axifuge*, la force avec laquelle un corps qui tourne autour d'un axe, tend à s'éloigner de cet axe; c'est proprement une force centrifuge, dont le centre est dans cet axe. Voyez CENTRIFUGE.

Quand une roue tourne sur elle-même, tous les points de cette roue, qui sont hors de la ligne ou axe qui passe par son milieu, ont une force *axifuge*. (O)

AXIOME, f. m. En Mathématique, on appelle *axiomes* des propositions évidentes par elles-mêmes, & qui n'ont pas besoin de démonstrations. Telles sont les propositions suivantes: le tout est plus grand que sa partie; si à de grandeurs égales on ajoute des grandeurs égales, les sommes seront égales; si deux figures étant appliquées l'une sur l'autre se couvrent parfaitement, ces deux figures sont égales en tout.

A Y U

AYUK, nom de l'étoile appelée communément la chèvre, dans la constellation du cocher.

AZELPHAGE, nom de l'étoile qui est à la queue du cygne.

AZIMECH, nom que les Arabes donnent à l'épi de la vierge; Bayer l'appelle aussi à Arcturnus.

AZIMUT, (Astron.) l'arc de l'horizon compris entre le méridien & un vertical quelconque, dans lequel se trouve le soleil ou une étoile. M. Colbrard croit que ce nom vient par corruption du mot arabe *assempt*, qui signifie proprement un point ou une marque.

L'*azimut*, quand l'astre se lève ou se couche, est le complément de l'amplitude orientale ou occidentale, ou ce qui lui manque pour faire un quart de la circonférence. Voyez AMPLITUDE.

Pour calculer l'*azimut* d'un astre à une heure donnée, quand on connoît sa déclinaison & la distance au méridien, on résout le triangle PZS (fig. 39 d'Astron.) forme au pôle, au zénith & à l'astre, dont on connoît deux côtés PZ , PS & l'angle compris, & l'on cherche l'angle Z , qui a pour mesure l'arc CO de l'horizon. Ce même triangle sert à calculer la hauteur d'un astre à une heure donnée.

Pour connoître par observation l'*azimut* d'une étoile, on tirera sur le plan de l'horizon une ligne méridienne, au-dessus de laquelle on suspendra un fil perpendiculaire ou vertical, en y attachant un poids. On suspendra ensuite un autre fil, en y attachant de même un poids & le plaçant de manière que l'étoile puisse être aperçue derrière les deux fils & désigner ainsi le vertical de l'étoile, l'on mesurera l'angle de la méridienne & de la ligne des deux fils, & ce sera l'*azimut* de l'astre, (Inst. Astronom. de M. le Monnier.) Mais la méthode la plus exacte est d'avoir un quart de cercle *azimutal*, à la manière de Tycho-Brahé & d'Hévélius. Voyez l'optique de Smith; édition du P. Pexanas. On trouve dans la connoissance des tems de 1762 & de 1782 des tables de hauteur & d'*azimut* pour Paris.

AZIMUT magnétique, est un arc de l'horizon compris entre le cercle *azimutal* du soleil & le méridien magnétique; c'est la distance apparente du soleil au point du nord ou du midi, marqué par la boussole. Voyez MAGNÉTIQUE.

On trouve l'*azimut magnétique* en observant le soleil avec un compas *azimutal*, lorsqu'il est élevé sur l'horizon à la hauteur de 10 ou de 15 degrés, soit avant midi soit après. Voyez le dictionnaire de marine.

CADRAN *azimutal*; c'est un cadran solaire dont le style ou gnomon est perpendiculaire au plan de l'horizon. Voyez CADRAN.

La connoissance de l'*azimut* sert quelquefois à

tracer la méridienne, qui est fort utile dans la géométrie pratique, & nécessaire dans la gnomonique & dans la navigation. Aussi nous expliquerons dans la gnomonique divers moyens de trouver l'*azimut*.

On appelle quelquefois *azimuts* les cercles verticaux. *VOY. VERTICAL AZIMUTAL*; & cercle *azimutal* est un cercle horizontal qu'on applique à un quart de cercle astronomique pour y marquer l'*azimut*; on le voit en la fig. 188 des planches d'*Astronomie*. (D. L.)

BACULAMETRIE, f. f. (Géom.) c'est l'art de mesurer avec des bâtons ou des verges les lignes tant accessibles qu'inaccessibles. *Voyez ACCESSIBLE, ARPENTAGE, MESURE, LEVER UN PLAN, &c.*

BAGUETTE divine ou divinatoire, f. f. (Méch.) on appelle ainsi un rameau fourchu ou une baguette courbée en arc, que certains charlatans font tourner sur les doigts des deux mains, & qui tourne (disent-ils) ou veulent-ils persuader aux spectateurs crédules) en vertu des émanations d'une eau souterraine, d'une pièce d'or ou d'argent cachée, d'une mine, &c. Il n'est fait aucune mention de cette baguette dans les auteurs qui ont vécu avant le onzième siècle. Les premiers qui l'ont employée prenoient pour cela un rameau fourchu de coudrier, d'aune, de hêtre ou de pommier. Les charlatans de ces derniers tems le font aperçu qu'une baguette de matière quelconque courbée en arc, produisoit le même mouvement. En effet on va voir que ce mouvement est purement mécanique, & que les indications de la *baguette divinatoire* ne sont que des tours de passe-passe que tout le monde peut exécuter, en éloignant & rapprochant alternativement les points d'appui de la *baguette*, ou (pour mieux tromper les yeux) en posant d'abord la *baguette* sur deux doigts de chaque main à même hauteur, puis levant & baissant alternativement les deux doigts d'une même main, ou des deux mains, ce qui peut se faire avec un peu d'usage, d'une manière presque imperceptible. Voici à quoi se réduit la question, considérée mécaniquement.

Soient (pl. Méc. fig. 11.) AOB un arc de cercle, situé d'abord dans une position horizontale; C , son centre de figure; G , son centre de gravité; AB , sa corde; OF , sa flèche. A l'effort des mains qui soutiennent réellement la *baguette* par les points K & H placés symétriquement, substituons un arc horizontal qui passe hors du point G , & qui ensuit l'arc aux points K & H , de telle manière que cet arc ne puisse avoir aucun mouvement de glissement, & que nous n'ayons à considérer que la simple rotation. Cela posé, il est clair, 1.^o que la pesanteur de l'arc, agissant suivant la verticale qui passe par le point G , l'arc tou-

nera autour de l'axe KH , dans le sens de O vers C .

2.^o Si l'axe KH demeurait immobile, il est évident que le point O étant arrivé au zénith, passeroit de l'autre côté, en vertu du mouvement acquis; puis reviendrait sur ses pas; puis se mouvrait dans le premier sens; ainsi de suite: ce qui se rapporte au mouvement d'oscillation des pendules ordinaires. Mais si lorsque le point O a passé le zénith, ou a reçu le mouvement nécessaire pour passer le zénith, on conçoit que l'axe KH est transporté parallèlement à lui-même en $K'H'$, alors le point O continuera à se mouvoir dans le premier sens; ce même mouvement se perpétuera, si le point O étant arrivé à l'horizon, l'axe revient en KH ; puis en $K'H'$; ainsi de suite. Or cette transposition mentale de l'axe produit le même effet que produit réellement le charlatan, en levant & baissant les doigts d'une main ou des deux mains, & faisant ainsi changer de place aux points d'appui K & H .

On voit que la *baguette* tournera à volonté du dedans au dehors, ou du dehors au dedans. Cela dépendra de la position initiale du point V ou V' par rapport au centre de gravité G . (L. B.).

BAJOYERS ou JOUILLIERES, f. f. pl. (Hydraul.) sont les ailes de maçonnerie qui revêtissent l'espace ou la chambre d'une écluse fermée aux deux bouts, par des portes ou des vannes que l'on leve à l'aide de câbles qui filent sur un treuil, que plusieurs hommes manœuvrent.

On pratique le long des *bayoyers*, des contre-forts, des enclaves pour loger les portes quand on les ouvre, & des perruis pour communiquer l'eau d'une écluse des deux côtés, sans être obligé d'ouvrir les portes. (K.)

* On donne aussi, sur les rivières, le nom de *bayoyers* aux bords d'une rivière, près les culées d'un pont.

BAISEMENT, f. m. (Géom.) *Voyez OSCULATION*.

BAISER, terme de Géométrie. On dit que deux courbes ou deux branches de courbes se *baisent*, lorsqu'elles se touchent en tournant leurs convexités vers le même côté; c'est-à-dire de manière que la concavité de l'une regarde la convexité de l'autre; mais si l'une tourne sa convexité d'un côté, & l'autre d'un autre côté, ou ce qui revient au même, si les deux convexités se regardent, alors on dit simplement qu'elles se touchent. Ainsi le point *baisant* & le point *touchant* sont différents.

On emploie plus particulièrement le terme de *baiser*, pour exprimer le contact de deux courbes qui ont la même courbure au point de contact, c'est-à-dire le même rayon de développement. Le *baisement* s'appelle encore alors *osculation*. *Voyez*

OSCULATION, DÉVELOPPÉE, COURBURE, &c.
(O).

BALANCE, f. f. (*Méch.*) C'est une machine qui se rapporte au levier, & dont l'usage est de faire connoître l'égalité ou la différence de poids de deux corps pesants.

Il y a plusieurs sortes de balances : les principales sont la *balance ordinaire* ou *moderne*, la *romaine*, & le *peson suédois* ou *denais*.

I. La balance ordinaire (*Méch. fig. 12.*) est composée d'un levier droit *AB* (*Voyez LEVIER*) nommé ici *fléau*, aux extrémités duquel sont suspendus, avec des cordons, deux bassins *C* & *D*, qui reçoivent les marchandises qu'on veut peser. Le fléau porte dans son milieu un axe *xy*, qui leur est perpendiculaire & dont les extrémités entrent & tournent librement dans des yeux pratiqués aux deux branches montantes d'une *châsse* *EM* qui soutient la machine. Ces extrémités de l'axe n'ont pas la forme cylindrique; elles sont taillées en couteaux, plus ou moins émoussés, suivant que la *balance* est destinée à peser des marchandises plus ou moins pesantes; le fléau s'appuie par les tranchants de ces couteaux dans les yeux de la châsse, avec une entière liberté de s'incliner de part ou d'autre; il porte une *aiguille* *fg* qui est dans la châsse quand il y a équilibre & que le fléau est horizontal, & qui, en s'écartant à droite ou à gauche de la châsse par sa partie supérieure, fait connoître non-seulement en quel sens le fléau s'est incliné, mais encore les plus petites inclinaisons dont il peut être affecté, ce qui sert à peser les marchandises avec toute l'exactitude possible.

Avant que de faire usage de la balance, il faut commencer par le mettre en équilibre, c'est-à-dire par faire en sorte que le fléau soit bien horizontal. Les deux bras *E A*, *E B*, doivent être exactement égaux. Si cette condition étant remplie, & les deux bras étant garnis de leurs bassins, un des côtés l'emporte sur l'autre, on mettra du côté le plus faible de petits poids en quantité suffisante pour établir l'équilibre, & maintenir le fléau dans la position horizontale. Ces petits poids doivent être regardés comme faisant partie de la *balance* même, & comme étrangers à ceux qu'on veut contrepeser.

Lorsque les deux bras *AE*, *BE* ne sont pas égaux, le plus long favorise le poids placé de son côté; car supposons que le fléau *AB* étant en équilibre & dans la position horizontale, on mette dans le bassin *C* un poids *P*, & dans le bassin *D* une marchandise *Q*, de manière qu'il y ait équilibre; ces deux poids *P* & *Q* se faisant équilibre, on aura (*Voyez LEVIER*) $P \times C :: B E :: A E$. Donc, si par exemple $B E > A E$, on aura $P > Q$. Les deux poids étant donc supposés égaux, l'un d'eux cependant l'emportera sur l'autre & paraîtra plus pesant. On appelle ces sortes de balances, *balances fausses*. Elles peuvent servir néanmoins,

de la manière suivante, à déterminer exactement le poids d'une marchandise.

Sans vous embarrasser quel est le plus long bras d'une *balance* que vous soupçonnez être *faussée*, mettez 1.^o dans l'un des bassins, par exemple dans le bassin *D*, la marchandise *Q* que vous voulez peser; & observez le poids *P* qui lui fait équilibre. 2.^o Transférez la marchandise *Q*, mettez-la dans l'autre bassin *C*, & observez le nouveau poids *P'* qui lui fait équilibre. Cela posé, multipliez *P* par *P'*, & tirez la racine quarrée du produit; elle sera la valeur exacte de *Q*. Car, par le principe de l'équilibre du levier, on a ces deux équations, $P \times A E = Q \times B F$; $P' \times B E = Q \times A E$, lesquelles étant d'abord multipliées ensemble, puis divisées par le facteur commun $A E \times B E$, donnent $P \times P' = Q^2$, & $Q = \sqrt{P \times P'}$.

On s'épargne la peine de transférer les poids, & sur-tout la longueur d'une extraction de racine quarrée, en faisant d'abord, & avant tout usage, les deux bras de la *balance* exactement égaux entr'eux. Nous observerons cependant encore, au sujet de l'extraction de la racine quarrée, que, si les deux poids *P* & *P'* différoient peu l'un de l'autre, on pourroit supposer, sans craindre d'erreur sensible, $Q = \frac{P+P'}{2}$; car soit $P' = P + p$, *p* étant une quantité très-subite par rapport à *P*, on aura $Q = \sqrt{P^2 + Pp} = P + \frac{p}{2}$, sensible ment; ou bien $Q = \frac{P+P'}{2}$.

Une chose à laquelle on doit faire la plus grande attention, est de mettre, avant qu'il est possible, dans une même ligne horizontale, le tranchant du couteau qui sert d'axe, & les deux points *A*, *B* d'où pendent les bassins; car si le point d'appui *E* (*fig. 12 & 14*) est au-dessous ou au-dessus de l'horizontale *AB*, pour peu que cette ligne soit inclinée à l'horizon, elle sera divisée en deux parties inégales par la verticale *EM* menée par l'appui, & conséquemment les poids qui se feront équilibre ne seront pas égaux. Dans le premier cas (*fig. 13*), la *balance* est trop mobile sur le point *E*, & elle est nommée *folle*; dans le second (*fig. 14*), elle trébuche trop difficilement, & elle est nommée *fourde*.

II. La romaine, ainsi nommée à cause du grand usage qu'on en faisoit chez les romains, sert à peser des marchandises de différentes pesanteurs, par le moyen d'un seul & même poids qu'on éloigne plus ou moins du point d'appui. Cette machine (*fig. 15*) est composée d'un fléau *AB*, suspendu par une anse *E K* qui le divise en deux bras *EA*, *EB* fort inégaux. Le bras le plus court porte un bassin *C*, ou un crochet destiné à soutenir les marchandises qu'on veut peser; & on fait couler, au moyen d'un anneau, le long du

bras EB , le poids constant P qui doit leur faire équilibre.

Il faut commencer par mettre la romaine en équilibre, ou le fléau dans la position horizontale, indépendamment de la marchandise & du poids qui doit la contre-balancer. Ensuite on établira l'équilibre de la marchandise & du poids, en vertu de l'équation $P \times EA = Q \times EB$, dans laquelle Q représente la marchandise, P le poids prépondérant, EA & EB les bras de levier de ces deux poids. Cette même équation sert à déterminer la graduation du bras EB . On voit, par exemple, que si le poids $Q = 10$ livres & le poids $P = 1$ livre, il faudra que la partie $EA = 10 EA$, ainsi des autres.

Cette balance à cela d'avantageux, qu'avec un seul & même poids on peut contre-passer d'autres poids très-considérables. De plus, elle fatigue moins les yeux de la chaffe que la balance ordinaire: car si, par exemple, on veut contre-peser avec celle-ci un poids $4P$, les deux bassins portent chacun un poids pareil, & la pression sur les yeux de la chaffe est $4P + 4P$, ou $8P$ (voy. FORCES PARALLÈLES); au lieu que dans la romaine, où le poids P , appliqué à la quatrième division du bras EB , contre-balance le poids $4P$ mis dans le bassin C , la pression sur les yeux de la chaffe est simplement $4P + P$, ou $5P$. Mais, d'un autre côté, le bras EB de la romaine est exposé à se plier quand il est un peu long; ce qui est un inconvénient auquel la balance ordinaire est moins sujette.

III. Le peson danois ou suédois, qui est fort usité en Danemarck & en Suède, est une longue pièce AB (fig. 16) de fer ou de bois, portant à l'une de ses extrémités une lourde masse A , & à l'autre un bassin ou un crochet C pour soutenir les marchandises qu'on veut peser; elle est traversée par un anneau E qui la soutient, & qu'on fait glisser suivant sa longueur, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre de part & d'autre du point E . Voici le principe de cet équilibre & de la graduation du peson.

Considérons le système de la masse A , de la verge AB , & du bassin ou crochet C , comme ne faisant qu'un seul & même poids P réuni à son centre de gravité H ; nommons Q le poids de la marchandise qu'on veut peser: pour qu'il y ait équilibre, on doit avoir l'équation $P \times EH = Q \times BE$, ou bien $P \times (BH - BE) = Q \times BE$; ce qui donne $BE = \frac{P \times BH}{P + Q}$. D'où l'on voit que, connaissant P & BH , il sera facile de graduer la verge BH , relativement aux différents poids Q qu'on veut peser. (L. B.)

* On appelle balance de roberval, une sorte de levier où des poids égaux sont en équilibre, quoiqu'ils paroissent situés à des extrémités de bras de levier inégaux. Voyez LEVIER.

Comme la balance est un vrai levier, sa pro-

priété est la même que celle du levier; savoir, que les poids qui y sont suspendus doivent être en raison inverse de leurs distances à l'appui, pour être en équilibre. Mais cette propriété du levier, que l'expérience nous manifeste, n'est peut-être pas une chose facile à démontrer en toute rigueur. Il en est à-peu-près de ce principe comme de celui de l'équilibre; on ne voit l'équilibre de deux corps avec toute la clarté possible que lorsque les deux corps sont égaux, & qu'ils tendent à se mouvoir en sens contraire avec des vitesses égales. Car alors il n'y a point de raison pour que l'un se meuve plutôt que l'autre; & si l'on veut démontrer rigoureusement l'équilibre lorsque les deux corps sont inégaux, & tendent à se mouvoir en sens contraire avec des vitesses qui soient en raison inverse de leurs masses, on est obligé de rappeler ce cas au premier, où les masses & les vitesses sont égales. De même on ne voit bien clairement l'équilibre dans la balance, que quand les bras en sont égaux & chargés de poids égaux. La meilleure manière de démontrer l'équilibre dans les autres cas, est peut-être de les ramener à ce premier, simple & évident par lui-même: c'est ce qu'a fait M. Newton dans le premier livre de ses Principes, section première.

Soient, dit-il (Méch. fig. 17), OK , OL , des bras de levier inégaux, auxquels soient suspendus les poids AP ; soit fait $OD = OL$, le plus grand des bras, la difficulté se réduit à démontrer que les poids AP , attachés au levier LOD , sont en équilibre. Il faut pour cela que le poids P soit égal à la partie du poids A qui agit suivant la ligne DC perpendiculaire à OD ; car les bras OL , OD , étant égaux, il faut que les forces qui tendent à les mouvoir soient égales, pour qu'il y ait équilibre. Or l'action du poids A , suivant DC , est au poids A , comme DC à DA , c'est-à-dire, comme OK à OD . Donc la force du poids A suivant $DC = \frac{A \times OK}{OD}$. Et comme cette force est égale au poids

P , & que $OL = OD$, on aura $\frac{A \times OK}{OD} = P$,

c'est-à-dire, que les poids A , P , doivent être en raison des bras de levier OL , OK , pour être en équilibre.

Mais en démontrant ainsi la propriété du levier; on tombe dans un inconvénient: c'est qu'on est obligé alors de changer le levier droit en un levier recourbé & brisé en son point d'appui, comme on le voit dans la démonstration précédente; de sorte qu'on ne démontre les propriétés du levier droit à bras inégaux que par celles du levier courbe, ce qui ne paroît pas être dans l'analogie naturelle. Cependant il faut avouer que cette manière de démontrer les propriétés du levier est peut-être la plus exacte & la plus rigoureuse de toutes celles qu'on a jamais données.

Quoi qu'il en soit, c'est une chose assez singulière

que les propriétés du levier courbe, c'est-à-dire dont les bras ne sont pas en ligne droite, soient plus faciles à démontrer rigoureusement que celles du levier droit. L'auteur du traité de *Dynamique*, imprimé à Paris en 1743, a réduit l'équilibre dans le levier courbe à l'équilibre de deux puissances égales & directement opposées; mais comme ces puissances égales & opposées s'évanouissent dans le cas du levier droit, la démonstration pour ce dernier cas ne peut être tirée qu'indirectement du cas général.

On pourroit démontrer les propriétés du levier droit dont les puissances sont parallèles, en imaginant toutes ces puissances réduites à une seule, dont la direction passe par le point d'appui. C'est ainsi que M. Varignon en a usé dans la *Mécanique*. Cette méthode, entre plusieurs avantages, a celui de l'élégance & de l'uniformité; mais n'a-t-elle pas aussi, comme les autres, le défaut d'être indirecte, & de n'être pas tirée des vrais principes de l'équilibre? Il faut imaginer que les directions des puissances prolongées concourent à l'infini; les réduire ensuite à une seule par la décomposition, & démontrer que la direction de cette dernière passe par le point d'appui. Doit-on s'y prendre de cette manière pour prouver l'équilibre de deux puissances égales appliquées suivant des directions parallèles à des bras égaux de levier? Il semble que cet équilibre est aussi simple & aussi facile à concevoir que celui de deux puissances opposées en ligne droite, & que nous n'avons aucun moyen direct de réduire l'un à l'autre. Or, si la méthode de M. Varignon, pour démontrer l'équilibre du levier, est indirecte dans un cas, elle doit aussi l'être nécessairement dans l'application au cas général. (O)

BALANCE HYDROSTATIQUE, est une espèce de balance qu'on a imaginée, pour trouver la pesanteur spécifique des corps liquides & solides. Voyez GRAVITÉ ou PESANTEUR SPÉCIFIQUE.

Cet instrument est d'un usage considérable pour connaître les degrés d'alliages des corps de toute espèce, la qualité & la richesse des métaux, mines, minéraux, &c. les proportions de quelque mélange que ce soit, &c. la pesanteur spécifique étant le seul moyen de juger parfaitement de toutes ces choses.

L'usage de la balance hydrostatique est fondé sur ce Théorème d'Archimède, qu'un corps plus pesant que l'eau, pèse moins dans l'eau que dans l'air, du poids d'une masse d'eau de même volume que lui. D'où il suit que si l'on retranche le poids du corps dans l'eau de son poids dans l'air, la différence donnera le poids d'une masse d'eau égale à celle du solide plongé.

Cet instrument (*Hydroz. fig. 12.*) n'a pas besoin d'une description fort ample. On pèse d'abord dans l'air le poids E, qui n'est autre chose qu'un plateau garni ou couvert de différents poids, &

le poids qu'on veut mesurer, lequel est suspendu à l'extrémité du bras F; ensuite on met ce dernier poids dans un fluide, & on voit par la quantité de poids qu'il faut ôter de dessus le plateau E, combien le poids dont il s'agit a perdu, & par conséquent combien pèse un volume de fluide égal à celui du corps.

Pour peser un corps dans l'eau, on le met quelquefois dans le petitseau de verre I K, & alors on ne doit pas oublier de couler le plateau R sur le petit plateau carré E, afin que le poids de ce plateau, qui est censé égal à celui du volume d'eau dont leseau occupe la place, puisse rétablir l'équilibre.

À l'égard des gravités spécifiques des fluides, on se sert pour cela d'une petite boule de verre G, de la manière suivante.

Pour trouver la pesanteur spécifique d'un fluide, suspendez à l'extrémité d'un des bras F un petit bassin, & mettez dedans la boule G; remplissez ensuite les deux tiers d'un vaisseau cylindrique O V, avec de l'eau commune: lorsque vous aurez mis la boule dedans, il faudra mettre sur le plateau E de petits poids, jusqu'à ce que les bras E, F, demeurent dans une position horizontale.

Ainsi, l'excès du poids de la boule sur celui d'un égal volume d'eau, se trouvera contrebalancé par les poids ajoutés au plateau E, ce qui la fera demeurer en équilibre au milieu de l'eau. Or concevons à présent cette boule ainsi en équilibre, comme si elle étoit réellement une quantité d'eau congelée dans la même forme: si à la place de l'eau qui environne cette partie congelée, nous substituons quelque autre liquide de différente pesanteur, l'équilibre ne doit plus subsister; il faudra donc pour le rétablir, mettre des poids sur celui des plateaux E, F, de la balance, qui sera le plus foible.

Ces poids qu'il aura fallu ajouter dans la balance, seront la différence en gravité de deux quantités, l'une d'eau, l'autre de la liqueur qu'on a voulu examiner, & dont le volume est égal à celui de la boule de verre. Supposons donc que le poids du volume d'eau dont la boule occupe la place, soit de 83 grains; si nous ajoutons à ce nombre celui des grains qu'il aura fallu ajouter sur le plateau auquel la boule est attachée, ou si nous ôtons de 803 grains le nombre de ceux qu'il auroit fallu mettre sur le plateau opposé, le reste sera le poids du volume du fluide égal à celui de la boule, & la gravité spécifique de l'eau sera à celle de ce fluide comme 803 est à ce reste; enfin si on divise ce même reste par 803, le quotient exprimera la gravité spécifique du fluide, l'unité exprimant celle de l'eau.

Pour rendre ceci plus sensible par un exemple, supposons qu'on veuille savoir la gravité du lait; plongeant dans cette liqueur la boule telle qu'elle est attachée à la balance, on trouve qu'il faudra mettre 13 grains sur le plateau auquel elle est suspendue,

pendue, pour rétablir l'équilibre: ajoutant donc 28 grains à 803, la somme sera 831; & ainsi la gravité spécifique du lait sera à celle de l'eau, comme 803 à 831. On peut donc, par le moyen de la balance hydrostatique, 1.^o connoître la pesanteur spécifique d'une liqueur; 2.^o comparer les pesanteurs spécifiques de deux liqueurs; 3.^o comparer les gravités spécifiques de deux corps solides; car si les deux corps solides pèsent autant l'un que l'autre dans l'air, celui qui a le plus de pesanteur spécifique pesera davantage dans l'eau: 4.^o comparer la gravité spécifique d'un corps solide avec celle d'une liqueur; car la gravité spécifique du corps est à celle de la liqueur comme le poids du corps dans l'air est à ce qu'il perd de son poids dans la liqueur. *Voyez aussi ARÉOMÈTRE.*

Le docteur Hook a imaginé une balance hydrostatique qui peut être d'une grande utilité pour examiner la pureté de l'eau, &c. Elle consiste en un ballon de verre d'environ trois pouces de diamètre, lequel a'un col étroit d'une demi-ligne de diamètre: on charge ce ballon de minium, afin de le rendre tant soit peu plus pesant qu'un pareil volume d'eau; on le trempe ensuite dans l'eau après l'avoir attaché au bras d'une exacte balance, qui a un contrepoids à l'autre bras. Cela fait, on ne sauroit ajouter à l'eau la plus petite quantité de sel, que le col du ballon ne s'élève au-dessus de l'eau d'un demi-pouce plus qu'il n'étoit d'abord. En effet, l'eau devenant plus pesante par l'addition du sel, le ballon qui y étoit auparavant en équilibre, doit s'élever. *Transact. philosoph.*

n. 197.

Plusieurs savans se sont donnés la peine de rédiger en table les pesanteurs d'un grand nombre de matières tant solides que fluides: on doit assurément leur savoir gré de ce travail, & l'on en sent toute la difficulté, quand on pense aux attentions scrupuleuses & au zèle qu'on est obligé de donner à ces sortes de recherches: mais leurs expériences, quelques exactes qu'elles aient été, ne peuvent nous servir de règle que comme des à-peu-près; car les individus de chaque espèce varient entr'eux quant à la densité, & l'on ne peut pas dire que deux diamans, deux morceaux de cuivre, deux gouttes de pluie, soient parfaitement semblables. Ainsi, quand il est question de savoir au juste la pesanteur spécifique de quelque corps, il faut le mettre lui-même à l'épreuve; c'est le seul moyen d'en bien juger. Au reste, on sera sans doute bien aise de trouver ici une table dressée sur des expériences fort exactes. Il suffit de dire qu'elles sont de M. Muschenbroëk. Les pesanteurs spécifiques de toutes les matières énoncées en cette table, sont comparées à celle de l'eau commune, & on prend pour eau commune celle de la pluie dans une température moyenne; ainsi, quand on voit dans la table, eau de pluie 1, 000; or de coupelle 19, 640; air 1, 001; c'est-à-dire que la pesanteur spécifique de l'or le plus fin est à

Mathématiques. Tome I, L.^{re} Partie.

celle de l'eau, comme 19 $\frac{1}{4}$ à-peu-près à 1, & que la pesanteur de l'air n'est presque que la millièmième partie de celle de l'eau.

Table alphabétique des matières les plus connues, tant solides que fluides, dont on a éprouvé la pesanteur spécifique.

Acier flexible & non trempé.....	7, 738.
Acier trempé.....	7, 704.
Agate d'Angleterre.....	2, 612.
Air.....	0, 001 $\frac{1}{4}$.
Albâtre.....	1, 872.
Alun.....	1, 714.
Ambre.....	1, 040.
Amiante.....	2, 913.
Antimoine d'Allemagne.....	4, 000.
Antimoine d'Hongrie.....	4, 700.
Ardoise bleue.....	3, 500.
Argent de coupelle.....	11, 091.
Bitum.	1, 700.
Bois de Brésil.....	1, 030.
cedre.....	0, 613.
orme.....	0, 600.
gayac.....	1, 337.
ébène.....	1, 177.
érable.....	0, 755.
frêne.....	0, 645.
bois.....	1, 030.
Borax.....	1, 720.
Caillou.....	2, 542.
Camphre.....	0, 995.
Charbon de terre.....	1, 240.
Cinabre naturel.....	7, 300.
artificiel.....	8, 200.
Cire jaune.....	0, 995.
rouge.....	1, 689.
blanche.....	1, 500.
Corne de Bœuf.....	1, 849.
cerf.....	1, 875.
Crysal de roche.....	2, 680.
d'Islande.....	2, 720.
Cuivre de Suede.....	8, 784.
jeté en moule.....	8, 000.
Diamant.....	3, 400.
Ecaillés d'huître.....	2, 092.
Encens.....	1, 071.
Eau commune ou de pluie.....	1, 000.
distillée.....	0, 993.
de rivière.....	1, 009.
Esprit de vin rectifié.....	0, 866.
de thérebenthine.....	0, 874.
Étain pur.....	7, 320.
allié d'Angleterre.....	7, 471.
Fer.....	7, 645.
Gomme arabique.....	1, 375.
Grenat de Bohême.....	4, 360.
de Suede.....	3, 978.

D d

Huile de lin.....	0, 912.
d'olive.....	0, 913.
de vitriol.....	1, 700.
Karabé ou ambre jaune.....	1, 065.
Lait de vache.....	1, 030.
Litarge d'or.....	6, 000.
d'argent.....	6, 040.
Magnésie.....	3, 530.
Marbre noir d'Italie.....	1, 704.
blanc d'Italie.....	1, 707.
Mercure.....	13, 193.
Noix de galle.....	1, 034.
Or d'essai ou décomposé.....	19, 640.
de Guinée.....	18, 838.
Os de bœuf.....	1, 646.
Pierre sanguine.....	4, 360.
calaminaire.....	5, 000.
à fusil, opaque.....	1, 542.
transparente.....	1, 641.
Poix.....	1, 150.
Sang humain.....	1, 040.
Sapin.....	0, 550.
Sel de Glauber.....	1, 246.
ammoniac.....	1, 453.
gomme.....	1, 144.
Polycrèse.....	1, 148.
Soufre commun.....	1, 800.
Talc de Venise.....	2, 780.
Tartre.....	1, 849.
Turquoise.....	2, 508.
Verd-de-gris.....	1, 714.
Verre blanc.....	3, 150.
Verre commun.....	1, 620.
Vin de Bourgogne.....	0, 953.
Vinaigre de vin.....	1, 011.
Vitriol d'Angleterre.....	1, 880.
ivoire.....	1, 825.

BALANCE, (*Astron.*) septième signe du zodiaque, & constellation du même nom; elle est appelée dans Cicéron, *jugum*; dans Ampelius *mochos*; dans Virgile & Ptolémée, les serres du scorpion; cette balance indique, suivant quelques auteurs, l'équilibre de la nature, l'égalité des jours & des nuits, la température de l'automne. Les anciens y ajoutaient la figure d'un homme, peut-être celle de Mochos, inventeur des poids & des balances; d'autres mettoient cette balance dans la main de la vierge. Virgile feint que c'étoit la justice d'Auguste consacrée par le nom d'une nouvelle constellation; peut-être, comme l'observe Scaliger, parce que la naissance d'Auguste tomboit au commencement du signe de la balance. Mais M. Dupuis fait voir que la balance existoit dans le zodiaque bien plus anciennement, & il croit qu'elle avoit dû être, dans l'origine, placée à l'équinoxe du printemps. (*Astronomie T. IV, p. 373*). Virgile lui-même semble

reconnoître une autre étymologie à ce nom de libra.

*Libra die somnique pares ubi fecerit horas
Et medium luci atque umbris jam dividet orbem,
Exercet, viri, tauros.* Géorg. 1. 208.

Les Perses faisoient autrefois au lever héliaque de cette constellation, la fin de l'âge d'or, & l'entrée du mal dans l'univers; ou comme l'explique M. Dupuis, le retour de l'hiver, la déviation périodique de la nature végétative & le commencement du règne du mauvais principe.

Il y a 51 étoiles de la balance dans le catalogue britannique. (*D. L.*)

BALANCEMENT, Voyez OSCILLATION.

BALANCIER, *f. m.* (*Mécan.*). Ce nom est donné communément à toute partie d'une machine qui a un mouvement d'oscillation, & qui sert ou à ralentir ou à régler le mouvement des autres parties.

BALANCIER de pompe, (*Hydrod.*). C'est le plus souvent une pièce de bois, ou une barre de fer posée horizontalement sur un point d'appui, qui en fait un levier de la première espèce. À une de ses extrémités répond un ou plusieurs pistons, & à l'autre est une bille bandante, ou quelque autre pièce répondante à une manivelle, qui donne le mouvement au balancier qui fait alors hausser le piston. On nomme aussi *balanciers* les pièces de bois qui servent à entretenir les barres de fer qui composent les chaînes de la machine de Marly, c'est-à-dire, les chaînes qui donnent le mouvement aux pompes du premier & du second puitsard. (†)

BALEINE, constellation méridionale qui contient 97 étoiles, suivant le catalogue de Flamsteed; elle est appelée aussi *etus*, *ete*, *draco*, *leo*, *ursus marinus*, *canis tritonis*, ou chien de mer, *piscis ou pristis*, espèce d'hydre ou de serpent: en arabe, *kaitos ou elketas*. Bayer, dans son *Uranométrie*, a peint un dragon au lieu d'une baleine; il trouvoit que la situation des étoiles sembloit l'exiger; d'ailleurs il y a eu des sphères anciennes où l'on avoit peint un dragon. Cependant le nom de baleine a universellement prévalu; les poètes disent que Neptune, dont l'amour pour Andromède s'étoit tourné en fureur, envoya une baleine pour la dévorer: ce monstre fut tué par Persée, & Neptune le plaça dans le ciel. Selon d'autres, Laomédon, roi des troyens, ayant été obligé d'involuer Héloïse sa fille, pour apaiser Neptune, elle fut délivrée par Hercule; & le monstre marin qui étoit l'instrument de la colère de Neptune, fut changé en cette constellation, appelée baleine.

Il y a dans cette constellation une étoile changeante fort singulière. Voyez ÉTOILE. (*D. L.*)

BALISTIQUE, *f. f.* Science du mouvement des corps pesants & jetés en l'air suivant une direction quelconque.

On trouvera à l'article PROJECTILE les lois de la Balistique. La théorie du jet des bombes est une partie considérable de cette science, & c'est principalement cette théorie qu'on y traite. Nous avons là-dessus plusieurs ouvrages, l'*Art de jeter les bombes*, de M. Blondel, de l'Académie des Sciences, un des premiers qui aient paru sur cette matière; le *Bombardier français*, par M. Belidor, &c. Mais personne n'a traité cette science d'une manière plus élégante & plus courte que M. de Maupertuis, dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des Sciences de Paris, de 1732; ce mémoire est intitulé *Balistique arithmétique*, & on peut dire qu'il contient en deux pages plus de choses que plusieurs traités que nous avons sur cette matière. M. de Maupertuis cherche d'abord l'équation analytique de la courbe *AMB* (Méch. fig. 47), que décrit un projectile *A* jeté suivant une direction quelconque *AR*; il trouve l'équation de cette courbe entre les deux co-ordonnées *AT*, *x*, & *TM*, *y*; & il n'a pas de peine à faire voir que cette équation est celle d'une parabole. En faisant *y* = 0, dans cette équation, la valeur correspondante de *x* lui donne la partie *AB* du jet; pour avoir le cas où la portée *AB* est la plus grande qu'il est possible, il prend la différence de la valeur de *AB*, en ne faisant varier que la tangente de l'angle de projection *RAB*; & il fait ensuite cette différence = 0, suivant la règle de *maximis & minimis*; ce qui lui donne la valeur de la tangente de l'angle de projection, pour que *AB* soit la plus grande qu'il est possible, & il trouve que cette tangente doit être égale au rayon, c'est-à-dire, que l'angle *BAR* doit être de 45 degrés. Pour avoir la hauteur *tm* du jet, il n'y a qu'à faire la différence de *y* = 0, parce que *tm* est la plus grande de toutes les ordonnées. Pour frapper un point donné *n* avec une charge donnée de poudre, il substitue dans l'équation de la parabole, à la place de *x*, la donnée *At*, & à la place de *y*, la donnée *In*, & il a une équation dans laquelle il n'y a d'inconnue que la tangente de l'angle de projection *RAB*, qu'il détermine par cette équation, &c. & ainsi des autres.

Au reste, la plupart des auteurs qui ont traité jusqu'à présent de la Balistique, ou ce qui est presque la même chose, du jet de bombes, ne l'ont fait que dans la supposition que les corps se meuvent dans un milieu non résistant; supposition qui est assez éloignée du vrai. M. Newton a démontré dans ses principes, que la courbe décrite par un projectile dans un milieu fort résistant, s'éloigne beaucoup de la parabole; & la résistance de l'air est assez grande pour que la différence de la courbe de projection des graves avec une parabole ne soit pas insensible. M. Robins, de la Société royale de Londres, a donné en anglais de *nouveaux principes d'Artillerie*, où il traite du jet des bombes, & en général du mouvement

des projectiles, en ayant égard à la résistance de l'air qu'il détermine en joignant les expériences à la théorie. M. Euler a fait d'excellentes remarques sur cet ouvrage; & le tout a été traduit & publié en français, cette année 1783, par M. Lombard, Professeur Royal de Mathématiques aux Ecoles d'Artillerie d'Auxonne. (O).

B A N

BANDES de Jupiter, en *Astronomie*, sont des bandes qu'on remarque sur le disque de Jupiter, & qui ressemblent à des ceintures. Voyez la figure 162 des planches d'Astronomie.

Les bandes de Jupiter sont plus brillantes que le reste de son disque, & terminées par des lignes parallèles. Elles ne sont pas toujours de la même grandeur, & en même nombre.

Elles ne sont pas non plus toujours à la même distance: il semble qu'elles augmentent & diminuent alternativement. Tantôt elles sont fort éloignées l'une de l'autre; tantôt elles paroissent se rapprocher; mais c'est toujours avec quelque nouveau changement. Elles sont sujettes à s'altérer de même que les taches du soleil: une tache très-considérable que M. Cassini avoit aperçue sur Jupiter en 1665, ne s'y conserva que près de deux années. Elle parut pendant tout ce tems immobile au même endroit de la surface. On en détermina pour lors la figure aussi-bien que la situation par rapport aux bandes. Elle disparut enfin en 1667, & ne reparut que vers l'an 1672, où l'on continua de l'apercevoir pendant trois années consécutives. Enfin elle s'est montrée & cachée alternativement; de manière qu'en 1708, on comptoit depuis 1665 huit apparitions complètes de cette tache. Voyez les anciens mémoires de l'Académie des Sciences, 1692, *Mém.* 1699, 1708, 1714. C'est par ses révolutions; observées un grand nombre de fois, qu'on a découvert la tems de la rotation de Jupiter autour de son axe, d'environ 9^h 56; il faut voir dans les Transactions philosophiques de 1781, les figures des bandes observées en différens tems par M. Herschel.

Il est vraisemblable que la terre que nous habitons est dans un état plus tranquille & bien différent de celui de Jupiter; puisque l'on observe dans la surface de cette planète des changemens, tels qu'il en arriveroit sur notre globe, si l'Océan, par exemple, changeant de lieu venoit à se répandre indifféremment sur toutes les terres, en sorte qu'il s'y formât de nouvelles mers, de nouvelles îles, & de nouveaux continens. *Inst. astron.* de M. le Monnier; mais Herschel croit que ce sont des nuages. *Transf. Phil.* 1781. Huygens aperçut aussi une espèce de bande sur le disque de Mars; mais elle n'est pas régulière, & on la voit difficilement.

BANQUE, f. f. c'est ainsi qu'on nomme à certains jeux, comme à celui du commerce, les cartes

D d ij

qui restent après qu'on en a donné à tous les joueurs le nombre qu'exige le jeu. La banque s'appelle à d'autres jeux, *talon* ou *fond*. Voyez TALON & FOND.

BANQUETTE (en *Hydraulique*) est un sentier construit des deux côtés de la cvette ou rigole d'un ruisseau pour y pouvoir arrêter & examiner si l'eau s'arrête ou se perd en quelque endroit : on donne ordinairement 18 pouces de large à ces sortes de banquettes. (O)

BANQUIER (terme de *Jeu*), c'est celui qui taille au pharaon, à la bassette, &c. & qui dans ces jeux a toujours de l'avantage : les autres joueurs s'appellent *pones* Voyez PHARAON, BASSETTE, PONTE. (O)

BAR

BARBE d'une comète (*Astron.*), c'est le nom qu'on donne à ces espèces de rayons qu'envoie une comète, vers la partie du ciel où son mouvement parait le porter. Voyez COMÈTE.

C'est en quoi la barbe de la comète est distinguée de sa queue, qui est formée des rayons poussés vers la partie d'où il semble que son mouvement l'éloigne. En un mot la barbe de la comète est une espèce de chevelure lumineuse & rayonnante qui la précède, & la queue est une chevelure lumineuse & rayonnante qui la suit. Voyez sur ce sujet les conjectures des philosophes, au mot COMÈTE. (O)

BAROMÈTRE, f. m. (*Hyd.*), instrument qui sert à mesurer la pesanteur ou l'élasticité de l'atmosphère & ses variations. Voyez le Dictionnaire de Physique.

BAROSCOPE, f. m. (*Hydr.*), signifie la même chose que baromètre.

BARRE, f. f. (*Méch.*), pièce de bois ou de fer qu'on emploie pour soulever un corps, ou pour faire tourner une machine. Voyez LEVIER.

BARRE (*Hydrat.*) : on appelle ainsi une espèce de banc de sable ou de gravier qui se forme toujours d'une manière plus ou moins sensible à l'embouchure d'une rivière dans la mer, ou même à la jonction de deux rivières.

Il est démontré par la théorie & par l'expérience, que la pente des rivières diminue à mesure qu'elles s'approchent de la mer. Ainsi, aux environs de l'embouchure, le courant devenu horizontal, on sensiblement tel, s'écoule par tous les endroits qui lui en offrent la facilité ; il s'étend en superficie, & diminue en profondeur. De-là résulte, à la jonction de la rivière avec la mer, la formation d'un amoncellement ou d'une espèce de barre, au-dessus de laquelle l'eau a peu de hauteur. Lorsque la mer est sujette au flux & reflux ; dans le tems du flux, l'eau de la mer qui entre dans le lit de la rivière, tend à transporter en amont la terre qui forme la barre ; mais dans le tems du reflux, l'eau de la rivière reprend son cours

naturel, ramène la terre, & tend à rétablir les choses dans leur premier état. Au bout d'un certain tems, ces deux courants contraires, en se combattant sans cesse, vont prendre au fond de la rivière une forme permanente, & propre à établir une espèce d'équilibre entre les effets réciproques qu'ils produisent. Dans la figure 12, (*pl. Hydrat.*) qui est un profil de la rivière & de la mer, pris suivant la longueur de la rivière, la courbe *DEP* représentant le fond de la rivière *ABED* & de la mer *CBEF* ; le point *E* est le sommet de la barre. On peut considérer *BE* comme un pertuis par lequel passent tour-à-tour les deux courants dont nous venons de parler. Il prend la profondeur requise pour modifier leurs forces & pour établir entr'elles la proportion convenable. Il a pour éléments principaux de ses dimensions, la quantité d'eau de la rivière, la vitesse & l'élevation de la haute mer.

On croit ordinairement que les barres sont formées par les dépôts des matières que l'eau charrie avec elle, & qui tombent au fond de la rivière à mesure que son lit s'approche de l'horizontale, & que par conséquent la vitesse du courant diminue. Mais, quand même les eaux courent parfaitement pures, il se formeroit toujours à l'embouchure une barre plus ou moins sensible. Car, en vertu de la force que l'eau a pour corroder le fond, elle tend à le rendre & le rend en effet à-peu-près horizontal dans le voisinage de l'embouchure. La profondeur de l'eau doit donc, par cette seule raison, devenir alors fort petite. Ensuite l'action du flux & reflux (si la mer y est sujette), la modifie, l'augmente ou la diminue, conformément aux loix de l'équilibre dont nous avons déjà parlé. Les dépôts des matières charriées par l'eau produisent des changements dans la figure & dans les dimensions de la barre ; mais ils n'en sont pas la cause primordiale. Elle peut souffrir aussi des variétés par les faibles que les vents transportent, & qui, en formant à l'embouchure, des dunes ou des amoncellements, font quelquefois changer de cours à l'eau.

Il y a au-dessus de Bayonne une fameuse barre à l'embouchure de la rivière d'Adour dans la mer. Pour la détruire ou la diminuer, on a changé plusieurs fois le cours de l'Adour en cet endroit. Après avoir construit en divers tems des épis qui n'avoient eu que des effets passagers, on se détermina en 1719, d'après le projet de M. de Tourny, directeur des fortifications, à enfermer l'Adour depuis un village appelé le Boucau jusqu'à la mer, entre deux longues digues de maçonnerie qui furent dès-lors commencées, qui ne sont pas encore achevées, & qui doivent le prolonger à une certaine distance dans la mer. La passe des vaisseaux fut dirigée ouest nord-ouest, suivant la délibération d'un conseil composé d'officiers de la marine & du corps de Génie. Les ouvrages pour la construction des digues ont été souvent interrompus.

& repris. On est parvenu à procurer 7 à 8 pieds de hauteur d'eau au-dessus de la barre en baïse mer.

Comme la mer mûrie de 11 à 12 pieds, la hauteur de l'eau est d'environ 18 pieds en haute mer. Si cette profondeur étoit bien franche, elle seroit suffisante pour l'entrée d'assez grands vaisseaux; mais à cause de l'agitation des vagues, il faut en rabattre 3 ou 4 pieds; & de plus, comme on ne doit pas attendre le moment précis de la haute mer pour entrer en rivière, il faut encore retrancher environ 2 pieds de la hauteur. Ainsi, pour l'ordinaire, on ne doit guères compter en haute mer qu'environ 12 pieds de profondeur d'eau pour l'entrée des vaisseaux, profondeur qui n'est pas suffisante & qu'on travaille à augmenter. Il est certain que le meilleur moyen d'y parvenir, est de resserrer l'adour entre deux digues, dont la direction & la hauteur aient d'ailleurs, autant qu'il est possible, l'avantage de faciliter l'entrée les vaisseaux & d'empêcher les ensablémens occasionnés par les vents. En diminuant ainsi la largeur de l'adour & en prolongeant les digues un peu avant dans la mer, on augmente la vitesse de la rivière; elle combat avec plus d'avantage le courant contraire de la mer; le fond prend la forme *D H e*, & le sommet de la barre est porté en *e*, point auquel répond une profondeur *C e* plus grande que *B E*. Je dis que le sommet de la barre est en *e*; car il faut remarquer qu'en la détruisant dans un endroit, on l'a fait naître, au bout d'un certain tems, en un autre, & que jamais on ne parviendra à l'annuler totalement. En effet, les mêmes causes qui produisoient la barre avant l'existence des digues, doivent évidemment en produire une autre après leur construction. Mais, comme elle sera portée plus avant dans la mer, elle pourra laisser au-dessus d'elle, pendant un long intervalle de tems, la hauteur d'eau dont on a besoin. Il conviendra de diminuer, le plus qu'il est possible, l'espace compris entre les digues, relativement au volume d'eau de la rivière, & sans qu'il en résulte aucune gêne pour la navigation, & de ne leur pas faire faire des coudes, car ces coudes sont très-nuisibles au mouvement de l'eau, & ils occasionnent pour l'ordinaire des attérissemens ou des ensablémens dans leurs environs. Il faudroit de plus qu'en descendant vers la mer, la largeur du canal diminuât, afin que dans le tems du reflux, le courant de la rivière resserrée de plus en plus, augmentât de plus en plus de vitesse & de profondeur, & qu'au contraire dans le tems du flux, la vitesse de la mer, entre les digues, diminuât de plus en plus par l'élargissement du canal. Je crois que, par tous ces moyens, on se procureroit une navigation commode & sûre au-dessus de la barre. Mais une précaution essentielle dans la construction des ouvrages, est de les mener de front, ou d'établir une espèce d'équilibre entre leurs parties correspondantes. Faute d'observer cet

équilibre, les ouvrages qu'on fait d'un côté de la rivière jettent l'eau vers le côté opposé, y occasionnent des gorges & des attérissemens. Ces dommages, qu'il faut réparer, augmentent la dépense & mettent dans l'achèvement des digues une lenteur très-préjudiciable.

Les mêmes remarques s'appliquent, proportion gardée, à l'embouchure de deux rivières qui sont injectées à croître & à décroître en des tems différens, comme cela est assez ordinaire. Il se forme à leur embouchure une espèce de flux & reflux qui produit à-peu-près les mêmes effets que celui de la mer.

Le mot de barre se prend encore quelquefois pour signifier cette espèce de remous auquel les rivières qui se jettent dans la mer sont sujettes pendant que la mer monte. Tel est, par exemple, le remous qui se fait sur la seine, pendant la durée du flux, depuis l'embouchure de cette rivière à Honfleur, jusques au pont de l'arche à plusieurs lieues au-dessus de Rouen. On voit l'eau de la mer remonter avec rapidité & glisser sur celles de la seine, à-peu-près comme elle seroit sur un terrain uni, sur-tout dans le voisinage de l'embouchure & dans les endroits où le lit de la rivière est resserré. On observe la même chose, proportion gardée, à l'embouchure de deux rivières qui se jettent l'une dans l'autre; quand l'une de ces rivières croît sans que l'autre croisse en même tems ou en même proportion. (*L. B.*)

BARRES, (jeu) est le nom que les jeunes gens donnent à un jeu qui consiste à se séparer en deux troupes, à venir se provoquer réciproquement, à courir les uns contre les autres entre des limites marquées; en sorte que si quelqu'un de l'un ou de l'autre parti est pris par ses adversaires, il demeure prisonnier jusqu'à ce que quelqu'un de son parti le délivre en l'emmenant malgré les poursuites du parti contraire. (*G.*)

BARRILLET, f. m. (Hydraulique) est un corps de bois arrondi en-dedans & en-dehors, avec un clapet posé sur le dessus. Ce corps loge dans une pompe à bras qui n'a point de corps de pompe, & sert de fond au jeu de piston, qui fait lever le clapet du barillet, & ensuite le fait refermer; & au moyen de la sifflette dont il est garni, l'eau ne peut retomber dans le puits quand la soupape est fermée.

On appelle encore quelquefois *barillet*, le piston d'une pompe à bras qui n'a point de corps de pompe, mais qui joue dans un tuyau de plomb, & qui tire l'eau par aspiration d'un puits ou d'une citerne.

Ces sortes de *barillets* sont attachés à une anse de fer, suspendue à une verge aussi de fer; & ils ont sur le dessus un clapet qui s'ouvre & se ferme à chaque coup de piston. Voyez POMPE, PISTON, CLAPET.

BAS DU CIEL, on donne quelquefois ce nom à la partie inférieure du méridien.

BASCULE, f. f. (*Mécanique.*) est une pièce de bois qui monte, descend, se hausse & se baisse par le moyen d'un effieu qui la traverse dans sa longueur pour être plus ou moins en équilibre. Ce peut être encore le contre-poids d'un pont levé ou d'un moulin à vent, pour en abatre le frein ; c'est à son axe ou rail par où passe un boulon qui la soutient sur un bâti de charpente. En général, *bascule* est proprement un levier de la première espèce, où le point d'appui se trouve entre la puissance & la résistance. (K)

BASE. La *base* d'une figure, en *Géométrie*, est proprement, & en général, la plus basse partie de son circuit. Voyez **FIGURE**.

La *base*, dans ce sens, est opposée au *sommet*, comme à la partie la plus élevée.

On appelle *base* d'un triangle un côté quelconque de cette figure, quoiqu'à proprement parler, le mot *base* convienne au côté le plus bas, sur lequel le triangle est comme appuyé ; ainsi, la ligne *AB* est la *base* du triangle *ABC* (*planch. Géom. fig. 21*), quoiqu'en d'autres occasions les lignes *AC* ou *BC* en puissent être la *base*. Dans un triangle rectangle, la *base* est ordinairement le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire, l'*hypothénuse*. Voy. **HYPOTHÉNUSE**. La *base* d'un triangle isocèle est de même le côté inégal aux deux autres. La *base* d'un solide est la surface inférieure, ou celle sur laquelle toute la figure est appuyée, ou peut être censée appuyée. Voy. **SOLIDE**.

La *base* d'une section conique est une ligne droite qui se forme dans l'hyperbole & la parabole par la commune section du plan coupant & de la *base* du cône. Voy. **CÔNE** & **CÔNIQUE**.

BASE, (*Astronomie.*) est une distance de deux ou trois lieues que l'on mesure avec la plus grande exactitude entre deux clochers, ou autres termes fixe pour établir les triangles qui servent à mesurer l'étendue d'un degré, & par conséquent la grandeur de la terre. La plus célèbre *base* astronomique est celle de 5717 toises, mesurée entre les centres des deux pyramides de Ville-Juive & de Juvisy, sur le chemin de Paris à Fontainebleau. Cette *base* a été mesurée plusieurs fois, comme on le voit dans le livre de la *Méridienne vérifiée*, & dans les *Mémoires de l'académie royale des sciences de Paris* 1754, pag. 181. On a mesuré des *bases* semblables dans tous les pays où l'on a voulu avoir la longueur d'un degré. Voyez **DEGRÉ** & **FIGURE DE LA TERRE**. (D. L.)

Les astronomes mesurent aussi des *bases* pour avoir la valeur des parties de leurs micromètres. (D. L.)

BASILISCUS, (*Astronomie.*) en grec *Aspidochelone*,

nom de la belle étoile qui est au cœur du lion, appelée aussi *regulus*, *stella regia*, en arabe *kabaleed*. (D. L.)

BASSETTE, f. f. forte de jeu de carte qui a été autrefois fort à la mode en France ; mais il a été descendu depuis, & il n'est plus en usage aujourd'hui. En voici les principales règles.

A ce jeu, comme à celui du *pharaon* (voyez **PHARAON**), le banquier tient un jeu entier composé de 52 cartes. Il les mêle, & chacun des autres joueurs qu'on nomme *portes*, met une certaine somme sur une carte prise à volonté. Le banquier retourne ensuite le jeu, mettant le dessus dessous ; en sorte qu'il voit la carte de dessous ; ensuite il tire toutes ces cartes deux à deux jusqu'à la fin du jeu.

Dans chaque couple ou taille de cartes, la première est pour le banquier, la seconde pour le porte ; c'est-à-dire, que si le porte a mis, par exemple, sur un roi, & que la première carte d'une paire soit un roi, le banquier gagne tout ce que le porte a mis d'argent sur son roi ; mais si le roi vient à la seconde carte, le porte gagne, & le banquier est obligé de donner au porte autant d'argent que le porte en a mis sur sa carte.

La première carte, celle que le banquier voit en retournant le jeu, est pour le banquier, comme on vient de le dire ; mais il ne prend pas alors tout l'argent du porte, il n'en prend que les $\frac{2}{3}$; cela s'appelle *facier*.

La dernière carte, qui devrait être pour le porte, est nulle.

Quand le porte veut prendre une carte dans le cours du jeu, il faut que le banquier baisse le jeu ; en sorte qu'on voie la première carte à découvert ; alors si le porte prend une carte (qui doit être différente de cette première), la première carte que tirera le banquier sera nulle pour ce porte ; si elle vient la seconde, elle sera *facée* pour le banquier ; si elle vient dans la suite, elle sera en pur gain ou en pure perte pour le banquier, selon qu'elle sera la première ou la seconde d'une taille.

M. Sauveur a donné dans le *Journal des Savans* 1679, six tables, par lesquelles on peut voir l'avantage du banquier à ce jeu. M. Jacques Bernoulli a donné dans son *Art coniclandi* l'analyse de ces tables, qu'il prouve n'être pas entièrement exactes. M. de Montmort, dans son *Essai d'analyse sur les jeux de hasard*, a aussi calculé l'avantage du banquier à ce jeu. On peut donc s'instruire à fond sur cette matière dans les ouvrages que nous venons de citer ; mais, pour donner là-dessus quelque teinture à nos lecteurs, nous allons calculer l'avantage du banquier dans un cas fort simple.

Supposons que le banquier ait six cartes dans les mains, & que le porte en prenne une qui soit une fois dans ces six cartes, c'est-à-dire, dans les

ving cartes couvertes : on demande quel est l'avantage du banquier.

Il est visible (voyez ALTERNATION & COMBINAISON) que les cinq cartes étant désignées par a, b, c, d, e , peuvent être combinées en 120 façons différentes, c'est-à-dire, en 5 fois 24 façons. Imaginons donc que ces 120 arrangements soient rangés sur cinq colonnes de 24 chacune, de manière que dans la première de ces colonnes a se trouve à la première place, que dans la seconde ce soit b qui occupe la première place, c dans la troisième, &c.

Supposons que a soit la carte du pont, la colonne où la lettre a occupe la première place, est nulle pour le banquier & pour les pontes.

Dans chacune des quatre autres colonnes, la lettre a se trouve six fois à la seconde place, six fois à la troisième, six fois à la quatrième, & six fois à la cinquième, c'est-à-dire, qu'en supposant A la mise du pont, il y a 24 arrangements qui font gagner $\frac{1}{2}A$ au banquier, 24 qui le font perdre,

c'est-à-dire, qui lui donnent $-A$, 24 qui le font gagner, c'est-à-dire, qui lui donnent A , & 24 enfin qui sont nuls. Cela s'ensuit des règles du jeu expliquées plus haut.

Or, pour avoir l'avantage d'un joueur dans un jeu quelconque, il faut, 1.^o prendre toutes les combinaisons qui peuvent le faire gagner ou perdre, ou qui sont nulles, & dont le nombre est ici 120. 2.^o Il faut multiplier ce qu'il doit gagner (en regardant les pertes comme des gains négatifs) par le nombre des cas qui le lui feront gagner; ajouter ensemble ces produits, & diviser le tout par le nombre total des combinaisons. Voy. JEU, PARI. Donc l'avantage du banquier est ici,

$$\frac{24 \times \frac{1}{2}A + 24 \times -A + 24 \times A}{120} = \frac{1}{10}A;$$

c'est-à-dire que, si le pont a mis, par exemple, un écu sur sa carte, l'avantage du banquier est de $\frac{1}{10}$ d'écu ou de huit sols.

M. de Montmort calcule un peu différemment l'avantage du banquier; mais son calcul, quoique plus long que le précédent, revient au même dans le fond. Il remarque que la mise du banquier étant égale à celle du pont, l'argent total qui est sur le jeu avant que le fort en ait décidé, est $2A$: dans les cas nuls, le banquier ne fait que retirer son enjeu & le pont le sien; ainsi le banquier gagne A : dans le cas où il perd, son gain est 0; dans les cas facés, il retire $A + \frac{1}{2}A$: dans les cas qui sont pur gain, il retire $2A$; ainsi, le fort total du banquier, ou ce qu'il peut espérer de retirer de la somme $2A$, est

$$\frac{24 \times A + 24 \times \frac{1}{2}A + 24 \times 0 + 24 \times A + 24 \times 2A}{120}$$

$$= A + \frac{1}{10}A; \text{ et comme il a mis au jeu } A, \text{ il s'en-}$$

suit que $\frac{1}{10}A$ est ce qu'il peut espérer de gagner, ou son avantage.

M. de Montmort examine ensuite l'avantage du banquier lorsque la carte du pont se trouve deux, ou trois, ou quatre fois, &c. dans les cartes qu'il tient; mais c'est un détail qu'il faut voir dans son livre même. Cette matière est aussi traitée avec beaucoup d'exactitude dans l'ouvrage de M. Bernoulli que nous avons cité.

A ce jeu, dit M. de Montmort, comme à celui du pharaon, le plus grand avantage du banquier est quand le pont prend une carte qui n'a point passé, & son moindre avantage quand le pont en prend une qui a passé deux fois. Voy. PHARAON. Son avantage est aussi plus grand lorsque la carte du pont a passé trois fois, que lorsqu'elle a passé seulement une fois.

M. de Montmort trouve encore que l'avantage du banquier, à ce jeu, est moindre qu'au pharaon; il ajoute que si les cartes facées ne payoient que la moitié de la mise du pont, alors l'avantage du banquier seroit fort peu considérable; & il dit avoir trouvé que le banquier auroit du déavantage, si les cartes facées ne payoient que le tiers. (O)

BASSIN, (f. m. (*Hydrod.*). On appelle ainsi en général un vase destiné à recevoir de l'eau ou une liqueur quelconque; mais on désigne plus particulièrement par ce mot affecté au même usage, une caisse de pierre, de bois, de plomb, de tôle, ou un espace creusé dans la terre & revêtu de maçonnerie ou de gazon.

Les bassins des fontaines sont ordinairement formés en pierre ou en marbre, enrichis de sculptures, & placés à une certaine hauteur au-dessus du sol d'un édifice ou d'une place publique.

Bassin de décharge se dit d'une pièce d'eau où se rendent les eaux des fontaines d'un jardin ou d'un édifice.

Bassin ou point de partage, bassin de distribution, le dit d'un bassin placé, dans un canal artificiel, à l'endroit le plus élevé; c'est-là que se rendent les eaux qui doivent alimenter le canal. Ainsi, par exemple, dans le canal de Languedoc, le bassin ou le point de partage est placé entre Toulouse & Béziers, & distant de ... lieues de la première de ces villes, & de ... lieues de la seconde.

Voyez, pour la construction & pour une plus grande nomenclature, le Dictionnaire d'Architecture.

BASSIN (Optique). Les miroitiers-lunettiers se servent de divers bassins de cuivre, de fer ou de métal composé, les uns grands, les autres plus petits, ceux-ci plus profonds, ceux-là moins, suivant le foyer des verres qu'ils veulent travailler.

C'est dans ces bassins que se font les verres convexes. Les sphères, qu'on nomme autrement des boules, servent pour les verres concaves; &

le rondau, pour les verres dont la superficie doit être plane & unie.

On travaille les verres au *bassin* de deux manières : pour l'une l'on attache le *bassin* à l'arbre d'un tour, & l'on y use la piece qui tient avec du ciment à une molette de bois, en la présentant & la tenant ferme de la main droite dans la cavité du *bassin*, tandis qu'on lui donne avec le pied un mouvement convenable ; pour l'autre, on affermit le *bassin* sur un billot ou sur un établi, n'y ayant que la molette garnie de son verre qui soit mobile. Les *bassins* pour le tour sont petits, & ne passent guères six à sept pouces de diamètre : les autres font très-grands, & ont plus de deux pieds de diamètre.

Pour dégrossir les verres qu'on travaille au *bassin*, on se sert des grès de gros éméri ; on les ardoient avec les mêmes matières, mais plus fines & tamisées : le tripoli & la potée servent à les polir : enfin on en achève le poliment au papier, c'est-à-dire, sur un papier qu'on colle au fond du *bassin*. Quelques-uns appellent ces *bassins* des moules, mais improprement.

La manière la plus convenable pour faire ces *bassins*, est le fer & le laiton, l'un & l'autre le plus doux qu'on puisse trouver ; car comme ils doivent être formés sur le tour, la matière en doit être traitable & douce, mais pourtant assez ferme pour bien retenir la forme dans le travail des verres. Ces deux sortes de matières sont excellentes & préférables à toutes les autres ; le fer néanmoins est sujet à la rouille, & le laiton ou cuivre jaune à se piquer & verdir par les liqueurs acres & salées : c'est pourquoi ces deux matières demandent que les instrumens qui en sont faits soient proprement tenus, bien nettoyés & essuyés après qu'on s'en est servi. L'étain pur & sans alliage est moins propre pour le premier travail de verre qui est le plus rude, à cause que sa forme s'altère aisément : on peut cependant l'employer utilement après l'avoir allié avec la moitié d'étain de glace. Le métal allié, qu'on ne peut former au tour à cause de sa trop grande dureté, comme celui des cloches qui est composé d'étain & de cuivre, ne vaut rien pour les formes dont nous parlons.

On peut préparer ces deux matières à recevoir la forme de deux manières, suivant qu'elles sont malléables ou fusibles : celles demandent toutes deux des modèles sur lesquels elles puissent être formées, au moins grossièrement d'abord, pour qu'on puisse ensuite les perfectionner au tour. La matière malléable demande pour modèle des arcs de cercle, faits de matière solide sur les diamètres des sphères desquelles on les veut former. Celle qui est fusible demande des modèles entiers de matières aisées à former au tour, comme de bois, d'étain, &c. pour en tirer des moules dans lesquels on puisse la jeter, pour lui donner la forme la plus approchée de celle qu'on desire ; car il

est ensuite fort aisé de la rendre régulière & de la perfectionner au tour.

Quoiqu'on puisse forger les formes de laiton ou cuivre jaune à froid au marteau, je conseille cependant de les mouler en fonte, & de leur donner même une épaisseur convenable à la grandeur de la sphère dont on veut les former, aussi bien qu'à la largeur de la superficie qu'on veut leur donner : premièrement, à cause qu'étant forgées & écrouées à froid, elles seroient aisément ressort sur leur largeur, & qu'elles altéreroient par ce moyen leur forme dans l'agitation du travail ; en second lieu, pour empêcher, par cette épaisseur convenable, que ce métal, s'échauffant sur le tour, ne se roidisse contre l'outil, comme il fait pour l'ordinaire, se rejetant dehors avec violence jusqu'à s'applanir, ou même devenir convexe de concave qu'il étoit, s'il n'a pas une épaisseur suffisante pour résister à son effort.

Pour faire les modèles qui doivent servir à faire les moules de ces platines, on ne sauroit employer de meilleure matière que l'étain, à cause qu'on peut le fondre avec peu de feu, & le tourner nettement sans altérer sa forme. Le bois néanmoins qui est plein, comme le poirier ou le chêne, qui est gras & moins liant, étant bien sec, y peut servir aussi commodément : pour l'empêcher même de s'enlever, & de se détacher à l'humidité de la terre ou du sable qui servent à le mouler, aussi bien que dans les changemens de tems, il convient de l'enduire & l'imbalmer d'huile de noix, de lin, ou d'olive au défaut de ces deux premières, laissant doucement sécher ces modèles d'eux-mêmes dans un lieu tempéré & hors du grand air.

La meilleure manière de mouler ces modèles est celle où l'on emploie le sable. Tout cuivre n'est pas propre pour faire ces formes ; on doit choisir celui qui est jaune & qu'on nomme *laiton doux*. On peut aussi le servir d'étain pur d'Angleterre, ou de celui d'Allemagne, allié avec moitié d'étain de glace. Le fer doux est aussi fort propre pour faire les *bassins* à travailler les verres.

M. Gouffier a trouvé une méthode de donner aux *bassins* & aux moules dans lesquels il fonde les miroirs de télescope, telle courbure qu'il peut souhaiter, soit parabolique, elliptique, hyperbolique, ou autre dont l'équation est donnée. Cette méthode sera expliquée dans un ouvrage particulier qu'il doit donner au public, sur l'art de faire de grands télescopes de réflexion, d'en mouler les miroirs, de manière qu'ils sortent du moule presque tout achevés. Voyez LUNETTES.

BASSINET, f. m. en Hydraulique, est un petit retranchement cintré que l'on ménage sur les bords intérieurs d'une cuvette, pour y faire couler la quantité d'eau distribuée aux particuliers par une ou plusieurs auges de différens diamètres ; ce qui s'appelle *jauger*.

On appelle

* On appelle encore de ce nom un *bassin* trop petit pour le lien. (K)

BASSINS, nom des deux principales étoiles de la balance, *bassin* austral & *bassin* boréal.

B A T.

BATADEUR, f. m. au jeu de Revertier, sont les dames qui font furcace sur la même flèche où il y en a déjà d'accouplées. Elles sont nommées *batadeur*, parce qu'elles servent à battre les dames découvertes, sans qu'on soit obligé de se découvrir soi-même.

BATARDEAU, f. m. terme de rivière & de mer: c'est une espèce de digue faite d'un double rang de pieux joints par des planches, & dont l'intervalle est rempli de terre; on s'en sert pour détourner l'eau d'une rivière.

On donne aussi le nom de *batardeau* à une espèce d'échafaud fait de quelques planches qu'on élève sur le bord d'un vaisseau pour empêcher l'eau d'entrer sur le pont, lorsqu'on couche le vaisseau sur le côté pour le radoubier. (Z)

BATEN-KAITOS, nom de l'étoile ζ de la baleine, la plus septentrionale des trois étoiles qui font sur le milieu du corps.

BATON DE JACOB. On donne quelquefois ce nom aux trois étoiles du baudrier d'Orion, qui sont en ligne droite, fig. 3 des planches d'Astronomie.

BATON d'arpenteur. Voyez EQUERRE d'arpenteur, instrument dont on se sert en mer pour mesurer la hauteur des astres; on l'appelle autrement *arbalète*, *arbalète*. Voyez ARBALÈTE.

BATONNET, jeu d'enfant: il se joue avec deux bâtons; l'un long, assez gros, rond, & long d'une aune ou environ; l'autre plus petit, rond, aiguillé par les deux bouts, & long de quatre à cinq pouces. On tient à la main le gros bâton; on frappe par une des extrémités pointues du petit qu'on appelle *bâtonnet*; le bâton s'élève en l'air; & l'adresse du jeu consiste à le frapper tandis qu'il est en l'air, & à l'envoyer bien loin. Si on ne l'atteint pas, ou si on ne l'envoie pas, en l'atteignant, à une certaine distance, on cède le *bâtonnet* à son adversaire, & l'on se succède ainsi alternativement.

BATTRE une dame au jeu du revertier: c'est mettre une dame sur la même flèche où étoit placée celle de son adversaire. Quand toutes les dames sont battues hors du jeu, on ne peut plus jouer, à moins qu'on ne les ait toutes rentrées.

* BATTRE au trictrac: c'est en comptant de la droite à la gauche les points amenés par les dés, tomber de la flèche la plus voisine d'une des dames, sur une flèche de son adversaire où il n'y ait qu'une dame; cette dame découverte est

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

battue, si le dernier point d'un des dés ou de tous les deux tombe sur elle.

On peut battre de trois façons; d'un dé, de l'autre, & des deux ensemble.

On bat par doublets, lorsqu'on a amené le même point des deux dés, comme deux quatre, deux cinq, &c.

On bat à faux, lorsqu'en comptant les points amenés par les deux dés, le dernier point de l'un & de l'autre des dés tombe sur une flèche de l'adversaire couverte de deux dames.

On gagne sur une dame battue simplement & d'une façon, dans le grand jeu, deux points; de deux façons, quatre; de trois façons, six.

On gagne sur une dame battue par doublets dans le grand jeu, quatre points; six dans le petit jeu.

Quand on bat à faux, on perd ce qu'on eût gagné en battant bien.

On bat le coin comme une dame, quand on a le sien & que l'adversaire ne l'a pas.

On bat les deux coins quand on n'a que deux dames abattues, & que les points amenés par l'un & l'autre dés, tombent tous les deux sur le coin.

On gagne quatre points quand on bat le coin ou les deux coins simplement; six quand on les bat par doublets.

On en perd autant si on bat le coin à faux; ce qui arrive quand on n'a que deux dames abattues, & que l'adversaire a son coin.

Il y a encore d'autres manières de battre. Voyez TRICTRAC, DAME, FLECHE, &c.

B É L

BELIER, (Astron.) nom d'une constellation qui a donné son nom à l'un des douze signes du zodiaque. Le *belier* étoit du tems d'Homère & d'Hésiode la première constellation du zodiaque, & le premier des douze signes s'appelle encore le *belier*. Il est appelé *princeps zodiaci*, *dux orgis*, *vervex*, *vernus portitor*, *ovis aures*, *chrysolallus*, c'est-à-dire, toison d'or, jupiter Ammon, *jovis fidus*, *minervæ fidus*, *xpm ou aures*, &c. Voyez CASIUS, *Cælum astronomico porticum*, pag. 11. Suivant la plupart des auteurs, le *belier* céleste est celui dont la toison occasionna le voyage des argonautes. Suivant M. Dupuis, c'est sur ce *belier*, dont le lever héliaque annonçoit autrefois le printemps, lorsque l'équinoxe étoit au taureau que fut faite la fable astronomique de la conquête de la toison d'or. Le serpentaire, appelé en Astronomie *jafon*, fxit par son lever, les premières étoiles du vaisseau par leur coucher du soir, l'arrivée du soleil dans le taureau; le lendemain le *belier* céleste dégagé des rayons solaires annonçoit le jour & le passage du soleil vers nos régions. C'est sur ce fondement que fut établie la fable de *Jafon* subjuguant un taureau qui vomissoit des flammes, & emportant la toison précieuse d'un *belier*, gardée par un dragon. Ce dragon est la

E c

halcine céleste, appelée souvent *draco*, & peinte sous la figure d'un monstre qui est placé sous le *bélier*; elle étoit alors absorbée en partie dans les feux solaires, le jour de l'équinoxe; c'est peut-être aussi le dragon des *hélépides*, dont le mauvais principe empruntait la forme pendant l'hiver & qui étoit tué par le bon principe au printemps. Il y en a qui prétendent que c'étoit le nom ou le pavillon du vaisseau sur lequel *Phrixus* & sa sœur *Hellé* prirent la fuite, pour éviter d'être sacrifiés par leur père *Athamas*. Sous le nom du *bélier*, il y en a qui ont entendu aussi le gouverneur de *Phrixus*, fils d'*Athamas*, qui fut si célèbre par sa science, que les habitants de la Colchide ne pouvoient le résoudre à le perdre, & que les grecs allèrent en force le délivrer de cet exil. D'autres, comme *Suidas*, ont entendu sous le nom de toison d'or, un livre en parchemin qui enseignoit le secret de la pierre philosophale, ou l'art de faire de l'or. Suivant *Plutarque*, une mine d'or; suivant *Justin*, les paillettes d'or qu'on retirait des fleuves avec des peaux de brebis, ou les trésors que *Phrixus* avoit emportés dans la Colchide. Voyez *Diodore*, liv. IV, & *Xenophon*, liv. VI. Le combat d'*Hercule* contre les *Amazones* est l'entrée du soleil dans le *bélier*. Voyez *ASTRONOMIE*, t. IV, p. 490.

Il est parlé de la constellation du *bélier* dans *Ovide*, sous le nom de la brebis d'*Hellé*, au septième des calendes de mai ou au 25 avril.

*Et frustra pecudem quæres athamantidos helles
Signaque dans imbres, & xorturque canis.*

Fast. IV. 903.

Le *bélier* étoit consacré en Egypte à Jupiter Ammon, qui présidoit à l'équinoxe du printemps. *Jablonski* *Pantheon ægyptiorum*, t. 163. M. Dupuis trouve qu'il étoit l'emblème des pâturages où l'on conduisoit les troupeaux à la fin du débordement (*Astron.* IV, 387).

Le caractère qui exprime ce signe est γ .

Cette constellation contient 66 étoiles dans le catalogue britannique.

Le soleil entre dans le signe du *bélier* vers le 20 mars, mais le signe du *bélier* est différent de la constellation du *bélier*. (D. L.)

BELLATRIX, nom de la belle étoile à l'épaulé occidentale d'*Orion*.

BELLEROPHON, nom de la constellation de pégalé.

BENETHNASH, nom de la dernière étoile de la queue de la grande ourse.

BERENICE. Voyez CHEVELURE DE BERENICE.

B Ê T

BÊTE, jeu de la bête ou de l'homme, (*Jeux*). Il se joue à trois, quatre, cinq, six & même sept :

mais, dans ce dernier cas, il faut que le jeu soit composé de trente-six cartes, & que la tourne soit la dernière du jeu de celui qui mêle : mais le mieux c'est de la jouer à cinq & à trois. Le jeu de cartes, quand on n'est que cinq, ne doit contenir que trente-deux cartes : & à quatre & à trois on ôte les sept. Le roi est la principale carte du jeu de la bête; la dame le suit & emporte le valet, qui le suit, celui-ci le dix, & ainsi des autres. Celui à qui il échoit de mêler les cartes, les fait couper à l'ordinaire au premier de sa gauche, & en distribue cinq à chaque joueur, en tel nombre à-la-fois qu'il lui plaît. Il y a de l'avantage à jouer en premier. Quand les cartes sont ainsi données, l'on tourne la première du talon que l'on y laisse retournée, parce qu'elle est la triomphe pendant tout le coup.

En commençant, chaque joueur met devant soi une fiche & deux jettons, l'un pour le jeu, & l'autre pour le roi de triomphe, quoique celui qui l'a ne joue pas; suffisant pour cela que le coup se joue; & celui qui mêle y en ajoute un troisième, qui le fait reconnoître pour avoir mêlé les cartes. Celui qui gagne tire les jettons & une fiche, & ainsi des autres à tous les coups, jusqu'à ce que toutes les fiches soient gagnées; après quoi chacun en remet un autre, & l'on recommence comme auparavant. Celui qui fait jouer, & à toutes les mains, gagne tous les jettons, tout ce qui est sur le jeu, s'il se des bêtes qui n'y auroient pas été mises pour le coup, & même les fiches; & outre cela chaque joueur est encore obligé de lui payer un jetton : s'il ne fait pas toutes les mains, il n'a pour l'avoir entrepris, que la peine & le chagrin de ne les avoir pas faites. Mais lorsque celui qui fait jouer ne leve pas trois mains, ou les deux premières, lorsqu'elles sont partagées entre les joueurs, il fait la bête, c'est-à-dire, qu'il met autant de jettons qu'il en auroit tiré s'il eût gagné. Ainsi, si le coup étoit simple, c'est-à-dire qu'il n'y eût pas sur le jeu des bêtes faites précédemment, & si l'on étoit cinq, celui qui feroit la bête ne la feroit que de 11 jettons, parce que la fiche & le jetton que chacun met devant soi en fait dix, & celui qui mêle met le onzième. Cependant il peut avoir été réglé entre les joueurs de mettre moins devant soi; alors la bête feroit proportionnée au nombre de jettons fixés.

L'on voit que, dans les onze jettons dont nous venons de parler plus haut, nous ne comprenons pas celui qui est destiné pour le roi de triomphe, qu'il laisseroit cependant, si faisant jouer il perdoit le coup; mais quand le roi le tire, chaque joueur en met de nouveaux pour le coup suivant. Toute bête simple doit aller sur le coup où elle a été faite; & s'il y en avoit plusieurs simples faites d'un même coup, elles iroient toutes ensemble. Mais les bêtes doubles doivent aller les unes après les autres dans les coups suivants, & toujours les plus grosses les premières.

Lorsqu'il y a une *bête* sur le jeu, les autres joueurs ne mettent point de jettons, excepté celui qui mêle, qui donne le tien à l'ordinaire. Celui qui gagne lorsqu'il y a une *bête* double au jeu, lève outre la *bête* une fiche, & tous les jettons qui sont au jeu; & fait la *bête* proportionnellement au gain, lorsqu'il perd. Quand nous avons dit que pour gagner il falloit au moins faire les deux premières mains, c'est bien entendu qu'aucun des joueurs n'en fait trois; puisqu'alors on perd comme si on les eût faites le dernier.

Il arrive assez souvent dans ce jeu que deux joueurs se disputent le gain du coup, parce que celui qui a fait jouer d'abord, n'empêche point de jouer aussi quiconque se trouve un assez beau jeu pour l'emporter sur lui & sur tous les joueurs qui se liguent contre lui en faveur du premier joueur, parce que le second risque de perdre le double de ce qui est au jeu; ce qui fait voir qu'on ne dit point *contre*, sans un très-beau jeu. On n'est plus reçu à le dire, quand une fois la première carte est jetée. Toute l'habileté des joueurs consiste à forcer celui qui fait jouer à surcouper, ou à se défaire de leurs bonnes cartes à propos, pour donner plus de force à ceux qui sont en état de le faire perdre; ce qui cependant n'est de lui que dans le cas où il n'y a point de vole à craindre. On doit au contraire garder tout ce qui peut l'empêcher, lorsqu'on en est menacé. On doit encore fournir de la couleur jouée; couper si l'on n'en a point; & si quelque autre avoit déjà coupé, il faudroit le faire d'une triomphe plus haute que la première, si l'on pouvoit.

Lorsque tous les joueurs ont vu leur jeu & passé, chacun peut aller en *curieuse*, en mettant un jetton au jeu. *V. CURIEUSE*. La curieuse est également avantageuse pour tous les joueurs, & n'est pas un moindre agrément du jeu de *bête*: mais on doit se contenter d'en avoir une. Nous avons déjà dit, que celui qui avoit le roi de triomphe retireroit les jettons qui lui sont destinés; celui qui retourne ce roi a le même privilège, pourvu toutefois, en l'un & l'autre cas, que le jeu se joue: celui qui fait la dévole, double tout ce qui est au jeu; fait autant de *bêtes* qu'il auroit pu en gagner, & donne un jetton à chaque joueur.

Pour faire jouer au jeu, il faut avoir en main un jeu dont on puisse faire trois mains, ou deux tout au moins, que l'on doit se hâter de faire le premier pour gagner. L'expérience apprendra bientôt quels sont les jeux qu'on peut jouer.

Celui qui renonce fait la *bête*; celui qui donne mal en est quitte pour un jetton à chacun, & refait: lorsque le jeu de cartes est faux, le coup où il est trouvé tel est nul; mais les précédents sont bons.

BÊTE, (au jeu de) La *bête* désigne la perte que fait un joueur qui ne fait pas trois mains

ou les deux premières, quand un autre joueur en fait trois.

BÊTE simple; c'est une *bête* faite en premier lieu, simplement sur l'enjeu de chaque joueur.

BÊTE double; se dit d'une *bête* faite sur une autre *bête*, non-seulement de l'enjeu de chaque joueur, mais encore de la *bête* qui étoit au jeu, & qu'on se proposoit de tirer.

BÊTE de renonce; c'est le do iblé paiement qu'on est obligé de faire de tout ce qui s'enlève du jeu dans un coup ordinaire, pour n'avoir pas fourni de la couleur qu'on demandoit.

BETEIGEOUSE ou BETELGEUSE, nom de la belle étoile à l'épaula orientale d'orion.

BEVAU ou BIVEAU ou BEUVEAU, *f. m.* (*Grém.*) On appelle ainsi du mot latin *bivium*, (chemin fourchu) l'angle que forment entr'elles deux faces coniques d'un corps, ou l'instrument destiné à prendre cet angle. Voyez SAUTERELLE.

On rencontre souvent dans la pratique de la coupe des pierres, des angles solides formés par trois plans qui se coupent; & on a besoin de savoir déterminer l'angle que deux quelconques de ces plans font ensemble. Cela s'appelle en termes d'ouvrier, *trouver le beuveau de deux panneaux*. (*Voyez PANNEAU*). La question réduite à la Géométrie se résout de la manière suivante.

Soient les trois plans *ASB*, *ASC*, *ESDD* (*fig. 35*), étendus d'abord sur un même plan, qui est celui de la planche, & qu'on peut regarder comme horizontal pour fixer les idées. Je suppose que le plan *ASB* demeure immobile, les deux autres se relèvent & tournent, l'un *ASC* autour de *AS* comme charnière; l'autre *ESDD* autour de *SB* comme charnière, jusqu'à ce que les deux lignes *SC*, *SE*, supposées égales, viennent se confondre & former une seule & même arête. Il naîtra de ce double mouvement un angle solide autour du point *S*; & la question, est par exemple, de déterminer l'angle que les deux plans *ASB*, *ASC* feront alors ensemble.

Cet angle est le même que l'angle reffiligne formé par deux perpendiculaires, tirées dans les deux plans, à un même point de leur section commune. (*Voyez PLAN*). Pour parvenir à trouver celui-ci, du point *C*, je mène *CO* perpendiculaire à la section commune *AS*, prolongée, des deux plans *ASB*, *ASC*; & du point *E*, je mène *EG*, perpendiculaire à *BS*. Cela posé, j'observe que pendant la rotation simultanée des deux plans *ASC*, *ESDD*, autour des lignes *AS*, *SB*, les droites *CO*, *EG*, demeurent toujours perpendiculaires aux lignes *ASO*, *BSG*; & que lorsque les points *C* & *E* viendroient à se confondre, ils seroient placés à l'extrémité supérieure d'une ligne verticale dont l'extrémité inférieure est représentée par le point *H*, intersection des droites *CO*, *EG*, sur le plan horizontal. De plus, j'observe que l'extrémité supérieure de la même verticale est distante du point *O*, de la quantité *CO*,
E c ij

puisque le point C décrit un arc de cercle, dont OC est le rayon. Donc, si l'on mène HI perpendiculaire sur CO , & que du point O , comme centre avec le rayon OC , on décrive un arc de cercle, qui coupe HI , au point I ; qu'ensuite on imagine que le triangle rectangle OHI tourne sur OH comme charnière, jusqu'à devenir vertical: le point I se confondra avec les points C & E . De plus, en regardant la droite CO comme située dans le plan horizontal, c'est-à-dire, dans le plan ASB ; il est évident que l'angle IOC est le même que celui que le plan ASC relevé, fait avec le prolongement ASb , du plan ASB , puisque cet angle IOC est formé par deux perpendiculaires, IO , CO , menées dans les deux plans ASC , ASb , au même point O de leur section commune. Donc, pour avoir l'angle que le plan ASC fait avec le plan ASB , il faut faire un angle, qui joint à l'angle IOC , vaille deux droits; ou, ce qui en est la suite, faire un angle qui soit composé d'un angle droit & d'un angle aigu, égal à l'angle OIH . Or cela peut s'exécuter ainsi très-communément, à l'aide des lignes qui sont déjà tirées dans la figure: du point H , comme centre, avec le rayon OC ou OI , décrivez un arc de cercle qui coupe SA au point M ; vous aurez le triangle rectangle MOH parfaitement égal au triangle rectangle IHO . Donc, si par le point M , on mène MN perpendiculaire à SA , l'angle HMN sera l'angle demandé, puisque cet angle est égal à la somme des deux angles SMN , OMH , dont le premier est droit, & dont le second est égal à l'angle OIH .

On déterminera, par la même méthode, les angles que les plans ASB , ASC font chacun avec le plan $ESBD$.

Ce problème est d'un fréquent usage dans les constructions de ces routes qu'on appelle *trompes*. Voyez ce mot. (L. B.)

BEZET, au jeu de triârac, est la même chose que deux as.

B I D

BIDET, ou charger le bidet (au triârac) se dit de l'action par laquelle un joueur met un grand nombre de dames sur une même flèche. Ce terme, autrefois assez usité, n'est plus d'usage à présent.

BIEZ, f. m. (Arts mécaniq. & hydraul.) est un canal élevé & un peu biaisé, qui conduit les eaux pour les faire tomber sur la roue d'un moulin; sa figure qui approche d'une bière, fait croire que son nom en est tiré.

On appelle *arrière-biez*, les canaux qui sont au-delà en remontant. (R.)

BILBOQUET, (jeu) petit bâton tourné, avec une cavité à chacun de ses bouts; on jette en l'air une petite boule attachée à un fil qui tient au milieu du bilboquet, & l'on tâche de la faire retomber & rester dans une des deux cavités.

B I N

BILLION, f. m. (Arithmétique.) On donne ce nom en Arithmétique au chiffre qui occupe la dixième place d'une suite horizontale de chiffres, en commençant de la droite vers la gauche, ainsi qu'on en est convenu dans la numération. Voyez NUMÉRATION.

BIMÉDIAL, adj. (Géom.) Quand deux lignes commençables seulement en puissance, sont jointes ensemble, la toute est irrationnelle par rapport à l'une de ces deux lignes; & on l'appelle *ligne première bimédiale*. Euclide, liv. X, propos. 38. Voyez COMMENSURABLE, IRRATIONNELLE, PUISSANCE. (E)

BINAIRE. L'ARITHMÉTIQUE binaire est une nouvelle sorte d'Arithmétique que M. Leibnitz fondeoit sur la progression la plus courte & la plus simple: c'est celle qui se termine à deux chiffres. Le fondement de toute notre Arithmétique ordinaire étant purement arbitraire, il est permis de prendre une autre progression qui nous donne une autre Arithmétique. On a voulu que la suite première & fondamentale des nombres allât jusqu'à dix, & que la suite infinie des nombres fût une suite infinie de divinités; mais il est visible que d'avoir étendu la suite fondamentale des nombres jusqu'à dix, ou de ne l'avoir pas étendu plus loin, c'est une institution qui est pu être différente; & même il paroît qu'elle a été faite assez au hasard par les peuples, & que les mathématiciens n'ont pas été consultés, car ils auroient pu aisément établir quelque chose de plus commode. Par exemple, si l'on eût poussé la suite des nombres jusqu'à douze, on y eût trouvé sans fraction des tiers & des quarts, qui ne sont pas dans dix. Les nombres ont deux sortes de propriétés, les unes essentielles, les autres dépendantes d'une institution arbitraire, & de la manière de les exprimer. Que les nombres impairs toujours ajoutés de suite, donnent la suite naturelle des carrés; c'est une propriété essentielle à la suite infinie des nombres, de quelque manière qu'on l'exprime. Mais que, dans tous les multiples de 9, les caractères qui les expriment additionnés ensemble, rendent toujours 9, ou un multiple de 9, moindre que celui qui a été proposé, c'est une propriété qui n'est nullement essentielle au nombre 9, & qu'il n'a que parce qu'il est le pénultième nombre de la progression décuple qu'il nous a plu de choisir. Si l'on eût pris la progression de douze, le nombre 11 auroit eu la même propriété.

Ainsi, dans toute l'arithmétique binaire, il n'y auroit que deux caractères, 1 & 0. Le zero auroit la puissance de multiplier tout par deux, comme dans l'Arithmétique ordinaire il multiplie tout par dix: 1 seroit un; 10, deux; 11, trois; 100, quatre; 101, cinq; 110, six; 111, sept; 1000, huit; 1001, neuf; 1010, dix, &c. ce qui est entièrement fondé sur les mêmes principes que les expressions de l'Arithmétique commune. Il est vrai que celle-ci seroit

très-incommode par la grande quantité de caractères dont elle auroit besoin, même pour de très-petits nombres. Il lui faut, par exemple, quatre caractères pour exprimer huit, que nous exprimons par un seul. Aussi M. Leibnitz ne vouloit-il pas faire passer son Arithmétique dans un usage populaire; il prétendoit seulement que dans les recherches difficiles elle auroit des avantages que l'autre n'a pas, & quelle conduiroit à des spéculations plus élevées. Le P. Bouvet, jésuite, célèbre missionnaire de la Chine, à qui M. Leibnitz avoit écrit l'idée de son *Arithmétique binaire*, lui manda qu'il étoit très-persuadé que c'étoit-là le véritable sens d'une ancienne énigme chinoise laissée il y a plus de 4000 ans par l'Empereur Fohi, fondateur des Sciences à la Chine, aussi-bien que de l'empire, entendue apparemment dans son siècle, & plusieurs siècles après lui, mais dont il étoit certain que l'incertitude s'étoit perdue depuis plus de 1000 ans, malgré les efforts & les recherches des plus savans *lettrés*, qui n'avoient vu dans ce monument que des allégories puériles & chimiques. Cette énigme consiste dans les différentes combinaisons d'une ligne entière & d'une ligne brisée, répétées un certain nombre de fois, soit l'une, soit l'autre. En supposant que la ligne entière signifie 1, & la brisée 0, on trouve les mêmes expressions des nombres que donne l'*Arithmétique binaire*. La conformité des combinaisons des deux lignes de Fohi, & des deux uniques caractères de l'Arithmétique de M. Leibnitz, frappa le P. Bouvet, & lui fit croire que Fohi & M. Leibnitz avoient eu la même pensée.

Nous devons cet article à M. Formey, qui l'a tiré de l'histoire de l'Académie des Sciences de Paris, année 1702. Voyez ECHELLES ARITHMÉTIQUES.

Cette Arithmétique seroit, comme on vient de le dire, peu commode; il faudroit trop de caractères pour exprimer d'assez petits nombres; cependant si le lecteur est curieux d'avoir une méthode pour trouver dans cette Arithmétique la valeur d'un nombre donné, ou pour exprimer un nombre quelconque, la voici en peu de mots.

On commencera par faire une table des différentes puissances de 2; savoir 2⁰ ou 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, &c. que l'on poussera le plus loin qu'il sera possible. Cela posé:

Soit donné, par exemple, le nombre 110101, dont on veut savoir la valeur; comme ce nombre a six chiffres, je prends la sixième puissance de 2, qui est 32, & qui sera représenté par le chiffre 1, qui est le 1^{er} à gauche: le chiffre suivant 1 indiquera la 5^e puissance 16; le chiffre suivant 0 ne donnera rien; le chiffre suivant 1 indiquera la 3^e puissance, c'est-à-dire 4; le chiffre suivant 0 ne donnera rien; enfin le dernier chiffre 1 donnera 1: ainsi, le nombre proposé équivaut à la somme des nombres 32, 16, 4, 1, c'est-à-dire 53, & ainsi des autres.

Présentement je suppose qu'on veuille exprimer le nombre 230 par l'*Arithmétique binaire*; je cherche d'abord la plus grande puissance de 2 contenue dans 230, c'est 128; & comme 128 est la 8^e puissance de 2, je vois que le nombre 230 exprimé comme on le desire, aura huit chiffres. Je mets donc

1 pour le premier chiffre à gauche:

j'ôte 128 de 230, il me reste 102; & comme 64, qui est la puissance de 2 qui suit immédiatement 128, se trouve dans 102, cela me fait voir que je dois encore mettre

1 à la seconde place à gauche;

je retranche 64 de 102, il me reste 38; or 32, qui est la puissance de 2 après 64, est encore dans 38; ainsi je mets

1 à la 3^e place à gauche:

je retranche 32 de 38, il me reste 6; or 16, qui est la puissance après 32, n'est point dans 6: je mets donc

0 à la 4^e place:

je retranche 8 de 6; & comme il n'y est pas, je mets encore

0 à la 5^e place:

je retranche 4 de 6, ce qui me donne

1 à la 6^e place:

enfin il me reste 2, qui s'exprimera par

1 à la 7^e place:

& comme il ne reste rien, on aura

0 à la 8^e place:

donc 230 sera exprimé par

11100110

Il est visible qu'à l'imitation de cette Arithmétique, on peut en imaginer une infinité d'autres où les nombres seront exprimés par plus ou moins de chiffres. Voyez ARITHMÉTIQUE & ECHELLES ARITHMÉTIQUES.

Soit en général n le nombre de caractères d'une Arithmétique quelconque, en sorte que 0, 1, 2, 3, ... $n-1$ soient ces caractères; & soit proposé de trouver la valeur d'un nombre quelconque, par exemple, $b c d e f$, exprimé avec les caractères de cette Arithmétique: on aura $b c d e f = b \times n^4 + c \times n^3 + d \times n^2 + e \times n + f$, & ainsi des autres.

Si on veut exprimer un nombre quelconque A par cette même Arithmétique, soit n la plus grande puissance de n contenue dans A ; soit divisé A

par n , soit a le quotient & le reste r ; soit ensuite

divisé r par n^{p-1} , b le quotient & le reste s ; soit

ensuite divisé s par n^{p-2} , le quotient c , & le reste

g : & ainsi de suite ; jusqu'à ce qu'on arrive à un reste K , qui soit ou 0, ou moindre que n : on aura $A = abc \dots K$, & le nombre des chiffres sera $p + 1$, &c. Voyez *Mém. Acad.* 1741, une méthode de M. de Buffon pour faire ce calcul par les logarithmes. (O)

BINOCLE, ou **TÉLESCOPE** *binoculaire*, c'est un télescope par lequel on peut voir les objets avec les deux yeux en même-temps. Voyez *TÉLESCOPE*. Il est composé de deux tuyaux qui commencent chacun des verres de même force. On a cru qu'il représenteroit les objets plus clairs & plus grands que le télescope monoculaire ; & cette raison a engagé plusieurs auteurs à en traiter assez au long, entre autres le P. Antoine-Marie de Reita, capucin, dans son *oculus Enoch & Elia* ; & après lui le P. Chérubin d'Orléans, aussi capucin, dans le tome 2 de sa *Dioptrique oculaire*, qui a pour titre de la *Vision parfaite* ; mais on a reconnu que ces sortes de télescopes étoient plus embarrassans qu'utiles : aussi la plupart des meilleurs auteurs qui ont traité de la dioptrique, n'en ont fait aucune mention.

On fait aussi des microscopes *binocles* ; mais comme ils ont les mêmes inconvénients que les télescopes de cet espèce, ils sont très-peu en usage. (O. T.) J'ai vu à la Haye, chez M. Hemslruss, des *binocles* de différentes espèces, qui réussissent très-bien. M. de Lisle s'en servoit aussi pour de très-grandes lunettes, parce qu'on n'auroit pas pu, sans cela, réunir le grossissement avec l'étendue du champ. (D. L.)

BINOME, f. m. (*Algèbre*.) C'est une quantité composée de deux parties ou de deux termes liés par les signes + ou - (voyez *MONOME*) ; ainsi, $a + e$ & $5 - 3$ sont des *binomes*.

Si une quantité algébrique a trois parties, comme $a + b + c$, on l'appelle *trinome* ; si elle en a quatre, on la nomme *quadrinome*, &c. ; & en général *multinome*.

M. Newton a donné une méthode pour élever en général un *binome* $a + b$ à une puissance quelconque n , dont l'exposant soit un nombre entier ou rompu, positif ou négatif.

Voici en quoi cette formule consiste :

$$(a+b)^m = a^m + mab^{m-1} + \frac{m(m-1)}{2}a^2b^{m-2} + \frac{m(m-1)(m-2)}{6}a^3b^{m-3} + \&c.$$

La seule inspection des termes en fait voir la loi même qu'un long discours.

Il est visible que lorsque m est un nombre entier, cette suite se réduit à un nombre fini de termes ; car soit par exemple $m = 2$, donc $m - 2 = 0$, donc tous les termes qui suivront les trois premiers seront $= 0$, puisqu'ils seront multipliés chacun par $m - 2$.

M. le marquis de l'Hôpital, dans son *traité des Sections coniques*, livre 10, a démontré cette formule pour le cas où m est un nombre entier. M. l'abbé de

Molieret a fait la même chose dans ses *éléments de Mathématiques*.

M. Clairaut, dans les *éléments d'Algèbre*, a démontré en général la formule du *binome* par les combinaisons ; M. l'abbé Boffut l'a aussi démontrée dans les siens.

Lorsque m est un nombre négatif ou une fraction, la suite est infinie, & pour lors elle ne représente la valeur de $(a+b)^m$ que dans le cas où elle est convergente, c'est-à-dire, où chaque terme est plus grand que le suivant. Voyez *SÉRIE* ou *SUITE*.

Soit, par exemple, un carré imparfait $a + b$, dont il faille extraire la racine carrée : il n'y aura qu'à élever $a + b$ à la puissance $\frac{1}{2}$; car tirer la racine carrée c'est élever à la puissance $\frac{1}{2}$, c'est la même chose. Voy. *EXPOSANT*. Ainsi, on aura

$$(a+b)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \times b \times a^{\frac{1}{2}-1} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times b^2 \times a^{\frac{1}{2}-2} + \&c. = a^{\frac{1}{2}} + \frac{b}{2a} - \frac{b^2}{8a^2} + \&c. :$$

formule ou suite infinie qui approchera de plus en plus de la racine cherchée.

De même, si on veut extraire la racine cube de $a + b$, il faudra élever cette quantité à l'exposant $\frac{1}{3}$; & on trouvera,

$$(a+b)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}} + \frac{b}{3a^{\frac{2}{3}}} - \frac{b^2}{9a^{\frac{5}{3}}} + \&c.$$

& ainsi des autres. Mais ces séries infinies ne sont bonnes qu'autant qu'elles sont convergentes.

Soit n le rang qu'occupe un terme quelconque dans la suite du *binome* $a + b$ élevé à la puissance quelconque m , on trouvera que ce terme est au suivant comme 1 est à $\frac{b}{a} \times \frac{m-n+1}{n}$; d'où il

s'ensuit que, pour que la série soit convergente, c'est-à-dire, que les termes aillent toujours en diminuant, il faut que $b \times (m - n + 1)$ soit toujours plus petit que na .

Ainsi, pour pouvoir trouver la racine approchée de $a + b$ par la formule précédente, il faut que $b \times (\frac{1}{2} - n + 1)$, pris positivement, soit plus petit que na , n étant un nombre entier quelconque.

De même pour extraire par cette formule la racine de $a + b$, il faut que $b \times (\frac{1}{3} - n + 1)$, pris positivement, soit toujours plus petit que na . (O)

* Nous allons ajouter ici une démonstration de la formule du *binome*, l'exposant étant quelconque.

Soit $1 + x$ le *binome* qu'il faut élever à la puissance n ; la question se réduit à trouver une fonction ordonnée par rapport aux puissances de x , qui soit égale à $(1+x)^n$.

Définissons d'abord l'expression $1 + x$. C'est.

une fonction de x & de n , telle que, mettant $n+1$ à la place de n , on ait une nouvelle fonction égale à la première, multipliée par $1+x$; avec cette condition que, lorsque $n=0$, elle soit 1, ou, si l'on veut, $1+x$, lorsque $n=1$.

Cela posé, soit $\frac{1}{1+x} = A + Bx + Cx^2 + D x^3 + \dots + (n)^m \dots$, A, B, C, D , étant des fonctions de n sans x ; $\frac{1}{1+x^{n+1}}$ sera égal à $A' + B'x + C'x^2 + D'x^3 + \dots + (n+1)^m x^m \dots A', B' \dots (n+1)^m$, étant ce que deviennent $A, B \dots (n)^m$ en mettant $n+1$ à la place de n . On aura donc (à cause de $1+x = 1+x \times \frac{1}{1+x}$), $A' + B'x + C'x^2 + D'x^3 + \dots + (n+1)^m x^m \dots = (A + Bx + Cx^2 + D x^3 + \dots + (n)^m x^m) (1+x)$.

D'où, comparant terme à terme, $A' = A, B' = B + A, C' = C + B, D' = D + C \dots$ & en général $(n+1)^m = (n)^m + (n)^{m-1}$.

Nous aurons donc, 1.^o A toujours constant & égal à 1;

2.^o A cause de $B' = B + 1, B = n$;

3.^o A cause de $C' = C + n, C = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

On pourroit satisfaire encore à ces équations, en ajoutant un terme arbitraire & indépendant de n aux A, B, C , &c. Mais il est évident que ces termes doivent tous être 0, puisque lorsque $n=0$, $\frac{1}{1+x} = 1$, quelque soit x .

En général, on observera que $(n+1)^m$, étant ce que devient $(n)^m$, en y mettant $n+1$ au lieu de n , puisque $(n+1)^m - (n)^m = (n)^{m-1}$; si $(n)^m$ est une fonction rationnelle de n du degré p , $(n)^m$ pourra être une fonction rationnelle de n du degré $p+1$. Or quand $n=1$, $(n)^m$ est du degré 1, donc pour $m=2$, $(n)^m$ sera du degré

2.... & généralement $(n)^{m-1}$ sera du degré $m-1$, & $(n)^m$ du degré m .

On aura donc sûrement $(n)^m$; mais, en observant les premiers termes de la valeur de $\frac{1}{1+x}$, on trouve $B=n.A, C=\frac{n-1}{2}B, D=\frac{n-1}{3}C$; il y a donc lieu de croire que, supposant $P(n)^m = Q(n)^{m-1}$, on aura pour P & Q des valeurs très-simples.

Or nous avons par ce qui précède

$$(n)^m = (n-1)^m + (n-1)^{m-1}$$

$$(n)^{m-1} = (n-1)^{m-1} + (n-1)^{m-2};$$

& par l'hypothèse

$$P + P(n-1)^m = (Q + q)(n-1)^{m-1} &$$

$$P + P'(n-1)^{m-1} = (Q + q')(n-1)^{m-2}$$

$$P + P, Q + q, \text{ étant ce que deviennent } P \text{ \& } Q \text{ en mettant } n-1 \text{ pour } n, \text{ \& } P + P', Q + q \text{ ce que deviennent } P \text{ \& } Q \text{ en mettant } n-1 \text{ pour } n, \text{ \& } m-1 \text{ pour } m.$$

On aura donc les deux équations,

$$P(n-1)^m + P(n-1)^{m-1} = Q(n-1)^{m-1} + Q(n-1)^{m-2}$$

$$\& P(n-1)^m + P(n-1)^{m-1} = \left\{ Q(n-1) + Q(n-1)^{m-2} \right\}$$

$$+ P(n-1) + P'(n-1)^{m-1} = \left\{ + q(n-1) + q'(n-1)^{m-2} \right\}$$

$$d'où P(n-1) + P'(n-1) = q(n-1) + q'(n-1)^{m-2}$$

Or il est évident qu'on satisfait à cette équation, en faisant $p=0, q'=0, p'=q$, & qu'on satisfait ainsi à ces équations, en supposant P & Q égales à des fractions rationnelles du premier ordre; soit en effet $P = am + b n + c$, & $Q = a'm + b'n + c'$, on aura $P = -b, p' = -a-b, q = -b', q' = -a'-b'$; d'où $b=0, a'=-b'$, $a=b' & P = am + c, Q = a'n - m + c'$.

Mais nous avons pour $m=1, \frac{Q}{P} = n$: d'où $an + cn = an - a + c'$, ou $c = c' - a$, & $a+c = a = c' & c=0$; donc $P = am, Q = a(n-m+1)$, & $\frac{Q}{P} = \frac{n-m+1}{m}$; donc $(n)^m = (n)^{m-1} \frac{n-m+1}{m}$, & par conséquent $(n)^m = \frac{n \cdot n - m \cdot n + 1 \cdot n - m + 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$.

Cette démonstration est rigoureuse & purement

analytique; elle ne demande que deux suppositions, l'une de l'équation $P(n) = Q(n)$: supposition à laquelle on s'est conduit par le calcul des premiers termes; la seconde est celle de P & de Q linéaires, qui est encore indiquée par le même calcul, & qui, de toutes, est la plus simple. (*M. D. C.*)

BIQUADRATIQUE, adj. (*Algèbre*). On donne ce nom à la puissance qui est immédiatement au-dessus du cube, c'est-à-dire, au quarré-quarré ou à la quatrième puissance. Voy. PUISSANCE, RACINE, QUARRÉ-QUARRÉ, &c. (*E*)

BI-QUINTILE, adj. (*Astron.*) c'est un aspect de deux planètes quand elles sont à 144 degrés de distance l'une de l'autre. Voy. ASPECT.

On appelle cet aspect *bi-quintile*, parce que les planètes sont alors éloignées l'une de l'autre de deux fois la cinquième partie de 360 degrés, c'est-à-dire, de deux fois 72 degrés, ou 144. (*O*)

BISSECTION, f. f. en *Géométrie*, est la division d'une étendue quelconque, comme un angle, une ligne, &c. en deux parties égales; c'est ce qu'on nomme autrement *bipartition*. Voyez DIVISION, &c. (*E*)

BIRIBI, f. m. (*Jeu*). C'est un jeu de hazard qui a été long-temps en vogue, & qui se joue encore quelquefois à Paris. Il nous est venu d'Italie, ainsi que le cavagnol, & les Italiens le nomment *biribisso*; mais alors il différoit, quant aux chiffres, du *biribi* que l'on joue actuellement. On place sur une grande table un tableau divisé en soixante & dix cases; dans chacune de ces cases se voit une figure & un nombre, depuis un jusqu'à soixante & dix, & les pontes mettent ce qu'ils veulent sur chaque nombre. On a un sac fermant à clef, dans lequel sont également soixante & dix olives; dans chacune est un billet peint sur vélin, qui porte une figure & un nombre correspondant à l'un de ceux du grand tableau. Le banquier fait sortir les olives une à une, par le moyen d'un ressort qui est à la tête du sac; si le billet qui en sort se trouve répondre à une case chargée, le banquier paye soixante-quatre fois la mise qui s'y trouve. La couche appartient aussi toujours au banquier; en sorte qu'il a un avantage de sept sur soixante & dix. Le *biribi* est au cavagnol ce que le pharaon est au lansquenet; car le pharaon & le *biribi* sont avantageux au banquier qui tient constamment; mais au lansquenet & au cavagnol, tous les joueurs sont banquiers à leur tour, lorsque cela leur convient, c'est-à-dire, tiennent la main ou le sac qui renferme les boules; le cavagnol est même d'une parité égalisée, & le banquier n'y a aucune espèce d'avantage.

Le *biribi* se joue encore aux côtes, c'est-à-dire, au pair; en sorte que le banquier ne donne que ce qui se trouve sur la case; mais il a, toujours

pour lui trois cases d'exception, qui sont perdre le ponté quoique son côté arrive.

Le *biribi* se joue encore à la raie droite; on met ce que l'on veut à la tête du tableau où il n'y a que sept chiffres, dont un produit l'avantage, au choix du ponté, & l'on emploie des jetons qui différencient, ou par la couleur, ou par le dessin, pour qu'on puisse reconnoître ce qu'ils valent & à qui ils appartiennent: le prix ordinaire qu'on leur attribue est de quatre fois moins un liard, sept fois & demi, quinze fois, & ainsi de suite, en doublant toujours. (*D. L.*)

BOIS, *résistance des bois*, (*Méch.*) Plusieurs auteurs, entr'autres M. de Buffon & M. Duhamel, ont cherché à déterminer, par la voie de l'expérience, la résistance qu'une pièce de bois oppose à l'effort d'un poids ou d'une force quelconque qui tend à la rompre: question de la plus grande importance pour l'architecture & pour la navigation. Voy. les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1741*, & le traité de M. Duhamel sur la *résistance des bois*. Ici je me borne à donner sur cette matière une théorie facilement applicable à la pratique.

1. Soit le rectangle *ABDC* (fig. 18) le profil d'une pièce de bois équilibrée en parallélogramme rectangle, soutenue horizontalement par les deux appuis *A* & *B*; que cette pièce, considérée comme non pesante (1), soit chargée, en un endroit quelconque *N*, d'un poids *Q* qui fasse équilibre à la résistance qu'elle oppose à sa rupture: on demande la valeur de *Q*?

Imaginons que la pièce soit composée d'une infinité de fibres ou de fils parallèles à *AB* & à *CD*. Dans l'instant où elle est prête à se rompre, les fibres s'allongent d'une certaine quantité dans la section verticale *NT*, & les petits allongements forment un espace triangulaire *FNI*, dont le sommet est en *N* & la base *FI* sur *AB*. De plus, les éléments *HK*, *PM*, *FI*, &c. du triangle *FNI*, sont proportionnels aux forces avec lesquelles les fibres sont tendues en ces endroits, puisqu'ils expriment les quantités dont les fibres sont tirées de leur état naturel pour résister à l'effort du poids *Q* qui tend à rompre la pièce.

Les résistances (que j'appelle *A* & *B*) des appuis étant des forces qui sont censées agir dans les sens *AS*, *BV*, il est clair qu'on peut considérer *CNT* & *DNT* comme deux leviers angulaires dont l'appui est en *N*. Dans le premier, le bras *CN* est poussé par la force *A*, tandis que le bras *NT* est tiré par la somme des tensions,

(1) Si on vouloit avoir égard au poids de la pièce, il faudroit considérer *Q* comme la résistance de ce poids, & du poids étranger dont elle est chargée, lequel seroit alors placé ailleurs qu'en *N*.

Des bras HK , PM , FI , &c.; & parcellément dans le second, le bras ND est poussé par la force B , tandis que le bras NT est tiré par la somme des tensions des fibres HK , PM , FI , &c. Ainsi, il y aura équilibre, si les moments des forces A & B , par rapport au point N , sont chacun égaux séparément à la somme des moments des tensions des fibres HK , PM , FI , &c., par rapport au même point N .

$$\text{Soient} \begin{cases} AB \text{ ou } CD \dots\dots\dots = a \\ CN \dots\dots\dots = b \\ ND \dots\dots\dots = a - b \\ \text{La hauteur ou épaisseur } NT \\ \text{de la pièce} \dots\dots\dots = h \\ \text{Sa largeur ou dimension hori-} \\ \text{zontale perpendiculaire à} \\ \text{la longueur} \dots\dots\dots = k \\ NR \dots\dots\dots = x \\ \text{Le fillet inférieur } FI \dots\dots = f. \end{cases}$$

La lettre f , qui exprime le dernier fillet FI , peut représenter en même tems la tension, les tensions des fillets du triangle de rupture NFI étant proportionnelles à ces fillets.

On aura les deux équations $A \times b = \int \frac{f k x^2 dx}{h}$,

$B \times (a - b) = \int \frac{f k x^2 dx}{h}$, dans lesquelles on doit faire $x = h$, après les intégrations; ce qui donne $Ab = \frac{f k h^3}{3}$, $B(a - b) = \frac{f k h^3}{3}$. Donc

$A + B = \frac{f k h^3}{3b} + \frac{f k h^3}{3(a-b)}$; mais, d'un autre côté,

on a $A + B = Q$; donc $Q = \frac{f k h^3}{3b} + \frac{f k h^3}{3(a-b)} = \frac{f a k h^3}{3(ab - b^2)}$. Telle est l'expression générale de Q .

II. Lorsque le point N est le milieu de la pièce, on a $b = \frac{1}{2}a$, & $Q = \frac{f k h^3}{3a}$. D'où l'on voit qu'à cause de f donnée & constante, la résistance (toujours mesurée par le poids Q) qu'une pièce de bois équilibrée oppose à être rompue dans son milieu, est comme le produit de la largeur par le carré de la hauteur ou épaisseur, divisé par la longueur de la pièce.

III. En général, les dimensions de la pièce, & la situation du point N étant données, on connoît Q , lorsque l'on connoît f . Or, suivant la septième Table de M. de Buffon (*Mém. de l'Acad.* 1741, pag. 334), une pièce de bois de chêne de 5 pouces d'équarrissage, sur 7 piés on 84 pouces de longueur, se rompt sous la charge de 11525 livres; on a donc alors 11525 livres

$$= \frac{f k x^2 \times x}{1 \times 14} ; \text{ d'où l'on tire } f = 5808,6 \text{ livres;}$$

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

valeur qu'on substituera dans l'expression générale de Q .

IV. On voit, par cette même expression $Q =$

$\frac{f a k h^3}{3(ab - b^2)}$, que tout restant, d'ailleurs le même; le poids Q devient un *minimum*, lorsque le point N se trouve à égales distances des points d'appuis A & B ; car alors le dénominateur $ab - b^2$ devient un *maximum*. Ainsi, le point de la moindre résistance de la pièce, ou le point où elle est le plus exposée à se rompre, sous une charge donnée, est son milieu, ce qui est évident par soi-même.

V. On voit aussi (ce qui est également évident) qu'il est avantageux de poser de champ une pièce de bois; car, toutes choses d'ailleurs égales, la résistance est comme $h^3 k$, lorsque h marque l'épaisseur de la pièce, & k la largeur; & la résistance de la pièce est comme $h k^3$, lorsque k marque l'épaisseur, & h la largeur. Or, en supposant $h > k$, il est visible que $h^3 k$ est plus grand que $h k^3$, dans le rapport de h à k .

VI. Il y a plus: une même pièce de bois de forme originellement cylindrique, peut être équilibrée de plusieurs manières; & parmi ces manières, il faut trouver celle qui rendra un *maximum* la résistance de la pièce posée de champ. Or, pour résoudre ce problème, soit le cercle MAN (fig. 19) la coupe d'une pièce de bois, il s'agit d'équarrir cette pièce en parallélogramme rectangle $ABDC$; de telle sorte que le produit $AC \times AB$ (qui, pour un point donné, représente la résistance de la pièce), soit un *maximum*?

Soient le diamètre $BC = 2a$; $AB = x$; & par conséquent $AC = 4a - x$. Ainsi, $x(4a - x)$ est *maximum*; ce qui donne, par la méthode ordinaire de *maximis* (V. *MAXIMUM*),

$$x = \frac{2a}{2}, \text{ \& } AC = \frac{2a}{2}. \text{ Donc } AB:AC::$$

$1:V2$. D'où l'on voit qu'afin que la pièce soit capable de la plus grande résistance possible, la largeur AB doit être à l'épaisseur AC , comme le côté d'un carré est à sa diagonale.

VII. Examinons maintenant la résistance d'une pièce de bois cylindrique. Je suppose donc que $ABDC$ (fig. 20) représente une telle pièce posée horizontalement sur les deux appuis A & B , & chargée d'un poids R ; que FI soit, comme ci-devant, l'écartement dans la partie inférieure, à l'instant de la rupture. Menons la verticale NT , & coupons, suivant cette ligne, la pièce perpendiculairement à sa longueur; ce qui donne, pour section, le cercle $NLTL$.

Par un point quelconque V de NT , menons dans le cercle la double ordonnée LI . Il est aisé de voir, par l'arête I , qu'en supposant AB ou $CD = m$; $CN = n$; $NT = z$; $FI = f$;

$L I$

$NV = x$: on aura ces deux équations $A \times n = \int f x^2 dx \sqrt{1 - x^2 - xx}$; $B \times (m - n) = \int f x^2 dx \sqrt{1 - x^2 - xx}$, dans lesquelles on doit faire $x = 1$, après les intégrations. Donc (en nommant n le rapport de la circonférence au diamètre), $A \times n = \frac{\pi f r^2}{2}$; $B \times (m - n) = \frac{\pi f r^2}{2}$. Ainsi, $A + B$, on $R = \frac{\pi f r^2 m}{2(n - m - n)}$, expression générale de la résistance d'une pièce de bois, de forme cylindrique.

VIII. Plusieurs praticiens m'ont demandé quelle étoit, à masses égales & en parité de circonférences, celle de deux pièces, l'une cylindrique, l'autre équarrie, en parallélépipède de la manière la plus avantageuse, qui opposoit le plus de résistance à sa rupture. La réponse à cette question se tire facilement des formules précédentes. En effet, il ne faut, pour cela, que comparer l'expression de R avec celle qui a été trouvée pour Q (art. 1), en faisant $m = a$; $n = b$; ensuite à $h = n r^2$; & (V 1) $h = k \sqrt{2}$; ce qui donne $h^2 = n^2 \sqrt{2}$, $A = r \sqrt{n} \cdot \sqrt{2}$. Alors on trouvera $R : Q ::$

$15 : 8 \sqrt{n} \cdot \sqrt{2} :: 15 : 16, 86$, à-peu-près. D'où l'on voit que, pour des longueurs & des masses égales, & sous des charges semblablement posées, la résistance de la pièce cylindrique est un peu moindre que la résistance de la pièce équarrie. Mais il faut considérer, d'un autre côté, que cette dernière pièce devant être tirée d'un arbre originellement cylindrique, on a (en nommant X le rayon de cet arbre), $X^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} = \frac{1}{4} h^2 = \frac{1}{4} n^2 \sqrt{2}$. Donc $X^2 : r^2 :: 3 n \sqrt{2} : 8 :: 13 : 8$, à-peu-près. Ainsi, pour une même longueur, la masse du cylindre dont on tire la pièce de bois équarrie, est plus grande que la masse de la pièce cylindrique, dans le rapport d'environ 13 à 8. Il y a donc une perte de bois assez considérable pour former la pièce équarrie ; ce qui donne, à cet égard, de l'avantage à la pièce cylindrique. Reste à savoir si, dans deux arbres de même nature, inégaux en grosseurs, les tenacités ou résistances des fibres élémentaires sont les mêmes. C'est sur quoi il faut interroger l'expérience.

Il y auroit plusieurs autres problèmes à résoudre sur ce sujet ; mais il suffit d'en avoir établi les principes (L. B.)

BOIS, au jeu de trictrac, se dit en général des dames avec lesquelles on joue. Voyez DAME & TRICTRAC.

BOOTES. (Astron.) Voyez BOUVIER.

BORÉAL (Astron.) se dit de tout ce qui est du côté du nord ou du septentrion.

BOUC, (Astron.) est le nom que quelques auteurs ont donné à la constellation du capricorne ; d'autres à la belle étoile de la chèvre, qui est dans la constellation du cocher. (D. L.)

Bouc : on donne ce nom, dans les machines hydrauliques, à une espèce de poulie garnie de cornes de fer qui sont monter & descendre une chaîne sans fin. C'est par le moyen d'un bouc que les eaux sont élevées du puits salé de Moyennic.

BOUFFÈES, en termes d'Hydraulique, est synonyme à *secouffes*.

Lorsque les jets sont engorgés par les vents, ils ne sortent que par bouffées ; c'est-à-dire, par secouffes. (K)

BOULE, au jeu de quilles, c'est un morceau de bois parfaitement rond, & percé d'un trou pour mettre le pouce, & d'une espèce de mortaise pour les autres doigts de la main. Elle sert à abattre les quilles.

BOULE, (jeu de) exercice fort connu. On le joue à un, deux, trois contre trois, ou plus même, avec chacun deux boules pour l'ordinaire : les joueurs fixent le nombre des points à prendre dans la partie à leur choix. C'est toujours ceux qui approchent le plus près des buts qui comptent autant de points qu'ils y ont de boules. Ces buts sont placés aux deux bouts d'une espèce d'allée très-unie, rebordée d'une petite berge de chaque côté, & terminée à chacune de ses extrémités par un petit fossé appelé *rayon*. Voy. NOYON. Quand on joue, si quelque joueur ou autre arrête la boule, le coup se recommence. Il n'est pas permis de taper des pieds pour faire rouler la boule davantage, ni de la pousser en aucune façon, sous peine de perdre la partie. Une boule qui est entrée dans le rayon, & a encore assez de force pour revenir au but, ne compte point : un joueur qui joue devant son tour, recommence si l'on s'en aperçoit ; celui qui a passé son tour, perd son coup. Il est libre de changer de rang dans la partie, à moins qu'on ne soit convenu autrement. Qui change de boule n'est obligé qu'à reprendre la sienne, & rejouer son coup si personne n'a encore joué après lui ; mais si quelqu'un a joué, il remet la boule à la place de celle qu'il a jouée, si l'autre veut jouer avec sa boule. L'adresse d'un joueur consiste à donner à la boule le degré de force nécessaire pour arriver au but ; pour cela, il faut qu'il fasse attention à la pesanteur, & qu'il tourne toujours le foot vers l'endroit du jeu le plus raboteux, ce qui varie cependant selon la disposition du terrain & la qualité de la boule.

BOULE, avoir la boule ; c'est, au jeu de ce nom, avoir droit de jouer le premier. Ce droit s'acquiert en jetant une quille vers la boule ; celui dont la

qu'elle est restée le plus près de la *boule*, jône le premier, & est dit avoir la *boule*.

BOULE, au jeu de mail, est une pièce de bois, ou d'autre bois très-dur bien tournée, que l'on chasse avec la malle ou mail. Voyez MAIL. Ces boules doivent être d'un poids proportionné à celui du mail, c'est-à-dire, environ de moitié. Si le mail dont on se sert pèse dix onces, il faut que la *boule* en pèse cinq, & ainsi des autres. Les meilleures de ces boules viennent des pays chauds.

Boules qui ne s'éventent pas au jeu de mail, sont des boules qui ne faient point, & qui ne se détournent point de leur chemin naturel.

BOUSSOLE. Voyez MAGNÉTISME; & pour l'usage de la boussole dans la levée des plans, voyez PLAN.

BOUSSOLE, (*Astron.*) constellation méridionale, établie par M. de la Caille dans son *Planisphere austral*: il l'appelle en latin *Pixis australis*; elle est située sur la proue de l'ancienne constellation du vaisseau. La principale étoile de cette constellation est de cinquième grandeur; son ascension droite, en 1750, étoit de 128° 23' 39", & sa déclinaison 32° 18' 10" australe; en forte qu'elle s'élève de 9 degrés à Paris. (*D. L.*)

BOUSSOLE, instrument d'Astronomie; il sera décrit dans le *Dictionnaire de Physique*. Il nous suffit de dire ici que la déclinaison de la boussole à Paris est, en 1783, d'environ 21 degrés à l'ouest. Voyez DÉCLINAISON.

BOUVIER, (*Astron.*) *Bootes*, constellation boréale qui a 43 étoiles, suivant Flamsteed.

On l'appelle aussi *Boots*, *Bubulus*, *Bubulus*, *Tardi-bubulus*, *Pestor*, *Custos boum*, *Clamator*, *Vociferator*, *Plauftri custos*, *Custos Erimantidos*, *Ufse*, *Arcturus*, *Arcturus minor*, *Septentrio*, *Philomelus* (fils de Cérés), *Icarus*, *Lycaon*, *Orion*, *Arcas*, *Lanceator*, *Venator Ufse*, *Arctophylax*. La belle étoile de cette constellation est appelée aujourd'hui généralement *Arcturus*; chez les Arabes, *Aramech*. Homère dit que cette étoile est d'un prestige funeste. Plaine l'appelle aussi *Sidas Horridum*.

On a appelé cette constellation *Atlas*; & l'on disoit qu'il portoit l'axe du monde, parce que, autrefois, la tête étoit fort près du pôle. Voyez le *Mémoire* de M. Dupuis, *Astron.* p. 410 & 423. Il épouse Hesperis, & il en naît sept filles; parce que quand cette constellation se couche, les Pléiades se lèvent: en effet, les sept étoiles des Pléiades sont appelées *Atlantides* ou filles d'*Atlas*.

Germanicus César dit que ce *bouvier* ou ce pasteur, qu'on a placé dans le ciel, étoit Icare, père d'Érigone, dont nous parlerons à l'article de la vierge; Bacchus lui avoit appris l'art de faire le vin pour l'enseigner aux hommes: il fut lapidé par des bergers qui étoient ivres. Sa fille découvrit le corps de son père par le moyen d'un chien qui lui étoit resté fidèle; elle se tua de dé-

sespoir, & elle fut placée dans le ciel avec son père & son chien. Voilà pourquoi Propercé appelle *bovius* d'Icare les sept étoiles de la grande ourse.

Fledant Icarii sidera tarda boves.

D'autres prétendent que le *bouvier* est Arcas, fils de Jupiter & de Callisto, qui enseigna aux hommes la manière de faire du pain, après l'avoir apprisé de Triptolème, & fut déshé par la reconnaissance des hommes.

Suivant M. Dupuis, il étoit naturel de placer un moissonneur pour marquer l'entrée du soleil dans le signe de la vierge, qui est une moissonneuse. Il y trouve aussi le fondement de la fable du roi Ériopion, dont il est parlé à l'occasion d'Orion: c'est le prince Boivin qui fait allusion à Icare, à qui Bacchus découvrit l'art de cultiver la vigne. Il est détrôné par Cronos ou persécuté par Persée, parce qu'on lever de Persée il se cachoit derrière les montagnes. (*Astr. IV*, 423.)

En effet, la constellation du *bouvier*, quoique fort septentrionale, descend sous l'horizon & se couche pour nous, comme le remarque Ovide:

Tingitur oceano cuflos erimantidos ufse,
Aequoraque fuis fidere turbat aquas.

Trist. I, 4, 1.

Le coucher comique du *bouvier*, c'est-à-dire, le tems où il se couche & son soleil levant, est annoncé, par Ovide, pour le cinquième de mars.

Sive est arctophylax, sive est piger ille bootes
Mergetur, vifus effugietque tuos.

Fast. III, 405.

Plutarque donne le nom de janus à une des étoiles de cette constellation, & M. Dupuis observe qu'effectivement cette constellation, du tems de Numa, marquoit le minuit du solstice d'hiver & le commencement de l'année des Romains. Ce génie à quatre visages portoit les clefs du tems, avoit douze autels à ses pieds pour représenter les douze mois, & le nombre de 365 dans les mains: il semble donc que ce n'étoit autre chose que la constellation qui étoit le départ de l'année & des sphères, & ouvroit la marche du tems. (*D. L.*)

B R A

BRACHYSTOCHRONÉ, f. f. (*Mécanique*) est le nom que Jean Bernoulli, alors professeur de Mathématique à Groningue, a donné à une courbe *A C B* (*pl. Méchan. fig. 21*) dont la propriété est telle qu'un corps qui tombe du point *A*, en vertu de sa pesanteur, le long de la concavité de cette courbe, arrive de *A* en *B* en moins de tems qu'il n'y arriveroit, s'il descendoit le long de toute autre courbe *A D B*, passant par les

F t ij

mêmes points A, B , ou même s'il descendoit le long de la droite AB . Il proposa aux géomètres, en 1697, de déterminer quelle étoit cette courbe. Le problème fut résolu par Jacques Bernoulli son frère, professeur de Mathématique à Bâle, par Leibnitz, par le marquis de l'Hôpital & par Neuton. Jean Bernoulli avoit averti les géomètres, dans son programme, que la ligne droite A, B , passant par les deux points A, B , quoiqu'elle fût la plus courte de toutes celles qu'on pouvoit faire passer par ces points, n'étoit pas néanmoins celle qu'un corps pesant, tombant de A , devoit parcourir en moins de tems; & en effet, on trouva que c'étoit une cycloïde, ou plutôt un arc de cycloïde passant par les points A, B , & dont le point A étoit l'origine. Voyez *Cycloïde*.

Il n'est pas impossible de faire sentir à ceux même qui sont peu versés dans la Mécanique transcendante, comment il peut se faire que la ligne droite AB ne soit pas la ligne de la plus courte descente. Car imaginons la ligne horizontale EC qui partage la courbe ACB en deux parties AC, CB , telles que la partie AC soit plus courte que AE , & la partie CB plus longue que EB ; il est certain que le corps A arrivera en C plutôt qu'il n'arriveroit en E , puisqu'il aura moins de chemin à faire. Il est vrai qu'il emploiera ensuite plus de tems à parcourir CB , qu'il n'en mettra à parcourir EB ; mais il faut remarquer que les tems employés à parcourir les lignes AE, AC, CB, EB , ne sont point entr'eux comme ces lignes, parce que le corps ne les décrit pas d'un mouvement uniforme: ainsi, il ne doit pas paroître impossible que l'excès du tems par AE sur le tems par AC , soit plus grand que l'excès du tems par CB sur le tems par EB . Ainsi, de ce que la ligne droite AB est plus courte que la ligne courbe ACB , il ne s'ensuit nullement que la ligne droite AB doive être descendue en moins de tems que la ligne courbe ACB . L'espèce de raisonnement métaphysique que nous venons de faire, peut bien servir à faire soupçonner que la ligne de la plus vite descente peut être une courbe: mais ce raisonnement ne sauroit jamais être une démonstration. C'est par le calcul seul qu'on peut s'assurer si ce qu'on a soupçonné est vrai, & le calcul démontre en effet qu'on a soupçonné juste. Voici à-peu-près comment on s'y prend pour déterminer la courbe de la plus vite descente. Soit ACB cette courbe, & ayant pris un arc infiniment petit Ce , soit imaginé un arc quelconque infiniment petit COe , terminé aux points C, e ; il est évident que le corps pesant arrivé en C , doit parcourir l'arc Ce en moins de tems que l'arc COe : car s'il étoit moins de tems à parcourir l'arc COe , alors ce serait $ACOeB$, & non ACB qui seroit la courbe de la plus vite descente, ce qui est contre l'hypothèse. Ainsi, la propriété de la courbe dont

il s'agit est telle qu'un de ses arcs quelconques infiniment petit Ce , est parcouru en moins de tems que tout autre arc infiniment petit COe , passant par les mêmes points C, e .

Maintenant, soient imaginés les points infiniment proches C, e ; & soit cherchée sur la ligne horizontale QL (fig. 22) la position du point K , tel que CKe soit parcouru en moins de tems que tout autre chemin CKe passant par C & e : on trouvera (voyez RÉFRACTION) en menant les lignes KR, er , perpendiculaires à QL , que le sinus de l'angle CKR doit être au sinus de Ker , comme la vitesse le long de CK à la vitesse le long de Ke ; d'où il s'ensuit que la courbe cherchée doit être telle que le sinus de l'angle qu'un de ses côtés quelconques infiniment petit CK fait avec la verticale KR , soit proportionnel à la vitesse en K , laquelle vitesse est comme la racine quarrée de la hauteur d'où le corps est parti. Or en achevant le calcul, on trouve que cette propriété convient à la cycloïde. Voy. *Cycloïde*.

Si l'on supposoit qu'un corpuscule de lumière traversât l'atmosphère, de manière qu'il arrivât d'un point à un autre dans le plus court tems possible, la courbe qu'il décrirait seroit une *brachyochrone*, pourvu que l'on fit certaine hypothèse sur la densité du milieu. Voyez RÉFRACTION, ACTION, CAUSES FINALES.

Voyez dans les *Mémoires de l'Académie de 1718*, deux solutions du problème de la *brachyochrone*, données par Jean Bernoulli, & toutes deux fort simples. Galilée a cru fausement que la *brachyochrone* étoit un arc de cercle. La Géométrie, de son tems, n'étoit pas encore assez avancée pour résoudre ce problème. On trouve dans le second volume de la *Mécanique* de M. Euler, imprimé à Pétersbourg en 1736, une solution très-élégante de ces problèmes, & des théorèmes fort simples & fort généraux sur les propriétés de la *brachyochrone*. La solution du problème devient beaucoup plus difficile lorsqu'on suppose que le corps se meut dans un milieu résistant, parce qu'alors la vitesse ne dépend pas de la hauteur seule. M. Euler a donné aussi la *brachyochrone* pour ce cas-là, ce que personne n'avoit encore fait avant lui. (O)

BRACON, f. m. (*Machine hydraulique*) : on appelle *bracon* d'un vanneau, d'une porte d'écluse, la console, la potence, ou l'appui qui soutient cette porte. (*K*)

BRANCHE de courbe, terme de Géométrie. Pour entendre ce que c'est que *branche* de courbe, imaginez une courbe géométrique, dont on a l'équation en x & en y , x représentant les abscisses, & y les ordonnées. Voyez COURBE, ABSCISSE, ORDONNÉE, &c. Il est évident:

1°. Qu'en prenant x positive, y aura un certain nombre de valeurs correspondantes à la même valeur de x .

2.^e Qu'en prenant x négative, y aura de même un certain nombre de valeurs correspondantes à la même x .

Or la courbe a autant de branches que y a de valeurs répondantes aux x tant positives que négatives. Voyez à l'article COURBE, pourquoi les ordonnées positives se prennent du même côté de l'abscisse, & les négatives du côté opposé.

Au reste, il est bon d'observer que les géomètres n'ont pas encore bien fixé la signification du mot *branche*. Par exemple, soit une courbe qui ait pour équation $y = \frac{xx}{a^2} + x + \frac{5}{6}a$, on regarde d'ordinaire

cette courbe comme n'ayant qu'une seule *branche*, parce que y n'a qu'une seule valeur. Cependant cette *branche* est quelquefois comptée pour deux, parce qu'elle s'étend à l'infini du côté des x positives, & du côté des x négatives. Introduit à l'analyse des lignes courbes par M. Cramer.

On appelle *branche infinie* une *branche* de courbe qui s'étend à l'infini.

L'hyperbole & la parabole ont des branches infinies. Mais le cercle & l'ellipse n'en ont point; ce sont deux courbes qui rentrent en elles-mêmes.

Les branches infinies d'une courbe sont ou *paraboliques* ou *hyperboliques*.

Les branches *paraboliques* sont celles qui peuvent avoir pour asymptote une parabole d'un degré plus ou moins élevé. Par exemple, la courbe dont l'équation seroit $y = \frac{x^3}{a^3} + \frac{b^2}{x}$, auroit une *branche infinie parabolique*, qui auroit, pour asymptote, une parabole ordinaire, dont l'équation seroit $y = \frac{x^3}{a^3}$. En effet, x étant infinie, l'équation se réduit à $y = \frac{x^3}{a^3}$, qui est celle de la parabole ordinaire.

De même, si l'équation étoit $y = \frac{x^4}{a^4} + \frac{b^3}{x^2}$, on trouveroit que la *branche infinie* auroit pour asymptote une parabole du troisième degré $y = \frac{x^4}{a^4}$.

Les branches *hyperboliques* sont celles qui ont, pour asymptote, une ligne droite; elles peuvent aussi avoir, pour asymptote, une hyperbole d'un degré plus ou moins élevé. Par exemple, la courbe $y = \frac{x^3}{a^3} + \frac{b^3}{x}$ dont nous venons de parler, se réduit à $y = \frac{b^3}{x}$, lorsque $x = 0$; elle a pour asymptote l'ordonnée infinie qui passe par l'origine, & elle peut avoir aussi pour asymptote l'hyperbole ordinaire.

De même la courbe $y = \frac{x^4}{a^4} + \frac{b^4}{x^2}$ a pour asymptote l'ordonnée infinie, qui passe par le point où $x = 0$; & elle a aussi pour asymptote une hyperbole cubique,

Il est visible que toutes les branches infinies sont ou *hyperboliques* ou *paraboliques*. Car soit dans l'équation d'une courbe y exprimée en x par une série dont tous les termes soient réels; il est évident que quand x sera infinie ou infiniment petite, toute cette équation se réduit à $y = x^m$, tous les autres termes étant alors regardés comme nuls. Or la *branche* sera *parabolique*, si m est positif & plus grand que 1, & *hyperbolique*, si m est négatif, ou 0, ou 1. Voyez SÉRIE.

Au reste, il ne faut pas croire que cette équation $y = x^m$ qui détermine si une *branche* est *hyperbolique* ou *parabolique*, soit suffisante pour connoître le nombre & la position des branches. Par exemple, soit $y = \frac{x^3}{a^3} + \sqrt{ax}$; en faisant x infinie,

on a $y = \frac{x^3}{a^3}$, & l'on voit que la *branche* est *parabolique*. De plus, on est tenté de croire que cette courbe aura, comme la parabole, deux branches infinies, l'une du côté des x positives, l'autre du côté des x négatives. Mais on se trompe; car x étant négatif, l'ordonnée $y = \frac{x^3}{a^3} + \sqrt{ax}$ sera imaginaire. On peut bien négliger $\sqrt{ax}$ vis-à-vis de $\frac{x^3}{a^3}$, lorsque $\sqrt{ax}$ & $\frac{x^3}{a^3}$ sont tous deux réels; mais, lorsque $\sqrt{ax}$ devient imaginaire, alors ce terme $\sqrt{ax}$ rend imaginaire $\frac{x^3}{a^3}$, & on ne sauroit conserver l'un sans l'autre. Je suis le premier qui ait fait cette remarque. Voy. les Mémoires de l'Acad. Royale des Sciences de Prusse, année 1746. Voyez aussi REBROUSSEMENT.

On trouvera une théorie très-complète des branches infinies des courbes, dans le viij. chapitre de l'introduction à l'analyse des lignes courbes, par M. Cramer. Il y donne la méthode de déterminer les différentes branches d'une courbe, & leurs asymptotes droites ou courbes. Comme cette théorie nous conduiroit trop loin, nous renvoyons là-dessus à son ouvrage. On trouve aussi d'excellentes choses sur ce sujet dans les usages de l'analyse de Disjuncta, par M. l'abbé de Gua. (O)

BRASSARD, f. m. instrument de bois dont on se sert pour jouer au ballon; c'est une douille de bois de chêne assez mince, de la longueur de l'avant-bras qu'on y fait entrer à force avec des mouchoirs, & serviettes, on autres linges. On peut avec le bras ainsi armé, recevoir le ballon & le frapper si fort que l'on vent sans se blesser. La surface du brassard est taillée en grosses dents, afin que le coup ne glisse pas sur le ballon.

Les anciens à qui le jeu de ballon n'étoit pas inconnu, ont eu aussi leurs brassards; mais ils n'étoient pas de bois; c'étoient des courroies d'un

chir fort, dont ils faisoient plusieurs tours sur leurs bras.

B R E

BREDOUILLE, f. f. terme de *Trictrac* : on appelle ainsi le jetton qui sert à marquer que les points qu'on a, ou les a pris sans interruption : ainsi, je gagne quatre points, je marque ces quatre points avec un jetton accompagné de celui de la *bredouille* : j'en gagne encore deux, qui avec quatre que j'avois font six, je marque ces six points avec un jetton, toujours accompagné de celui de la *bredouille*. Mon adversaire joue, il gagne deux points ; alors je perds la *bredouille*, & c'est lui qui la gagne, & qui la conservera jusqu'à ce que je la lui ôie en lui gagnant quelques points avant qu'il en ait pris douze ; alors nous ne l'avrons ni l'un ni l'autre ; car nous nous serons interrompus tous les deux en prenant alternativement des points. Si l'on gagne douze points sans interruption, ou, comme on dit au jeu, douze points *bredouille*, on marque deux trous ; s'ils ne sont pas *bredouille*, on ne marque qu'un trou.

S'il y a des trous *bredouille*, il y a aussi des parties *bredouille*. La partie du *trictrac* est de douze trous ; on la gagne *bredouille* quand on prend ces douze trous tout de suite & sans interruption. Il y a des joueurs qui la font payer double.

Pour que le trou & la partie soient *bredouille*, il n'est pas nécessaire que votre adversaire ne prenne point de trous ni de points ; il suffit que vous fassiez vos douze points ou vos douze trous tout de suite ; que votre adversaire eût des points ou des trous avant que vous en prissiez, cela est indifférent.

BRELAND, f. m. (jeu de cartes) ; il se joue à tant de personnes que l'on veut : mais il n'est beau, c'est-à-dire, très-ruineux, qu'à trois ou cinq. L'ordre des cartes est as, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six : l'as vaut onze points ; le roi, la dame, le valet & le dix, en valent dix ; les autres cartes comptent autant de points qu'elles en portent ; on laisse rarement les six dans le jeu.

On donne trois cartes, ou par une, ou par deux & ure, ou par une & deux, mais non par trois. Si un joueur a dans ses trois cartes, l'as, le roi & la dame d'une même couleur, il compte trente-un ; s'il a l'as & le dix, il compte vingt-un ; s'il a le dix, le neuf & le sept, il compte vingt-six, & ainsi des autres cartes ou jeux qui peuvent lui venir.

S'il a dans ses trois cartes, ou trois as, ou trois rois, ou trois valets, &c., il a *breland*. Un *breland* est supérieur à quelque nombre de points que ce soit ; & entre les *brelands*, celui d'as est supérieur à celui de rois ; celui de rois à celui de dames, & ainsi de suite.

Les as, ou plus généralement les cartes qui se trouvent dans la main des joueurs, emportent toutes les cartes inférieures de la même couleur qui se trouvent aussi sur le jeu ; ainsi, si un joueur a trois cœurs par le valet, & qu'un autre joueur

ait ou l'as, ou la dame, ou le roi de cœurs sent ou accompagné, il ne reste rien au premier, & le second a quatre cœurs au moins. Il n'y a d'exception à cette règle que le cas du *breland* ; les as mêmes n'emportent point les cartes qui sont *breland* dans la main d'un joueur.

Celui qui donne met seul au jeu ; cet enjeu s'appelle *passé*, & la *passé* est si forte ou si foible qu'on veut. Il y a primauté entre les joueurs. Celui qui est le plus à droite du donneur, prime sur celui qui le suit ; celui-ci sur le troisième, & ainsi de suite. Le donneur est le dernier en carte. A égalité de points entre plusieurs joueurs, le premier en carte a gagné.

On n'est jamais forcé de jouer ; si l'on a mauvais jeu, on *passé* ; si tout le monde *passé*, la main va à celui qui étoit le premier en carte ; il joint son enjeu au précédent, & il y a deux *passés* ; le nombre des enjeux ou *passés* augmente jusqu'à ce que quelqu'un joue. Mais si un joueur dit, *je joue*, n'écrit-il point de concurrent, il tire toutes les *passés* qui sont sur jeu, sans même être obligé de montrer son jeu.

Si un joueur dit, *je joue*, il met autant d'argent sur jeu qu'il y a de *passés* ; si un autre joueur dit aussi, *je joue*, il en fait autant, & ainsi de tous ceux qui joueront : puis ils abattent leurs cartes. Ils s'envoient les uns aux autres les cartes de même couleur, inférieures à celles qu'ils ont ; & celui qui compte le plus de points dans les cartes d'une seule couleur, a gagné : ou s'il y a des *brelands*, celui qui a le *breland* le plus haut ; ou celui qui a un *breland*, s'il n'y en a qu'un, tire tout l'argent qui est sur le jeu.

Il faut observer que la carte retournée est du nombre de celles qui peuvent être enlevées ou par celui qui a dans la main la carte la plus haute de la même couleur, ou de préférence par celui qui a trois autres cartes, non de la même couleur, mais de la même espèce : ainsi, dans le cas où la carte retournée seroit un dix, le joueur qui auroit trois dix en main, auroit de droit le quatrième ; ce qui lui formeroit le jeu qu'on appelle *tricon*. Le *tricon* est le jeu le plus fort qu'on puisse avoir ; cependant ce jeu n'est pas sûr.

Si le *breland* est un jeu commode, en ce qu'on ne joue que quand on veut, c'est un jeu cruel, en ce qu'on n'est guère libre de ne jouer que ce qu'on veut. Tel se met au jeu avec la résolution de perdre ou de gagner un louis dans la soirée, qui en perd so en un coup. C'est votre tour à parler, vous croyez avoir jeu de risquer la valeur de la *passé* ; je suppose qu'elle soit d'un écu, vous dites, *je joue*, & vous mettez au jeu un écu. Celui qui vous suit, croira pouvoir aussi risquer un écu, & dira, *je joue*, & mettra son écu : mais le troisième croira son jeu meilleur qu'un écu ; il dira, *je joue aussi, voilà l'écu de la passé*, mais j'en mets vingt, trente, quarante en sus. Le quatrième joueur, ou *passé*, ou tient, ou enchérit.

S'il passe, il met ses cartes au talon ; s'il tient, il met & l'écu de passe, & l'enclère du troisième joueur ; s'il enchérit, il met & l'écu de passe, & l'enclère du troisième joueur, & son enclère particulière. Le cinquième joueur choisit aussi de passer, de tenir ou de pousser. S'il tient, il met la passe, l'enclère du troisième, & celle du quatrième ; s'il pousse ou enchérit, il ajoute encore son enclère. Le jeu se continue de cette manière, jusqu'à ce que le tour de parler revienne à celui qui a joué le premier ; il peut ou passer, en ce cas il perd ce qu'il a déjà mis sur jeu ; ou tenir, en ce cas il ajoute à sa mise la somme nécessaire pour que cette mise & son addition fassent une somme égale à la mise totale du dernier enchérisseur, ou il pousse & enchérit lui-même ; & en ce cas, il ajoute encore à cette somme totale son enclère. Les enclères ou tenues se continuent, & vont aussi loin que l'acharnement des joueurs les entraîne, à moins qu'elles ne soient arrêtées tout court par une dernière tenue faite dans un moment où celui qui tient, ajoutant à sa mise ce qui manque pour qu'elle fasse avec son addition une somme totale égale à la dernière enclère, tous les joueurs se trouvent avoir sur le jeu la même somme d'argent, excepté celui qui a fait, à qui il en coûte toujours la passe de plus qu'aux autres. En général, tout joueur qui a moins d'argent sur jeu qu'un autre joueur peut enchérir, & les enclères se poussent nécessairement jusqu'à ce qu'il arrive une tenue au moment où la mise de tous ceux qui ont suivi les enclères, est absolument égale.

Il faut savoir qu'on n'est point obligé de suivre les enclères, & qu'on les abandonne quand on veut ; mais aussi qu'on perd en quittant, tout ce qu'on a mis d'argent sur le jeu : il n'y a que ceux qui suivent les enclères jusqu'au bout, qui puissent gagner.

Lorsque tous les joueurs qui ont suivi les enclères sont réduits à l'égalité de mise & arrêtés par quelque tenue, ils abattent leurs cartes, ils les distribuent celles qui leur appartiennent par le droit de supériorité de celles qu'ils ont, s'il n'y a point de *brelard* ; & celui qui forme le point le plus haut dans les cartes d'une même couleur, gagne tout. S'il y a un *brelard*, celui qui l'a, tire ; s'il y en a plusieurs, tout l'argent appartient au plus fort *brelard*, à moins qu'il n'y ait un tricon : le tricon a barre sur tout. Il n'y a de ressource contre le tricon, que d'avoir plus d'argent que lui, & que de le forcer à quitter par une enclère qu'il n'est pas en état de suivre. C'est par cette raison que nous avons dit que le tricon étoit le plus beau jeu que l'on pût avoir, sans toutefois être un jeu sûr.

Tel est le jeu qu'on appelle *brelard* : il n'y a peut-être aucun jeu de hasard plus terrible & plus attrayant. Il est difficile d'y jouer sans en prendre la fureur : & quand on en est possédé, on ne peut

plus supporter d'autres jeux ; ce qu'il faut, je crois, attribuer à ses révolutions, & à l'espérance qu'on a de pousser le gain tant qu'on veut, & de recouvrer en un coup la perte de dix séances malheureuses ; espérances extravagantes, car il y a démonstration morale que le gain ne peut aller que jusqu'à un certain point ; & il est d'expérience que le grand gain rend les joueurs plus réfrés & plus timides, & que la grande perte les rend plus avides & plus téméraires. La police n'a pas tardé à sentir les tristes suites de ce jeu, & il a été pros crit sous les peines les plus sévères : cependant il se joue toujours, & je suis convaincu que les hommes n'y renonceroient que quand ils en auroient inventé un autre qui soit aussi égal & plus orageux ; deux conditions difficiles à remplir, car il faut convenir que le *brelard* est un jeu très-égal, quand l'enclère la plus forte est bornée.

BRICOLE, f. m. (*Méch*). On dit au jeu de billard qu'une bille en frappe une autre par bricole, lorsqu'au lieu d'être poussée directement contre elle, elle ne vient la rencontrer qu'après avoir frappé la bande du billard, & avoir été renvoyée par cette bande.

Soit *F* une des billes, & *A* l'autre, (*Méch*, fig. 23), *H G* la bande du billard ; si on pousse la bille *F* suivant *FE*, & que renvoyée suivant *EA* par le point *E* de la bande, elle vienne choquer la bille *A*, cela s'appelle *choquer de bricole*. Pour trouver le point *E* de la bande auquel il faut pousser la bille *F* pour choquer la bille *A* de bricole, menez de la bille *A* la perpendiculaire *AG* à la bande *GH*, & prolongez-la de manière que *GB* soit égal à *AG* ; ensuite visez de *F* en *B*, & poussez la bille *F* suivant *FB* ; le point *E* où *FB* coupe *GH*, sera le point de bricole : car tirant *FE* & *AE*, il est aisé de démontrer que l'angle *FEH* est égal à l'angle *AEG*. Donc, suivant les lois de la réflexion des corps, (*Voyez* RÉFLEXION), la bille poussée suivant *FE*, rebondira suivant *FA*.

Au reste les bons joueurs, par la seule habitude, trouvent ce point *E* sans préparation, & les maladroits le manquent avec cet échafaudage.

On peut donner aussi des règles géométriques pour toucher une bille par deux *bricoles* ou davantage ; mais elles seroient plus curieuses dans la théorie, qu'utiles dans la pratique. *Voyez* l'article Miroir, où l'on traite assez au long de la réflexion simple ou multiple des rayons ; réflexion qui représente parfaitement les *bricoles* simples ou multiples d'une bille de billard. (*O*)

BRINEK, f. m. (*Astronomie*). nom que les Arabes donnent à la belle étoile de la Lyre.

BRISE, f. f. (*Architect.* *Hydraulique*) c'est une poutre en bécule, posée sur la tête d'un gros picu, laquelle sert à appuyer par le haut les aiguilles d'un portais. (*X*)

BRUSQUEMBILLE, (jeu de la). On peut jouer à la *brusquebille* deux, trois, quatre ou cinq; mais il est bon d'observer qu'à deux & à quatre on ne joue qu'avec trente-deux cartes, qui sont les mêmes que celles avec lesquelles on joue au piquet; & lorsque l'on joue trois ou cinq, il faut que le jeu soit composé de trente cartes seulement; c'est-à-dire qu'on enlèvera deux sept, n'importe lesquels. Lorsqu'on joue à quatre, l'on est deux contre deux; & l'on se met ensemble, afin de pouvoir se communiquer le jeu.

Les *brusquebilles* sont les as & les dix; elles enlèvent les autres cartes de la même couleur, mais elles sont enlevées par les triomphes; le reste des cartes conserve le rang & la supériorité ordinaires.

Lorsque l'on joue en partie, c'est-à-dire un contre un, deux contre deux, on convient d'abord de ce qu'on jouera; & si l'on joue trois ou cinq, on prend un certain nombre de jettons que l'on fait valoir ce qu'on veut; celui qui mêle, donne à couper à sa gauche, & distribue ensuite à chaque joueur trois cartes, une à une ou toutes ensemble, en prend autant pour lui, & en retourne une dessus le talon, qui est celle qui fait la triomphe, & qu'il met retourne à moitié sous le talon, de manière qu'on puisse la voir. Celui qui est premier, jette la carte qu'il veut de son jeu; le second joue ensuite sur cette carte celle de son jeu qu'il juge à-propos, & ainsi des autres, chacun à son tour. Celui qui gagne la main, prend une carte au talon; chacun des autres joueurs en fait autant, en allant de droite à gauche; l'on recommence à jouer comme au premier coup, & l'on continue jusqu'à ce que toutes les cartes du talon soient prises, chaque joueur y en prenant une pour remplacer celle de son jeu qu'il jette à chaque coup; & celui qui prend la dernière carte, prend la triomphe qui retourne.

J'ai dit que le second à jouer jettoit la carte que lui-même sembleroit, parce qu'un n'est point obligé de fournir à ce jeu de la couleur de la carte jouée, encore qu'on en ait; il n'y a point de renonce; on peut couper une carte à laquelle on auroit pu fournir, voilà la manière de jouer le jeu. On recommence à chaque tour de la même façon, jusqu'à ce que l'on ait joué les coups dont on est convenu. Il y a quelques personnes qui prétendent qu'on ne peut renoncer, lorsqu'une fois toutes les cartes du talon sont levées, & qu'il faut couper absolument si l'on n'a pas de la couleur jouée; mais je crois que cela dépend de la volonté des joueurs. Passons aux droits qui se paient à ce jeu.

Celui qui joue la *brusquebille* de l'as & de la triomphe, reçoit deux jettons de chacun. Il retire également deux jettons de chaque joueur, pour tous les as qu'il jouera après, pourvu qu'il fasse la levée; car s'il ne la faisoit, au lieu de gagner deux jettons de chaque joueur, il est obligé de leur en payer deux à chacun. Il en est de même des dix, qui

valent de chaque joueur un jetton chacun; mais s'il ne lève pas la main, il est obligé d'en donner un à chaque joueur. Celui qui a plus de points dans les levées qu'il a faites, gagne enfin la partie. Voici la manière de compter ces points. Après que toutes les cartes du talon ont été prises, & que l'on a joué toutes les cartes que l'on avoit en main, chacun voit les levées qu'il a, & comme onze points pour chaque as, dix pour chaque dix, quatre pour chaque roi, trois pour chaque dame, deux pour chaque valet, & les autres ne sont comptés pour rien. Celui qui, en comptant ainsi, se trouve avoir plus de points, gagne la partie; l'on doit par conséquent tâcher de faire des levées où il y ait beaucoup de points, des as, des rois, des dames, des dix & des valets, afin de pouvoir gagner le jeu. L'usage & le bon sens apprendront mieux à jouer ce jeu, que tout ce que nous pourrions en dire, la situation du jeu demandant de jouer un même coup tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il est quelquefois bon d'avoir la main, d'autrefois de l'abandonner à son adversaire. En général, pour bien jouer la *brusquebille*, il faut une grande attention pour voir, non-seulement les triomphes qui sont déjà sortis, mais encore les *brusquebilles* qui sont passées & celles qui sont encore dans le jeu, afin d'en faire son avantage en jouant.

Voici quelques règles qui pourront rendre plus complète la connoissance qu'on a déjà de ce jeu, sur ce que nous en avons dit. Celui qui mêle & trouve une ou plusieurs cartes retournées, ou en retourne lui-même, refait, sans autre peine. Si le jeu de carte est faux par une carte de moins, tout ce qui a été payé dans le coup est bien payé; mais on ne peut gagner la partie, & l'on cesse de jouer pour deux cartes qui manqueraient, aussi-tôt qu'on s'en aperçoit; si le coup est fini, il est bon. Celui qui joue avant son rang, ne peut reprendre sa carte. Celui qui a jeté sa carte, ne sauroit y revenir sous quelque prétexte que ce soit. Celui qui prendroit avant son tour une carte du talon, s'il a joint à son jeu la carte prise au talon, paie à celui à qui elle auroit été de droit, la moitié de ce qui est au jeu, & il la lui rend; & s'il ne l'avoit pas jointe à son jeu, mais vû seulement, il donneroit deux jettons à chaque joueur, & la laisseroit aller à qui doit la prendre de droit. Celui qui en tirant sa carte du talon en voit une seconde, paie deux jettons à chaque joueur. Lorsque l'on joue en partie deux contre deux, si l'un des joueurs, en prenant sa carte du talon, voit celle qui doit aller à son adversaire, il leur est libre de recommencer la partie; & si la carte vû revient à lui ou à son compagnon, le jeu se continue. Il n'y a point de renonce, & l'on n'est point forcé de mettre plus haut sur une carte jouée. Celui qui ayant accusé avoir un certain nombre de points, en auroit davantage, & ne les accuseroit qu'après que les cartes seroient trouillées, ne pourroit y revenir, & perdrait

& perdrait la partie, si un autre joueur avoit plus de points dans ses levées qu'il n'en auroit accusé. Celui qui quitteroit le jeu avant la partie finie, la perdrait.

BRUSQUEMILLE, au jeu de ce nom, est le nom qu'on donne aux & aux dix, qui sont les premières cartes du jeu; les as enlèvent cependant les dix. Voyez l'article précédent.

BURIN. (*Astron.*) Constellation méridionale établie par M. de la Caille dans son planisphère austral. Il l'appelle en latin *carum scapiorum*; elle est placée entre l'éridan, la colombe & la dorade. La principale étoile de cette constellation est de cinquième grandeur. Elle avoit en 1750, 68° 8' 21" d'ascension droite, & 42° 21' 6" de déclinaison australe; ainsi, on peut la voir dans les provinces méridionales de la France. (*D. L.*)

C A B

CABESTAN, f. m. (*Méch.*) c'est une machine de bois, reliée de fer, faite en forme de cylindre ou de cône tronquée, posée perpendiculairement sur le pont d'un vaisseau, que des barres passées en travers par le haut de l'effieu sont tourner en rond. Ces barres étant conduites à force de bras, sont tourner autour du cylindre un câble, au bout duquel sont attachés les gros fardeaux qu'on veut élever.

C'est encore en virant le *cabestan*, qu'on remonte les bateaux, & qu'on tire sur terre les vaisseaux pour les calser, qu'on les décharge des plus grosses marchandises, qu'on lève les vergues & les voiles, aussi-bien que les ancres.

Il y a deux *cabestans* sur les vaisseaux, qu'on distingue par *grand* & *petit cabestan*: le *grand cabestan* est placé derrière le grand mât sur le premier pont, & s'élève jusqu'à quatre ou cinq pieds de hauteur au-dessus du deuxième. On l'appelle aussi *cabestan double*, à cause qu'il sert à deux étages pour lever les ancres, & qu'on peut doubler la force en mettant des gens sur les deux ponts pour le faire tourner.

Le *petit cabestan* est posé sur le second pont, entre le grand mât & le mât de misène. Il sert principalement à hisser les mâts de hune & les grandes voiles, & dans les occasions où il faut moins de force que pour lever les ancres.

Il est visible par la description de cette machine, que le *cabestan* n'est autre chose qu'un treuil, dont l'axe au lieu d'être horizontal, est vertical. Voyez à l'article *AXE* les loix par lesquelles on détermine la force du treuil, appelé en latin *axis in peritrochio*, axe dans le tambour, ou assis dans le tour. Dans le *cabestan* le tambour, *peritrochium*, est le cylindre, & l'axe ou l'effieu sont les leviers qu'on adapte aux cylindres, & par le moyen desquels on fait tourner le *cabestan*.

Le *cabestan* n'est donc proprement qu'un levier, *Mathématiques. Tome 1, 1.^{re} Partie.*

ou un assemblage de leviers auxquels plusieurs puissances sont appliquées. Donc, suivant les loix du levier, & abstraction faite du frottement, la puissance est au poids comme le rayon du cylindre est à la longueur du levier auquel la puissance est attachée; & le chemin de la puissance est à celui du poids comme le levier est au rayon du cylindre. Moins il faut de force pour élever le poids, plus il faut faire de chemin: il ne faut donc point faire de leviers trop longs, afin que la puissance ne fasse pas trop de chemin; ni trop courts, afin qu'elle ne soit pas obligée de faire trop d'effort; car, dans l'un & l'autre cas, elle seroit trop fatiguée.

On appelle encore en général du nom de *cabestan* tout treuil dont l'axe est posé verticalement: tels sont ceux dont on se sert sur les ports à Paris, pour attirer à terre les fardeaux qui se trouvent sur les gros bateaux, comme pierres, &c.

Un des grands inconvénients du *cabestan*, c'est que la corde qui se roule dessus descendant de sa grosseur à chaque tour, il arrive que, quand elle est parvenue tout-à-fait au bas du cylindre, le *cabestan* ne peut plus vincer, & l'on est obligé du choquer, c'est-à-dire de prendre des boîtes, de déviter le *cabestan*, de hausser le cordage, &c. manœuvre qui fait perdre un tems considérable. C'est pour y remédier que l'Académie des Sciences de Paris proposa, pour le sujet du prix de 1739, de trouver un *cabestan* qui fût exempt de ces inconvénients. Elle remit ce prix à 1741; & l'on a imprimé, en 1745, les quatre pièces qu'elle crut devoir couronner, avec trois *accessits*. L'Académie dit, dans son avertissement, qu'elle n'a trouvé aucun des *cabestans* proposés exempt d'inconvénients. Cela n'empêche pas néanmoins, comme l'Académie l'observe, que ces pièces, sur-tout les quatre pièces couronnées, & parmi les *accessits*, celle de M. l'abbé Fenel, ne contiennent d'excellentes choses, principalement par rapport à la Théorie. Nous y renvoyons nos lecteurs. (*O*)

C A D

CADMUS, nom de la constellation du ser-penteaire.

CADRAN SOLAIRE, (*Astronom.*, *Gnomon.*) est un instrument propre à montrer l'heure qu'il est; ou une surface sur laquelle sont tracées des lignes qui indiquent l'heure par l'ombre d'un style, ou par un rayon solaire.

On fait aussi des *cadrans* pour trouver l'heure par les étoiles. La science des *cadrans* s'appelle *Gnomonique*, nous en donnerons l'histoire au mot *Gnomonique*: nous allons décrire ici les différentes espèces de *cadrans*, avec les principes, les démonstrations & les règles de pratique nécessaires pour les bien entendre & les exécuter.

1. *Cadran équinoxial*: le premier objet de tout *cadran solaire* est autre chose que l'art de diviser en 24 heures égales le mouvement du soleil; ainsi,

G g

le premier & le plus simple de ses moyens doit être de placer un cercle divisé en 24 parties égales, de manière que le soleil en parcourt la circonférence, & réponde en 24^h à ses 24 parties. Pour cela, il ne faut que le placer parallèlement à l'équateur, & c'est-à-la le *cadran équinoxial*.

Le cas le plus simple du *cadran équinoxial* est celui où le soleil est dans l'équateur; & l'observateur placé sous la ligne équinoxiale: il faut alors que le plan du cercle ou du *cadran* soit vertical; & si on le dirige le matin vers le soleil levant, on est sûr que le soleil le suivra jusqu'à son coucher. L'axe ou le style qu'on aura placé perpendiculairement au cercle & dans le centre, jettera son ombre sur les 12 parties égales pendant les 12 heures du jour.

Si l'on étoit sous le pôle, ce seroit un cercle horizontal qui formeroit en tout tems une division du mouvement diurne en 24 parties égales. Si l'observateur s'avance vers un des pôles, l'équateur s'abaîssera d'autant, & le cercle qui doit servir de *cadran* devra être incliné de même; par exemple, à Paris de 41 degrés.

Nous prendrions donc ici un cercle divisé en 24 parties, nous l'inclinerons à l'horizon de 41^{de}, ce qui se peut faire avec un triangle de bois, dont un côté soit à l'autre comme sept à huit, le plus grand côté étant placé horizontalement; nous dirigerons le cercle vers le soleil le matin, le jour de l'équinoxe, sans changer cette inclinaison, & nous serons sûrs que le soleil suivra le cercle pendant toute la journée, parce qu'ils font l'un & l'autre dans l'équateur.

Si l'on ignoroit la hauteur de l'équateur, on pourroit encore y suppléer; on dirigeroit le matin le cercle vers le soleil, & marquant la ligne de ce plan qui auroit été dirigée vers le soleil, on tiendrait cette ligne immobile, & vers le tems de midi, on feroit tourner ce cercle autour de cette ligne fixe pour le diriger encore vers le soleil; & comme deux lignes déterminent un plan, le cercle se trouveroit encore par-là dans le plan de l'équateur.

On feroit la même chose en élevant le plan du cercle vers le midi, à la hauteur du soleil lorsqu'il cesse de monter sensiblement, & sans changer cette hauteur du plan, on le tourneroit le soir à droite ou à gauche pour le diriger vers le soleil.

Dans le cas où le soleil n'est pas dans l'équateur, mais où il a une déclinaison, il faut élever au centre du cercle un style, qui, sur le rayon du cercle soutenu d'une égal à cette déclinaison au-dessus ou au-dessous du plan; alors les cercles horaires passant tous par les 12 rayons & par le style, l'ombre du style répondra sur les 12 lignes horaires. En effet, les cercles horaires qui passent tous par les pôles, marquent nécessairement les heures; quand le soleil est à 15 degrés du méridien ou dans un cercle horaire qui fait avec le méridien un angle de 15 degrés; il est nécessairement

une heure de tems vrai, quelle que soit la déclinaison du soleil. Voyez ANGLE MOBILE.

Si la déclinaison n'est pas connue exactement; il faut mettre le style égal aux quantités suivantes que j'ai calculées en centièmes du rayon; ce seront des lignes du pied de roi, en surposant le rayon du cercle de 8 pouces & un tiers.

Table de la longueur du style nécessaire pour former & placer un *cadran équinoxial*.

Déclinaison.	Jours de l'année où le soleil a cette déclinaison.				Longueurs du style.
2°	15 mars	25 mars	17 sept.	27 sept.	3 ½
4	10	30	12	3 oct.	7
6	5 mars	4 avril	7	8	10 ½
8	27 fév.	10	1 sept.	13	14
10	22	15	25 août	19	18
12	16	21	21	24	21
14	21	27 avril	15	30 oct.	25
16	4 fév.	4 mai	8	6 nov.	29
18	28 janv.	11	1 août	13	32 ½
20	20 janv.	20	23 juillet	21 nov.	36
22	9 janv.	31 Mai	12 juillet	2 déc.	40
23 ½		21 juin		21 déc.	45 ½

Si l'on manquoit même de cette table, on croit varier le style & l'angle du plan jusqu'à ce qu'on eût le matin & le soir deux ombres égales; alors le *cadran* seroit orienté, quelque fut la longueur du style.

Enfin, si l'on ignoroit entièrement la déclinaison, il faudroit d'abord orienter le *cadran* par deux ombres égales le matin & le soir, & le lendemain l'élever aux environs de midi jusqu'à ce que l'ombre fût encore égale à celles du matin & du soir.

Ainsi, l'on peut faire un *cadran équinoxial* avec la première planche qui se trouve, sans connoître ni la latitude du lieu, ni la déclinaison du soleil, pourvu que l'ombre du style soit de la même longueur pendant quelques heures avant & après midi; si l'ombre est plus grande le matin que le soir, c'est une preuve que le *cadran* regardoit trop le couchant; si elle est plus grande à midi & que ce soit dans la face supérieure du *cadran*, c'est une preuve que le *cadran* est trop relevé, & on l'abaisse pour la rendre égale.

Si l'on fait la déclinaison du soleil & que l'on fasse le style égal à la tangente de cette déclinaison, & l'inclinaison du plan égale à la hauteur de l'équateur, le *cadran* fera placé dès le premier moment où l'on aura vu le soleil; & plus l'on fera près de six heures, plus la position sera exacte. Il suffira que l'ombre du style vienne sur la circonférence du cercle.

Quand même il ne seroit pas élevé convenablement, s'il est bien orienté & que la ligne de six heures soit horizontale, il marquera très-juste aux environs de six heures & de midi : il n'y aura que les heures intermédiaires qui pourroient être défectueuses.

Comme l'ombre de la pointe d'un style est mal terminée, on peut se servir d'un style au bout duquel il y ait un petit bouton, ou mieux encore un petit trou qui soit de l'orient à l'occident, & qu'on puisse tourner pour l'observation du midi. Je néglige le changement de déclinaison dans l'espace de quelques heures; l'erreur qui en résulte se corrigeroit facilement dans la saison opposée ou le changement se feroit en sens contraire, mais elle est indifférente dans l'usage ordinaire.

Le cadran équinoxial doit avoir deux faces, une au nord pour les rems ou le soleil à une déclinaison boréale, une au midi pour les déclinaisons australes, à moins qu'il ne soit transparent ou évidé. Le style passe au travers & marque sur les deux faces. Si l'on veut qu'il marque le jour même de l'équinoxe, il faut qu'il y ait un rebord ou un anneau sur une partie de la circonférence, pour recevoir l'ombre du style.

On trouve presque par-tout de petits cadrans à boussole dans de petites boîtes carrées d'ivoire, appelées vulgairement *cadrans de Dieppe*; le dessus de la boîte sert de *cadrans équinoxial*, en plaçant au centre un style ou une épingle, & l'inclinant pour la latitude du lieu par le moyen d'un petit support qui est placé dessous.

On voit dans la figure 246 des planches d'Astronomie, un cercle divisé en parties égales, avec les heures marquées tout au tour, comme elles doivent l'être sur le *cadrans équinoxial*. La figure 247 représente un *cadrans équinoxial*, monté à la hauteur du pôle par le moyen d'un quart de cercle *AB* avec son style *BD*; la boussole *C* qui sert à l'orienter; cet instrument n'a pas besoin d'explication. Un des avantages du *cadrans* que nous venons d'expliquer, c'est qu'on peut se tromper sensiblement sur la position du cercle, sans qu'il en résulte une erreur sensible pour les heures marquées sur le *cadrans*.

II. L'anneau astronomique est une espèce de *cadrans équinoxial portatif*, & qui s'oriente de lui-même à-peu-près de la façon que nous avons expliquée en indiquant la construction du *cadrans équinoxial*, nous en avons donné la description au mot *Aneau*.

III. Le *cadrans sphérique* est aussi naturel & aussi simple que le *cadrans équinoxial*; il est donné immédiatement par la nature & la direction du mouvement diurne. Je suppose qu'on ait un globe isolé, comme on en voit dans les jardins exposés au soleil & qu'on ait un style qui puisse s'appliquer perpendiculairement à la surface du globe dans tous les points par le moyen de trois pieds.

Si le style est creux de manière qu'un rayon

solaire puisse passer au travers dans toute la longueur, on marquera une suite de points pendant quelques heures, & ce sera le parallèle diurne du soleil pour ce jour-là. Il n'en faut pas davantage pour tracer tout le *cadrans* & tous les cercles de la sphère du monde avec la plus grande facilité.

Ayant cherché les points du globe qui sont à égales distances de tous les points du cercle qu'on a décrit, on aura les pôles de l'équateur. Le cercle qui sera dans le milieu à la même distance des deux pôles sera l'équateur.

Le point le plus élevé de l'équateur sera le point de midi.

Les deux points qui seront situés horizontalement à la hauteur du centre, seront les points de six heures. Les autres heures seront dans les points intermédiaires de 15 en 15 degrés.

On fera mouvoir autour des deux pôles un demi-cercle horaire, que l'on tournera vers le soleil quand on voudra savoir l'heure qu'il est, jusqu'à ce qu'il couvre son ombre exactement, il sera dès-lors dirigé vers le soleil.

Comme il y a toujours la moitié de ce globe, & la moitié de son équateur éclairée par le soleil, la séparation de la lumière & de l'ombre suffiroit pour indiquer l'heure qu'il est; car à midi cette limite doit tomber sur les points de six heures, & à six heures sur ceux de midi & de minuit; mais cette ombre étant mal terminée & la séparation difficile à distinguer, il vaut mieux se servir d'un demi-cercle mobile.

Si l'on faisoit les mêmes opérations au printemps & en automne, on trouveroit deux équateurs différens de douze minutes, à cause du changement de déclinaison du soleil, & l'on prendroit le milieu; mais cette différence n'est d'aucune importance pour les heures du *cadrans*; elle est même absolument insensible sur un globe d'un pied de diamètre, & c'est à-peu-près la grandeur qu'on peut donner à de pareils cadrans.

IV. *CADRAN HORIZONTAL.* Le *cadrans* le plus commun & le plus facile dans l'usage ordinaire, est le *cadrans horizontal* qu'on place sur une fenêtre, sur un pilier dans un jardin, & qu'on transporte à volonté; ainsi, nous l'expliquerons avec tout le détail nécessaire, & par toutes les méthodes qu'on peut y employer.

La théorie commence à être ici un peu plus compliquée que pour le *cadrans équinoxial*; mais on peut se passer, dans la pratique, de cette théorie; cependant, comme les principes doivent être établis & démontrés dans cet ouvrage, nous allons tâcher de les rendre clairs, en nous servant du *cadrans équinoxial* pour trouver la construction du *cadrans horizontal*.

Commençons par donner une idée de la projection gnomonique ou de l'intersection des cercles horaires, avec le plan d'un *cadrans*. Imaginons une petite sphère semblable à la terre, qui aura son horizon parallèle au nôtre, son axe élevé &

parallèle à celui de la terre, son équateur placé dans le même sens que le cercle équinoxial du monde, ses cercles horaires situés de la même manière.

Le soleil étant à l'horizon de Paris, sera aussi dans l'horizon de ce globe, car ils sont parallèles; & la distance du soleil est si grande, que la différence est insensible entre le centre de la terre & le centre d'un globe situé à la surface de la terre.

Quand le soleil sera dans le méridien du lieu, il sera dans le méridien du globe, &c.

A six heures, le soleil est dans un cercle horaire perpendiculaire au méridien; il voit donc l'axe de côté & perpendiculairement; tous ses rayons visuels sont perpendiculaires à l'axe, au méridien & à la méridienne, & parallèles à l'horizon; ainsi, l'ombre de cet axe sera perpendiculaire à l'ombre méridienne. D'ailleurs le soleil & l'axe sont dans le plan du cercle de six heures, qui coupe l'horizon à l'est & à l'ouest; ainsi, l'ombre ne peut sortir de ce plan, & coupera l'horizon sur la ligne qui va de l'orient à l'occident.

Si la terre devenoit transparente, & que nous visions notre axe former une ombre sur l'horizon, à six heures nous la verrions perpendiculaire à la ligne de midi. Ainsi, la ligne de six heures est la section de l'horizon & du cercle horaire de 90° ou de six heures, soit dans l'intérieur de la terre, soit sur un autre globe quelconque qui auroit, comme la terre, son horizon, son axe, son cercle de six heures.

Cette section sur l'horizon est le premier article fondamental qu'il faut avoir bien conçu avant d'aller plus loin. Le soleil, à six heures, est toujours à 90° du méridien, plus ou moins près du pôle ou de l'équateur, plus ou moins élevé sur l'horizon, mais toujours dans le cercle horaire de six heures. Le soleil, l'axe, l'ombre de cet axe, & par conséquent la ligne d'ombre ou la ligne horaire du cadran, sont dans ce plan. Sur quelque plan que vous receviez cette ombre, vous y aurez une ligne horaire de six heures, & cette ligne sera toujours la commune section du cercle de six heures & du plan où vous recevrez l'ombre: car la commune section de deux plans ou de deux cercles est la rencontre de ces cercles ou plans, prolongés ou non prolongés; c'est la ligne qu'un de ces plans vous cache sur l'autre plan quand vous bornoyez dans le premier; c'est le tracé de toutes les lignes du premier à leur rencontre sur le second.

Ainsi, toute ligne qui sera, dans le cercle de six heures, placée en quelque sens que ce soit, aura toujours son ombre sur la commune section de ce cercle & du plan où vous la recevrez.

Si l'on choisit l'axe, c'est parce que l'axe appartenant non-seulement à cette heure, mais à toutes les autres & à tous les cercles horaires.

Ce que j'ai dit du cercle de six heures à lieu

pour tous les autres cercles horaires dont il faut avoir les intersecions sur l'horizon, & ce seront les lignes horaires du cadran horizontal.

Ainsi, pour faire un cadran horizontal, il ne faut que placer un axe parallèle à l'axe du monde, concevoir les cercles de 1, 2, 3, 4, 5 heures à 15, 30, 45, 60, 75 degrés du méridien, & marquer sur le plan horizontal leur trace ou leur section.

Pour cela, il suffit d'avoir un point de chacune de ces lignes horaires, car l'axe marque un point commun à toutes les lignes, & nous l'appellerons le centre du cadran; c'est le point où l'axe, le style, l'aiguille du cadran, coupe le plan de ce même cadran. Pour avoir un point de section de la ligne d'une heure sur le plan du cadran, on concevra l'axe *CA*, figure 250 relevé au-dessus du plan, & incliné de 45°, si c'est pour Paris; une ligne *AE* qui lui sera perpendiculaire, & qui représentera un rayon de l'équateur qui est nécessairement perpendiculaire à l'axe du monde. Par cette ligne *AE*, l'on concevra un plan perpendiculaire à l'axe *AC*, & ce sera le plan de l'équateur; il coupera la méridienne *CPD* & le plan horizontal du cadran sur la ligne *EH*, qui sera la commune section de l'équateur & du plan, ou la ligne équinoxiale du cadran.

Transportons le rayon *AE* de l'équateur sur *ED*, & du centre *D* décrivons le cercle *EQ*. Prenons un arc *EF* de 45°, & tirons le rayon *DFG*, je dis que le point *G* de l'équinoxiale est le point cherché, où le cercle de 45° ou de neuf heures du matin coupe l'équinoxiale, en sorte que la ligne *CG* sera la ligne de neuf heures.

En effet, le point *A* étant le centre de l'équateur relevé au-dessus du plan, & le plan de l'équateur passant en *E*, la ligne *BEH* est tangente à l'équateur, ainsi qu'au cercle *EQ*. Si l'on prend 45° de l'équateur à la droite du point *E*, & qu'on tire par le centre *A* un rayon à ce point de 45°, il ira rencontrer la tangente *EH* au point *G*; le plan passant par la ligne *CA* & par le point *G*, sera un angle de 45° avec le plan du méridien *CAE*; car cet angle sera mesuré par les 45° de l'équateur, les angles des plans étant toujours mesurés par l'angle de deux lignes perpendiculaires à la commune section; ainsi, la ligne *AE* & la ligne qu'on suppose aller de *A* en *G* étant, dans le plan de l'équateur, perpendiculaires à l'axe *CA* qui est leur commune section, elles mesurent l'angle des deux plans du méridien & du cercle horaire; mais l'un passe en *E*, donc l'autre passe en *G*, le point *C* étant commun.

Ce que j'ai fait avec 45° pour trois heures de distance au méridien, le sera avec 30° pour deux heures, avec 15° pour une heure, & ainsi de suite: les lignes de la gauche sont parallèles à celles de la droite. On voit dans la figure 250, un cadran horizontal tracé pour la latitude de Paris.

Nous pouvons chercher une expression géométrique de l'angle que nous venons de trouver; nous prendrons CE pour unité ou pour rayon; AE sera le sinus de la hauteur du pôle, par exemple, de 49° pour Paris; ED sera aussi le sinus de 49° ; & comme EG est la tangente de 45° pour le rayon ED , elle sera en parties du rayon CE , égale à $\sin. 49^\circ \text{ tang. } 45^\circ$; mais EG est la tangente de l'angle de trois heures sur le cadran, ou de l'angle ECG pour le rayon même que nous avons choisi; d'où il suit que l'angle cherché on l'angle du cadran pour trois heures est tel que sa tangente, est égale au produit du sinus de la latitude par la tangente de l'angle horaire.

Voici une table des angles des lignes horaires dans un cadran horizontal pour $48^\circ 50'$ de latitude à chaque demi-heure.

Il y a des tables parcellées pour différentes latitudes dans la Gnomonique de M. de Parcieux, &c.

Matin.	Deg.	Mm.	Soir.
XII	0	0	
	5	39	
XI	11	25	I
	17	18	
X	23	29	II
	30	1	
IX	36	58	III
	44	26	
VIII	52	31	IV
	61	11	
VII	70	24	V
	80	5	
VI	90	0	VI
	99	55	
V	109	36	VII
	118	49	
IV	127	29	VIII

L'expression que je viens de démontrer pour les angles d'un cadran horizontal, fournit une construction qui est plus commode, à certains égards, que celle dont nous avons fait usage, en suivant la position de l'équateur, & considérant les intersections naturelles des lignes horaires sur l'équinoxiale.

On prendra un arc PZ , fig. 251, égal au complément de la hauteur du pôle, & ZO égal à l'angle de 15° si c'est pour une heure, &c., ainsi que l'arc GF ; avant tiré les lignes FD & OB perpendiculaires sur CZ , & DE perpendiculaire sur CP , on prendra BA égale à CE , & la ligne CA sera la ligne d'une heure, CZ étant prise pour la méridienne.

En effet, par la construction $CD = \sin. 15^\circ$, $CE = \sin. \text{lat.} \sin. 15^\circ = BA$; $CB = \cos. 15^\circ$.

donc $\frac{BA}{BC} = \text{tang. } BCA = \frac{\sin. 15^\circ}{\cos. 15^\circ} \sin. \text{lat.} =$

$\text{tang. } 15^\circ \sin. \text{lat.}$ ce qui est l'expression de l'angle d'une heure sur le cadran, comme nous l'avons déjà démontré.

On évite, par cette construction, de se servir des tangentes qui, en approchant de 90° , sont trop longues, & exigeroient une trop grande figure. Il y a plusieurs autres méthodes pour tracer un cadran horizontal; Lambert & M. Cassillon en ont donné dans les suppléments de l'Encyclopédie; On peut y employer une ellipse, suivant M. Ferguson; mais de si longs détails ne font pas du ressort de cet ouvrage.

Le calcul trigonométrique donne encore la même expression pour les lignes du cadran horizontal. Soit PX , fig. 40 d'Astronomie, le cercle horaire d'une heure, qui fait avec le méridien PZE un angle de 15° , & qui coupe en X l'horizon HO ; le point X est celui où se dirige nécessairement la ligne d'une heure dans le cadran horizontal, puisque cette ligne est la section du cercle d'une heure avec l'horizon. Il ne s'agit donc que de trouver l'arc HX ou l'arc XO . Dans le triangle POX rectangle en O , on a, par les règles de la Trigonométrie sphérique, cette proportion. Le rayon est au sinus du côté PO ou de la hauteur du pôle, comme la tangente de l'angle P est à la tangente du côté opposé XO ; ainsi, la tangente de cet arc ou la tangente de son supplément, qui est l'angle d'une heure sur le cadran horizontal, est égale à la tangente de 15° , multipliée par le sinus de la latitude.

On a cherché à éviter ce calcul par des échelles gnomoniques, semblables aux différentes lignes des compas de proportion; & M. Cassillon a donné de grands détails à ce sujet dans les suppléments de l'Encyclopédie.

Les Éléments de Mathématiques qui nous viennent d'Angleterre, commencent en effet deux échelles par lesquelles on construit les cadrans solaires avec autant d'exactitude que de facilité, pour quelque hauteur du pôle que ce soit; elles devroient se trouver dans tous les compas de proportion; cependant elles font peu connues en France. Clavius en parla dans ses Œuvres mathématiques imprimées en 1612, & Van-Schooten en donna la démonstration dans ses Exercices mathématiques, liv. 2, sect. 29, pag. 510 & suiv. (édition de J. Elzevir, 1657.)

Van-Schooten en attribue l'invention à Samuel Foster, professeur d'Astronomie dans le collège de Gresham à Londres, qui, en 1618, publia à ce sujet un traité, intitulé: *The art of dialing, by a new easy and most expedient way*. Jean Collins décrit au long cette méthode dans un livre, intitulé: *The description and uses of a great universal*

quaderns, imprimé à Londres en 1693 : cet auteur en attribue l'invention à Jean Ferrero, Espagnol. Harris en parle dans son *Lexicon technicum*, article *Dialling-lines*. Krafft en a donné une démonstration algébrique dans le troisième tome des *Mémoires de Petersbourg pour les années 1741—42*, pag. 255 & suiv. Enfin M. Lambert, de l'Académie royale des sciences & belles-lettres de Berlin, dans ses *Remarques pour étendre l'usage des Mathématiques pratiques*, tom. 3, imprimé en allemand à Berlin 1772, sous le titre de *propriété particulière des tangentes*, se propose la chose comme un problème qu'il résout par le calcul d'une manière plus simple que n'avait fait Krafft. Sa méthode est expliquée fort au long dans les suppléments de l'Encyclopédie, au mot *cadran* : mais ces calculs sont trop longs & trop abstraits pour devoir trouver place dans une Encyclopédie ; ils seroient bons tout au plus dans un grand traité de Gnomonique.

Lorsque le *cadran* est tracé, il faut y placer le style ou l'axe, c'est-à-dire, une ligne qui fasse avec le *cadran* un angle égal à la hauteur du pôle, ou une plaque de métal dont les côtés fassent le même angle.

Si le *cadran* est un peu grand, la plaque devant être épaisse, c'est le bord occidental du style qui doit marquer le matin, & le bord oriental pour le soir : dans ce cas, il faut tracer deux méridiennes parallèles entr'elles & séparées d'une quantité égale à l'épaisseur du style, & l'on a comme deux moitiés de *cadran* éloignées de cette quantité. On le voit ainsi dans la figure 274.

Lorsqu'un *cadran* solaire est tracé sur une pièce de cuivre, sur une ardoise, sur une pierre ou sur une planche bien dressée, & qu'on y a fixé le style, il s'agit de le placer dans la direction de la méridienne, ou de l'orienter ; il faut d'abord qu'il soit bien horizontal : on se sert pour cela d'un niveau, ou bien on se contente d'y verser un peu d'eau pour voir si elle ne coule d'aucun côté.

L'orientation du *cadran* se peut faire par le moyen de la boussole ; mais il faut bien avoir égard à la déclinaison de l'aiguille, qui est actuellement de 21° à Paris, & qui est différente suivant les tems & les lieux. Les boussoles sont sujettes à nous tromper ; une barre de fer qu'on ne voit pas peut déranger l'aiguille.

Il vaut donc mieux tracer une ligne méridienne par les méthodes que nous indiquerons au mot *MÉRIDIENNE*, comme par des hauteurs correspondantes, par des cercles concentriques, ou par le moyen de l'étoile polaire, en prenant le moment où l'étoile de la racine de la grande ourse passe au-dessous de l'étoile polaire.

On peut encore le servir d'une seule hauteur en cherchant l'azimut par la figure de l'analemmé, expliquée au mot *PROJECTION*. En effet, si l'on a observé à un certain moment la longueur de l'ombre *TQ*, fig. 252, d'un style *BT*, & qu'on

faîte un triangle *BTQ*, on aura la hauteur *HB* du soleil : ayant décrit le demi-cercle *HBO*, on prendra *PO* égal à la hauteur du pôle ; on tirera la ligne *PQ* pour représenter l'axe du monde ; & une perpendiculaire *EQ* pour faire le demi-diamètre de l'équateur, tandis que *HQO* sera le diamètre de l'horizon. On prendra l'arc *EM* égal à la déclinaison du soleil, & la perpendiculaire *MA* sera le rayon du parallèle du soleil pour le jour donné. Du point *B* qui marque la hauteur du soleil par l'observation, on mènera la ligne horizontale *BC*, qui marquera le diamètre de l'alimantarat du soleil ; elle coupera la ligne *MA* au point *S*, qui sera la projection du lieu du soleil, & la ligne verticale *ZQ* au point *G*, qui sera le centre de l'alimantarat : donc l'intervalle *GS* sera le sinus de l'azimut sur le petit cercle, ou le sinus de la distance au vrai point d'orient ou d'occident. Ainsi, en portant le double de *GS* sur la ligne des cordes d'un compas de proportion, ouvert pour le rayon *BG*, qui est la corde de 60°, l'on aura un nombre de degrés, dont la moitié sera la distance du soleil au point d'orient ou d'occident. Le complément sera son azimut ou sa distance horizontale au vrai point de midi ; ce qui suffira pour tracer une méridienne, ou pour orienter le *cadran*, en faisant avec la ligne de l'ombre un angle égal à celui de la méridienne avec la ligne d'ombre qu'on a marquée.

Cet azimut du soleil peut se trouver également par le calcul trigonométrique ; mais l'opération graphique dont je viens de parler est bien suffisante dans la pratique.

Avec un seul point d'ombre pris sur un plan horizontal, on peut trouver le centre du *cadran*, & par conséquent avoir la méridienne. Soit *S* (fig. 253 & *Afr.*) la pointe d'un style élevé sur un plan horizontal, ou une plaque percée d'un trou, & dont le rayon tombe en *R*, *P* le pied du style ou le point qui répond perpendiculairement au-dessous de *S*, & *C* le centre que l'on cherche. La longueur de la ligne *SC* est facile à connaître ; car c'est l'hypothénuse d'un triangle dont *SP* est le côté, & l'angle *SCP* égal à la hauteur du pôle : ainsi *SC* est égal à *SP* divisé par le sinus de la hauteur du pôle, & on peut la trouver avec le compas en faisant un triangle. On mesure la longueur *SR* du rayon solaire ; on connoît aussi la longueur *CSR*, qui est le complément de la déclinaison du soleil ; on peut calculer *RC*, ou la trouver graphiquement en faisant un triangle, dont les deux côtés & l'angle connu soient ceux du triangle *CSR* : quand on aura la longueur *RC*, on décrira avec ce rayon un arc de cercle dont *R* soit le centre. On prendra sur cet arc un point qui soit éloigné de la pointe du style *S* de la quantité *SC* qui a été trouvée, & ce point sera le centre du *cadran*, ou le point par lequel on peut mener la méridienne. *P. C.*

L'inégalité des intervalles entre les lignes ho-

raires d'un *cadran* horizontal fournit encore un moyen fort simple pour orienter un *cadran*, si l'on a une montre qui ne varie pas dans l'espace de quelques heures; car ayant mis le *cadran* à-peu-près dans la situation qu'on estime qu'il doit avoir, ou mettra la montre d'accord avec le *cadran* à midi ou une heure; si elle est encore également d'accord à 5 ou 6 heures, c'est une preuve que le *cadran* est bien orienté.

Il y a un autre moyen pour orienter un *cadran* horizontal, quand il est un peu grand; on fera une équerre ou un triangle rectangle *CSB*, (fig. 253) dont les côtés *CS* & *CB* puissent s'ajuster exactement sur l'axe du *cadran*, & sur une ligne horaire comme celle de six heures; l'extrémité *B* marquera le point de l'équinoxe; & si l'on fait au sommet *S* du style un angle *BSR*, égal à la déclinaison du soleil pour un jour quelconque, le point *R* marquera le point où doit passer l'ombre ce jour-là sur la ligne de six heures. Ce point *R* tombera en dedans du triangle *CSB*, si la déclinaison du soleil est australe; alors il ne s'agira que de tourner le *cadran* horizontalement, de manière que l'ombre du point *S* vienne sur le point *R* qu'on a marqué, & y vienne quand cette ombre sera sur la ligne de 6 heures: le tâtonnement n'est pas difficile.

Si l'on veut attendre le jour de l'équinoxe pour orienter un *cadran*, la ligne équinoxiale qui a servi à le tracer, servira aussi à le placer; car si l'ombre du sommet du style tombe sur l'équinoxiale, un peu loin du midi, l'on est sûr que le *cadran* est bien placé.

Enfin on peut orienter un *cadran* horizontal en plaçant sur la même plaque un *cadran* azimutal, dont nous donnerons ci-après la description, comme dans la figure 274. Aussitôt que les deux *cadrans* marqueront la même heure, on sera sûr qu'ils sont tous deux bien orientés.

Un *cadran* horizontal fait pour Paris avec son style fixe, peut servir à toutes les latitudes, en inclinant de la quantité dont on a changé de latitude; par exemple, à 51° de latitude, il suffit d'incliner le *cadran* de 2° vers le midi. Sous l'équateur, on élèvera le plan du *cadran* de 49°; son style deviendra parallèle à l'horizon, & marquera sur le plan du *cadran* incliné les mêmes heures qu'il marquoit quand le *cadran* étoit horizontal, & le style incliné ou élevé de 49° comme le pôle. C'est sur ce principe qu'étoit fondé le *cadran universel* & à méridienne, décrit par Julien le Roi, horloger célèbre de Paris, & père de quatre fils qui se sont distingués dans différentes carrières. On trouve de tems en tems de ces *cadrans*, où il y a une platine à charnière qui peut s'incliner à différentes latitudes sur la platine horizontale qui porte la boussole.

V. *cadran méridional*, est un *cadran* vertical qui est tourné directement vers le midi, ou celui que

l'on décrit sur la surface du premier vertical, qui regarde le midi.

Le soleil éclaire le plan du premier vertical qui regarde le midi, lorsque dans la course il passe de ce vertical au méridien, ou qu'il va du méridien au premier vertical; il emploie six heures avant midi & six heures après, le jour de l'équinoxe, & environ quatre heures & demie avant midi, & quatre heures & demie après, le jour du solstice d'été; en hiver, le soleil ne paroît sur l'horizon qu'après six heures: d'où il s'ensuit qu'un *cadran méridional* ne peut marquer les heures que depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir.

La manière de tracer ce *cadran* est la même que pour le *cadran* horizontal (fig. 250); sur le vertical qui regarde le midi, tracez une ligne verticale pour servir de méridienne *QED*; faites un angle *ACE* égal à l'élévation de l'équateur, ou au complément de la hauteur du pôle; tirez une ligne droite *AE* qui fasse un angle droit *CAE*, & qui rencontre la perpendiculaire en *E*, par le point *E* tirez la ligne droite *BH* qui coupe la méridienne *QED* à angles droits. Prenez *ED* égal à *EA*, & avec ce rayon décrivez un quart de cercle *EQ*. Le reste se fait comme dans le *cadran* horizontal, excepté que les heures d'après midi doivent être écrites à main droite, & celles d'avant-midi à main gauche, au contraire du *cadran* horizontal de la figure 250. Enfin au point *A* fixez un style oblique, qui fasse un angle égal à l'élévation de l'équateur; ou bien, élevez en *P* un style perpendiculaire au plan, & égal à *PA*; ou enfin élevez sur *CP* un triangle *ACP*, qui soit perpendiculaire au plan du *cadran*.

L'ombre du style *CA* couvrira les différentes lignes horaires aux heures qui répondent à ces lignes.

Le *cadran septentrional*, ou le *cadran vertical* directement septentrional, se trace sur la surface opposée du premier vertical, qui regarde le nord; la manière de le décrire est la même, si ce n'est que le centre est en bas, parce que le style est toujours dirigé vers le pôle élevé, ou parallèle à l'axe du monde.

Le soleil n'éclaire cette surface que quand il avance de l'orient au premier vertical, ou qu'il vient de ce même vertical au couchant: de plus le soleil est dans le premier vertical à six heures du matin & à six heures du soir le jour de l'équinoxe; le jour du solstice d'été il se lève sur l'horizon de Paris à quatre heures, & arrive au premier vertical vers les sept heures & demie; & en hiver le soleil n'éclaire point du tout ce plan septentrional: d'où il est évident que le *cadran septentrional* ne peut marquer que les heures d'avant sept heures & demie du matin, & celles d'après sept heures & demie du soir. C'est pourquoi comme dans l'automne & dans l'hiver le soleil ne se lève pas avant six heures, & qu'il se couche avant six

heures du soir, on voit que pendant toutes ces deux faïsons, le *cadran septentrional* n'est d'aucun usage; mais en le joignant au *cadran méridional*, il supplée ce qui manque à celui-ci.

VI. Le *cadran oriental*, ou le *cadran droit directement oriental*, est celui que l'on trace sur le côté du méridien qui regarde l'orient. Comme le soleil n'éclaire le plan du méridien qui regarde l'orient qu'avant midi; un *cadran oriental* ne peut marquer les heures que jusqu'à midi. On tire une ligne droite *AB* (fig. 253) parallèle à l'horizon, & une ligne *AK*, qui fasse avec elle un angle *KAB*, égal à l'élevation de l'équateur. D'un point *D* avec un rayon *DE* pris à volonté, on décrit un cercle; & par le centre *D*, on tire *EDC* perpendiculaire à *AK*; le cercle est divisé en quatre quarts; on subdivise chacun de ces quarts en six parties égales; & du centre *D*, par les différentes divisions, l'on tire les lignes droites *D4*, *D5*, *D6*, *D7*, &c. & par les points de rencontre de ces rayons & de la tangente *EG*, parallèle à *AD*, on tire les lignes horaires qui sont toutes parallèles à *EC*. Enfin en *D*, l'on élève un style égal au rayon *DE* perpendiculairement au plan, ou sur deux pieds fixés perpendiculairement en *E*, *C*, & égaux au même rayon *DE*, l'on attache un axe ou un style parallèle au plan du *cadran*, & répondant perpendiculairement sur la ligne *EC*: c'est le style du *cadran*. Par ce moyen, le bout de l'index, ou le style entier aux différentes heures, jettera son ombre sur les lignes respectives 44, 55, 66, &c. Le style est toujours dirigé vers le pôle; le cercle *CKE* étant conçu, relevé perpendiculairement au plan du *cadran*, représentera l'équateur, & les lignes *E7*, *E8*, sont les tangentes de 15°, de 30°, en partant du cercle de six heures.

Le *cadran occidental*, ou le *cadran droit directement occidental*, se trace sur le côté occidental du méridien, par un procédé tout semblable.

Comme le soleil n'éclaire qu'après midi le côté du plan du méridien, qui regarde l'occident, on voit qu'un *cadran occidental* ne peut marquer les heures que depuis midi jusqu'au soleil couchant.

Ainsi, en joignant le *cadran occidental* avec l'*oriental*, ces deux cadrans marqueront toutes les heures du jour.

Pour tracer un *cadran occidental*, la construction est précisément la même que celle du *cadran oriental*, excepté que les heures vont en croissant de bas en haut, depuis une heure jusqu'à huit.

VII. Le *cadran polaire* est celui qu'on trace sur un plan incliné, qui passe par les pôles du monde, & par les points de l'orient & de l'occident sur l'horizon. Il y en a de deux espèces; s'ils regardent le zénith, on les appelle *polaires supérieurs*; s'ils regardent le nadir, ils sont appelés *polaires inférieurs*.

Ainsi, le *cadran polaire* est incliné à l'horizon avec lequel il fait un angle égal à l'élevation du

pôle: il forme le plan du cercle de six heures; il y a un quart de l'équateur, & de chacun des parallèles à l'équateur, intercepté entre ce plan & le méridien: donc la surface supérieure est éclairée par le soleil depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir; & la surface inférieure depuis le lever du soleil jusqu'à six heures du matin, & depuis six heures du soir jusqu'au coucher du soleil.

C'est pourquoi le *cadran polaire inférieur* marque les heures du matin depuis le lever du soleil jusqu'à six heures, & celles du soir depuis six heures jusqu'à son coucher; & le *cadran polaire supérieur* marque les heures depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Pour tracer un *cadran polaire supérieur*, tirez une ligne droite *AB* (fig. 255) parallèle à l'horizon; & ayant choisi *CE* pour la ligne méridienne, divisez *CE* en deux parties égales, & par *C* tirez une ligne droite *FG*, parallèle à *AB*; ensuite d'un centre *D* avec l'intervalle *DE*, décrivez un quart de cercle, & divisez-le en six parties égales: du centre *D*, par les différents points de division, tirez les lignes droites *D1*, *D2*, *D3*, *D4*, *D5*, jusqu'à la tangente *EB*; portez les mêmes intervalles à gauche ou à l'occident pour le matin, & des points 5, 4, 3, 2, 1, &c. élevez des perpendiculaires qui rencontrent la ligne *FG* aux points correspondants, ce seront les lignes horaires. Enfin élevez en *D* un style perpendiculaire égal à *DE*; on sur deux styles égaux à cette même ligne *DE*, placez une règle horizontale, parallèle à *EC*; son ombre marquera les heures en tombant sur les lignes marquées 1, 2, 3, qui sont les lignes horaires; leurs intervalles sont les tangentes des angles horaires 15°, 30°, &c. Si l'on conçoit le quart de cercle *EG* relevé perpendiculairement au plan du *cadran*, de manière que le centre *D* réponde perpendiculairement sur le point *E*, ce cercle représentera l'équateur, & l'on concevra facilement que le soleil décrivant l'équateur, les rayons *D1*, *D2*, seront dirigés vers le soleil, à une heure, à deux heures, & ainsi des autres.

Un *cadran polaire supérieur* ne diffère des cadrans orientaux & occidentaux que par sa situation, & que par la manière d'écrire les heures; ce qui fera la ligne du midi pour un *cadran polaire*, est la ligne de 6 heures pour les *cadrans orientaux* ou occidentaux.

On a un *cadran polaire inférieur* en supprimant les heures d'avant midi, 9, 10, &c. & celles d'après midi, 1, 2, &c. & en ne laissant que les heures 7 & 8 du matin, & 4 & 5 du soir, qui deviendront alors les heures 7 & 8 du soir, & 4 & 5 du matin, en retournant le *cadran*.

On trouve sur les petits cadrans d'ivoire, qui sont communs par-tout, un *cadran polaire* tracé, avec des courbes, qui marquent les arcs des signes. Pour s'en servir, il faut orienter la boîte du *cadran*,

du *cadran*, à élever le centre vers le pôle du monde, & planter au couvercle une épingle ou un style, dont la longueur soit égale à DE ou DG , c'est-à-dire, à la distance qu'il y a sur le *cadran* entre la ligne de midi & celle de trois heures.

CADRAN vertical déclinant. Tous les *cadrans* dont nous venons de parler, font des cas particuliers de la Gnomonique: nous passons à des méthodes plus générales.

Le *cadran vertical déclinant* est celui que l'on pratique le plus sur les murailles. Nous expliquerons huit méthodes différentes pour le faire, ou du moins pour en déterminer la partie fondamentale.

Mais il est nécessaire d'avertir que la plupart des murailles ont une inclinaison qu'il faut corriger par une couche de plâtre bien verticale & bien plane, si l'on veut employer exactement les méthodes que je vais décrire.

La première méthode suppose un *cadran* équinoxial, qui est le premier & le plus simple de tous les *cadrans*, déjà fait & placé devant le mur sur lequel on veut tracer un *cadran vertical*; le style du *cadran* équinoxial prolongé jusqu'à la muraille, marquera la place, la direction & la situation du style; car c'est toujours parallèlement à l'axe du monde que le style doit être placé, dans l'un comme dans l'autre.

Les lignes du *cadran* équinoxial, prolongées en droite ligne jusqu'à la muraille, y marqueront chacune un point par où doit passer la ligne correspondante du *cadran vertical*. Le centre du *cadran* est un autre point commun à toutes ces lignes: ainsi, l'on pourra tirer les lignes horaires sur le plan vertical déclinant.

En effet, les lignes horaires étant les intersections des cercles horaires sur le plan du *cadran*, dès qu'il y a un point commun aux plans des deux *cadrans* par où passe une ligne horaire de l'un des *cadrans*, elle marque nécessairement sur l'autre un point du même cercle, du même plan, & par conséquent de la ligne horaire.

On pourroit sur-tout réussir facilement à tracer ainsi un *cadran déclinant*, si l'on avoit pour *cadran* équinoxial un *équatorial*, instrument qui s'oriente de lui-même; j'en ai vu un dessiné par M. Mignon, à Lunay, près d'Alençon, d'une manière très-commode pour ces opérations. Le centre de l'équateur est traversé par un tube, dans lequel on s'alligne pour marquer le centre du *cadran*; l'équateur porte une alidade que l'on dirige sur les différentes heures, & par laquelle on borne pour marquer sur la muraille la trace de la ligne équinoxiale, & les points horaires de cette ligne.

La seconde méthode que l'on peut indiquer pour tracer un *cadran vertical*, suppose un *cadran* horizontal bien orienté, par une des méthodes que j'ai expliquées assez au long. On prolongera le style & les lignes horaires jusqu'à la rencontre de la muraille, ainsi que je viens de le dire pour

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

le *cadran* équinoxial, & l'on aura de même la position du style & des lignes horaires sur le *cadran vertical*.

On feroit la même chose avec un *cadran vertical* méridional, qui seroit portatif, & qu'on orienteroit devant le mur. Il pourroit être tracé sur une glace; & alors mettant une lumière pendant la nuit à la pointe du style, l'ombre des lignes iroit marquer sur le mur la direction de toutes les lignes horaires.

Au défaut d'une glace, il suffiroit de quelques trous faits sur les lignes horaires du *cadran vertical* méridional.

Si le mur approchoit trop d'être exposé à l'orient ou à l'occident, en sorte que le style prolongé ne pût le rencontrer que fort loin, il faudroit faire le *cadran* sans centre. Pour avoir une ligne horaire du *cadran vertical*, on tendroit un fil depuis la ligne horaire du *cadran* horizontal par divers points du style; ce fil iroit marquer autant de points sur le plan vertical: ce qui détermineroit la ligne horaire cherchée.

La troisième méthode que l'on emploie pour tracer un *cadran vertical déclinant*, consiste dans une opération graphique, dont je vais donner les règles & les démonstrations; mais elle suppose qu'on connoisse la déclinaison du plan ou l'angle du méridien, soit par une méridienne déjà tracée au moyen des méthodes que nous avons expliquées, soit par le moyen du déclinateur représenté dans la figure 216, qui porte une règle mobile FG sur un demi-cercle AED & une boussole G .

Soit la méridienne verticale CLM (fig. 257) l'horizontale LP , on fera l'angle MLD égal à la déclinaison du plan; on élèvera en un point D à volonté la verticale DP , & la perpendiculaire LP : le point P sera le pied du style; car si l'on imagine la ligne LD relevée en l'air, & le triangle perpendiculaire au plan de la figure & du *cadran*, le style passant en D , la perpendiculaire DP sera le style droit, & P le pied du style.

Ayant pris LH égale à DL , & fait l'angle LHC égal à la hauteur du pôle, l'intersection C sera le centre du *cadran*, & la ligne CPB sera la soufitylaire, c'est-à-dire, la ligne du *cadran* sur laquelle répondra perpendiculairement le style du *cadran*. En effet, H étant conçu relevé, ainsi que le point D perpendiculairement sur le point P , ou dans une position horizontale & dans la direction LD de la méridienne, la ligne HC sera le style du *cadran*.

Sur la ligne PS perpendiculaire à la soufitylaire, on prendra PS égal à PD , qui est le style droit, & CSX marquera le style du *cadran*; on lui tirera une perpendiculaire SB , & par le point B on tirera une ligne BM , perpendiculaire à la soufitylaire, & ce sera l'équinoxiale; car S étant regardé comme le centre de l'équateur, donc

H h

le plan est perpendiculaire au style ou à l'axe du monde, l'intercession de l'équateur avec le plan du *cadran* sera l'équinoxiale: or cette ligne est une perpendiculaire tirée sur la soufyllaire; en effet, toutes les fois que deux plans sont perpendiculaires sur un troisième, leur commune section est perpendiculaire aux deux autres sections, qu'ils font sur le troisième plan. Il suffit de mettre un livre entr'ouvert, debout sur une table pour sentir l'évidence de cette proposition, mieux que par un appareil de démonstration. Or l'équateur & le plan du *cadran* sont tous deux perpendiculaires au cercle horaire, qui est le méridien du plan: ainsi leur commune section, qui est l'équinoxiale sera perpendiculaire sur les deux sections, dont l'une est le rayon de l'équateur, & l'autre la soufyllaire.

Le point d'intercession *R* de l'équinoxiale avec l'horizontale *H I P R*, sera le point de 6 heures; car le rayon de 6 heures dans l'équinoxe est perpendiculaire au style, & horizontal, comme la ligne *S P*, qui est perpendiculaire au plan: donc il doit être à la même hauteur que le point *P*; donc il est placé à la rencontre de l'horizontale *P R* & de l'équinoxiale *B R*.

Ayant pris sur la soufyllaire *B A* égale à *B S*, ce sera le rayon de l'équinoxial, supposé couché sur le plan du *cadran*, le point *A* sera le centre diviseur de l'équinoxiale, le point *M* étant le point du midi; l'angle *R A M* sera droit: on divisera le quart de cercle *K O* en 6 heures; & tirant des rayons par les points de divisions, ils rencontreront l'équinoxiale aux points par lesquels doivent passer les lignes horaires menées du centre *C*. Ainsi, ayant pris, par exemple, un arc *K N* de 15 degrés, & tiré une ligne *A N Q* jusqu'à l'équinoxiale, on aura le point *Q*, par lequel doit passer la ligne d'une heure *C Q*.

En prenant de même 30°, l'on trouvera la ligne de deux heures, & ainsi des autres.

Quatrième méthode. La déclinaison du mur sur lequel on veut tracer un *cadran* étant la chose la plus difficile ou la plus embarrassante, on a cherché divers moyens de s'en passer, & sur-tout par les points d'ombre; & le moyen le plus simple consiste à trouver la soufyllaire du *cadran* par le moyen de deux ombres égales. Cette méthode ressemble à celle qu'on emploie pour tracer une méridienne par des cercles concentriques. *Gnomonique de la Hire, 1698, pag. 35.*

Je suppose qu'on ait planté dans le mur un faux style, soit une pointe pour en marquer l'ombre, soit un trou pour laisser passer un rayon on une image du soleil. *M. de Parcieux* faisoit ses faux styles de deux pièces, comme on le voit, fig. 258.

Lorsque le soleil arrive dans le cercle horaire, qui est perpendiculaire au plan du *cadran*, ou dans le méridien du plan, il répond perpendiculairement sur la soufyllaire, & l'ombre est la plus courte qui soit possible. Avant & après il la voit

obliquement, & les ombres sont plus longues; l'obliquité est la même une heure avant & une heure après; car le soleil faisoit 15° par heure d'un cercle horaire à l'autre, il est 15° au-dessus de la méridienne du plan dans le premier cas, & 15° au-dessus dans le second cas; il est dans les deux cas à des situations parfaitement semblables au-dessus & au-dessous: ainsi les ombres doivent être égales dans les deux cas.

Ainsi, ayant marqué le pied du style ou le point du mur, on répond perpendiculairement la pointe du style, ou le trou de lumière, on décrira de ce pied comme centre des cercles concentriques; on marquera sur chaque circonférence le point d'ombre avant, & après le passage du soleil par la méridienne du plan; on partagera en deux les arcs interceptés sur chaque circonférence; le milieu sera un des points de la ligne cherchée, qui doit aussi passer par le pied du style.

On peut faire cette opération à plusieurs intervalles différens, & l'on aura plusieurs points d'ombre, qui tous appartiendront à la soufyllaire.

Lorsqu'on a la soufyllaire, il est facile de décrire le reste du *cadran* comme dans la méthode précédente.

La difficulté d'avoir de ces faux styles percés d'un trou pour les points de lumière, a fait dire à *M. de la Prife* qu'on pourroit y suppléer par un solide *S* de 9 à 10 pouces, fig. 259, & de deux pouces & demi d'équarrissage, avec deux traverses qui assument le dessous du solide, & en forment comme une quadruple équerre qui assure la situation perpendiculaire du solide sur le plan.

L'ombre *O* de l'angle *S* du solide, se détermine avec assez de précision; en tirant des lignes *O A*, *O B* qui rasent légèrement l'ombre des côtés *C* & *D* de la base supérieure du prisme; le point de concours de ces deux lignes donne le point d'ombre cherché. *Méthode nouvelle pour tracer des cadrans, par M. de la Prife, à Caen, 1781.*

Cinquième méthode. Un seul point d'ombre peut donner le centre d'un *cadran vertical*, de la manière que nous avons employée pour le *cadran horizontal*. Car quand on connoît la longueur du rayon solaire *S O*, fig. 260, la longueur du style *S C* qui est égale au style droit divisé par le cosinus de la latitude, & l'angle *C S O* qui est égal à 90° plus ou moins la déclinaison du soleil, on peut résoudre le triangle, soit par le calcul, soit par une opération graphique, & trouver le côté *C O*; alors du point *O*, comme centre avec le rayon *O C*, l'on décrira un arc de cercle; du centre *S* avec une longueur égale à *S C*, on décrira un autre arc, & l'intersection commune sera le centre *C* du *cadran*.

Quand le faux style est une plaque percée d'un trou pour laisser passer le rayon solaire, il faut le boucher avec une pièce de bois bien ronde, & dont le centre puisse servir aux opérations précédentes,

Sixième méthode. On peut aussi trouver la position de l'axe du cadran par deux points d'ombre, qui ne supposent point des ombres égales; mais qu'on prend les plus éloignés qu'il soit possible.

On tendra deux fils comme SO du sommet du style S aux deux points d'ombre, & un troisième SC qui fasse avec les deux autres un angle égal au complément de la déclinaison du soleil; celui-ci marquera la position de l'axe ou du style SC .

Deux triangles de carton CSO découpés de manière qu'un de leurs angles S soit le complément de la déclinaison du soleil, & dont un côté seroit dans la direction du point d'ombre, étant réunis par leurs côtés supérieurs, marqueraient aussi la direction de l'axe.

On pourroit encore se contenter d'un seul point d'ombre, & faire un des triangles de carton, de manière que son côté vertical fit avec l'autre un angle égal au complément de la hauteur du pôle, (à Paris 41°) & quand un de ses côtés, réuni avec celui de l'autre triangle s'appliquerait contre le mur, il y marquerait le centre du cadran, & le côté oblique marquerait la position du style.

Septième méthode. Lorsqu'on a un style comme AB , fig. 261, dont la pointe B a donné trois points d'ombre C, D, F , il ne s'agit que d'avoir un cercle ODH qui touche les trois rayons BC, BD, BF & l'axe IB qui, traversant perpendiculairement le cercle, passera en B au bout du style, indiquera l'axe du cadran.

C'est le premier fondement de la *Manière universelle* de *M. Desjardes pour poser l'esclieu aux cadrans*, publiée en 1643. Elle est en effet très-simple dans la Théorie & assez commode dans la pratique. La figure fait voir comment on assemble la pointe du style avec les trois points d'ombre au moyen de trois règles ou de trois fils, sur lesquels on ajuste le dessous de l'axe IB , ou la partie qui passe exactement par le centre de la platine ou du cercle DH destiné à représenter le parallèle diurne du soleil pour ce jour-là. Les principes établis ci-dessus seront assez comprendre que les trois rayons solaires BC, BD, BF faisant le même angle avec l'axe BI & avec le cercle DHG , le style BI du cadran est nécessairement parallèle à l'axe du monde; les angles que les rayons font avec l'axe BI seroient des angles droits le jour de l'équinoxe, alors le cercle seroit parallèle aux trois rayons ou aux trois fils.

La huitième méthode que l'on peut employer pour les cadrans verticaux déclinans, est celle de la hauteur & de l'azimut du soleil, calculés par un point d'ombre, à la manière de *M. de Parcieux* qui a composé un volume presque entier pour l'explication de cette méthode, en détaillant tous les cas, tous les calculs, toutes les précautions, tous les exemples avec beaucoup de clarté, mais avec une espèce de prolixité. *Nouveaux traités de Trigonométrie & Gnomonique*, Paris 1741, in-4.

Ayant planté un faux style S , fig. 262, marque

le pied du style P & un point d'ombre O , l'on tire une horizontale PH & une verticale HO , on en mesure exactement les longueurs, & l'on s'en sert pour trouver par la Trigonométrie la hauteur du soleil & la différence de son azimut à celui du plan.

La hauteur du soleil sert à trouver son azimut vrai, & la différence trouvée précédemment donne celui du plan ou sa déclinaison.

Quand on connoît la déclinaison du plan, l'on peut trouver les lignes horaires soit par l'opération graphique de la troisième méthode, soit par la Trigonométrie sphérique, comme nous l'expliquerons dans la neuvième méthode.

Si l'on conçoit le style S relevé perpendiculairement au-dessus de P & réuni avec le point H par une ligne horizontale SH , on aura un triangle rectangle en P , situé horizontalement, dont on aura mesuré exactement les côtés SP, PH , & dont on pourra calculer & même mesurer l'hypothénuse SH . On calculera aussi l'angle H qui sera la différence entre l'azimut du soleil & celui du plan, puisque c'est un angle formé dans un plan horizontal entre la ligne PH du plan, & la ligne SH qui est dans le vertical du soleil. L'hypothénuse SH formera avec la verticale HO un triangle rectangle en H , dans le plan du vertical du soleil; connoissant les deux côtés SH & HO de ce triangle & même SO que l'on peut mesurer, on calculera l'angle O , qui est la distance du soleil au zénith, au moment où l'on a mesuré le point d'ombre.

Dans le triangle PZS , fig. 39, connoissant la distance ZS du soleil au zénith, la distance au pôle PS , & la distance du pôle au zénith PZ , on calculera l'angle Z qui est l'azimut du soleil. Ainsi, l'on connoît l'angle que fait le vertical du soleil avec le méridien, & comme l'on connoît par l'opération précédente, l'angle que fait le vertical du soleil avec le plan du cadran, la somme ou la différence de ces deux angles donnera l'angle du méridien & du cadran; ainsi, l'on connoît par un seul point d'ombre la position du mur sur lequel on se propose de tracer un cadran, après quoi l'on exécutera l'opération graphique dont nous avons donné le détail & la démonstration dans la troisième méthode, où l'on y appliquera le calcul trigonométrique.

La neuvième méthode pour tracer les cadrans verticaux est celle de la Trigonométrie sphérique, en supposant la déclinaison du plan connue par un des moyens que nous avons indiqués. Soit Z , fig. 40, le zénith, P , le pôle, $ZDRB$ le vertical qui est dans le plan du cadran.

PZD angle du plan ZB du cadran avec le méridien ZPO .

PR un arc perpendiculaire sur ZB , qui est le méridien du plan, le cercle de la soufitylaire; l'arc PR est l'angle de l'axe avec la soufitylaire.

PD un cercle horaire, par exemple, celui d'une
H b ij

heure qui fait avec le méridien un angle ZPD de 15° .

L'arc ZR est égal à l'angle de la soufflayre avec la verticale ou la méridienne.

L'arc DR est l'angle de la soufflayre avec la ligne horaire qui passe en D .

Dans le triangle ZPR on connoît PZ & l'angle Z du plan avec le méridien, l'on cherchera ZX , & ZPX , par les analogies suivantes.

R ; $\cos. Z$:: $\tan. PZ$:: $\text{ang. } ZR$.

R ; $\sin. PZ$ ou $\cos. \text{lat.}$:: $\sin. Z$:: $\sin. PR$ angle de l'axe avec la soufflayre.

R ; $\cos. PZ$ ou $\sin. \text{lat.}$:: $\tan. Z$:: $\cos. ZPR$ angle du méridien avec le cercle PR ou méridien du plan; cet angle s'appelle quelquefois différence des longitudes.

On tirera l'angle horaire ZPD de l'angle ZPR ou on les ajoutera, pour avoir l'angle DPZ , & l'on fera cette proportion; R ; $\sin. PR$:: $\tan. DPR$; $\tan. DR$, angle de la ligne horaire avec la soufflayre, mesuré dans le plan du cadran. M. de Clapiès a donné dans les Mémoires de l'Académie pour 1707, le calcul des angles des lignes horaires pour les cadrans solaires, verticaux ou inclinés, déclinatoires par les triangles rectilignes. M. de Paricux a donné lui-même des tables des angles horaires dans les cadrans verticaux à Paris, pour différentes déclinaisons; & M. Garnier en a donné même pour différentes latitudes en Europe, *Gnomonique mise à la portée de tout le monde*; Maréchal 1773, in-8°.

Lorsqu'on connoît par le calcul les angles des lignes horaires, on peut les tracer sur la muraille, en calculant en pieds, pouces & lignes, ou en parties égales d'une échelle quelconque les distances de ces lignes à la méridienne ou à la soufflayre. Soit SP , fig. 263, la hauteur du style droit, X le centre du cadran, PX la soufflayre. On mesure d'abord le style droit ou la distance perpendiculaire SP du faux style ou de la pointe du style au plan du cadran; dans le triangle SPX dont on connoît un côté SP & l'angle SPX du style avec la soufflayre, on trouvera la distance PX du centre du cadran au pied du style, & la distance SX ; dans le triangle SXE rectangle en S , on trouvera XE distance du centre X à l'équinoxiale EQ .

Pour tirer une ligne horaire comme $XKTLR$ dont on connoît l'angle avec la soufflayre, connoissant XE & l'angle EXL , on trouvera EL en parties de la même échelle que la hauteur du style droit SP , on prendra donc EL de la quantité trouvée, & l'on tirera du centre X la ligne horaire par le point L .

Pour s'assurer de l'exactitude de ces mesures avant que de peindre les lignes, on prendra sur une bonne montre l'espace d'une heure, & l'on verra si l'ombre a parcouru exactement l'intervalle des deux lignes horaires dans l'espace d'une heure.

Si l'on veut tirer les lignes horaires par le moyen de la méridienne verticale XFM , on se servira des angles que font ces mêmes lignes comme XR ; dans le triangle XEM , on connoît XE & l'angle MXE que fait la méridienne avec la soufflayre; on cherchera la longueur de la ligne XM ou la méridienne depuis le centre X jusqu'à l'équinoxiale M .

Dans le triangle MXR rectangle en M , connoissant XM & l'angle MXR de la méridienne avec la ligne horaire, on cherchera MR , & par le point R , on tirera du centre X la ligne horaire XR .

CADRAN sans centre. Lorsqu'un cadran vertical décline beaucoup vers l'orient ou vers l'occident, le centre est si loin, qu'il seroit difficile, souvent impossible de le marquer, à moins de faire le cadran très-petit: on y supplée par deux équinoxiales ou deux horizontales, en calculant deux fois la hauteur du style droit, ou deux fois le rayon de l'équateur pour des points de l'axe éloignés d'une certaine quantité.

On choisira les deux horizontales quand la déclinaison du plan sera petite, & que cependant l'on ne pourra pas avoir de centre. On préférera les deux équinoxiales quand la déclinaison sera fort grande, parce que les deux horizontales seroient trop près, si l'on vouloit s'en servir pour trouver les lignes horaires éloignées de la méridienne.

Si le point E , fig. 263, est l'intersection de l'équinoxiale avec la soufflayre, on prendra la distance SE de la pointe du style au point E , on la portera de E en C , on décrira le cercle AE qui représente l'équateur; le rayon CAM , mené au point de midi, déterminera le point A duquel il faut partir pour diviser le cercle AE de 15 en 15 degrés; l'arc AO étant supposé de 15° , on tirera COL , ce qui donnera sur l'équinoxiale ME le point L où doit passer la ligne horaire comme XL pour une heure après-midi.

On tirera une autre ligne FD parallèle à l'équinoxiale ME ; & ayant pris sur l'axe SVB un autre point B dont la distance à l'équinoxiale soit une ligne BD perpendiculaire au style en D , on portera cette distance sur la soufflayre de D en G . On décrira un autre cercle HD qui représentera encore l'équateur; & en partant du rayon GHF qui passe par la méridienne F , on prendra des arcs de 15° comme HN ; on tirera par chaque point N des rayons GNK qui, prolongés jusqu'à la tangente FDV , donneront sur cette seconde équinoxiale les points horaires K correspondans à ceux de la première équinoxiale ME , & on tirera les lignes horaires comme KL , par les points correspondans K & L des deux lignes équinoxiales.

Si l'on a employé le calcul comme dans la méthode précédente, on saura quel angle doit faire chaque ligne horaire KL avec la méridienne FM ,

& combien le centre X doit être éloigné de l'équinoxiale M ; ainsi, dans le triangle XMR connoissant le côté M & l'angle X , on trouvera la valeur de MR . On prendra un point F deux ou trois pieds plus haut; & résolvant le triangle XFT , on trouvera la valeur de la perpendiculaire FT , ce qui déterminera la ligne horaire TR , sans employer le centre X .

On connoît aussi l'angle SXP du style avec la soufrière, on connoît SP , on calcule des perpendiculaires comme VD & QE pour des distances XE , XD prises à volonté, & l'on place le style VQ au soufrière DE , en menant une triple équerre, fig. 264, à un bout du style, & une double équerre à l'autre bout pour le soutenir en place, jusqu'à ce que les supports $VDQE$ soient scellés.

IX. CADRANS inclinés & déclinaux. On choisit rarement, pour tracer des cadrans, les surfaces qui ne sont ni verticales, ni horizontales; cependant M. de la Hire, considérant que les murailles les plus solides ne sont jamais exactement verticales, a regardé tous les cadrans comme pouvant avoir un certain degré d'inclinaison, & il a cherché des méthodes générales qui pussent servir pour des cadrans inclinés: nous en traiterons à son exemple, mais beaucoup plus en abrégé, parce qu'il nous a paru qu'il y avoit dans ces méthodes plus d'élégance & de savoir, que d'utilité pour la pratique.

On appelle quelquefois *reclinans* ces cadrans inclinés quand ils ne passent pas par le pôle, & *déclinans* lorsqu'ils ne regardent pas les points cardinaux, ou qu'ils sont à-la-fois inclinés & déclinaux.

Je commencerai par indiquer un moyen mécanique, mais facile de tracer ces cadrans sur toutes sortes de plans, en y employant un cadran équinoxial ou un cadran horizontal bien orienté. La méthode est la même que celle qu'on a vue pour les cadrans verticaux dans la première & seconde méthode.

Je passe donc à la méthode indiquée par la plupart des auteurs, & qui suppose qu'on connoisse la déclinaison & l'inclinaison du plan. On connoît la première par le moyen du déclinauteur, fig. 256, & la seconde par le moyen d'un demi-cercle décrit sur une planche carrée $ABCD$, fig. 263, & garni d'un à-plomb FGH qu'on applique sur le plan incliné $IBCL$, en observant de le placer sur une ligne perpendiculaire aux lignes horizontales du plan; la distance EG entre le fil à-plomb & la ligne du milieu FE , forme un arc égal à celui qui mesurerait l'angle L , inclinaison du plan IL sur la ligne horizontale KL .

Supposons un plan qui décline du midi à l'orient de 35 degrés, c'est-à-dire, qui regarde le midi & l'orient sous un angle de 35° & incliné de 25°, supérieur.

Tirez les deux lignes AE , GD à angles droits, le point d'intersection E étant supposé le lieu ou le pied du style; prenez sur la ligne horizontale une quantité EF égale à la longueur du style; de l'extrémité F , comme centre, soit décrit un arc HI , coupant l'horizontale GD au point G ; prenez l'arc GH égal à l'inclinaison qui est de 25°, & GI égal à son complément 65°, la ligne imaginée de F en I sera horizontale, & de F en H verticale. Par le point I tirez l'horizontale MI LN , & par le point H la ligne FKH qui coupe la ligne OE au point K .

Prenez la distance FL , & portez-la de L en O ; du point O , comme centre, décrivez l'arc PLQ , du point L prenez l'arc LQ égal à la déclinaison du plan 35°, à droite du point L , si le cadran décline vers l'orient; ou s'il décline du septentrion à l'occident, prenez l'arc LP égal au complément de la déclinaison; la ligne OQN marquera au point N le point du midi; car puisqu'il FL égale OL , si l'on imagine le point F & le point O relevés horizontalement à la hauteur du point L , ayant pris l'arc LQ égal à la déclinaison du plan, la ligne horizontale OQN sera dans le méridien: mais la ligne FK est verticale, & la ligne menée de F à N est une méridienne horizontale; le point K est donc dans le méridien, donc la ligne KN est la méridienne du cadran, & la ligne perpendiculaire OPM marquera en M le point de six heures.

Ayant tiré la méridienne par le point N & le point K pour avoir le centre C , on abaissera du point M une perpendiculaire MBR sur la méridienne; on portera l'espace NO depuis le point N jusqu'en R sur cette perpendiculaire, ou bien l'espace KF depuis K ; car le point F & le point R sont un même point; pour faire une intersection en R , & l'on tirera la ligne occulte NR du point R on décrira l'arc $V'SX$, on prendra SV de 49°, qui est la hauteur du pôle pour Paris, & la ligne VR ira marquer en C , sur la méridienne, le centre du cadran.

En effet, pour trouver le centre du cadran C , il faut avoir une ligne NR qui soit placée, par rapport à la méridienne du plan & dans le plan, comme la méridienne horizontale ON l'étoit dans le méridien, c'est-à-dire, qui fasse avec la méridienne du plan le même angle que faisoit la méridienne horizontale; pour cela, il ne s'agit que de faire tourner la ligne ON autour du point N , sans changer ni sa longueur, ni sa distance perpendiculaire à la méridienne NC , & l'amener en NR . Pour cela, je conçois un plan perpendiculaire au méridien, passant par la ligne horizontale OM qui est perpendiculaire au méridien, & je le fais tourner jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la méridienne NC de mon plan; alors la ligne tirée du point M & la ligne tirée du point O seront également perpendiculaires en B sur la méridienne, puisqu'elles sont toutes deux

dans un plan perpendiculaire à la méridienne en B ; la ligne BR fera la hauteur perpendiculaire du point O ou du point R au-dessus de la méridienne; & en renversant sur le plan le triangle NBR , nous aurons le même angle KNR , puisque l'hypothénuse & le côté BR sont les mêmes, & il importe peu que BR soit perpendiculaire à la méridienne NB , ou dans le plan ou au-dessus du plan. Prenons donc au-dessus de la méridienne horizontale NR un arc SV de 49° , la ligne RV ira au pôle & au centre du cadran, la ligne RX dans l'équateur & dans le méridien; donc l'équinoxiale passera par le point Z de la méridienne.

On fera aussi SX égal au complément de la hauteur du pôle; la ligne ou le rayon RX coupera la méridienne en Z , & par ce point on tirera l'équinoxiale MZ . La soufflayre CE est perpendiculaire à l'équinoxiale en T ; car elle est formée par l'assemblage des perpendiculaires abaissées de l'axe du cadran sur le plan, & par la commune section de deux cercles qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, le plan & le méridien du plan; mais l'équateur est aussi perpendiculaire au méridien du plan; donc il fera sur le plan une commune section qui sera perpendiculaire à celle du méridien ou du cercle horaire du plan. En effet, quand deux plans sont perpendiculaires l'un à l'autre, un autre plan aussi perpendiculaire à l'un ne peut faire qu'une section parallèle à celle du premier; le style passe par C & par le bout F du style droit EF . Pour tracer les heures, on peut porter sur le cercle PIQ les arcs des heures pris sur un cadran horizontal dont la méridienne soit sur OQN , on prolongera les rayons jusqu'à la tangente horizontale MN , & l'on aura les points où passent les lignes horaires, ou bien l'on cherchera le centre H diviseur de l'équinoxiale MTZ , en portant la distance TF entre le point T & le bout du style sur la soufflayre CT . On décrira sur ce rayon un cercle dont l'équinoxiale soit tangente, on le divisera de 15 en 15 degrés, en commençant au point Z où la méridienne coupe l'équinoxiale, ou au point M de 6 heures; les rayons tirés de 15 en 15 degrés marqueront sur l'équinoxiale les points par lesquels il faut tirer les lignes horaires qui partent du centre C du cadran.

C'est sur ce principe que l'on trace des cadrans sur différentes faces d'un polyèdre ou d'un solide à plusieurs pans, comme on en voit souvent dans les jardins.

Les opérations que nous venons d'exécuter avec la règle & le compas, se peuvent remplacer par la Trigonométrie sphérique, si l'on avoit à construire un très-vaste cadran.

Soit TRB , fig. 267, la moitié de l'horizon, Z le zénith, P le pôle, A le grand cercle dans le plan duquel est le cadran incliné & déclinant. L'arc ZV , perpendiculaire au plan, est le complément de

l'inclinaison, & l'angle AZV le complément de la déclinaison ER du cadran. L'arc PY , perpendiculaire sur le plan, est l'angle du style avec la soufflayre.

Dans le triangle AZV , on cherchera l'arc AZ qui, ajouté avec PZ , donnera AP ; l'on cherchera aussi l'angle A .

Dans le triangle APY , connoissant AP & l'angle A , on trouvera AY , angle de la soufflayre avec la méridienne, S l'élevation du style sur le plan égale à PY , & l'angle APY que le méridien du lieu fait avec le cercle horaire perpendiculaire au cadran, ou avec le méridien du plan.

Pour trouver les lignes horaires, on supposera un cercle horaire PO , faisant avec le méridien un angle P de 15° pour une heure, &c.; on l'ôtera de l'angle APY pour avoir OPY qui, avec l'arc PY , fera trouver OY : c'est la mesure de l'angle que fait dans le plan du cadran la ligne d'une heure avec la soufflayre.

Si l'on veut rapporter les lignes horaires à l'horizontale du plan, on résoudra le triangle ARI dans lequel on connoît l'inclinaison R & la déclinaison IR par rapport au méridien; on trouvera AR qui mesure l'angle de la méridienne avec l'horizontale du cadran.

Ce problème général a été résolu analytiquement dans un mémoire qui fait partie du volume, intitulé: *Recherches sur la Gnomonique, les Rétrogradations & les Eclipses 1751*, dont les auteurs étoient M. du Séjour & M. Goudin. Celui-ci en a donné une solution dans l'Encyclopédie d'Yverdon au mot *Gnomonique*, & dans les suppléments de Paris au mot *Cadran*.

Jusqu'ici j'ai supposé qu'on connoît l'inclinaison & la déclinaison du plan sur lequel on veut tracer un cadran; mais on peut y suppléer avec des points d'ombre, comme dans les cadrans verticaux.

Quand on connoît la hauteur du pôle & la déclinaison du soleil, il suffit d'un seul point d'ombre pour trouver la soufflayre sur un plan quelconque. (La Hire, p. 44.)

Soit S la pointe du style (fig. 268), qui a donné le point A ; P le pied du style, ou le point sur lequel tombe la perpendiculaire, abaissée du style S sur le plan; H à une ligne horizontale qui réponde ou soit de niveau à la hauteur du style S ; PZ parallèle à Hh , & égale au style droit PS ; BPH perpendiculaire sur l'horizontale Hh ; on tirera HZ , & ZB perpendiculaire à ZH .

On fera séparément un angle psa (fig. 269) égal à la distance du soleil au pôle, & l'angle psb égal au complément de la hauteur du pôle, pour que psd représentant l'axe du cadran, la ligne sb soit verticale; & ayant pris un point d à volonté, on fera sb égale à ZB , & sa égale au rayon solaire, mesuré de S en A ; on joindra les lignes ad & bd .

" On tirera la ligne AB ; du point B comme centre, avec un demi-diamètre égal à $b d$, on décrira un arc $f L$; du point A avec un rayon égal à $a d$, on décrira un arc $g L$; du point L , on mènera la ligne LO perpendiculaire sur AB : cette ligne fera le rayon d'un cercle sur lequel doit être le point de l'axe que l'on cherche, représenté par le point d .

Du point O comme centre avec un rayon OL , on décrira un arc de cercle $D L e$; du point P , on mènera PGK perpendiculaire à OL , ou parallèle à BA ; du point P , comme centre avec un rayon égal à $d s$, on fera une intersection I sur la ligne OL . Alors GI sera égale au rayon de la base d'un cône, dont l'axe est égal à PG , & le côté égal à PI .

On fera GK égale à la hauteur du style PS du point K avec un rayon égal à GI ; on décrira un arc RD , qui coupera le cercle DL en D , ce point étant conçu relevé au-dessus de la ligne $LGIO$, et celui où doit passer le style en sorte que DQ perpendiculaire sur LO , marquera le point de la soufflante, qui répond perpendiculairement fous le point d du style.

En effet, si l'on conçoit le cône dont le sommet est au point S , relevé au-dessus de P , le centre de la base au point K relevé au-dessus de G , & le côté PI égal à $d s$; la circonférence de sa base renfermera tous les points où peut répondre le point d de l'axe. Mais le cercle LD renfermera aussi tous les points qui sont éloignés de A & de B autant que le point d : donc c'est à la rencontre des deux arcs que doit être le point d de l'axe; donc la perpendiculaire DQ marquera le point de la soufflante, correspondant au point d de l'axe.

Ayant un point Q de la soufflante, on tirera la ligne PQ par le pied du style, & ce sera la soufflante, au moyen de laquelle on décrira le cadran par la méthode indiquée ci-devant.

Dans la Gnomonique de M. de la Hire, il y a dix méthodes semblables pour trouver par deux ou trois points d'ombre, ou la soufflante, ou le centre d'un cadran incliné, sans connaître même la déclinaison du soleil, ni la hauteur du pôle; la plupart de ces méthodes sont assez compliquées pour les démonstrations, & il me semble qu'elles ne font pas fort utiles pour la pratique.

X. Cadran sans style par la hauteur du soleil.
Dans tous les cadrans dont nous avons parlé jusqu'ici, il y a un style parallèle à l'axe du monde; mais on peut aussi trouver l'heure qu'il est par la hauteur du soleil ou par son azimut, de plusieurs manières différentes; & c'est ce que nous allons expliquer.

L'astrolabe ou planisphère, dont les astronomes depuis Ptolémée ont fait un usage continu, s'appliquoit à tous les problèmes de la sphère & de la Trigonométrie sphérique. On dut naturellement l'appliquer à trouver l'heure par le moyen

de la hauteur du soleil; ce qui produisit les cadrans où l'heure est marquée par le fil même qui sert à mesurer la hauteur du soleil.

Aussi voyons-nous ces cadrans décrits dans les plus anciens auteurs de Gnomonique. Schallien Munsler en décrit un, dont il dit *quadrans juxta veterum usum*, & il cite Regiomontanus comme en ayant fait un d'une espèce particulière, différent de ceux des anciens. Dans celui de Munsler, les lignes horaires sont des courbes tracées par la table des hauteurs du soleil à différents heures du jour & en différents tems de l'année; & c'est celui que nous allons décrire. Munsler se servoit de l'astrolabe pour trouver les hauteurs du soleil à toute heure; mais il y a des tables des hauteurs qui sont propres à construire de pareils cadrans, elles se trouvent dans la *Connoissance des tems*, de 1782, pour Paris, & pour d'autres latitudes dans la Gnomonique de Dom Bedos, & dans les *Tables du Nonagisme*, imprimées à Avignon en 1776; celles-ci ont été calculées par M. Trubchet, d'Auxerre.

On y peut suppléer par la résolution du triangle PZS , que nous avons expliqué au mot HAUTEUR, & qui sert également à trouver l'heure qu'il est quand on a observé la hauteur du soleil, ou la hauteur pour une heure donnée.

Mais, pour un cadran, il suffiroit de l'opération graphique de l'analemme. (*V. PROJECTION.*) Soit $H O$ l'horizon, fig. 222, P le pôle, $E Q$ l'équateur, $M S A$ le parallèle diurne du soleil pour une déclinaison $E M$, $H B$ la hauteur observée du soleil, $B C$ une ligne parallèle à $A O$; ayant ouvert un compas de proportion sur le rayon $M A$ du parallèle, on cherchera quel est l'arc dont le double de $S A$ est la corde, on en prendra le supplément à 180° , & prenant une heure pour 30° , 2^h pour 60° , &c. on aura l'heure qui répond à la hauteur $B H$ observée, ou à la position du point S sur le parallèle diurne du soleil.

Connoissant la hauteur du soleil à différentes heures, nous allons tracer les lignes horaires sur le cadran.

Soient P & C (fig. 270) les deux pinnules que l'on dirige vers le soleil pour mesurer sa hauteur; AB , ED deux arcs de cercles décrits du centre C , dont l'un serve pour le solstice d'hiver, l'autre pour le solstice d'été, on pourra en décrire tant qu'on voudra dans l'intervalle AE pour les différents mois de l'année.

Si je veux marquer 9 heures du matin pour le 21 décembre, je cherche la hauteur du soleil, qui est $7^\circ \frac{1}{2}$; je prends un arc AF de cette quantité, & le point F est un des points de la ligne de 9 heures.

Si je fais la même opération avec la hauteur du soleil le 21 juin, qui est $46^\circ \frac{1}{2}$, il faudra prendre ce nombre de degrés sur le cercle d'un haut; on aura l'arc EG , & le point G sera l'autre extrémité de la ligne de 9 heures.

Pour trouver le point qui répond au 1^{er} avril, je me fers d'un cercle décrit par le point *H*, & le nombre de degrés que le soleil à ce jour-là de hauteur tonnant en *K*, me donne un troisième point de la ligne horaire cherchée; quand on a ainsi un grand nombre de points, on trace la ligne à la main.

Le fil à plomb, qui pend librement du centre *C*, porte un coulant, une perle, un grain d'émal, que l'on peut changer de place; on amène le fil sur la ligne *CA*, l'on met la perle à la distance *CH*, si c'est le premier avril, on dirige les pinnules vers le soleil, & le fil à-plomb se trouvant tomber dans la direction *CK* à neuf heures, la perle manquera en *K* sur la ligne de 9 heures, & l'on fera sûr qu'il est en effet 9 heures du matin.

On a donné dans les suppléments *in-folio* de l'Encyclopédie, la description d'un semblable cadran, par M. Lambert, disposé tout différemment, mais qui n'a pas plus d'avantage. Dans les mêmes suppléments au mot *AZIMUT*, on trouve la description d'un instrument semblable pour trouver l'azimut du soleil par le moyen de sa hauteur; il est de l'invention de M. Lambert, ainsi qu'un double secteur qui sert au même usage; mais l'article étant très-long, & ne me paroissant pouvoir être que peu d'usage, il m'a semblé ne devoir pas entrer dans ce Dictionnaire.

L'anneau solaire est un cadran de même espèce, c'est-à-dire, où l'on marque l'heure par les hauteurs du soleil, dans la concavité d'un petit anneau où les lignes horaires sont tracées, *Bion*, pag. 375.

XI. CADRAN universel par les hauteurs du soleil. Ce cadran, qui est appelé quelquefois le *capucin* (fig. 271) à cause de la forme pointue de la partie supérieure, se trouve dans Sebastien Munster, sous le nom de *Quadrangulum Horoscopium*, ou *Horologium quadrangulum generale*: il est aussi dans Oronce Finé; ce qui me fait penser que l'invention en est plus ancienne que les ouvrages de ces deux auteurs, publiés en 1531. Il est décrit dans Clavius, pag. 327; mais aucun de ces auteurs n'en a donné la démonstration; je vais tâcher d'y suppléer.

Construction. D'un point *A* pris pour centre (fig. 271), on décrit un arc de cercle *EF*; on prend de chaque côté de la ligne du milieu *AD* des arcs de 23°, 28° pour y marquer les déclinaisons du soleil au premier degré, au 10^e & au 20^e de chaque signe, ou pour le 1, le 10 & le 20 de chaque mois; à droite les déclinaisons australes, à gauche les déclinaisons boréales. Pour cet effet, on peut décrire par la corde *EF* un cercle divisé en degrés; on y marquera les longitudes du soleil; on tirera par chaque longitude une perpendiculaire sur *EF*; elle coupera l'arc *EDF* au point de la déclinaison cherchée.

Ayant pris *OL* pour la largeur du cadran, on

décrira un quart de cercle *OM*, sur lequel on prendra les latitudes terrestres; on en marquera les tangentes sur le bord extérieur *OV*, & par ces différents points on tirera des perpendiculaires dans le triangle *AEF*: ainsi *AM*, *AG* seront égales aux tangentes de 45° de 60°, & les lignes passant par les points *M* & *G* parallèlement à *EF*, sont celles où l'index devra être placé sous les latitudes de 45° & de 60° respectivement, & ainsi des autres.

A l'extrémité *L* de la ligne *OAL*, on fera encore un triangle des lignes *CAB*, en y transportant les divisions de la ligne *MX*, qui passe à 45°, & dont la distance *AM* est égale à *AL*. On mettra en haut les déclinaisons boréales de *L* en *C*, en bas les déclinaisons australes de *L* en *B*.

Pour tracer les lignes horaires, on continuera le cercle décrit sur *OA*; on divisera la partie *ONL* de 15 en 15 degrés; on tirera des perpendiculaires à *OA*, & ce seront les lignes horaires *CH*, *AN*, *OP*, en commençant par *CH*, qui sera la ligne de midi, mais qui ne peut servir réellement, parce que la hauteur du soleil varie trop peu aux environs du midi.

Usage. On suspend un fil à-plomb sur le point du triangle *AEF*, qui répond à la hauteur du pôle du lieu où l'on est, & à la déclinaison ou au lieu du soleil le jour de l'observation. Le fil à-plomb a une perle ou un nœud mobile qu'on amène sur le point de la ligne *BLC*, qui répond encore au lieu du soleil sur le petit triangle. Dans cet état, le grain est à la distance convenable de la suspension pour marquer l'heure sur les lignes horaires lorsque le bord supérieur *EFG* sera dirigé vers le soleil, ou élevé de la quantité de la hauteur du soleil par le moyen des pinnules qui sont au bord supérieur de la plaque du cadran.

Je suppose, par exemple, qu'on soit à 60° de latitude, & que le soleil soit au solstice d'été, on suspendra le fil à-plomb au point *E*; on fera couler la perle jusqu'en *C*, & la longueur du fil *EC* rendu libre marquera l'heure sur les lignes *CH*, *AN*, *OP*.

Pour varier aisément la suspension du fil à-plomb, on se sert d'un petit bras recourbé & brisé, mobile à frottement, dont on amène l'extrémité sur le point d'intersection de la ligne de déclinaison & de la ligne de latitude.

Démonstration. Pour plus de facilité, je commencerai par le cas le plus simple; si l'observateur est sous la ligne équinoxiale, & le soleil dans l'équateur, le point de suspension est en *A*, & la perle du fil à-plomb partant du point *L* à midi quand le soleil est au zénith arrive en *N* quand le soleil se couche, & que la ligne *EF* est dirigée vers l'horizon; elle parcourt des arcs égaux en tems égaux, ou 15 degrés à chaque heure sur la circonférence *LN*; ainsi, les lignes horaires

qui

qui font tirées de 15 en 15 degrés, satisfont dans ce cas-là.

Si le soleil est dans le tropique, le fil à-plomb à midi tombe à l'extrémité *B* du petit zodiaque, ou il fait un angle de 66° avec la ligne *AN*; c'est la hauteur méridienne ce jour-là pour un observateur situé sous la ligne. A mesure que la ligne s'abaisse, l'angle *BAN* diminue comme la hauteur du soleil; les intervalles des lignes horaires, comprises entre *LH* & *AN*, sont les cosinus des angles horaires par la construction, puisqu'on a pris ces angles horaires sur l'arc *LN*; ainsi, les sinus des angles du fil à-plomb avec la ligne *AN* diminuent comme les cosinus des angles horaires. Or il est facile de voir que c'est aussi la marche des hauteurs du soleil dans ce cas-là. En effet, soit *EV* (fig. 32), le diamètre de l'équateur, *HO* l'horizon, *TP* le rayon du tropique, décrit par le soleil; suivant la propriété de la projection de l'analemmatique, le soleil à 4 heures répond en *M* dans la projection, en sorte que le cosinus *TM* de l'angle horaire est la moitié du rayon *TP* du parallèle; mais *MT* est aussi le sinus de la hauteur du soleil: donc le sinus de la hauteur du soleil est comme le cosinus de l'angle horaire; donc le cadran répond à ce qui se passe dans la sphère pour ce cas-là.

Supposons maintenant pour l'observateur une latitude quelconque égale à *PO* (fig. 252), *EQ* l'équateur, *MAF* le parallèle du soleil, *K* le lieu du soleil dans la projection analemmatique, *KL* le sinus de la hauteur du soleil, *KA* le cosinus de l'angle horaire; on voit que la ligne *KL* sera toute la journée proportionnelle à *KE*, qui est la somme du cosinus de l'angle horaire actuel, & du cosinus *AF* de l'angle horaire au lever ou au coucher du soleil.

Or si le point de suspension dans le cadran est en *E* (fig. 271), & que la perle décrive l'arc *KQC* depuis le lever du soleil, qu'elle sera en *K* jusqu'à midi qu'elle sera en *C*, le sinus, comme *QR* de l'arc *QK*, qu'elle aura décrit à sept heures du matin, sera la somme de *QS* & de *SR*, c'est-à-dire, du cosinus de l'angle horaire à sept heures, & du cosinus de l'angle horaire au point *K* vers *P*, qui est le lever du soleil dans ce cas-là: donc elle marquera les heures & les hauteurs comme nous avons vu qu'elles sont dans l'analemmatique.

J'ai dit que la perle étoit en *C* à midi; il est aisé de voir qu'en effet l'angle *CEK* est égal à la hauteur méridienne du soleil; car le triangle *EAC* est semblable au triangle *GAL* (dont l'angle *G* est égal à la hauteur de l'équateur, puisque *AG* est la tangente de la latitude), les côtés *AE* & *AC* étant plus grands que *AG* & *AL* dans le rapport de la sécante de 23° à son rayon; ainsi, la ligne *EC* est plus inclinée que *GL* de 23°; par rapport à *GA* ou *EA*; donc elle est inclinée d'une quantité égale à la somme

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

de la hauteur de l'équateur & la déclinaison du soleil, c'est-à-dire, égale à la hauteur méridienne.

On trouve le lever & le coucher du soleil sur ce cadran en plaçant le fil à-plomb parallèlement à la ligne *VOP*, & regardant à quelle ligne horaire il répond.

On peut aussi mesurer la hauteur du soleil à une heure quelconque, en suspendant le fil en *A* au centre du demi-cercle *LNO* qu'on peut diviser en degrés, & que les lignes horaires paraissent en quarts d'heure, qui sont chacun $3\frac{1}{4}$ de la circonférence.

Dans les suppléments de l'Encyclopédie au mot *HEURE*, on a donné la description & la figure de ce cadran, d'après un journal anglais, en y ajoutant un quart de cercle mobile, avec une alidade & deux règles qui se meuvent par des coulisses pour placer le centre du quart de cercle sur un point quelconque. Mais l'ancienne méthode que j'ai suivie ici est aussi commode & moins dispendieuse; & j'ai cru qu'il falloit préférer ici l'explication des cadrans, que l'on a le plus souvent exécutés, & que l'on rencontre le plus fréquemment.

On trouve aussi dans les suppléments de l'Encyclopédie au mot *CADRAN*, la description d'un instrument, qui donne également l'heure par le moyen de la hauteur en faisant mouvoir une règle pour différentes latitudes, & une alidade pour les différentes déclinaisons; cet instrument est de *M. Lambert*.

XII. *Cadran analemmatique ou azimutal, fig. 274.* Il fut donné en 1644, par Vautelard, dans un ouvrage françois, intitulé: *Traité de l'origine, démonstration, construction & usage du quadrans analemmatique*, & il fit le principal objet d'un livre de Forster, publié, en 1654, à Londres sous le nom de *Elliptical Horology*. Ce cadran a été copié depuis par tous les auteurs de Gnomonique, toujours sans démonstration; ce qui fit que j'en donnai une dans les *Mémoires de l'Académie*, année 1757; mais en voici une autre bien plus simple, déduite du principe de la projection orthographique.

Construction. Soit *ABD* (fig. 272) une ellipse décrite sur un plan horizontal, dont le petit axe soit au grand, comme le sinus de la latitude est au rayon (à Paris comme 753 est à 1000); du centre *C*, l'on prendra sur la méridienne du côté du nord, quand le soleil déclina au nord une distance *CM* égale au produit du cosinus de la latitude par la tangente de la déclinaison du soleil (à Paris 286 au solstice), on élèvera en *M* un style vertical. On divisera l'ellipse *ABD* en heures par des perpendiculaires comme *EF* abaissées de 15 en 15 degrés du cercle circonscrit *AED*, & le style marquera l'heure sur la circonférence de l'ellipse.

Démonstration. Soit HO (fig. 272), l'horizon vu de profil, ou projeté sur le méridien, OEQ la projection de l'équateur ou d'un *cadran* équinoxial, dont le style est BES . Concevons que le *cadran* équinoxial soit projeté sur l'horizon par des perpendiculaires, sa circonférence formera une ellipse, dont le petit axe HO sera le sinus de l'angle Q égal à la latitude du lieu. Le style ES , qui est égal à la tangente de la déclinaison, aura pour projection MC ou SA plus petite que SE dans le rapport du sinus de l'angle SEA , ou du cosinus de la latitude au rayon.

Au moment où le sommet du style S marque l'heure sur un point horaire de la circonférence du *cadran* équinoxial, on peut considérer le rayon solaire, qui va du sommet du style au point horaire, comme projeté, ainsi que le sommet S , la projection de ce rayon solaire ira du point M au point où se projette le point horaire; ainsi, on peut ne considérer que la projection, & l'on sentira que le point M doit faire ombre sur le point de l'ellipse, qui répond au même point du cercle, ou qui en est la projection.

On peut aussi concevoir un cercle vertical passant par le soleil & par le sommet du style S , l'ombre du point S sera nécessairement dans ce vertical, ainsi que le point horaire du *cadran*, & sa projection; donc le point M & l'ombre toute entière du style vertical SM , se trouveront dans le plan du même cercle vertical; donc l'ombre du point S & du point M tombera sur le point de l'ellipse où tombe le point horaire du cercle ou du *cadran* équinoxial.

Pour éviter le calcul de la quantité CM , on peut employer la construction suivante. Ayant pris un arc PO (fig. 273) égal à la hauteur du pôle, & DO égal à la déclinaison, on tirera EP ,

ED & la perpendiculaire PG ; le segment GK sera la quantité dont le style devra être éloigné du centre, sur un *cadran* dont le rayon EO seroit le demi-grand axe. En effet, $GK = EG$, tang. décl. = cof. latit. tang. décl. expression qui revient au même que celle de la démonstration précédente.

On peut aussi trouver le point M en cherchant le foyer F de l'ellipse, & faisant l'angle CFM égal à la déclinaison du soleil; car la distance BF du foyer au petit axe est égale au rayon AC ; ainsi CF est le cosinus de la latitude: donc $CM = \text{cof. lat. tang. décl.}$.

On trouve dans la plupart des auteurs une construction fort compliquée, & que je ne rapporterai point ici par cette raison, mais elle revient au même que celle-ci.

On lit aussi dans les suppléments de l'Encyclopédie *in-folio* une théorie générale, mais très-longue de ce *cadran*, & une construction géométrique de M. Lambert; mais je crois l'article précédent très-suffisant pour le *cadran* azimutal.

Il est inutile de parler ici de la manière de tracer une ellipse; on peut le faire ou avec un cordon égal au grand axe, fixé sur les deux foyers, ou avec un compas à ellipse, ou enfin avec deux cercles concentriques divisés en 24 heures, de la manière que nous expliquerons en parlant des éclipses.

Voici une table des principales mesures nécessaires à la construction de ces *cadrans* pour différentes hauteurs du pôle.

La moitié du grand axe étant divisée en 1000 parties égales, on voit dans cette table combien de ces parties doit avoir la distance qu'il faut mettre entre le centre du *cadran* & le style, le 22 de chaque mois, ou à l'entrée du soleil dans chaque signe.

DISTANCES ENTRE LE CENTRE ET LE STYLE, dans un Cadran azimutal.				
Hauteurs du pôle ou latitudes.	21 { Février, Avril, Août, Octobre.	22 { Janvier, Mai, Juillet, Novembre.	23 { Juin, Décembre.	Moitié du petit axe.
30°	176	318	376	500
35	166	301	356	574
40	156	282	333	643
45	144	260	307	707
50	131	236	279	766
55	117	210	249	819

Ce *cadran* azimutal a l'avantage de n'être pas sujet à l'incertitude des réfractions.

M. Lambert a remarqué dans les éphémérides

de Berlin, pour 1777, qu'on peut substituer à l'ellipse un cercle horizontal divisé en parties égales, pourvu que le style soit incliné vers le

point qui tient le milieu entre le zénith & le pôle, & que la distance au centre soit égale au produit de la tangente de la moitié de la hauteur de l'équateur par celle de la déclinaison; je n'en donnerai pas ici la démonstration; c'est un objet de pure curiosité.

XIII. CADRAN cylindrique par les hauteurs. On fait souvent de petites colonnes portatives qui, présentées au soleil, y marquent l'heure qu'il est, au moyen d'un style horizontal perpendiculaire à l'axe du cadran. On voit dans la figure 275 le développement du papier dont on environne le cylindre; la ligne *BA* qui est égale à la circonférence du cylindre, est divisée en six parties égales pour répondre à six mois de l'année, parce que les six autres se répètent sur les mêmes divisions. Sur chacune de ces divisions, on tire une ligne verticale comme *CD*, sur laquelle on cherche les points de chacune des lignes horaires, par le moyen de la table des hauteurs du soleil à différentes heures du jour. Pour cet effet, ayant pris une longueur *SE* égale à la saillie du style qui doit faire ombre, on tire une ligne *TE* qui fasse un angle *T* égal à la hauteur du soleil pour le jour & l'heure données; par exemple, à deux heures pour le 20 de mai ou de juillet, & l'on porte la longueur *SE* de *C* en *F* sur la ligne du 20 mai ou du 20 juillet; le point *F* marque l'endroit où doit passer la ligne de deux heures: car lorsque le style sera tourné sur le point *C*, & exposé directement au soleil de manière que son ombre couvre la ligne *CD*, la pointe *T* du style jettera son ombre au point *F* & y marquera deux heures, puisque la ligne *GFH* est la ligne de 2 heures. On trouvera de plus grands détails sur cette espèce de cadran, dans la *Gnomonique* de Dom Bedos 1774; mais ce que je viens de dire suffit pour en faire comprendre le principe, & peut-être même pour la plupart de ceux qui voudroient en construire.

XIV. CADRAN qui se voit à Paris sur la colonne de l'hôtel de Soissons ou de la halle au blé L'hôtel de Soissons fut bâti en 1573 par Catherine de Médicis, sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Nesle; il prit le nom d'hôtel de Soissons en 1604, ayant été acheté par Charles de Bourbon, comte de Soissons; le prince de Carignan, mort en 1741, ayant laissé des dettes, les créanciers le firent démolir; la ville de Paris acheta le terrain, & l'on y a bâti la halle au blé.

Catherine de Médicis y avoit fait faire une colonne de 80 pieds de haut, par Jean Bulland: M. de Bachaumont l'acheta pour empêcher qu'elle ne fût démolie; & en 1764, M. de Viarmes, prévôt des marchands, engagea M. Pingré à y faire un cadran solaire; il n'y en avoit aucun parmi ceux qui avoient été décrits jusqu'alors qui pût convenir à cette colonne; & M. Pingré a imaginé celui dont je vais donner la description d'après l'ouvrage qu'il publia en 1764: *Mémoire sur la colonne de la halle aux blés*; à Paris, chez Barrois,

J'y ajouterais les résultats des calculs qu'il n'avoit point publiés, & une figure exacte du cadran, avec la partie de la colonne sur laquelle il est tracé.

On a choisi à 50 pieds de hauteur au-dessus du pavé un espace de 9 pieds, qu'on a rendu cylindrique en remplissant les cannelures de la colonne, & qui s'est trouvé avoir 29 pieds 9 pouces 9 lignes & $\frac{1}{2}$ de circonférence, & le rayon en lignes 684,35. Une ligne verticale tirée sur la face méridionale de ce tambour, exprime la section du méridien de la colonne; les intersections des cercles horaires sont des ellipses qu'on y a tracées, & qui forment sur le tambour les lignes horaires du cadran.

Un cercle horizontal qui fait le tour de la partie supérieure, porte 15 styles horizontaux qui ont 4 pieds 5 pouces 2 lignes de saillie, & dont chacun couvre par son ombre une des ellipses horaires à l'heure qu'elle marque.

Toutes ces lignes horaires le réunissent en un point qui exprime le pôle austral ou l'intersection de l'axe du monde & du cadran; il est au-dessous de l'horizontale de 5 pieds 5 pouces 2 lignes $\frac{1}{2}$, qui est la tangente de la latitude du lieu $41^{\circ} 8' 10''$, pour un rayon de 4 pieds 8 pouc. 11 lign. 35.

Pour trouver la place des styles sur le cercle supérieur, ou l'intersection des lignes horaires avec l'horizon, il suffit d'avoir le point de l'horizon où passent les cercles horaires d'une heure, de deux heures, &c. Soit *HPO* le méridien, fig. 40, *P* le pôle, *PX* le cercle horaire d'une heure, qui fait avec le méridien un angle *P* de 15° ; dans le triangle *POX* rectangle en *O*, dont on connoît *PO* qui est la latitude du lieu, $48^{\circ} 51' 55''$, & l'angle *P*, l'on trouvera *HX*, $11^{\circ} 24' 34''$; ainsi, le premier style est implanté à $11^{\circ} 24' 34''$ de la méridienne sur le cercle horizontal du cadran. Cet angle est le même que celui de la ligne d'une heure sur un cadran horizontal; j'en ai donné la table ci-dessus; mais voici les compléments des angles *X*, ou les inclinaisons des cercles horaires par rapport aux verticaux, pour servir à tracer les lignes horaires sur le cadran, telles qu'on les voit dans la figure 276.

HEURES.		Inclinaison des cercles horaires.
Soir.	Matin.	
...1...	...11...	...9°...48...
...2...	...10...	...19...12...
...3...	...9...	...27...43...
...4...	...8...	...34...44...
...5...	...7...	...39...27...
...6...	...6...	...41...8...
...7...	...5...	...39...27...
...8...	...4...	...34...44...

Pour tracer les courbes horaires sur le tambour, il falloit en chercher plusieurs points. Je suppose qu'on veuille favoir à quelle distance de la méridienne passe la ligne d'une heure prise un pied au-dessous de la ligne horizontale; je suppose que *H* soit le pied du style d'une heure ou de onze heures, *HV* une ligne verticale tirée sur la surface de la colonne, *O* le point cherché sur la surface de la colonne, *OV* une ligne horizontale tirée du point *O* au-dessus de la colonne perpendiculaire sur le plan du vertical, dont *HV* est l'intersection; on a trouvé ci-dessus l'angle formé en *H* entre le vertical & le plan du cercle horaire dans lequel est la ligne horaire *HO*; on cherchera la longueur de la perpendiculaire *OV*, en disant: Le sinus total est à

un pied ou 144 lignes, comme la tangente de $9^{\circ} 48' 10''$; à la perpendiculaire *OV*, 248 l. 81. Cette perpendiculaire forme un triangle horizontal avec le rayon de la colonne qui passe en *O*; & pour avoir l'angle au centre, il suffira de dire: Le rayon de la colonne 681,35 est à *OV* comme le sinus total est au sinus d'un angle qu'on trouvera $2^{\circ} 5' 12''$; c'est la distance horizontale entre le vertical du point *O* & celui du point *H*; or le vertical du point *H*, suivant le calcul précédent, est éloigné de $11^{\circ} 24' 34''$ de la méridienne; donc le point *O* en sera éloigné de $9^{\circ} 19' 12''$. M. Pingré a calculé ainsi de pied en pied pour la hauteur, la situation horizontale de chaque ligne horaire, & il a fait passer les courbes par tous les points ainsi marqués.

Distance à la méridienne.	I heure.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Sur l'horizontale,	11°.....25	15°.....30	36°.....59	52°.....32	70°.....25	90°.....0	109°.....35
un pied plus bas.	9.....19	19.....17	30.....38	44.....8	60.....26	79.....24	99.....36
2 pieds.....	7.....14	15.....4	24.....11	35.....32	50.....24	68.....24	89.....17
3.....	5.....8	10.....47	17.....35	26.....32	39.....4	56.....29	78.....14
4.....	3.....2	6.....26	10.....42	16.....46	26.....29	42.....35	61.....11
5.....	0.....55	1.....58	3.....32	5.....36	10.....18	23.....2	40.....11
6.....	1.....13	2.....37	4.....39				
7.....	3.....21	7.....24	13.....49				
8.....	5.....32	12.....27	25.....22				
9.....	7.....43	17.....51	48.....17				

On voit sur cette colonne d'autres courbes qui sont dorées, & qui marquent les arcs des signes; ils sont représentés dans la figure; mais il seroit trop long d'en donner ici la démonstration & le calcul.

XV. CADRAN aux étoiles; on l'appelle quelquefois *nocturnal* de Munster. Il est composé de trois pièces principales; 1.^e une platine *CD*, fig. 277, percée au centre *C* pour appercevoir l'étoile polaire au travers; 2.^e un cadran mobile divisé en 24 heures; 3.^e une alidade *GH* mobile autour du cercle, & dont une partie déborde la circonférence. On suppose que l'on regarde l'étoile polaire par le trou du centre, le manche *B* étant en bas dans le plan d'un vertical, le plan de l'instrument incliné comme l'équateur. On regarde en même-temps une autre étoile circumpolaire, & l'on place l'alidade sur cette étoile. La figure est faite pour la claire de la petite ourse qui est la précédente, ou supérieure des deux gardes ou des deux belles étoiles de la petite ourse, marquée *B*; elle a $14^{\circ} 51'$ d'ascension droite; ainsi, elle passe au méridien à midi le 7 novembre. Le cadran des heures est mobile sur la platine, de manière que l'heure du passage au méridien (de l'étoile pour

laquelle il est fait) soit toujours à la partie supérieure, & le passage inférieur au bas de la platine. Par exemple, la claire de la petite ourse passe au méridien inférieur à minuit le 7 novembre; si l'on amène donc le nombre 12 en bas où est le 7 novembre, marqué d'une fleur de lys dans la figure, le cercle des heures est disposé comme un cadran équinoxial fait pour le soleil; le midi est en haut, parce que l'étoile passe à midi; le 5 décembre elle passe à dix heures; il faut donc que les 10^{es} du cadran soient en bas ce jour-là; pour cela on avance à droite de 30^{es} l'index, la fleur de lys ou les 12^{es}, ou on les met au 5^e de décembre.

Il y a 200 ans que l'on comptoit 11 jours de moins à pareille situation du soleil: aussi l'on trouve de ces cadrans où il y a le 27 octobre; cette différence vient du vieux style sur lequel on comptoit 11 jours de moins. Voyez CALENDRIER. La précession de l'étoile est peu considérable. On se servoit assez souvent des deux dernières étoiles de la grande ourse; on mettoit alors en bas le 29 août; c'étoit à-peu-près cela dans le dernier siècle. Actuellement c'est le 3 septembre; car ce jour-là on a 16^{es} 48 ou 50^{es} pour l'ascension droite du so-

Jeil, égale à celle de ces deux étoiles. Les heures vont vers la gauche en haut, parce qu'en regardant le nord, les étoiles qui avancent vers le couchant vont à gauche.

Les jours du mois vont aussi à gauche ou du même sens, puisque plus le soleil avance dans l'écliptique, & plus l'étoile avance en passant plutôt au méridien; il faut donc qu'on ait dans le méridien un moindre nombre d'heures, & pour cela on doit tourner le cadran vers la gauche.

On ne fait plus guère de ces sortes d'instruments; ils ne lauroient avoir de la précision à cause de leur petitesse, & à raison de la différence qu'il y a entre l'étoile polaire & le vrai pôle du monde auquel on ne peut pas diriger le centre de l'instrument.

On peut trouver l'heure exactement par le passage des étoiles au-dessous de la polaire; je l'ai expliqué en détail dans le premier volume de mon *Astronomie*, où j'ai donné la table de ce qu'il faut ajouter à la distance de l'équinoxe au soleil, pour avoir exactement l'heure qu'il est quand une étoile passe dans le vertical ou dans l'à-plomb de l'étoile polaire. Voyez ÉTOILE.

XVI. Le cadran à la lune ou le cadran lunaire est celui qui montre l'heure pendant la nuit, par le moyen de la lumière de la lune, ou de l'ombre d'un style que la lune éclaire. On peut faire des cadrans où les intersections des lignes horaires avec les lignes qui marquent le quartième à la lune, indiquent l'heure; mais on peut se servir aussi d'un cadran solaire, comme si c'étoit un cadran lunaire, c'est-à-dire, trouver l'heure à la lune par le moyen d'un cadran solaire. On observera l'heure que l'ombre du style montre à la lumière de la lune; on trouvera l'âge de la lune dans le calendrier, & on multipliera le nombre des jours par trois quarts, le produit sera le nombre d'heures qu'il faut ajouter à l'heure marquée par l'ombre, afin d'avoir l'heure qu'on demande. La raison de cette pratique est, que la lune passe tous les jours au méridien, ou à quelque cercle horaire que ce soit, trois quarts d'heure plus tard que le jour précédent; or le jour de la nouvelle & de la pleine lune, elle passe au méridien en même-temps que le soleil; d'où il s'ensuit, par exemple, que le troisième jour après la nouvelle lune, elle doit passer deux fois trois quarts d'heure ou une heure & demie plus tard au méridien; le 16 de la lune il y a douze heures, & ainsi des autres.

Si le nombre des jours multipliés par $\frac{3}{4}$ & ajoutés au nombre des heures excède 12, il faudra en ôter deux.

Les arcs des signes que l'on voit souvent sur les grands cadrans & même sur les petits, sont des courbes hyperboliques décrites par l'ombre de la pointe du style en divers tems de l'année; on n'en trace jamais que six, trois au-dessus de l'équinoxial, & trois au-dessous; comme on les voit

sur le cadran vertical, fig. 278, la ligne équinoxiale γ tenant lieu de la courbe qui répond aux équinoxes.

Pour tracer ces courbes on en cherche un point sur chaque ligne horaire au moyen du *Trigone*, fig. 279. C'est un instrument composé d'une règle DA & d'un secteur de cercle qui a $23^{\circ} 28'$ de chaque côté de la ligne du milieu, perpendiculaire à DA ; les points c & d sont éloignés de $11^{\circ} 29'$ du milieu, & les points b & f de $20^{\circ} 10'$. Ce sont les déclinaisons du soleil à un signe & à deux signes de distance aux équinoxes. La ligne DA représentant l'axe du monde ou le style d'un cadran, les rayons Da , Db , &c. représentent les rayons solaires au commencement de chaque signe.

On dispose l'instrument en sorte que le bout de règle AD soit le long de l'axe du cadran, fig. 280, le point D à l'extrémité du style, & le plan de l'instrument dans le plan du cercle horaire, sur lequel on veut opérer; c'est dans la figure le plan même du méridien. On prend ensuite le fil DP par l'extrémité P , & on l'étend, en sorte qu'il passe par-dessus une division de l'instrument; on fait une marque f à l'endroit où le fil rencontre la ligne horaire du cadran; & cette marque est un des points par où passera l'arc du signe auquel la division dont on s'est servi se rapporte; c'est dans notre figure aux signes du Ω , & des Π ; de même aux autres divisions.

Après avoir ainsi trouvé dans un cercle horaire les sept rencontres ou extrémités des sept lignes de l'instrument prolongées, on le changera de position, en sorte que son plan coïncide avec le plan d'un autre cercle horaire, dans lequel on trouvera de même les extrémités du prolongement des lignes de l'instrument; on ne les a marqués sur la figure 280 que sur la ligne méridienne. Ayant ainsi dans chaque ligne horaire les points que le fil aura marqué pour chaque signe, il ne reste plus qu'à les joindre les uns aux autres; savoir tous les γ ensemble, tous les ν , &c. & l'on aura les arcs des signes tracés, ainsi qu'ils sont dans la fig. 278 & d'aurant plus exactement, que le nombre des lignes horaires sera plus grand.

On doit remarquer que tous les γ sont en ligne droite; c'est qu'ils représentent l'intersection de l'équateur & du plan du cadran, qui est une ligne droite; les autres sont des sections coniques, parce qu'elles représentent l'intersection du plan du cadran, & des surfaces coniques que décrivent les rayons. Ces courbes ont un axe commun, qui est la soufflante.

Ce moyen de trouver les arcs des signes, en se servant de l'instrument, n'est pas très-exact si le cadran est fort grand, on peut bien avec un petit instrument prendre des angles, dont les côtés sont très-grands, mais l'erreur se multiplie. Voici une autre méthode fondée sur la même théorie.

Il faut tracer en grand sur un mur ou sur le

plancher, la figure du *trigone* telle qu'elle est représentée, fig. 281, sur la ligne γD , élever la perpendiculaire DA , égale à la longueur de l'axe du *cadran*; prendre ensuite sur la ligne $D\gamma$ l'intervalle Do , égal à la distance du sommet du style à l'équinoxiale du *cadran* sur une ligne horaire, mener ensuite la ligne AM , elle sera coupée par les lignes du *trigone* aux points $abcdfg$; qu'il faut ensuite rapporter sur la ligne horaire à laquelle appartient la distance Do dont on s'est servi; procéder ainsi sur chaque ligne horaire, & joindre ensuite ensemble tous les points correspondans au même signe comme dans la première méthode.

Pour trouver les mêmes points par le calcul, il faut connoître l'angle du style avec la ligne horaire, dont la mesure est l'arc PO , fig. 267 du cercle horaire compris entre le pôle & le plan du *cadran*; il faut connoître aussi la distance SX , fig. 263, entre le sommet du style & le centre du *cadran*, en pieds, pouces & lignes, ce qui est facile dès qu'on a la hauteur du style droit SP & l'angle SXP du style & de la souillure, dont la mesure est PY , fig. 267. Alors dans le triangle ADP , fig. 280, connoissant l'angle ADP distance du soleil au pôle, qui est la somme ou la différence de 90° & de la déclinaison du soleil avec l'angle DAF & le côté AD , on trouvera la longueur de AP .

La *méridienne du tems moyen* est une des choses qui méritent le plus d'être tracées sur de grands *Cadran*s, parce que le tems moyen & uniforme est celui que l'on devoit toujours employer dans l'usage de la vie comme dans les observations & les tables astronomiques. Cependant la première ligne de cette espèce a été celle de M. de Fouchy chez le comte de Clermont. On en trouve la description détaillée dans les *Gnomoniques* faites par de Parcieux & D. Bedos.

La *méridienne*, fig. 284, est supposée horizontale; elle est environnée d'une courbe qui commence en haut le 21 juin 76° à droite, & finit en bas le 21 décembre 78° à gauche de la méridienne du tems vrai.

Pour tracer cette courbe, il faut tracer les arcs des signes de cinq en cinq degrés, diviser un quart d'heure avant & après midi en minutes & en secondes, prendre dans une table de l'équation du tems la différence entre le midi vrai & le midi moyen, & la prendre sur l'arc du signe qui répond au jour donné; & l'on a ainsi une suite de points par lesquels on fait passer une courbe.

On traceoit autrefois sur de grands *cadran*s les heures italiques, babyloniennes & judaïques, ainsi, nous devons en donner ici une petite explication.

Les heures italiques qui commencent au coucher du soleil, & les heures babyloniennes qui commencent au lever, doivent commencer à la ligne horizontale HQ , fig. 282, qui est la ligne de 24 heures italiques ti le *cadran* regarde le couchant, ou de 24 heures babyloniennes s'il regarde l'orient.

Le point de l'équinoxiale EQ marqué 5^h du soir pour un *cadran* occidental, appartient à la ligne de 23^h italiques ou de 11^h babyloniennes, puisque le soleil étant dans l'équateur se couche à 6 heures, donc à cinq heures du soir il est 23 heures d'Italie; mais alors il se leve à 6 heures du matin, donc il est 11^h de Babylone.

Le même point marqué 11^h du matin pour un *cadran* oriental, appartient à 13^h italiques & à une heure babylonique.

Pour avoir un autre point de chacune des lignes dont nous venons de parler, il faut décrire un parallèle diurne $ABCD\Gamma G$, c'est-à-dire un des arcs des signes que nous venons d'expliquer. Je choisis pour exemple celui que le soleil décrit quand il se leve à 8 heures du matin, & qu'il se couche à 4 heures du soir; le point C qui précède d'une heure le coucher sur un *cadran* occidental, appartient à la ligne de 23 heures italiques & à la ligne de 7 heures babyloniennes.

Le point C sur un *cadran* oriental, suit d'une heure le lever du soleil; ainsi, il appartient à la ligne d'une heure babylonique, & à la ligne de 17 heures italiques.

Quand on aura bien compris cet exemple, on pourra tracer toutes les lignes dont il s'agit; j'en entrerais pas dans un plus grand détail, puisque l'on ne fait plus aucun usage des lignes horaires babyloniennes, & très-peu des italiques. Voyez M. DE LA HIRE, page 153.

Les heures judaïques, appelées aussi les heures antiques ou planétaires, commençoient au lever du soleil, divisoient le jour & la nuit séparément en 12 heures; ainsi, pour les tracer sur un *cadran*, il faut diviser les arcs lémi-diurnes sur les parallèles ou arcs des signes en six parties égales depuis l'horizontale jusqu'à la méridienne; par les points de division on tirera des lignes courbes qui seront les lignes horaires sur lesquelles la pointe du style marquera les heures judaïques.

Par exemple le parallèle AO , fig. 283, pour le solstice d'hiver depuis la méridienne en A jusqu'à la ligne horizontale en O , renferme 4 heures qui répondent à la partie EO de l'équinoxiale, c'est cette partie qu'il faut diviser en six également.

Du point C centre-diviseur de l'équinoxiale, on décrira un arc de cercle DF , on tirera des rayons aux points E & Q de l'équinoxiale, & l'on divisera en six parties égales l'arc EQ , qui dans ce cas est de 60° . On conduira des lignes CG , CH , CI , CK , CL , jusqu'à l'équinoxiale: par ces points de l'équinoxiale, on tirera des lignes qui se dirigent vers le centre, s'il y en a un dans le *cadran* proposé; ces lignes Gg , Ha , &c. diviseront l'arc lémi-diurne AO en six parties égales.

Les autres parallèles étant divisés de même, on marquera d'abord les autres points de division de chacun, à partir de l'horizontale ou de la méridienne, & la courbe qui passera par tous ces points sera une des lignes horaires antiques.

TABLE DES DÉCLINAISONS DU SOLEIL,

A CHAQUE JOUR DU MOIS,

Pour une année moyenne entre deux bissextiles, vers la fin de ce siècle,
telle que les années 1782, 1786, 1790.

JANVIER.		FÉVRIER.		MARS.		AVRIL.		MAI.		JUIN.	
J O U R S	Déclin. Australe.	J O U R S	Déclin. Australe.	J O U R S	Déclin. Australe.	J O U R S	Déclin. Boréale.	J O U R S	Déclin. Boréale.	J O U R S	Déclin. Boréale.
	D. M.		D. M.		D. M.		D. M.		D. M.		D. M.
1	22 59	1	16 58	1	7 25	1	4 42	1	15 72	1	22 7
2	22 54	2	16 41	2	7 2	2	5 5	2	15 30	2	22 15
3	22 48	3	16 23	3	6 39	3	5 28	3	15 47	3	22 22
4	22 41	4	16 5	4	6 16	4	5 51	4	16 5	4	22 29
5	22 35	5	15 47	5	5 53	5	6 14	5	16 22	5	22 36
6	22 27	6	15 29	6	5 30	6	6 36	6	16 59	6	22 42
7	22 20	7	15 10	7	5 6	7	6 59	7	16 55	7	22 48
8	22 12	8	14 51	8	4 43	8	7 21	8	17 12	8	22 54
9	22 3	9	13 32	9	4 19	9	7 44	9	17 28	9	22 58
10	21 54	10	14 12	10	3 56	10	8 6	10	17 43	10	23 3
11	21 45	11	13 52	11	3 32	11	8 28	11	17 59	11	23 8
12	21 35	12	13 32	12	3 9	12	8 50	12	18 14	12	23 12
13	21 25	13	13 12	13	2 45	13	9 11	13	18 29	13	23 15
14	21 14	14	12 52	14	2 22	14	9 33	14	18 43	14	23 18
15	21 3	15	12 31	15	1 58	15	9 54	15	18 58	15	23 21
16	20 51	16	12 10	16	1 34	16	10 16	16	19 11	16	23 23
17	20 40	17	11 49	17	1 11	17	10 37	17	19 15	17	23 25
18	20 27	18	11 28	18	0 47	18	10 58	18	19 38	18	23 26
19	20 15	19	11 7	19	0 23	19	11 19	19	19 51	19	23 27
20	20 2	20	10 45	20	0 B. 1	20	11 39	20	20 4	20	23 28
21	19 48	21	10 24	21	0 24	21	12 0	21	20 16	21	23 28
22	19 35	22	10 2	22	0 48	22	12 20	22	20 28	22	23 28
23	19 20	23	9 40	23	1 12	23	12 40	23	20 59	23	23 27
24	19 6	24	9 18	24	1 35	24	12 59	24	20 51	24	23 26
25	18 51	25	8 55	25	1 59	25	13 19	25	21 1	25	23 25
26	18 36	26	8 33	26	2 22	26	13 38	26	21 12	26	23 23
27	18 21	27	8 10	27	2 46	27	13 58	27	21 22	27	23 20
28	18 5	28	7 48	28	3 9	28	14 16	28	21 32	28	23 18
29	17 49			29	3 32	29	14 35	29	21 41	29	23 14
30	17 32			30	3 56	30	14 53	30	21 50	30	23 11
31	17 15			31	4 19			31	21 59		

TABLE DES DÉCLINAISONS DU SOLEIL,

A CHAQUE JOUR DU MOIS,

Pour une année moyenne entre deux biffextiles, vers la fin de ce siècle, telle que les années 1782, 1786, 1790.

JUILLET.			AOUT.			SEPTEMB.			OCTOBRE.			NOVEMBRE.			DÉCEMBRE.		
Jours.	Déclin. Boréale.		Jours.	Déclin. Boréale.		Jours.	Déclin. Boréale.		Jours.	Déclin. Austral.		Jours.	Déclin. Austral.		Jours.	Déclin. Austral.	
	D. M.			D. M.			D. M.			D. M.			D. M.			D. M.	
1	23	7	1	17	58	1	8	11	1	3	20	1	14	35	1	21	54
2	23	3	2	17	43	2	7	49	2	3	43	2	14	54	2	22	3
3	22	58	3	17	27	3	7	27	3	4	6	3	15	13	3	22	12
4	23	53	4	17	11	4	7	4	4	4	30	4	15	31	4	22	20
5	22	47	5	16	55	5	6	42	5	4	53	5	15	50	5	22	27
6	21	41	6	16	38	6	6	20	6	5	16	6	16	8	6	22	34
7	21	35	7	16	22	7	5	57	7	5	39	7	16	25	7	22	41
8	21	28	8	16	5	8	5	35	8	6	2	8	16	43	8	22	48
9	22	21	9	15	47	9	5	12	9	6	25	9	17	0	9	22	53
10	22	14	10	15	30	10	4	49	10	6	48	10	17	17	10	22	59
11	22	6	11	15	12	11	4	26	11	7	10	11	17	34	11	23	4
12	21	57	12	14	54	12	4	3	12	7	33	12	17	50	12	23	8
13	21	49	13	14	36	13	3	40	13	7	55	13	18	6	13	23	12
14	21	40	14	14	17	14	3	17	14	8	18	14	18	22	14	23	16
15	21	30	15	13	59	15	2	54	15	8	40	15	18	37	15	23	19
16	21	21	16	13	40	16	2	31	16	9	2	16	18	52	16	23	22
17	21	10	17	13	20	17	2	8	17	9	24	17	19	7	17	23	24
18	21	0	18	13	1	18	1	44	18	9	46	18	19	21	18	23	26
19	20	49	19	12	41	19	1	21	19	10	8	19	19	35	19	23	27
20	20	38	20	12	22	20	0	58	20	10	30	20	19	49	20	23	28
21	20	26	21	12	2	21	0	34	21	10	51	21	20	2	21	23	28
22	20	15	22	11	42	22	0	11	22	11	12	22	20	15	22	23	28
23	20	2	23	11	21	23	0A.	13	23	11	33	23	20	28	23	23	27
24	19	50	24	11	0	24	0	36	24	11	54	24	20	40	24	23	26
25	19	37	25	10	40	25	0	59	25	12	15	25	20	52	25	23	24
26	19	24	26	10	19	26	1	23	26	12	36	26	21	3	26	23	22
27	19	10	27	9	58	27	1	46	27	12	56	27	21	14	27	23	20
28	18	56	28	9	37	28	2	10	28	13	16	28	21	25	28	23	17
29	18	42	29	9	15	29	2	33	29	13	36	29	21	35	29	23	13
30	18	28	30	8	54	30	2	57	30	13	56	30	21	45	30	23	9
31	18	13	31	8	32				31	14	16				31	23	5

L'horizontale

L'horizontale & la méridienne font les seules qui soient des lignes droites, & celle-ci est toujours la sixième heure, il y en a 12 depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, & la première se compte une heure après le lever, la sixième à midi, la douzième au coucher du soleil, après quoi l'on compte les heures de nuit comme on avoit compté les 12 heures de jour.

En suivant cette méthode, nous aurions à Paris des heures de jour qui seroient doubles de celles de la nuit en été, & qui n'en seroient que la moitié en hiver; aussi cette méthode abandonnée depuis long-tems, n'est plus pour la Gnomonique qu'un objet d'érudition & de pure curiosité.

Il en est de même des autres lignes que l'on a mis quelquefois sur les cadrans; comme les maisons célestes, &c. mais on n'en fait plus usage.

M. Bixot, Conseiller au Présidial de Belançon, a fait au faubourg de Taragnon un cadran vertical déclinant d'une espèce singulière, qui ne paroît que lorsque le soleil luit. Il a fait peindre un ange gardien sur un mur; il a mis au-dessus un avant-toit formé par trois plaques de sole, on a tracé les lignes horaires sur ces trois plaques & on les a ouvert avec la lime, aussi-bien que les chiffres; les demi-heures sont indiquées par une suite de trous faits avec le foret, le soleil passant au travers de ces ouvertures, représente un cadran lumineux, tel que l'heure actuelle se trouve à l'extrémité du doit index de l'ange. *Mémoire de février 1758.*

CAL

CALCUL ASTRONOMIQUE, assemblage des règles & des méthodes, par lesquelles on calcule les mouvemens des astres, & sur-tout les éclipses, avec les fractions sexagésimales, les logarithmes, les règles de la trigonométrie, &c. Comme nous n'avons rien dit à ce sujet au mot ARITHMÉTIQUE, il est bon de donner ici une idée des premiers élémens du calcul astronomique.

Les astronomes divisent le ciel en 12 signes, chaque signe en 30 degrés, le degré en 60 minutes, la minute en 60 secondes; c'est-là ce qu'on appelle les fractions sexagésimales; l'addition s'en fait comme celle des nombres ordinaires, en observant de retenir 60 secondes pour en former une minute; 60 minutes pour en former un degré; 30 degrés pour en former un signe, & de rejeter 12 signes, lorsque la somme va au-delà. Exemple pour additionner les deux quantités suivantes:

4°	15'	58"	45"
8	14	30	16
1	00	29	01

Mécaniques. Tome I, 1.^{re} Partie.

On observe dans les secondes que 6 dixaines doivent former la minute: on remarque pour les minutes que de 8 dixaines, il n'en faut mettre que 2 sous les minutes & retenir les 6 autres qui forment un degré: à l'égard des degrés, comme il s'en trouve 30, on en compose un signe entier, de même que s'il y avoit 24 heures, on en composeroit un jour; enfin de 12 signes qu'il devroit y avoir dans la somme, on en retranche 12: on efface le cercle entier étant passé, on se trouve au même point que s'il n'y eût pas été; il est donc inutile d'y avoir égard. Un autre qui auroit parcouru 13 signes, & celui qui n'en auroit parcouru qu'un, s'ils étoient partis du même point, s'y retrouveroient tout de même, sans aucune différence dans leurs situations.

La soustraction des fractions sexagésimales suppose la même règle; il faut emprunter une minute pour en former 60 secondes, ou un degré pour en former 60 minutes, un signe pour en former 30 degrés, & un cercle entier pour en former douze signes, si la quantité que l'on veut soustraire est la plus grande. Exemple:

de	4'	6'	25'	30'
il faut ôter	5	8	35	40.
il reste	10	27	49	50.

Il est clair que si de 4 signes, on en ôte 5, il doit en rester onze; car un autre qui auroit 4 signes de longitude & que l'on seroit rétrogradé de 5 signes, se trouveroit avoir repassé le point équinoxial d'un signe tout entier, & auroit par conséquent 11 signes de longitude.

Il est rare que l'on fasse des multiplications ou des divisions avec des fractions sexagésimales; mais dans les cas où l'on auroit à faire une règle de trois, on pourroit réduire en minutes ou en secondes les trois premiers termes de la proposition, & opérer comme sur les nombres ordinaires.

On trouve dans tous les anciens livres d'Astronomie, comme dans les *Ephémérides* d'Argoli, &c. une table qui a pour titre *Tabula sexagenaria*, qui seroit à ces sortes de parties proportionnelles; elle renferme 60 nombres du huit en bas, depuis 1 jusqu'à 60; chacune des colonnes suivantes a en tête la suite des nombres naturels, ou des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2, 4, 6, &c. quand il y en a plus de 60, on met une minute & le surplus en secondes; ainsi, dans la colonne de 10 & vis-à-vis de 15, c'est-à-dire dans la 15^e ligne horizontale de cette colonne, on trouve 2° 30'; c'est le quatrième terme d'une proposition qui commenceroit par 60 minutes & dont les termes suivans seroient 10 & 15. Cette table sexagénaria peut servir également à la division des fractions sexagésimales; on préfère aujourd'hui l'usage des logarithmes logarithiques; mais on a publié en Angleterre, en 1780, des tables sexa-

Kk

général de M. Taylor, qui sont fort utiles pour ceux qui ont beaucoup de calculs à faire. Il y a aussi une table hexcentenaire publiée à Londres en 1779, par M. Bernoulli, pour les cas où le premier terme de la proportion est $10^{\circ} 0'$; ces tables donnent jusqu'aux dixièmes de seconde.

On a proposé bien des fois de substituer les décimales à la méthode actuelle du calcul astronomique. Mercator publia en 1676 des *Institutions astronomiques*, dans lesquelles les *Tables rudolphines* étoient réduites à ce principe, & où le cercle étoit divisé en décimales; mais le changement considérable que cette méthode auroit exigé dans toutes les méthodes & dans toutes les tables connues, a empêché que les astronomes n'aient adopté la méthode.

Le calcul astronomique est fondé aussi sur les *logarithmes*, la trigonométrie sphérique; mais ces différentes parties seront expliquées à leurs places respectives. (D. L.)

CALCUL, f. m. (*Mathém. pure*). Inputation de plusieurs sommes jointes, soustraites, multipliées, ou divisées. Voyez ARITHMÉTIQUE.

L'art de calculer en général, est proprement l'art de trouver l'expression d'un rapport unique, qui résulte de la combinaison de plusieurs rapports. Les différentes espèces de combinaisons donnent les différentes règles de calcul. Cela est expliqué plus au long à l'article ARITHMÉTIQUE.

Voyez les différentes espèces de calcul aux articles ALGÈBRE, DIFFÉRENTIEL, EXPONENTIEL, INTÉGRAL, ADDITION, &c.

Plusieurs peuples de l'Amérique, de l'Afrique & de l'Asie calculent avec des cordes, auxquelles ils font des nœuds.

Le calcul aux jettons se fait aisément, en représentant les unités par les jettons, les dizaines par d'autres jettons, les centaines par d'autres. Par exemple, si je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 jettons pour marquer les centaines, 1 pour les dizaines, 5 pour les unités. Voyez DIXAINE, &c.

Le mot calcul vient du latin *calculus*, qui signifie une pierre, parce que les anciens se servoient de petits cailloux plats pour faire leur supputation, soit des sommes multipliées ou divisées dans les comptes, soit en Astronomie & en Géométrie. De-là vient que nous avons donné le nom de calcul aux Sciences des nombres, à l'Arithmétique, à l'Algèbre. Les Romains s'en servoient encore pour donner les suffrages dans les assemblées & dans les jugemens; ils marquoient aussi les jours heureux avec une pierre blanche, *dies albo notanda lapillo*, dit Horace, & les jours malheureux par une pierre noire. Ils avoient emprunté la première de ces coutumes des Grecs, qui nommoient ces espèces de jettons naturels *κεραία*; c'étoient d'abord des coquilles de mer, remplacées depuis par des pièces d'airain de la même figure, appelées *σφονδύλες*. Deux choses distinguoient les calculs; la forme &

la couleur. Ceux qui portoitent condamnation étoient noirs & percés par le milieu, les autres étoient entiers & blancs. M. l'abbé de Canaye, (*Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres, Tom. I & VII.*) dit qu'on pourroit regarder la précaution de percer les noirs comme une preuve que les Aréopagites, qui s'en servoient, jugoient pendant la nuit; car à quoi bon percer les calculs noirs, si l'on eût pu voir les uns & les autres, & appercevoir, par le secours de la lumière, la différence de leur couleur; au lieu qu'en jugeant dans les ténèbres il est clair qu'on avoit besoin d'une différence autre que celle de la couleur & relative au tact, pour démêler les calculs de condamnation d'avec ceux qui marquoient l'absolution. On comptoit ces calculs, & le nombre des uns & des autres décidait pour ou contre l'accusé.

On se servoit aussi de calculs ou bulletins pour tirer les athlètes au fort dans les jeux publics, & les apparier. Voici comme la chose se pratiquoit aux jeux olympiques, au rapport de Lucien dans son dialogue, intitulé: *He. votime ou des Sêtes*. « On place, dit-il, 1^{re} au des juges, une urne d'argent consacrée au dieu en l'honneur de qui se célèbrent les jeux. On met dans cette urne des ballottes de la grosseur d'une fève, & dont le nombre répond à celui des combattans. Si ce nombre est pair, on écrit sur deux de ces ballottes la lettre A, sur deux autres la lettre B, sur deux autres la lettre T, & ainsi du reste. Si le nombre est impair, il y a de nécessité une des lettres employées qui ne se trouve inscrite que sur une seule ballotte; ensuite les athlètes s'approchent l'un après l'autre, & avant invoqué Jupiter, chacun met la main dans l'urne & en tire une ballotte. Mais un des mastigophores ou porteverges lui retient la main, l'empêche de regarder la lettre marquée sur cette ballotte jusqu'à ce que tous les autres aient tiré la leur. Alors un des juges faisant la ronde examine les ballottes de chacun, & apparie ceux qui ont les lettres semblables. Si le nombre des athlètes est impair, celui qui a tiré la lettre nique est mis en ré-serve pour se battre contre le vainqueur. » (O)

CALCULER, v. act. c'est en général appliquer les règles ou de l'Arithmétique ou de l'Algèbre, ou les uns & les autres, à la détermination de quelque quantité. Voyez CALCUL.

CALENDERS, chez les Romains étoit le nom du premier jour du mois.

CALENDRIER, f. m. (*Astron.*) c'est une distribution de tems disposée pour les usages de la vie; ou bien c'est une table ou un almanach qui contient l'ordre des jours, des semaines, des mois, des sêtes, &c. qui arrivent pendant le cours de l'année. Voyez TEMS, ANNÉE, MOIS & JOUR.

Il a été appelé *calendarium*, du mot *calenda*, quo l'on écrivoit anciennement en gros caractères au commencement de chaque mois. Voyez CALENDER.

La première chose à remarquer dans le *calendarium*

est l'ordre des années, nous avons parlé de la durée & de la forme des années chez tous les Peuples du monde au mot ANNÉE, mais nous devons développer ici le *calendrier* des Romains, & celui dont on se sert actuellement dans toute l'Europe, qui est le *calendrier* Grégorien.

Le *calendrier* des Romains, tel qu'il fut établi par César, contient les 12 mois comme celui de Numa, les uns de 30 jours les autres de 31; mais au lieu de compter comme nous le premier du mois, le 2, le 3, &c. le premier jour s'appelloit jour des calendes, le suivant étoit le quatrième on le sixième avant les nones, on le verra suffisamment dans la table suivante qui contient un *calendrier* romain, que des savans ont recueilli d'après divers monumens, & que M. Felice a donné dans l'Encyclopédie d'Yverdon en 1771, & qu'on a inséré dans les suppléments de l'Encyclopédie de Paris in-folio, il paroît tiré des antiquités romaines de Rofin & de Denfert pour la partie des fêtes romaines, avec plusieurs additions, & M. l'abbé Brotier y a fait diverses corrections. Je ne fais où la partie astronomique a été prise, elle est différente dans d'autres *calendriers*, il y en a un de Geminus, deux qui portent le nom de Prothémée, un du P. Petau dans son *uranologium*, celui-ci est le plus complet, parce qu'il cite Ovide, Plin, Columelle.

Dans ce *calendrier* de Jules-César, on voit le même ordre & la même suite de mois que dans celui de Numa; janvier, mars, mai, quintil ou juillet, sextil ou août, octobre & décembre, ont chacun 31 jours; & les quatre mois, avril, juin, septembre & novembre, seulement 30. Février, dans les années communes, n'a que 28 jours, & 29 dans les années intercalaires ou bissextiles. La suite des huit lettres *nundinales*, est placée sans interruption depuis le premier jusqu'au dernier jour de l'année, pour qu'il y ait toujours à chaque année une lettre qui marque les jours des assemblées, appellées *comitia* par les romains, & qui revenoient tous les neuf jours: les citoyens de la campagne se rendoient à la ville ces jours-là, pour y apprendre ce qui concernoit la discipline, la religion ou le gouvernement. C'est pourquoi si le jour *nundinal* de la première année étoit sous la lettre A, qui est au premier, au neuvième, au dix-septième, au vingt-cinquième de janvier, &c. la lettre du jour *nundinal* de l'année suivante étoit D, qui est au quatrième, au douzième, au vingtième du même mois, &c. Car la lettre A se trouvant aussi au vingt-septième de décembre, si de ce jour on compte huit lettres, entre les quatre B, C, D, E, qui restent après A dans le mois de décembre, il en faudra prendre quatre autres au commencement de janvier de l'année suivante; savoir, A, B, C, D, sans que la lettre D, qui se trouve la première dans le mois de janvier, soit la neuvième après

le dernier A du mois de décembre précédent, & qu'elle soit par conséquent la lettre *nundinale*, ou qui marque les jours de ces assemblées, auxquelles on peut aussi donner le nom de *foires* ou *marchés publics*. Ainsi, par le même calcul, la lettre *nundinale* de la troisième année sera G; celle de la quatrième B; &c. ainsi des autres, à moins qu'il n'arrive du changement par l'intercalation.

Pour entendre les lettres marquées dans la seconde colonne pour la qualité de chaque jour, il faut savoir que l'on ne pouvoit plaider & juger qu'à certains jours. On appelloit *fasti*, en français *fastes*, les jours auxquels on pouvoit rendre la justice, *quibus fas est iure agere*; & *nefasti*, ceux auxquels cela n'étoit pas permis, *quibus nefas est*, comme nous l'apprenons dans ces deux vers d'Ovide:

Ille nefastus erit per quem tria verba silentur;

Fastus erit per quem iure licetis agi.

C'est-à-dire, que le jour est *nefaste*, dans lequel le préteur ne prononce point les trois mots solennels, ou la formule de droit, *do, dico, addico*, comme on dirait chez nous qu'il est fête ou vacance au palais; il y avoit aussi de certains jours qu'on appelloit *comitia*, marqués par un C, dans lesquels le peuple s'assembloit au camp de Mars, pour élire les magistrats, ou pour y traiter des affaires de la république, ces assemblées du peuple étoient appellées *comitia*, *comices*. Le préteur ou sacrificateur, qui étoit appelé *Rex*, se trouvoit quelquefois dans ces *comices*; enfin il y avoit un jour de l'année où l'on avoit coutume de nettoyer le temple de Vesta, & d'en transporter le farnier; ce qui se faisoit avec tant de cérémonie, qu'il n'étoit pas permis de plaider pendant ce temps-là.

Ces remarques suffisent pour entendre les lettres de la seconde colonne, 1.^e la lettre N signifie *nefastus dies*, ou jour *nefaste*, cela signifie qu'on ne peut pas rendre la justice en ce jour. 2.^e F, ou *festus*, veut dire qu'on peut rendre la justice. 3.^e FP, ou *fastus primus parte diei*, signifie qu'on peut la rendre dans la première partie du jour. 4.^e NP, ou *nefastus primus parte diei*, qu'on ne peut pas la rendre dans la première partie du jour. 5.^e EN, ou *endotereus* ou *interseus*, c'est-à-dire, entrecoupé, qu'on le peut dans certaines heures, & qu'on ne le peut pas dans d'autres. 6.^e C, ou *comitiellus*, veut dire que l'on tient ce jour-là les assemblées qu'on appelle *comices*. 7.^e Quand il y a ces lettres Q, R, C, F, on *quando rex commisit*, *fas*, qu'on le peut lorsque le sacrificateur, appelé le *roi*, a assisté aux *comices*. 8.^e Enfin ces lettres Q, ST, D, F, signifie, *quando sacerdos datus*, *fas*, qu'on le peut aussi-tôt que le farnier a été transporté hors du temple de la déesse Vesta.

K k ij

Lettres Nombres	Qualités des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mars.	ANVIER, Sous la protection de Junon.
A	F	I.	1	Kalendis. Januar. Sacrifices à Janus, à Junon, à Jupiter & à Esculape.
B	F		2	IV. Nonas. Jour malheureux, Dies ater.
C	C	IX.	3	III. Nonas. Coucher de l'écrevisse.
D	C		4	Pridie. Nonas.
E	F	XVIII.	5	Nonis. Januar. Lever de la lyre. Coucher au soir de l'aigle.
F	F	VI.	6	VIII. Idus.
G	C		7	VII. Idus.
H	C	XIV.	8	VI. Idus. Sacrifices à Janus.
A		III.	9	V. Idus. Les Agonales.
B	EN		10	IV. Idus. Milieu de l'hiver.
C	NP	XL	11	III. Idus. Les Carmentales.
D	C		12	Pridie Idus. Les Compitales.
E	NP	XIX.	13	Idibus Januar. Les trompettes font des publications par la ville en habit de femme.
F	EN	VIII.	14	XIX. Kal. Febr. Jour vicieux par décret du Sénat.
G			15	XVIII. Kal. Febr. A Carmenta, Porrima & Postverta.
H	C	XVI.	16	XVII. Kal. Febr. A la Concorde. Commencement du coucher au matin du lion.
A	C	V.	17	XVI. Kal. Febr. Le Soleil dans le verseau.
B	C		18	XV. Kal. Febr.
C	C	XIII.	19	XIV. Kal. Febr.
D	C	II.	20	XIII. Kal. Febr.
E	C		21	XII. Kal. Febr.
F	C	X.	22	XI. Kal. Febr.
G	C		23	X. Kal. Febr. Coucher de la lyre.
H	C	XVIII.	24	IX. Kal. Febr. Les fêtes sementines ou des semailles.
A	C	VII.	25	VIII. Kal. Febr.
B	C		26	VII. Kal. Febr.
C	C	XV.	27	VI. Kal. Febr. A Castor & Pollux.
D	C	IV.	28	V. Kal. Febr.
E	F		29	IV. Kal. Febr. Les équiries au champ de Mars.
F	F	XII.	30	III. Kal. Febr. Coucher de la Fidicule, ou Lyre... Les Pacales, ou Dédicace de l'Autel de la Paix.
G	F	I.	31	Pridie Kal. Febr. Aux dieux Pénates.

Lettres Nombres.	Qualités des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mars.	FÉVRIER, Sous la protection de Neptune.	
H	N	IX.	1	Kalendis Febr.	A Junon Sospita, à Jupiter, à Hercule, à Diane. Les Lucaires.
A	N	XVIII.	2	IV. Nonas.	
B	N		3	III. Nonas.	Coucher de la lyre & du milieu du lion.
C	N	VI.	4	Pridie Nonas.	Coucher du dauphin.
D	N	XI.	5	Nonis Febr.	Lever du verseau.
E	N	XII.	6	VIII. Idus.	
F	N	III.	7	VII. Idus.	
G	N		8	VI. Idus.	
H	N	XI.	9	V. Idus.	Commencement du printemps.
A	N		10	IV. Idus.	
B	N	XIX.	11	III. Idus.	Jeux génialiques. Lever de l'arc-ture.
C	N	VIII.	12	Pridie Idus.	
D	NP		13	Idibus Febr.	A Faune & à Jupiter. Défaite & mort des Fabiens.
E	C	XVI.	14	XVI. Kal. Mart.	Lever du corbeau, de la coupe & du serpent.
F	NP	V.	15	XV. Kal. Mart.	Les Lupercales.
G	END		16	XIV. Kal. Mart.	Le Soleil au signe des poissons.
H	NP	XIII.	17	XIII. Kal. Mart.	Les Quirinales.
A	C	II.	18	XII. Kal. Mart.	Les Fornacales. Les Férales aux dieux Manes.
B	C		19	XI. Kal. Mart.	
C	C	X.	20	X. Kal. Mart.	
D	F		21	IX. Kal. Mart.	A la déesse Muta ou Larunda. Les Férales.
E	C	XVIII.	22	VIII. Kal. Mart.	Les Carysties.
F	NP	VII.	23	VII. Kal. Mart.	Les Terminales.
G	N		24	VI. Kal. Mart.	Le Regifuge. Lieu du Biffert.
H	C	XV.	25	V. Kal. Mart.	Lever au soir de l'arc-ture.
A	EN	IV.	26	IV. Kal. Mart.	
B	NP		27	III. Kal. Mart.	Les équités au champ de Mars.
C	C	XII.	28	Pridie Kal. Mart.	Les Tarquins vaincus.

Mois.	Lettres	Qualités des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mars.	MARS. Sous la protection de Minerve.
D		NP	I.	1	Kalendis Mart. Les Matronales. A Mars. Fêtes des Anciles.
E		F		2	VI. Nonas. A Junon Lucine.
F		C	IX.	3	V. Nonas. Coucher du second des poissons.
G		C		4	IV. Nonas.
H		C	XVII.	5	III. Nonas. Coucher de l'arcure. Lever du vendangeur. Lever de l'écrevisse.
A		NP	VI.	6	Pridie Nonas. Les Vestaliennes. En ce jour, Auguste fut créé grand Pontife.
B		F		7	Nonis Mart. A Vê-Jupiter au bois de l'asyle. Lever du Pégase.
C		F	XIV.	8	VIII. Idus. Lever de la couronne.
D		C	III.	9	VII. Idus. Lever de l'orion. Lever du poisson septentrional.
E		C		10	VI. Idus.
F		C	XI.	11	V. Idus.
G		C		12	IV. Idus.
H		EN	XIX.	13	III. Idus. * Ouverture de la mer.
A		NP	VIII.	14	Pridie Idus. Les équiries secondes sur le Tibre.
B		NP		15	Idibus Mart. A Anna Pérenna. Le Parricide. Coucher du scorpion.
C		F	XVI.	16	XVII. Kal. April.
D		NP	V.	17	XVI. Kal. April. Les Libérales ou les Bacchanales. Les Agones. Coucher du milan.
E		C		18	XV. Kal. April. Le Soleil au signe du bélier.
F		N	XIII.	19	XIV. Kal. April. Les Quinquatres de Minerve pendant cinq jours.
G		C	II.	20	XIII. Kal. April.
H		C		21	XII. Kal. April. Premier jour du siècle. Coucher au matin du cheval.
A		N	X*	22	XI. Kal. April.
B		NP		23	X. Kal. April. Le Tubilustre.
C	Q. Rex. C. F.	NP	XVIII.	24	IX. Kal. April.
D		C	VII.	25	VIII. Kal. April. Les Hilaries à la mère des dieux. Equinoxe du printemps.
E		C		26	VII. Kal. April.
F		NP	XV.	27	VI. Kal. April. En ce jour, César se rendit maître d'Alexandrie.
G		C	IV.	28	V. Kal. April. Les Mégaliens.
H		C		29	IV. Kal. April.
A		C	XII.	30	III. Kal. April. A Janus, à la Concorde, au Salut & à la Paix.
B		C	I.	31	Pridie Kal. April. A la Lune ou à Diane sur l'Aventin.

Lettres Nominatives.	Qualités des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mars	AVRIL, Sous la protection de Vénus.	
C	N	IX.	1	Kalendis Aprilis.	A Vénus, avec des fleurs & du myrthe. A la Fortune virile.
D	C	XVIII.	2	IV. Nonas.	Coucher des Pléiades.
E	C		3	III. Nonas.	
F	C		4	Pridie Nonas.	Jeux Mégaliens à la mère des dieux, pendant huit jours.
G	NP	XIV.	5	Nonis. Aprilis.	A la Fortune publique citérieure.
H			6	VIII. Idus.	Jeux pour la victoire remportée par César sur Juba, en Afrique.
A	N	III.	7	VII. Idus.	Naissance d'Apollon & de Diane.
B	N		8	VI. Idus.	Coucher de la balance. Coucher d'orion.
C	N	XI.	9	V. Idus.	
D	N		10	IV. Idus.	Les Céréales. Les jeux Circenses.
E	N	XIX.	11	III. Idus.	A la Fortune primigénie.
F	N		12	Pridie Idus.	La mère des dieux amenée à Rome. Jeux en l'honneur de Cérés, pendant huit jours.
G	NP	XVI.	13	Idibus. April.	A Jupiter vainqueur, & à la Liberté.
H	N		14	XVIII. Kal. Maii.	
A	NP		15	XVII. Kal. Maii.	Les Fordicides ou Fordicales.
B	N		16	XVI. Kal. Maii.	Auguste salué Empereur. Coucher des Hyades.
C	N	XIII.	17	XV. Kal. Maii.	
D	N		18	XIV. Kal. Maii.	Les équiries au grand Cirque. Brûlement des renards.
E	N	X.	19	XIII. Kal. Maii.	Les Céréales. Le Soleil au signe du taureau.
F	N		20	XII. Kal. Maii.	
G	NP	XVIII.	21	XI. Kal. Maii.	Les Palicennes ou Pariliennes. Naissance de Rome.
H	N		22	X. Kal. Maii.	Les secondes Agonicennes ou Agonales.
A	NP	VII.	23	IX. Kal. Maii.	Les premières Vinaliennes à Jupiter & à Vénus.
B	C		24	VIII. Kal. Maii.	
C	NP	XV.	25	VII. Kal. Maii.	Les Robigales. Coucher du bélier. Milieu du printemps.
D	F		26	VI. Kal. Maii.	Lever du chien. Lever des chèvres.
E	C	XII.	27	V. Kal. Maii.	Les Fêtes latines au mont Sacré.
F	NP		28	IV. Kal. Maii.	Les Florales pendant six jours. Lever au matin de la chèvre.
G	C	I.	29	III. Kal. Maii.	Coucher au soir du chien.
H	C		30	Pridie Kal. Maii.	A Vesta Palatine. Les premières Larentales.

Lettres Numériques	Qualités des Jours.	Nombres d'Or.	J. du Mo.	M A I,	
				Sous la protection d'Apollon.	
A	N	IX.	1	Kalendis Maii.	A la bonne Déesse. Aux Lares Prestites ou Protecteurs. Jeux flo- raux pendant trois jours.
B	F	XVII.	2	VI. Nonas.	Les Compitales.
C	C		3	V. Nonas.	Lever du Centaure & des Hyades:
D	C		4	IV. Nonas.	
E	C		5	III. Nonas.	Lever de la lyre.
F	C		6	Pridie Nonas.	Coucher du milieu du scor- pion.
G	N	XIV.	7	Nonis Maii.	Lever au matin des virgilies, ou pleiades.
H	F	III.	8	VIII. Idus.	Lever de la chevrette. (chèvre.)
A	N	XI.	9	VII. Idus.	Les Lemuriennes de nuit pendant trois jours. Les Luminaires.
B	C		10	VI. Idus.	
C	N		11	V. Idus.	Coucher d'orion. Jour malheureux pour se marier.
D	NP	XIX.	12	IV. Idus.	A Mars le vengeur au cirque.
E	N	VIII.	13	III. Idus.	Les Lémuriennes. Lever des Pleiades. Commencement de l'été.
F	C	XVI.	14	Pridie Idus.	A Mercure. Lever du taureau.
G	NP		15	Idibus Maii.	A Jupiter. Fêtes des marchands. Naissance de Mercure. Lever de la lyre.
H	F	V.	16	XVII. Kal. Jun.	
A	C	XIII.	17	XVI. Kal. Jun.	
B	C		18	XV. Kal. Jun.	
C	C	II.	19	XIV. Kal. Jun.	Le Soleil dans les gémeaux.
D	C	X.	20	XIII. Kal. Jun.	
E	NP		21	XII. Kal. Jun.	Les Agonales ou Agoniennes de Janus.
F	N	XVIII.	22	XI. Kal. Jun.	A Vê-Jupiter. Lever du chien.
G	NP		23	X. Kal. Jun.	Les Fêtes de Vulcains. Les Tu- bilustres.
H	Q. Rex. C. F.	VII.	24	IX. Kal. Jun.	
A	C	XV.	25	VIII. Kal. Jun.	A la Fortune. Lever de l'aigle.
B	C		26	VII. Kal. Jun.	Le second Regifuge. Coucher de l'arcture.
C	C	IV.	27	VI. Kal. Jun.	Lever des Hyades.
D	C	XII.	28	V. Kal. Jun.	
E	C		29	IV. Kal. Jun.	
F	C	I.	30	III. Kal. Jun.	
G	C	IX.	31	Pridie Kal. Jun.	

Lettres Nominatives	Qualités des Jours.	Nombre d'Ors	J. de Mo.	J U I N ,	
				Sous la protection de Mercure.	
H	N	XVII.	1	Kalendis Jun.	A Junon. A la Monnoie. A Tempesta. A Fabaris. Lever de l'aigle.
A	F	VI.	2	IV. Nonas.	A Mars. A la déesse Carna. Lever des Hyades.
B	C	XIV.	3	III. Nonas.	A Bellone.
C	C		4	Pridie Nonas.	A Hercule au Cirque.
D	N		5	Nonis Jun.	A la Foi. A Jupiter Sponfor, ou au dieu Fidius, Saint, Semipater.
E	N	XI.	6	VIII. Idus.	A Vesta.
F	N		7	VII. Idus.	Les jours Piscatoriens au champ de Mars. Lever de l'arcure.
G	N	XIX.	8	VI. Idus.	A l'entendement au Capitole.
H	N P		9	V. Idus.	Les Vestaliennes. Autel de Jupiter Pistor. Couronnement des aînés.
A	N	VIII.	10	IV. Idus.	Les Matraliennes de la Fortune forte. Lever au soir du dauphin.
B	N	XVI.	11	III. Idus.	A la concorde. A la mère Matula.
C	N		12	Pridie Idus.	A Jupiter Invictus. Le petit Quinquatrus. Commencement de la chaleur.
D	N	V.	13	Idibus Jun.	
E	N	XIII.	14	XVIII. Kal. Jul.	
F	Q. ST. D. F.		15	XVII. Kal. Jul.	Transport du temple de Vesta. Lever des Hyades.
G	C	II.	16	XVI. Kal. Jul.	Lever d'orion.
H	C	X.	17	XV. Kal. Jul.	Lever du dauphin entier.
A	C		18	XIV. Kal. Jul.	
B	C		19	XIII. Kal. Jul.	A Minerve au mont Aventin. Le soleil au signe du cancer.
C	C	XVIII.	20	XII. Kal. Jul.	A Summanus. Lever du serpen- taire.
D	C	VII.	21	XI. Kal. Jul.	
E	C	XV.	22	X. Kal. Jul.	
F	C		23	IX. Kal. Jul.	
G	C	IV.	24	VIII. Kal. Jul.	A la Fortune forte. Solstice d'été.
H	C	XII.	25	VII. Kal. Jul.	
A	C		26	VI. Kal. Jul.	Lever de la ceinture d'orion.
B	C	I.	27	V. Kal. Jul.	A Jupiter Stator & au Lar.
C	C	IX.	28	IV. Kal. Jul.	
D	F		29	III. Kal. Jul.	A Quirinus au mont Quirinal.
E	C		30	Pridie Kal. Jul.	A Hercule & aux Muses. Les Po- plufuges.

<i>Letres Nominatives</i>	<i>Qualités des Jours.</i>	<i>Nombre d'Or.</i>	<i>J. de Mo.</i>	QUINTILE ou JUILLET, <i>Sous la protection de Jupiter.</i>	
F	N	XVII.	1	<i>Kalendis</i> Jul.	Passage d'une maison en d'autres.
G	N.	VI.	2	VI. Nonas.	
H	N		3	V. Nonas.	
A	NP	XIV.	4	IV. Nonas.	Coucher au matin de la couronne. Lever des Hyades.
B	N	III.	5	III. Nonas.	Le Poplufage.
C	N		6	Pridie Nonas.	Jeux Apollinaires pendant huit jours. A la Fortune féminine.
D	N	XI.	7	<i>Nonis</i> Jul.	Les Nones Caprotines. La fête des Servantes. Disparition de Ro- mulus.
E	N		8	VIII. Idus.	La Vitulation. Coucher du milieu du capricorne.
F	EN	XIX.	9	VII. Idus.	Lever au soir de Céphée.
G	C	VIII.	10	VI. Idus.	Les vents étiétiens commencent à souffler.
H	C		11	V. Idus.	
A	NP	XVI.	12	IV. Idus.	Naissance de Jules-César.
B	C	V.	13	III. Idus.	
C	C		14	Pridie Idus.	A la Fortune féminine. Les Mer- catus ou les Mercuriales, pen- dant six jours.
D	NP	XIII.	15	<i>Idibus</i> Jul.	A Castor & à Pollux.
E	F	II.	16	XVII. Kal. Aug.	Lever de l'avant-chien.
F	C		17	XVI. Kal. Aug.	Jour funeste de la bataille d'Allia.
G	C	X	18	XV. Kal. Aug.	Les Lucariens. Jeux pendant quatre jours.
H	NP		19	XIV. Kal. Aug.	Jeux pour la victoire de César. Le Soleil au signe du lion.
A	C	XVIII.	20	XIII. Kal. Aug.	Les Lucariennes.
B		VII.	21	XII. Kal. Aug.	
C	C		22	XI. Kal. Aug.	Jeux de Neptune.
D		XV.	23	X. Kal. Aug.	
E	N	IV.	24	IX. Kal. Aug.	Les Furinales. Jeux Circenses pen- dant six jours. Coucher du ver- seau.
F	NP		25	VIII. Kal. Aug.	Lever de la canicule.
G	C	XII.	26	VII. Kal. Aug.	Lever de l'aigle.
H	C	I.	27	VI. Kal. Aug.	
A	C		28	V. Kal. Aug.	
B	C	IX.	29	IV. Kal. Aug.	Coucher de l'aigle.
C	C		30	III. Kal. Aug.	
D	C	XVII.	31	Pridie Kal. Aug.	

CALENDRIER ROMAIN.

267

Lettre Nominative	Qualité des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mois.	SEXTILE ou AOUT; Sous la protection de Cérès.
E	N	VI.	1	Kalendis Aug.
F	C	XIV.	2	XIV. Nonas. A Mars. A l'Espérance.
G	C	III.	3	III. Nonas. Fêtes. De ce que César a subjugué l'Espagne.
H	C	III.	4	Pridie. Nonas.
A	F	XI.	5	Nonas. Aug.
B	F	XI.	6	VIII. Idus. Lever du milieu du lion.
C	C	XIX.	7	VII. Idus. Au Salut au mont Quirinal.
D	C	VIII.	8	VI. Idus. A l'Espérance. Coucher du milieu de l'arcture.
E	NP		9	V. Idus. Coucher du milieu du verseau.
F	C	XVI.	10	IV. Idus. Au Soleil indigète au mont Quirinal.
G	C	V.	11	III. Idus. A Opis & à Cérés.
H	C		12	Pridie Idus. A Hercule au cirque Flaminius.
A	NP	XIII.	13	Idibus Aug. Coucher de la lyre. Commencement de l'automne.
B	F	II.	14	XIX. Kal. Sept. Les Lignapées.
C	C		15	XVIII. Kal. Sept. A Diane au bois Aricien. A Vertumne. Fêtes des esclaves & des servantes.
D	C	X.	16	XVII. Kal. Sept. Coucher au matin du dauphin.
E	NP		17	XVI. Kal. Sept. Les Portunnales. A Janus.
F	C	XVIII.	18	XV. Kal. Sept. Les Consuales. Ravissement des Sabin.
G	FP	VII.	19	XIV. Kal. Sept. Les Vinales dernières. Mort d'Auguste.
H	C		20	XIII. Kal. Sept. Coucher de la lyre. Le Soleil au signe de la vierge.
A	NP	XV.	21	XII. Kal. Sept. Les Vinales Eustiques. Les grands Mystères. Les Consuales.
B	EN	IV.	22	XI. Kal. Sept. Lever au matin du vendangeur.
C	NP		23	X. Kal. Sept. Les Vulcanales au cirque Flaminius.
D	C	XII.	24	IX. Kal. Sept. Les Fêtes de la lune.
E	NP	I.	25	VIII. Kal. Sept. Les Opiconfives au Capitole.
F	C		26	VII. Kal. Sept.
G	NP	IX.	27	VI. Kal. Sept. Les Volturnales.
H	NP		28	V. Kal. Sept. A la victoire in Curia. Coucher de la fêche. Fin des vents étésiens.
A	F	XVII.	29	IV. Kal. Sept.
B	F	VI.	30	III. Kal. Sept. On montre les ornemens de la déesse Cérés.
C	C		31	Pridie Kal. Sept. Lever au soir d'Andromède.

L. i ij

Nombres. Lettres	Qualités des Jours.	Nombres d'Os.	J. de Mois.	SEPTEMBRE.	
				Sous la protection de Vulcain.	
D	N	XIV.	1	Kalendis	Septemb. A Jupiter Maimactes. Fêtes à Neptune.
E	N	III.	2	IV. Nonas.	A la victoire d'Auguste. Fêtes.
F	NP	XL	3	III. Nonas.	Les Dionysiaques ou les Vendanges.
G	C		4	Pridie Nonas.	Jeux Romains pendant huit jours.
H	F		5	Nonis	
A	F	XIX.	6	VIII. Idus.	A l'Érèbe d'un bélier & d'une brebis noire.
B	C	VIII.	7	VII. Idus.	
C	C	XVI.	8	VI. Idus.	
D	C		9	V. Idus.	Lever de la chevrette. (le soir).
E	C		10	IV. Idus.	Lever de la tête de Méduse.
F	C	V.	11	III. Idus.	Lever du milieu de la vierge.
G	N	XIII.	12	Pridie Idus.	Lever du milieu de l'Arcture.
H	NP	II.	13	Idibus Sept.	A Jupiter. Dédicace du Capitole. Le clou fiché par le Préteur. Départ des Hirondelles.
A	F	X.	14	XVIII. Kal. Oct.	Épreuve des chevaux.
B			15	XVII. Kal. Oct.	Les grands jeux Circenses voués pendant cinq jours.
C	C		16	XVI. Kal. Oct.	
D	C	XVIII.	17	XV. Kal. Oct.	
E	C	VII.	18	XIV. Kal. Oct.	Lever au matin de l'épi de la vierge.
F	C		19	XIII. Kal. Oct.	Le Soleil dans le signe de la balance.
G	C	XV.	20	XII. Kal. Oct.	Le Mercatus pendant quatre jours. Naissance de Romulus.
H	C	IV.	21	XI. Kal. Oct.	
A	C	XII.	22	X. Kal. Oct.	Coucher d'Argo & des poissons.
B	NP		23	IX. Kal. Oct.	Jeux Circenses. Naissance d'Auguste. Lever au matin du centaure.
C	C	I.	24	VIII. Kal. Oct.	Équinoxe de l'automne.
D	C	IX.	25	VII. Kal. Oct.	A Vénus, à Saturne & à Mania.
E	C		26	VI. Kal. Oct.	
F	C		27	V. Kal. Oct.	A Vénus mère. A la Fortune de retour.
G	C	XVII.	28	IV. Kal. Oct.	Fin du lever de la vierge.
H	F	VI.	29	III. Kal. Oct.	
A	C	XIV.	30	Pridie Kal. Oct.	Festin à Minerve. Les Méditinales.

Nombres Lettres	Qualités des Jours.	Nombres d'Or.	J. de Mars	OCTOBRE, Sous la protection de Mars.	
B	N	III.	1	Kalendis	Octob.
C	F		2	VI.	Nonas.
D	C	XI.	3	V.	Nonas.
E	C		4	IV.	Nonas. Coucher au matin du Bootès;
F	C	XIX.	5	III.	Nonas. On montre les ornemens de Cérés;
G	C	VIII.	6	Pridie	Nonas. Aux dieux Manes.
H	F		7	Nonis.	Octob.
A	F	XVI.	8	VIII.	Idus. Lever de l'étoile brillante de la
					couronne.
B	C	V.	9	VII.	Idus.
C	C		10	VI.	Idus. Les Ramales.
D		XIII.	11	V.	Idus. Les Méditrinales. Commencement
					de l'hiver.
E	NP	II.	12	IV.	Idus. Les Augustales.
F	NP		13	III.	Idus. Les Fontinales. A Jupiter libérateur. Jeux pendant trois jours;
G	EN	X.	14	Pridie	Idus.
H	NP		15	Idibus.	Octob. Les Marchands à Mercure.
A	F	XVIII.	16	XVII.	Kal. Nov. Jeux populaires. Coucher d'arc-
					ture.
B	C	VII.	17	XVI.	Kal. Nov.
C	C		18	XV.	Kal. Nov. A Jupiter libérateur. Jeux.
D	NP	XV.	19	XIV.	Kal. Nov. L'Armilustre.
E	C	IV.	20	XIII.	Kal. Nov. Le Soleil au signe du scorpion;
F	C		21	XII.	Kal. Nov. Jeux pendant quatre jours.
G	C	XII.	22	XI.	Kal. Nov.
H	C	I.	23	X.	Kal. Nov. Aupere Liber. Coucher du taureau;
A	C		24	IX.	Kal. Nov.
B	C	IX.	25	VIII.	Kal. Nov.
C	C		26	VII.	Kal. Nov.
D	C	XVII.	27	VI.	Kal. Nov. Jeux à la Victoire.
E	C	VI.	28	V.	Kal. Nov. Les petits Mystères. Coucher des
					Virgilies.
F	C		29	IV.	Kal. Nov.
G	C	XIV.	30	III.	Kal. Nov. Les Fêtes de Vertumne. Jeux
					voués.
H	C	III.	31	Pridie	Kal. Nov. Coucher d'arc-
					ture.

Lettres Nombres.	Qualités des Jours.	Nombres P.O.	J. de Mo.	NOVEMBRE. Sous la protection de Diane.	
A	N		1	<i>Kalendis</i>	Novemb. Banquet de Jupiter. Jeux Circenses. Coucher de la tête du taureau.
B	F	XL	2	IV.	Nonas. Coucher au soir de l'arcture.
C	F		3	III.	Nonas. Lever au matin de la Ficule. (la lyre).
D		XIX.	4	Pridie	Nonas.
E	F	VIII.	5	<i>Nonis</i>	Novemb. Les Neptunales. Jeux pendant huit jours.
F	F		6	VIII.	Idus.
G	C	XVI.	7	VII.	Idus. Montre des ornemens.
H	C	V.	8	VI.	Idus. Lever de la claire du scorpion.
A	C		9	V.	Idus.
B	C	XIII.	10	IV.	Idus.
C	C	II.	11	III.	Idus. Clôture de la mer. Coucher des Virgiles.
D	C		12	Pridie	Idus.
E	N P	X.	13	<i>Idibus</i>	Nov. Banquet commandé. Les Lectif- ternies.
F	F		14	XVIII.	Kal. Dec. Épreuve des chevaux.
G	C	XVIII.	15	XVII.	Kal. Dec. Jeux populaires au cirque, durant trois jours.
H	C	VII.	16	XVI.	Kal. Dec. Fin des semailles de froment.
A	C		17	XV.	Kal. Dec.
B	C	XV.	18	XIV.	Kal. Dec. Le Mercatus durant trois jours. Le Soleil au sagittaire.
C	C	IV.	19	XIII.	Kal. Dec. Souper des Pontifes en l'honneur de Cybèle.
D	C		20	XII.	Kal. Dec. Coucher des cornes du taureau.
E	C	XII.	21	XL	Kal. Dec. Les Libérales. Coucher au matin du lièvre.
F		I.	22	X.	Kal. Dec. A Pluton & à Proserpine.
G	C		23	IX.	Kal. Dec.
H	C	IX.	24	VIII.	Kal. Dec. Bruma ou les Brumales pendant trois jours.
A	C		25	VII.	Kal. Dec. Coucher de la canicule. (sirius).
B	C	XVII.	26	VI.	Kal. Dec.
C	C	VI.	27	V.	Kal. Dec. Sacrifices mortuaires aux Gaulois détruits & aux Grecs, in foro Boario.
D	C		28	IV.	Kal. Dec.
E	C	XIV.	29	III.	Kal. Dec.
F	F	III.	30	Pridie	Kal. Dec.

Nominata.	Lettres	Qualités des Jours.	Nombre d'Or.	J. de Mois.	D É C E M B R E , Sous la protection de Vesta.	
G		N	XI.	1	Kalendis	Decemb. A la Fortune féminine.
H				2	IV.	Nonas.
A			XIX.	3	III.	Nonas.
B			VIII.	4	Pridie	Nonas. A Minerve & à Neptune.
C		F		5	Nonis.	Decemb. Les Faunales.
D		C	XVI.	6	VIII.	Idus. Coucher du milieu du sagittaire.
E		C	V.	7	VII.	Idus. Lever au matin de l'aigle.
F		C		8	VI.	Idus.
G		C	XIII.	9	V.	Idus. A Junon Jugale.
H		C	II.	10	IV.	Idus.
A		NP		11	III.	Idus. Les Agonales. Les quatorze jours Alcyoniens.
B		EN	X.	12	Pridie	Idus.
C		NP		13	Idibus	Decemb. Les Equiries ou course des chevaux.
D		F	XVIII.	14	XIX.	Kal. Jan. Les Brumales. Les Ambrosiennes.
E		NP	VII.	15	XVIII.	Kal. Jan. Les Confuales. Lever du matin de l'écrevisse entière.
F		C		16	XVII.	Kal. Jan.
G				17	XVI.	Kal. Jan. Les Saturnales pendant cinq jours.
H		C	XV.	18	XV.	Kal. Jan. Lever du cigne. Le Soleil au signe du capricorne.
A		NP	IV.	19	XIV.	Kal. Jan. Les Opaliennes.
B		C		20	XIII.	Kal. Jan. Les Sigillaires pendant deux jours.
C		NP	XII.	21	XII.	Kal. Jan. Les Angéronales. Les Divales. A Hercule & à Vénus, avec du vin mêlé.
D		C	I.	22	XI.	Kal. Jan. Les Compitales. Les Fêtes dédiées aux Lares. Jeux.
E		NP	IX.	23	X.	Kal. Jan. Les Fêtes de Jupiter. Les Larentinales ou Laurentinales. Coucher de la chèvre.
F		C		24	IX.	Kal. Jan. Les Juvénales. Jeux.
G		C	XVII.	25	VIII.	Kal. Jan. La fin des Brumales. Solstice d'hiver.
H		C	VI.	26	VII.	Kal. Jan.
A		C		27	VI.	Kal. Jan. A Phébus pendant trois jours. Lever au matin du dauphin.
B		C	XIV.	28	V.	Kal. Jan.
C		F	III.	29	IV.	Kal. Jan. Coucher au soir de l'aigle.
D		F		30	III.	Kal. Jan. Coucher au soir de la canicule.
E		F	XI.	31	Pridie	Kal. Jan.

5.^e La troisième colonne est pour les dix-neuf caractères des nombres du cycle lunaire, ou *nombre d'or*, pour marquer les nouvelles lunes dans toute l'année, suivant l'ordre auquel elles arrivoient du tems de Jules-César, du moins plusieurs savans ont pensé qu'on avoit compté ainsi des le tems de César, & qu'on avoit pris pour la première année du cycle lunaire l'an 45 avant J. C. ou l'année de la réforme julienne; il est vrai que la nouvelle lune cette année-là, fut le premier janvier; mais Scaliger & Petau pensent que ces nombres n'ont été mis dans le *calendrier* julien que depuis le concile de Nicée.

Quoi qu'il en soit, cette colonne est tirée de *Gauricus*, & le P. Petau, l. 6, c. 14, en a donné l'explication détaillée. Dans la première année du cycle de 19 ans, la nouvelle lune arrivoit le 1 janvier & le 31, le 1 mars & le 31, le 29 avril, &c. en sorte qu'on trouve le nombre 1 vis-à-vis de tous ces jours-là. Le nombre 11 se trouve vis-à-vis de tous les jours de l'année, où arrivoit la nouvelle lune dans la seconde année de chaque cycle de 19 ans, comme au 20 de janvier, au 18 février, &c. qui étoient des jours de nouvelle lune, l'an 44 avant J. C. ou 43, suivant la manière de compter des astronomes. Cela suffiroit pour trouver les nouvelles lunes d'une année quelconque dans l'histoire romaine; car tous les 19 ans elles revenoient au premier janvier. Voyez CYCLE LUNAIRE.

6.^e La quatrième colonne marque la suite des jours des mois, suivant notre usage; on les a mis pour montrer le rapport qu'il y a entre la manière de nommer & de compter les jours des romains & la nôtre, & faire voir quels sont, selon notre façon de compter, les jours auxquels les fêtes romaines peuvent répondre.

7.^e La cinquième colonne contient la division des mois en *calendes*, *nones* & *ides*, qui étoient en usage parmi les romains. Elle n'est point en parties égales, comme les *calendes* des grecs, mais en portions fort différentes, dont on peut voir les raisons dans le P. Petau, *Doctr. temp.* liv. 2, ch. 74. Les variétés en sont renfermées dans ces vers latins :

*Sex majus nonas, october, julius & mars;
Quatuor at reliqui. Dabit idus quilibet aë.*

C'est-à-dire, que les mois de mars, mai, juillet & octobre, ont six jours de *nones*, & que tous les autres n'en ont que quatre; mais qu'il y a dans tous huit jours d'*ides*; ce qu'il faut entendre ainsi, savoir: que le premier jour de chaque mois s'appelle toujours *calende* ou *kaltnda*, les *calendes*; qu'aux quatre mois, mars, mai, juillet & octobre, le septième du mois s'appelle *nonas*, les *nones*, & le treizième *ides*, les *ides*. Les autres jours se comptent à rebours du mois suivant, comme le 28, le 29, &c. avant les *calendes* du mois suivant. Les jours qui sont depuis les *calendes* jusqu'aux *nones*, prennent le nom du

nonnes du mois courant: les autres jours qui sont entre les *nones* & les *ides*, prennent aussi le nom des *ides* du même mois. Mais tous les autres jours depuis les *ides* jusqu'à la fin, prennent le nom des *calendes* du mois suivant. On voit au reste que les tables des fêtes, sur lesquelles les romains plaçoient leurs mois & leurs jours par année, prenent dans la suite le nom de *calendrier*, parce que ce nom de *calendes* étoit écrit en gros caractères à la tête de chaque mois.

8.^e Enfin la dernière colonne comprend les choses qui appartiennent principalement à la religion des romains, comme font les fêtes, les sacrifices, les jeux, les cérémonies, les jours heureux ou malheureux; aussi bien que les commencemens des signes, les quatre points cardinaux de l'année, qui sont les quatre saisons, le lever & le coucher des étoiles, voyez LEVER & MÈLANGE, &c. Cela étoit d'un grand usage parmi les anciens, qui s'en sont long-tems servi pour marquer la différence des saisons, au lieu de *calendrier*, au moins jusqu'à ce qu'il eût été rédigé dans une forme plus régulière par la correction de Jules-César. Nous voyons dans la plupart des livres anciens, que l'on se gouvernoit entièrement par l'observation du lever & du coucher des étoiles, dans la Navigation, dans l'Agriculture, dans la Médecine & dans la plus grande partie des affaires publiques & particulières, parce que les apparitions d'étoiles étoient plus faciles à bien distinguer que les limites des saisons & l'inégalité des jours.

J'aurois augmenté cette partie du *calendrier*; mais les auteurs anciens sont si peu d'accord entr'eux, que j'ai cru le travail trop peu utile.

CALENDRIER gregorien, est celui dont nous nous servons depuis 1582, & qui fut rédigé à Rome sous le pape Grégoire XIII. Il y avoit long-tems qu'on s'occupoit de ce projet de réformation, comme on peut le voir dans l'histoire ecclésiastique du P. Alexandre. Pierre d'Ailly, chancelier de l'Université de Paris, en 1414, le cardinal Cusa, Régis Montanus, sous le règne de Sixte IV, s'en occupèrent; l'ouvrage fut enfin terminé sous Grégoire XIII.

Le point fixe, d'où l'on partit dans la réformation du *calendrier*, fut la règle qu'on attribue aux pères du concile de Nicée tenu en 325. Suivant cette règle, l'équinoxe doit être le 21 de mars, & la fête de Pâque le dimanche après le xiv^e de la lune du premier mois, c'est-à-dire, de la lune, dont le 14^e arrive ou le jour même, ou après le jour de l'équinoxe.

On crovoit, au tems du concile de Nicée, que l'année étoit à-peu-près de 365^e 5^e 55^e, suivant le sentiment de Ptolémée. On supposoit donc que l'équinoxe, qui arrivoit alors le 21 de mars, arriveroit toujours de même, ou qu'on y remédieroit dans la suite. Mais comme il y a six minutes de moins dans la véritable durée de l'année solaire, l'équinoxe

l'équinoxe arrivoit chaque année six minutes plutôt qu'on ne crovoit; & du tems de Gregoire XIII, en 1577, il le trouvoit arriver le 11 de mars; il auroit fallu oncêtre trois jours de l'année tous les 400 ans, pour que le 21 de mars fut toujours près du véritable équinoxe.

Ce fut le 14 février 1581 que parut le bref par lequel Gregoire XIII ordonna l'observation des trois articles qui devoient remplir pour toujours l'intention attribuée aux PP. du concile de Nicée: les voici en abrégé.

1.^o Il est dit qu'après le 4 octobre 1582, on retrancha 10 jours du mois, en sorte que le jour qui suivra la fête de S. François, qu'on a coutume de célébrer le 4 octobre, sera appelé non le 5, mais le 15 d'octobre, & que la lettre dominicale G sera changée en C.

2.^o Pour qu'à l'avenir l'équinoxe du printemps ne puisse pas s'éloigner du 21 de mars, les années bissextiles qui avoient lieu de quatre en quatre ans, n'auront pas lieu dans les années séculaires 1700, 1800, 1900, mais seulement l'an 2000, & ainsi dans la suite à perpétuité; de sorte que trois années séculaires soient toujours communes, & la quatrième bissextile. Le troisième article de la réformation, a pour objet les nouvelles lunes, & nous en parlerons ci-après.

Voici la table des années séculaires bissextiles ou communes, dans laquelle on voit que les nombres séculaires 16, 20, 24, &c. divisibles par 4 sans reste, sont les seuls qui expriment des années bissextiles, comme dans le cours d'un siècle les nombres divisibles par 4 expriment aussi des années bissextiles.

1600 bissextile.	2000 b.	2400 b.
1700 commune.	2100 c.	2500 c.
1800 commune.	2200 c.	2600 c.
1900 commune.	2300 c.	2700 c.

En continuant ainsi, l'on verra que l'année 3200 doit être bissextile, parce que 32 est divisible par 4; mais, pour plus grande exactitude, il faudroit faire cette année de 365 jours seulement, en sorte que depuis 4800 jusqu'à 5600, il n'y eût point de bissextile; car l'année étant réellement de 365¹/₄ 48' 48", les 11' 12" qu'il y a de moins font un jour en 128 ans, ou 28 jours en 3600 ans; ainsi, il faudroit retrancher 28 bissextiles séculaires sur 36 siècles, au lieu que la règle précédente n'en retranche que 27.

Il y auroit encore une correction à faire dans la forme des années civiles, si l'on pouvoit changer ainsi les usages des nations pour la commodité des calculs, ce seroit la distribution des mois.

M. Carouge considérant la durée du tems que le soleil emploie à parcourir chaque signe, observe

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

que si l'on avoit placé le commencement de l'année au solstice d'hiver en faisant les trois premiers mois & les trois derniers de 30 jours, le soleil entreroit dans chaque signe presque toujours le premier du mois, & chaque saison occuperoit précisément trois mois; & comme le mois de janvier répond au signe où le soleil est le moins de tems, ce seroit celui qu'on seroit de 29 jours dans les années communes. (*Journal des Savans*, août 1776, janvier 1779.)

Tous les Etats catholiques adoptèrent le calendrier de Gregoire XIII, & les dix jours que l'on retrancha de l'année en 1582, furent cause d'une différence qui a subsisté long-tems en Europe dans la manière de compter les jours; toutes les fois, par exemple, que l'on comptoit en Angleterre le 2 janvier, on comptoit le 12 en France, c'est-à-dire, 10 jours de plus; les personnes qui craignoient l'équivoque devoient ainsi, $\frac{1}{2}$ janvier, c'est-à-dire, le deux vieux style, ou style julien, & le 12 nouveau style ou style grégorien. Lorsqu'en 1700 on eut supprimé une bissextile, suivant le calendrier grégorien, la différence se trouva de 11 jours, parce que dans le calendrier julien on avoit fait l'année 1700 plus longue d'un jour; ce qui faisoit compter ensuite un jour de moins.

Cette différence du vieux & du nouveau style a subsisté long-tems entre les pays protestans & les pays catholiques: les protestans d'Allemagne ont reçu en 1700 le nouveau calendrier. On voit dans les *Transactions philosophiques*, n.^o 203, 6^e, ce que l'on pensoit en Angleterre de la réformation; mais elle y a été adoptée enfin, & le nouveau style a commencé en Angleterre au mois de septembre 1752. On a retranché alors 11 jours, & l'on s'est trouvé d'accord avec le calendrier grégorien: l'uniformité a lieu actuellement dans tous les Etats de l'Europe; la Russie est le seul pays où l'on compte encore 11 jours de moins que dans les autres pays de l'Europe.

La réformation du calendrier avoit encore un autre objet dans les vues de l'égglise; c'étoit de remettre les nouvelles lunes, & sur-tout le quatorzième de la lune pasciale, au même état où elles avoient été en 325, au tems du concile de Nicée, & dont elles étoient éloignées de plus de quatre jours. Denis le Petit assure que, suivant l'intention du concile, on doit célébrer la fête de Pâque le premier dimanche après le 14^e de la lune, si ce 14^e arrive le 21 de mars ou après le 21 de mars; ainsi, la fête de Pâque ne doit jamais arriver plutôt que le 22 de mars; car la règle dit que ce sera le premier dimanche après le quatorzième. De même elle ne doit jamais arriver plus tard que le 25 avril: car si la pleine lune tombe au 20 mars, ce ne sera pas la pleine lune pasciale; on attendra celle qui suit le 21 mars ou celle du 18 avril; & si le 18 avril se trouve un dimanche, ce ne sera encore que le dimanche suivant, 25 avril, qui sera le jour de Pâque.

M m

Le P. Alexandre fait voir combien l'église a pris de soin, depuis le concile de Nicée, pour empêcher qu'il ne se glissât quelques erreurs dans la célébration de la Pâque : on s'en est occupé dans divers siècles ; & l'un des premiers qui s'en occupèrent fut S. Hippolyte, évêque & martyr, qui vivoit l'an 228. Enfin Grégoire XIII rassembra à Rome des savans de divers pays dès l'année 1576. Un médecin de Calabre, nommé Luigi Lilio, ou *Aloisius Lilius*, lui présenta pour lors un projet de *calendrier*, intitulé : *Compendium novæ rationis restituendi calendarii*, que le pape adressa, en 1577, à tous les princes chrétiens & à toutes les universités célèbres pour le faire examiner, & qui fut adopté dans le bref de la réformation.

L'épacte, dans son principe, est ce qu'il faut ajouter à l'année lunaire pour former l'année solaire. La suite des épactes est la suite des différences qui se trouvent entre ces deux sortes d'années. Il y a des épactes astronomiques destinées à trouver exactement les syzygies astronomiques moyennes en heures, minutes & secondes. Voyez ÉPACTE. Mais celles du *calendrier* sont destinées seulement à trouver, suivant l'intention de l'église & la règle établie en 1582, les jours des nouvelles lunes ecclésiastiques ; je dis suivant l'intention & la règle de l'église, parce que les nouvelles lunes ecclésiastiques ne sont pas tout-à-fait d'accord avec les N. L. moyennes de l'Astronomie.

L'épacte qu'on assigne à chaque année dans le *calendrier*, est le nombre qui indique l'âge de la lune au commencement de cette année, suivant le *calendrier* ecclésiastique : de-là il suit que si la nouvelle lune arrive le 1. janvier, l'épacte est zéro pour cette année-là ; mais, l'année suivante, elle sera de 11, parce que l'année lunaire n'est que de 354 jours, & l'année solaire de 365, ou 11 jours de plus ; ce qui fait que la nouvelle lune étant tombée au 20 décembre, la lune aura 11 jours le 1. janvier de l'année suivante. De même l'année d'après, l'épacte est de 22 ; la troisième année elle seroit de 33, si l'on en ôtoit 30 pour former un mois complet : elle se réduit donc à 3. Par ce moyen les épactes d'années suivent l'ordre naturel des multiples de onze, en retranchant toujours 30 ; savoir, 11, 22, 3, 14, 25, 6, 17, 28, 9, 20, 1, 12, 23, 4, 15, 26, 7, 18, 29. Tel est l'ordre naturel & primitif des épactes, quand on suppose les mois lunaires de 29 & de 30 jours, les années civiles de 365 jours, avec un bissextile tous les quatre ans.

Cet ordre primitif & régulier est celui qu'on suppose à l'époque du concile de Nicée ; mais en s'en éloignant, on observe deux défauts dans cette règle : ou deux interruptions : on les appelle *équation lunaire* & *équation solaire* ; la première vient de ce que le cycle lunaire de 19 ans est défectueux d'environ $1\frac{1}{2}$; les 235 lunaisons ne faisant pas tout-à-fait 19 ans ; de sorte qu'au bout de 312 ans, les nouvelles lunes arrivent un jour plutôt, &

l'on est obligé de prendre l'épacte plus forte d'une unité. La seconde équation a lieu à cause du retranchement de trois bissextiles sur l'espace de 400 ans, qui fait que la nouvelle lune arrive plus tard, & qu'il faut diminuer l'épacte. De cette double inégalité, il résulte que chaque siècle exige un nouvel ordre d'épacte ; il y en a 30 suites différentes qui forment ce qu'on appelle la *table étendue des épactes*, & que l'on trouvoit ci-après.

Ces 30 suites tiennent lieu de 30 *calendriers* qu'il auroit fallu avoir ; elles composent un total assez parfait que les règles de l'église & de la société civile pouvoient l'exiger.

Ces 30 lignes sont désignées par 30 lettres de l'alphabet qui descendent dans un ordre rétrograde, mais dans lesquelles on a seulement évité d'employer certaines lettres qui pouvoient occasionner de la confusion dans les caractères. En tête de la table, on trouve les 19 nombres du cycle lunaire, en commençant par 31, qui, au tems du concile de Nicée, se plaçoit vis-à-vis le 1. janvier. La première ligne horizontale de la table, marquée P, n'est autre chose que la suite des nombres que nous avons indiqués ci-dessus, en commençant par 0, ou 1, sans autre interruption que celle d'un jour de plus, quand le nombre d'or devient 1, parce qu'alors la dernière lunaison n'est que de 29 jours au lieu de 30 ; ce qui fait avancer les nouvelles lunes d'un jour. Cette dernière lunaison est une des sept intercalaires qu'il y a en 19 ans ; mais elle est exceptée de la règle. Voyez CYCLE LUNAIRE. La seconde ligne marquée N a une unité de moins, & ainsi des autres.

La première ligne de la table des épactes, marquée P, fut attribuée, dans la réformation du *calendrier*, au sixième siècle : on supposait que les nombres d'or indiquoient exactement, pour ce siècle-là, les nouvelles lunes. L'on prit pour époque du *calendrier* l'année 550, tems postérieur à celui du concile, parce qu'on voulut que les nouvelles lunes du *calendrier* fussent en retard sur les nouvelles lunes astronomiques moyennes, de peur que la fête de Pâque ne vint à être célébrée avant le XIV de la lune pâchale, contre l'intention de l'église. Or les nouvelles lunes moyennes arrivent quelquefois un peu avant la nouvelle lune vraie, sur laquelle les Juifs se régloient : l'église a donc voulu avoir dans son *calendrier* des nouvelles lunes moyennes qui ne pussent jamais devancer les vraies, mais qui les suivissent toujours.

On a donc pris pour racine l'année 550, sous le règne de l'empereur Justinien ; alors les nombres d'or indiquoient les nouvelles lunes environ 16 heures plus tard qu'au tems du concile de Nicée, comme on le voit par les tables astronomiques, & il n'y avoit plus de danger qu'elles pussent être indiquées plutôt que les nouvelles lunes vraies. L'on attribua à l'année 550 & au sixième siècle entier la première ligne de la table générale des épactes, qui est marquée P dans la table étendue

que nous expliquons ici : mais comme au bout de 300 ans, c'est-à-dire l'an 800, il y a une équation lunaire, & que la lune anticipe d'un jour dans le calendrier, les nouvelles lunes arrivant un jour plutôt, c'est le nombre précédent qui indique les nouvelles lunes ; il faut prendre la dernière ligne *a*, dont les épâtes sont plus fortes d'un jour. Après un autre intervalle de 300 ans, c'est-à-dire l'an 1100, il y a encore une équation lunaire ; la lune anticipe encore d'un jour : il faut donc, pour le douzième siècle, remonter d'une ligne, & l'on aura la ligne *b* qui commence par II, XIII, &c. ; de même en 1400, on aura la ligne *c*, qui commence par l'épâte III.

En 1582, l'on retrancha 10 jours de l'année : les nouvelles lunes arrivèrent donc 10 jours plus tard ; ainsi, il faut descendre de dix lignes dans la table générale, & venir à *D* pour 1582 ; je dis que cela s'appelle descendre, parce que de la ligne *c* à la ligne *a*, on descend d'abord de deux lignes ; & si l'on diminue encore l'épâte de l'unité, on trouve les ombres de la première ligne *P* qui est censée descendre encore davantage ; car la table générale des épâtes est comme un cercle dans lequel on recommence dans le même ordre & sans interruption, lorsqu'on l'a parcouru tout entier.

En 1600, il n'y a eu ni équation lunaire, ni équation solaire, puisque la première avait été employée en 1400, & que la seconde ne devait arriver qu'en 1700, 1800 & 1900 ; ainsi, l'on a conservé la ligne *D* qui commence par XXIII.

En 1700, il y a eu une équation solaire, parce qu'on a omis une bissextile, & que l'année a été plus courte d'un jour : les nouvelles lunes ont dû arriver, par cette raison, un jour plus tard ; & pour les indiquer un jour plus tard, il faut avoir l'épâte plus petite d'une unité : ainsi, en 1700, il a fallu descendre d'une ligne dans la table, & prendre la suite des épâtes qui répond à la lettre *C*, & qui commence par XXII. Cela doit arriver ainsi toutes les fois que l'on omet un jour ou qu'on passe une bissextile ; ce que nous appelons équation solaire. Il auroit dû y avoir une équation lunaire en 1700 ; mais elle fut remise à 1800.

Quoique l'équation lunaire eût été employée pour l'année 1400, la lune anticipe d'un jour sur le cycle lunaire, non pas en 300 ans, mais seulement en 312 $\frac{1}{2}$ ans. Ces 12 $\frac{1}{2}$ ans avoient été omis quatre fois depuis l'an 500 ; savoir, en 800, 1100, 1400, 1700 : ainsi, il y avoit 40 ans dont on avoit anticipé l'équation lunaire. D'ailleurs, en partant de l'année 550, c'étoit en 850, 1150, 1450, 1750 qu'on devoit employer l'équation lunaire ; ainsi, ajoutant encore à 1750 les 50 ans dont on étoit resté encore en retard, on trouve qu'en 1800, il faudra employer l'équation lunaire : on regarde ainsi tous les 25 siècles. Cette équation se voit une augmentation dans l'épâte de 180 : mais cette année-là, il y aura un jour interca-

laire omis, de même qu'en 1700 ; & par conséquent on devoit, de même retrancher un de l'ordre des épâtes, & descendre d'une ligne dans la table générale. Ces deux effets se détruiront ; les nouvelles lunes ne monteront ni ne descendront ; elles demeureront aux mêmes jours ; la même ligne *C* dans la table générale servira pour tout le 19^e siècle qui commence en 1800, comme elle avoit servi pour le siècle précédent.

En 1900, on omettra encore un jour intercalaire ; les nouvelles lunes descendront d'un jour ; il faudra descendre à la ligne *B* de la table générale. L'année 2000 ne changera point de ligne, parce qu'il n'y a cette année-là ni intercalaire omise, ni équation lunaire. En 2100, on omet un intercalaire, & l'on emploie l'équation lunaire, parce qu'il y a 300 ans d'écoulés depuis 1800, où l'on a fait la dernière équation ; ainsi, le 21^e siècle, qui commence à 2100, conservera la même lettre *B* que le siècle précédent, & de même que je l'ai remarqué pour l'année 1800.

En 2200, on omettra une intercalaire, & il n'y aura point d'équation lunaire ; ainsi, on descendra à la ligne *A* de la table générale ; & par la même raison, en 2300, on descendra à la ligne *u*.

En 2400, on aura eu 300 ans depuis la dernière équation lunaire de 2100 : il y aura donc une équation lunaire ; mais il n'y aura point d'équation solaire ; ainsi, les nouvelles lunes monteront d'un jour, & on reviendra à la ligne *A*. 2500, équation sol. on descendra à la ligne *u*. 2600, équation sol. on descendra à la ligne *t*. 2700, équation sol. & lun. on conservera la ligne *t*. 2800, aucune équation, on conservera la ligne *t*. Ainsi, dans les principes de Lilius, il est aisé de continuer à l'infini la table de l'équation des épâtes, si l'on a égard à l'intercalaire qu'on doit retrancher trois fois en 400 ans, & à l'équation lunaire qui doit arriver tous les 300 ans, d'abord sept fois de suite, & après cela au bout de 400 ans seulement, à cause des 12 $\frac{1}{2}$ ans & demi qu'on néglige tous les 300 ans, & qui se trouvent avoir produit 100 ans au bout de 8 fois 300 ans ou de 2400 ans : il faut renvoyer alors l'équation lunaire & l'année séculaire qui suivra comme nous l'avons indiqué, lorsque parvenus à 1700 ans nous avons rejoint l'équation lunaire à 1800. Il arrivera donc tousjours que l'équation lunaire sera différée au bout de 2400 ans, à compter de 1800, c'est-à-dire, dans les années 4200, 6800, 9300, 11800, & ainsi de suite, en allant toujours par 2500 ; alors, au lieu d'être employée au bout de 300 ans, elle ne le sera qu'au bout de 400 ans pour cette fois-là : par ce moyen, la lune ne remonte dans le calendrier que de 8 jours en 2500 ans, au lieu qu'elle remonteroit de 8 jours en 2400 ans. On a marqué ces années de retard d'un double caractère *CC* dans la table de l'équation des épâtes qu'on trouvera plus bas, & où l'on voit quelle ligne on doit prendre pour chaque siècle dans la table étendue des épâtes.

M m ij

TABLE ÉTENDUE DES ÉPACTES,

Contenant les trente suites d'Épâctes qui peuvent avoir lieu dans différents siècles, suivant le Calendrier Grégorien. *Article 1575, page 303.*

REMARQUES. Les Nombres d'Or sont dans la première ligne de la Table, en tête de chaque colonne. La 9^e ligne marquée C, est celle qui a lieu depuis 1700 jusqu'à 1900, & qui recommence tous les 19 ans. Par exemple, l'Épacte est XXII en 1769, 1788, 1807 &c.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P *	XI	XXII	III	XIV	XXV	VI	XVII	XXVIII	IX	
N XXIX	IX	XXI	II	XIII	XXIV	V	XVI	XXVII	XVIII	
M XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XV	XXVI	XVII	
H XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XIV	XXV	VI	
G XXVI	VIII	XVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	V	
F XXV	VI	XVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	
E XXIV	V	XVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	
D XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XVIII	XXIX	X	XXI	II	
C XXII	III	XIV	XXV	VI	XVII	XXVIII	IX	XX	I	
B XXI	II	XIII	XXIV	V	XVI	XXVII	VIII	XIX	*	
A XX	I	XII	XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	
u XIX	*	XI	XXII	III	XIV	XXV	VI	XXVII	XXVIII	
t XVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVI	XXVII	
s XVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XXV	XXVI	
r XVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XIV	25	
q XV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	
p XIV	XXV	VI	XXVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	
n XIII	XXIV	V	XXVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	
m XII	XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	X	XXI	
l XI	XXII	III	XIV	XXV	VI	XXVII	XXVIII	IX	XX	
k X	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVI	XXVII	VIII	XIX	
j IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XXV	XXVI	VII	XXVIII	
i VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XIV	XXV	VI	XXVII	
h VII	XXVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVI	
f VI	XXVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XXV	
e V	XXVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XXIV	
d IV	XXV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	X	XXI	II	XXIII	
c III	XXIV	XXV	VI	XXVII	XXVIII	IX	XX	I	XXII	
b II	XXIII	XXIV	V	XXVI	XXVII	IVIII	XXIX	*	XXI	
a I	XXII	XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	X	

TABLE ÉTENDUE DES ÉPACTES,

Contenant les trente suites d'Épactes qui peuvent avoir lieu dans
différens siècles, suivant le Calendrier Grégorien. *Article 1575,*
page 303.

*REMARKES. Les Nombres d'Or sont dans la première ligne de la Table, en tête de
chaque colonne. La 9^e ligne marquée C, est celle qui a lieu depuis 1700 jusqu'à 1900,
& qui recommence tous les 19 ans. Par exemple, l'Épacte est XXII en 1768, 1788,
1807, &c.*

	13	14	15	16	17	18	19	1	2
P	XX	I	XII	XXIII	IV	XV	XXVI	VIII	XIX
N	XIX	*	XI	XXII	III	XIV	XXV	VII	XVIII
M	XVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	VI	XVII
H	XVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	V	XVI
G	XVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	IV	XV
F	XV	XXVI	VII	XVIII	XXIX	X	XXI	III	XIV
E	XIV	25	VI	XVII	XXVIII	IX	XX	II	XIII
D	XIII	XXIV	V	XVI	XXVII	VIII	XIX	I	XII
C	XII	XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XVIII	*	XI
B	XI	XXII	III	XIV	25	VI	XXIX	XXIX	X
A	X	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVIII	XXVIII	IX
u	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XXVII	XXVII	VIII
t	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XIV	XXVI	VII
s	VII	XVIII	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXV	VI
r	VI	XVII	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIV	V
q	V	XVI	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXIII	IV
p	IV	XV	XXVI	VII	XXIII	XXIX	X	XXII	III
n	III	XIV	25	VI	XXII	XXVIII	IX	XXI	II
m	II	XIII	XXIV	V	XXI	XXVII	VIII	XX	I
l	I	XII	XXIII	IV	XXV	XXVI	VII	XXIX	*
k	*	XI	XXII	III	XIV	25	VI	XXVIII	XXIX
i	XXIX	X	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVII	XXVIII
h	XXVIII	IX	XX	I	XII	XXIII	IV	XXVI	XXVII
g	XXVII	VIII	XIX	*	XI	XXII	III	XXV	XXVI
f	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	X	XXI	II	XIV	XXV
e	25	XXIV	XXVI	XXVII	IX	XX	I	XIII	XXIV
d	XXIV	V	XXV	XXVI	VIII	XIX	*	XII	XXIII
c	XXIII	IV	XV	XXVI	VII	XXVIII	XXIX	XI	XXII
b	XXII	III	XIV	25	VI	XXVII	XXVIII	X	XXI
a	XXI	II	XIII	XXIV	V	XXVI	XXVII	IX	XX

TABLE DE L'ÉQUATION DES ÉPACTES.

ANNÉES.	Lignes d'Épactes.	ANNÉES.	Lignes d'Épactes.	ANNÉES.	Lignes d'Épactes.
1582	D	2500	u	3500	p
Bissex. 1600	D	2600	t	3600	p
1700	C	2700	t	3700	p
1800	C	2800	t	3800	n
1900	B	2900	f	3900	n
Bissex. 2000	B	3000	f	4000	n
2100	B	3100	r	4100	m
2200	A	3200	r	4200	l
2300	u	3300	r	4300	l
Bissex. 2400	A	3400	q	4400	l

Il y auroit un changement à faire après l'an 1800 dans les règles précédentes, & un autre au bout de 481 416 ans, mais on les a négligés, on en peut voir le détail dans *Clavius*.

En suivant ces règles, on trouveroit le retour des mêmes lettres & dans le même ordre au bout de 300 mille ans; c'est-là le grand cycle du calendrier, mais comme les données ne comportent pas une si grande précision, nous ne nous arrêterons pas à ce détail.

Quand on a trouvé par la table (étendue des épactes, quelle est celle des 30 lignes que l'on doit employer dans le siècle où l'on se trouve; le nombre d'or qui est à la tête de chaque colonne vous apprend quelle est l'épacte de l'année; ainsi, en 1781 le nombre d'or étant 16, on trouve au-dessous de 16, dans la neuvième ligne marquée C, que l'épacte est XV; en 1786 elle sera * qui veut dire 30 ou zero.

Connoissant l'épacte de l'année, on peut trouver toutes les nouvelles lunes & les jours de la semaine dans le *calendrier perpétuel* des épactes, on *calendrier* de Grégoire X III que l'on trouvera ci-après, ou l'on marque les épactes *, xxix, xxviii, &c. & les lettres A, B, C, D, E, F, G, en commençant par le premier jour de janvier, dans ce *calendrier* tous les jours auxquels répond l'épacte de l'année font ceux des nouvelles lunes de cette année-là, mais il y a trois observations à

faire sur trois articles particuliers de ce *calendrier* perpétuel.

Au lieu du nombre 30, on met une étoile * qui tient lieu de 30 & de zero; en effet, dans les années où il y a une nouvelle lune le premier décembre & le 31, l'épacte qui marque l'âge de la lune quand l'année finit, devroit être 30, parce que la lune a 30 jours quand l'année finit, mais elle devroit être zero si l'on confidoit la nouvelle lune du 31 décembre; ainsi, l'on met un signe ambigu qui tient lieu de l'une & de l'autre, & qui s'applique également à ces deux circonstances.

Dans le *calendrier perpétuel* on a pratiqué six interruptions, où l'on a mis ensemble les épactes XXIV & XXV, sans cela les 12 suites des épactes qui sont de 30 chacune, formeroient 360 jours, au lieu de 354 qu'elles doivent former pour s'accorder avec l'année lunaire qui a 11 jours de moins que l'année solaire. Cette suppression de 6 jours a été répartie sur la seconde trentaine, sur la 4^e, la 6^e, la 8^e, la 10^e & la 12^e; & les jours où elle tombe sont le 5 février, le 5 avril, le 3 juin, le 1 août, le 29 septembre & le 27 novembre. Ces six jours qui, par la disposition précédente, devroient avoir XXV d'épacte, ont tout-à-fait XXV & XXIV. Par-là on gagne un nombre à chaque fois, & il se trouve qu'à la fin de décembre on a gagné 6 jours, qui, ajoutés aux 5 jours qu'il y a de moins dans les 160 jours d'épacte, que dans l'année, font 11 jours, comme cela doit être puisque l'année lunaire n'a que 354 jours.

CALENDRIER PERPÉTUEL DES ÉPACTES,

SUIVANT GRÉGOIRE XIII,

Pour servir à trouver toutes les nouvelles Lunes, les jours de la semaine,
Et les Fêtes mobiles pour une année quelconque.

JANVIER.			FÉVRIER.			MARS.			AVRIL.			MAI.			JUIN.		
J. du M.	Epactes.	Let. dom.															
1	*	A	XXIX		D	*	D	XXIX	G	XXVIII	B	XXVII	E				
2	XXIX	B	XXVIII		E	XXIX	E	XXVIII	A	XXVII	C	XXVI	F				
3	XXVIII	C	XXVII		F	XXVIII	F	XXVI		XXVI	D	XXV, XXIV	G				
4	XXVII	D	25, XXVI		G	XXVII	G	25, XXVI	C	25, XXV	E	XXIII	A				
5	XXVI	E	XXV, XXIV		A	XXVI	A	XXV, XXIV	D	XXIV	F	XXII	B				
6	25, XXV	F	XXIII		B	25, XXV	B	XXIII	E	XXIII	G	XXI	C				
7	XXIV	G	XXII		C	XXIV	C	XXII	F	XXII	A	XX	D				
8	XXIII	A	XXI		D	XXIII	D	XXI	G	XXI	B	XIX	E				
9	XXII	B	XX		E	XXII	E	XX	A	XX	C	XVIII	F				
10	XXI	C	XIX		F	XXI	F	XIX	B	XIX	D	XVII	G				
11	XX	D	XXVIII		G	XX	G	XXVIII	C	XXVIII	E	XVI	A				
12	XIX	E	XVII		A	XIX	A	XVII	D	XVII	F	XV	B				
13	XVIII	F	XVI		B	XVIII	B	XVI	E	XVI	G	XIV	C				
14	XVII	G	XV		C	XVII	C	XV	F	XV	A	XIII	D				
15	XVI	A	XIV		D	XVI	D	XIV	G	XIV	B	XII	E				
16	XV	B	XIII		E	XV	E	XIII	A	XIII	C	XI	F				
17	XIV	C	XII		F	XIV	F	XII	B	XII	D	X	G				
18	XIII	D	XI		G	XIII	G	XI	C	XI	E	IX	A				
19	XII	E	X		A	XII	A	X	D	X	F	VIII	B				
20	XI	F	IX		B	XI	B	IX	E	IX	G	VII	C				
21	X	G	VIII		C	X	C	VIII	F	VIII	A	VI	D				
22	IX	A	VII		D	IX	D	VII	G	VII	B	V	E				
23	VIII	B	VI		E	VIII	E	VI	A	VI	C	IV	F				
24	VII	C	V		F	VII	F	V	B	V	D	III	G				
25	VI	D	IV		G	VI	G	IV	C	IV	E	II	A				
26	V	E	III		A	V	A	III	D	III	F	I	B				
27	IV	F	II		B	IV	B	II	E	II	G	*	C				
28	III	G	I		C	III	C	I	F	I	A	XXIX	D				
29	II	A				II			G	*	B	XXVIII	E				
30	I	B				I			A	XXIX	C	XXVII	F				
31	*	C				*	F		B	XXVIII	D						

CALENDRIER PERPÉTUEL DES ÉPACTES,

SUIVANT GRÉGOIRE XIII,

*Pour servir à trouver toutes les nouvelles Lunes, les Jours de la semaine,
& les Fêtes mobiles pour une année quelconque.*

JUILLET.			A O U T.			SEPTEMBRE.			OCTOBRE.			NOVEMBRE.			DÉCEMB.		
J. de M.	Epactes.	Lett. dom.															
1	XXVI	G	XXV. XXIV	C	XXIII	F	XXII	A	XXI	D	XX	E	XIX	F	XXVIII	G	A
2	25. XXV	A	XXIII	D	XXII	G	XXI	B	XX	E	XIX	F	XVIII	G	XVII	A	B
3	XXIV	B	XXII	E	XXI	A	XX	C	XIX	F	XVIII	G	XVII	A	XVI	B	C
4	XXIII	C	XXI	F	XX	B	XIX	D	XVIII	A	XVII	B	XVI	C	XV	D	E
5	XXII	D	XX	G	XIX	C	XVIII	E	XVII	B	XVI	D	XV	F	XIV	G	A
6	XXI	E	XIX	A	XVIII	D	XVII	F	XVI	C	XV	E	XIV	G	XIII	A	B
7	XX	F	XVIII	B	XVII	E	XVI	A	XV	D	XIV	F	XIII	A	XII	B	C
8	XIX	G	XVII	C	XVI	F	XV	B	XIV	E	XIII	G	XII	B	XI	C	D
9	XVIII	A	XVI	D	XV	G	XIV	C	XIII	F	XII	A	XI	D	X	E	F
10	XVII	B	XV	E	XIV	A	XIII	D	XII	G	XI	B	X	E	IX	F	G
11	XVI	C	XIV	F	XIII	B	XII	E	XI	A	X	C	IX	F	III	G	A
12	XV	D	XIII	G	XII	C	XI	F	X	B	IX	D	III	A	II	A	B
13	XIV	E	XII	A	XI	D	X	G	IX	C	VIII	E	II	B	I	B	C
14	XIII	F	XI	B	X	E	IX	A	VIII	D	VII	F	I	C	XXIX	C	D
15	XII	G	X	C	IX	F	VIII	B	VII	E	VI	G	XXVIII	D	XXVII	D	E
16	XI	A	IX	D	VIII	G	VII	C	VI	F	V	A	XXVII	E	XXVI	E	F
17	X	B	VIII	E	VII	A	VI	D	V	G	IV	B	XXVI	F	XXV	F	G
18	IX	C	VII	F	VI	B	V	E	IV	A	III	C	XXV	G	XXIV	G	A
19	VIII	D	VI	G	V	C	IV	F	III	B	II	D	XXIV	A	XXIII	A	B
20	VII	E	V	A	IV	D	III	G	II	C	I	E	XXIII	B	XXII	B	C
21	VI	F	IV	B	III	E	II	A	I	D	XXII	F	XXII	C	XXI	C	D
22	V	G	III	C	II	F	I	B	XXI	E	XX	G	XXI	D	XX	D	E
23	IV	A	II	D	I	G	*	C	XX	F	XX	A	XX	E	XX	E	F
24	III	B	I	E	*	A	XXIX	D	XX	G	XX	B	XX	F	XX	F	G
25	II	C	*	F	XXIX	B	XXVIII	E	XX	A	XX	C	XX	G	XX	G	A
26	I	D	XXVIII	G	XXVIII	C	XXVII	F	XX	B	XX	D	XX	A	XX	A	B
27	*	E	XXVII	A	XXVII	D	XXVI	G	XX	C	XX	E	XX	B	XX	B	C
28	XXIX	F	XXVI	B	25. XXVI	E	25. XXV	A	XX	D	XX	F	XX	C	XX	C	D
29	XXVIII	G	XXV	C	XXV. XXIV	F	XXIV	B	XX	E	XX	G	XX	D	XX	D	E
30	XXVII	A	25 XXV	D	XXIII	G	XXIII	C	XX	F	XX	A	XX	E	XX	E	F
31	25 XXVI	B	XXIV	E		A	XXII	D	XX	G	XX	B	XX	F	XX	F	G

Les 12 lunaïons de chaque année font alternativement de 30 & de 29 jours; aufli l'on met alternativement 29 épâcles & 29, d'abord les 30 dans le mois de janvier, enfuite 29 feulement, en en réunissant deux au même jour, puis 30 & ainfi de fuite. L'épâcle XXIV dans février & toutes celles qui la fuivent, fe trouve remontée d'un rang au-deffus de fa place naturelle vers le commencement du mois, à caufe des deux épâcles XXV & XXIV qui font réunies au 5 février; ainfi, les lunaïons qui commencent par les 30 épâcles qui précèdent les deux épâcles accumulées au 5 de février; c'est-à-dire, par les épâcles XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 1, II, &c. jufqu'à l'épâcle XXIV incluſivement, contiennent feulement 29 jours; il faut dire la même chofe des lunaïons qui répondent aux 30 épâcles ſemblables, qui précèdent dans cinq autres endroits du *calendrier* la réunion de XXIV & XXV.

Dans les mois qui ont deux épâcles au même jour XXV & XXIV, on pourroit craindre qu'il n'y eût deux nouvelles lunes indiquées au même jour dans l'efpace de 19 ans, favoir, l'une quand l'épâcle de l'année ſeroit XXV, & l'autre quand elle ſeroit XXIV; or il ne peut pas y avoir deux nouvelles lunes dans les 19 ans qui tombent au même jour du mois, puifqu'ils n'y reviennent qu'après les 19 ans révolus. Pour éviter à cet inconvenient dans la difpoſition des épâcles de la table étendue, on a mis 35 en chiffre arabe au lieu de XXV dans toutes les ſuites d'épâcles, ou dans toutes les lignes où les deux nombres 24 & 25 ſe trouvent enſemble & peuvent renſeigner dans l'efpace de 19 ans, ce nombre 25 eſt mis dans le *calendrier* à côté de XXVI, parce que dans ces mêmes lignes d'épâcles les nombres 25 & XXVI ne peuvent pas ſe trouver enſemble dans l'efpace de 19 ans.

Dans les mois qui ont 25 & XXVI d'épâcle au même rang ou au même jour, il ne peut pas arriver non plus que la nouvelle lune ſoit indiquée deux fois au même jour en 19 ans, parce que 25 ne ſe trouve point dans les huit ſuites d'épâcles qui contiennent vingt-cinq & vingt-fix, on n'a mis dans celle-ci que le nombre romain XXV, qui, dans le *calendrier*, eſt à côté de XXIV; mais XXV & XXIV ne font point enſemble dans ces huit ſuites-là; ainſi, l'on a toujours eu ſoin de faire en ſorte que les deux figures qui font enſemble dans le *calendrier* à un même jour, ne fuſſent pas dans une même ſuite d'épâcles; il eſt bien vrai que les mêmes nombres y ſont, mais l'un eſt en chiffres romains & en petites capitales, l'autre en chiffres arabes, & cette différence de forme les diſtingue aſſez; quelquefois on met le 25 en rouge comme dans les bréviaires ou dans les livres imprimés en deux couleurs.

Toutes les ſois que dans les cycles de 19 ans, l'épâcle XXV concourt avec un nombre d'or plus grand que onze, c'est-à-dire, avec les nombres d'or, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il y a

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

a toujours dans ce même cycle une épâcle XXIV, mais ſi pour lors on prend l'épâcle 25 qui eſt d'un caractère ou d'une couleur différente, qui dans ſix endroits du *calendrier* eſt placée à côté de l'épâcle XXVI, il ne pourra jamais y avoir deux nouvelles lunes au même jour, parce que cette épâcle 25, marquée d'un caractère & d'une autre couleur, répond par-tout à un jour différent de celui qui a l'épâcle XXIV.

Mais lorfque dans un cycle de 19 ans, l'épâcle XXV ſe rencontre avec un nombre d'or plus petit que 12, on avec les nombres d'or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11, il ne peut pas arriver que dans le même cycle l'épâcle XXIV ſe trouve employée avec l'épâcle XXV, pour lors on prend l'épâcle XXV qui, dans ſix endroits, eſt marquée au même jour que l'épâcle XXIV, & puifque l'épâcle XXIV n'aura pas lieu dans ce cycle-là, on ne risque point de trouver dans le même cycle deux nouvelles lunes au même jour.

De même, quoique l'épâcle 25 qui eſt différente en caractère ou en couleur, ſe trouve dans ſix jours de l'année à côté de l'épâcle XXVI, on ne craindra pas cependant de trouver deux nouvelles lunes au même jour dans les 19 ans, parce que quand l'épâcle XXV ſe trouve avec un nombre d'or plus grand que 11, (& ce ſont les ſeuils cas où l'on ſe ſerve du caractère 25,) l'épâcle XXVI n'a jamais lieu dans le même cycle pour indiquer les nouvelles lunes.

En eſſet, dans la table éternelle des épâcles, on voit aux 8 lignes marquées N, E, B, r, n, k, e, b, qui chacune répondent à un cycle lunaire entier de 19 ans, l'épâcle 25 diſtinguée par les chiffres arabes ſous les 8 nombres d'or, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, l'épâcle XXIV ſous les onze autres & jamais l'épâcle XXVI; mais dans les 22 autres lignes horizontales de la table, où l'épâcle XXV ſe trouve ſous les 11 petits nombres d'or depuis 1 jufqu'à 12, on trouve quelquefois l'épâcle XXVI, mais on n'y trouve pas XXIV. Si donc on prend tantôt l'épâcle XXV qui eſt dans le *calendrier* à côté de XXIV, & tantôt l'épâcle 25 qui eſt d'un autre caractère ou d'une autre couleur, & placée dans le *calendrier* à côté de XXVI, ayant égard aux nombres d'or petits ou grands avec leſquels elle concourt; il n'arrivera jamais que, dans le même cycle de 19 ans, il y ait deux nouvelles lunes au même quatrième du mois, quoique dans les ſix endroits ci-deſſus marqués, il y ait au même jour XXV avec XXIV, & XXVI avec l'épâcle 25 d'un caractère différent.

Ainſi l'épâcle XXIV ne peut pas avoir lieu quand l'épâcle XXV concourt avec un des onze premiers nombres d'or, mais ſeulement quand-elle concourt avec un nombre d'or plus grand que 11, & l'épâcle XXVI n'a jamais lieu lorfque l'épâcle 25 de caractère différent concourt avec un nombre d'or plus grand que 11.

Na

Cette épacte 25 relevée d'un jour, fait que la 2^e lune de l'année a 29 jours & non pas 30, & répond mieux au moyen mouvement de la lune que l'épacte XXV qui est un peu en retard.

On a choisi les épactes XXV & XXIV pour les accumuler ensemble, quoiqu'on eût pu choisir d'autres épactes quelconques; mais c'étoit à-peu-près vers ces mêmes jours que l'on employoit l'équation de la lune dans l'ancien *calendrier* des nombres d'or du Concile de Nicée, & l'on a cherché à s'en rapprocher le plus qu'il étoit possible dans la disposition du nouveau *calendrier*.

Ces nombres XXV & XXIV que l'on met ensemble, ont même été choisis d'ailleurs avec dessein, pour faire en sorte que presque toutes les lunaisons pasciales fussent de 29 jours, comme le voulaient les pères du concile de Nicée, & qu'elles commençassent toujours entre le 8 de mars & le 5 avril. Il n'y a dans le nouveau *calendrier* que deux exceptions à la première règle, c'est lorsqu'on a pour épacte 25 ou XXIV, & que 25 concourt avec un nombre d'or plus grand que 11, ce qui arrive bien rarement; il n'y a que ces deux lunes pasciales qui soient de 30 jours. Lorsque les PP. de Nicée assignèrent un espace de 29 jours pour les nouvelles lunes pasciales, depuis le 8 de mars jusqu'au 5 avril, il étoit facile d'y arranger 19 nombres d'or, de façon que tous donnaient des lunaisons de 29 jours; mais comme il y a 30 épactes; on ne sauroit les arranger toutes dans 29 jours, à moins qu'on n'en mette deux à-la-fois au même jour, comme cela arrive au 5 avril, c'est ce qui fait que la lunaison de l'épacte XXIV a 30 jours, & par conséquent aussi celle de l'épacte 25, placée au-dessus de XXIV. (Clavius, page 103.)

L'équation de la lune se place au 5 avril par une raison semblable pour se rapprocher de l'ancien usage de l'église, mais il seroit trop long d'entrer ici dans ces détails.

Le troisième artifice employé dans la disposition des épactes du *calendrier perpétuel*, consiste à avoir mis à la fin de décembre à côté de l'épacte XX, une épacte extraordinaire 19, qui est aussi différente ou par le caractère ou par la couleur. Celle-ci sert uniquement à marquer la nouvelle lune le dernier de décembre, lorsque l'épacte XIX concourt avec les nombres d'or 19, ce qui n'arrivera plus jusqu'après l'an 8200, & lorsque de 30 cycles de la table étendue, celui qui a la lettre D, sera en usage comme il l'a été depuis la correction grégorienne jusqu'à l'année 1700 exclusivement, c'est dans cette ligne D seulement que l'épacte XIX se trouve sous le nombre d'or 19; l'épacte 19 placée au 31 de décembre, doit alors indiquer une nouvelle lune comme cela est arrivé en 1595, 1614, 1633, 1652, 1671, 1690; en effet, dès que le nombre d'or est 19, on doit ajouter 12 à l'épacte de l'année pour former celle de l'année suivante, au lieu qu'on n'ajouteroit que 11 dans les autres cas. Ainsi, à l'épacte XIX

lorsqu'elle a lieu avec le nombre d'or 19, il faut ajouter 12 & l'on a 1 d'épacte pour l'année suivante, mais l'usage de l'épacte 1 ne se trouve dans le *calendrier* qu'au 30 de janvier; donc si l'épacte 19 n'étoit pas placée dans le *calendrier* au 31 de décembre pour indiquer une nouvelle lune, la lunaison de décembre ne contenant alors que 29 jours, il n'y auroit point de lunaison indiquée dans le *calendrier* depuis le 2 décembre jusqu'au 29 de janvier, car, dans le mois de décembre, il n'y a pas d'autre épacte XIX que celle du 2 de décembre, & dans le mois de janvier il n'y a pas d'épacte 1 avant le 30. Cependant il y a dans le cas dont il s'agit une lune de 29 jours qui commence le 2 décembre; le calcul prouve même qu'il y a en effet une nouvelle lune moyenne ce jour-là, quand le nombre d'or 19 concourt avec l'épacte XIX. (Clavius, page 104.)

Mais l'exception dont il s'agit, ou l'addition de l'épacte 19, extraordinairement cumulée avec l'épacte XX au 31 décembre, ne fait dans le *calendrier* aucune confusion, parce qu'elle est à côté de l'épacte XX qui n'a jamais lieu dans le cycle où l'épacte XIX concourt avec le nombre d'or 19: en effet, on peut voir dans la table étendue des épactes, que la ligne D qui a lieu dans le cas prévu ne renferme pas l'épacte XX. Ce nombre ne se trouve point dans les 19 épactes de ce cycle, il ne peut donc pas y avoir double emploi, ni deux nouvelles lunes indiquées au même jour dans l'espace de 19 ans, quoiqu'il y ait deux épactes au même jour, c'est-à-dire 19 & XX.

Les épactes ne peuvent indiquer que les nouvelles lunes moyennes, c'est-à-dire, les nouvelles lunes qui auroient lieu, si la lune & le soleil alloient toujours d'un mouvement uniforme, & que leur longitude moyenne fût toujours égale à leur longitude vraie. Ce seroit assez pour l'usage du *calendrier* civil; car l'on est toujours sûr de ne pas se tromper de plus d'un jour même en se restreignant aux moyens mouvements; mais nous devons observer encore, que non-seulement les nouvelles lunes désignées dans le *calendrier* par les épactes ne sont point les nouvelles lunes astronomiques vraies qu'on observe & qu'on trouve dans nos sphériques, mais elles ne sont pas même exactement d'accord avec les nouvelles lunes moyennes. Il y a souvent des différences qui deviennent sensibles; par exemple, en 1700 la pleine lune moyenne arriva le samedi, 3 avril, vers les 11^h du soir à Rome; Pâque devoit donc se célébrer le lendemain, suivant la règle; mais dans le *calendrier* la pleine lune étoit indiquée pour le 4 avril, la fête se trouva renvoyée au 11 du même mois. (Voyez l'Hist. de l'Acad. 1701.) Lors de la correction grégorienne on voulut remettre les nouvelles lunes aux mêmes lieux où elles étoient du tems du concile de Nicée, par le moyen du cycle des 19 ans. Mais comme en 625 ans le cycle ramena la nouvelle lune deux jours plutôt, il y avoit alors quatre jours de différence entre

les nouvelles lunes astronomiques & celles du cycle. Dans l'exécution, on n'a tenu compte que de 3 jours au lieu de 4; de-là vient que la pleine lune astronomique moyenne vient souvent un jour avant la pleine lune pascalale, & que le *calendrier* n'a point à cet égard la justesse qu'on avoit eu intention de lui donner; de-là vient aussi la contradiction apparente que l'on trouvera quelquefois entre les calculs rigoureux de l'Astronomie, & les calculs du comput ecclésiastique.

Ainsi, dans l'exécution du projet de la réformation, l'on n'a pas exactement suivi l'intention de la bulle de Grégoire XIII; il auroit dû y avoir une équation lunaire en 1700. Depuis 1700, l'épacte répondant au nombre d'or 1, auroit dû être 1, au lieu qu'on ne lui attribue que 0 ou *, en sorte qu'on n'a augmenté que de 3 jours les épactes lunaires, depuis le concile jusqu'à présent, au lieu de 4 jours. Cette erreur d'un jour a fait tomber la fête de Pâque, en 1704, au 23 mars, au lieu qu'elle auroit dû être le 20 avril, parce que la pleine lune dans cette année-là, devoit être marquée au 20 mars, & qu'elle ne le fut qu'au 21: or le 20 mars n'est point du mois pascal, mais le 21 en est. (*Hist. Acad. 1701.*) (J. Bernoulli *opera*, Lausanne, 1743, tom. iv.) La raison de ce défaut, est que l'objet des réformateurs étoit de demeurer plutôt au-dessous qu'au-dessus des véritables nouvelles lunes, pour empêcher que les épactes n'indiquassent la nouvelle lune plutôt qu'elle n'arrive réellement; & que la fête de Pâque ne fût célébrée le XIV^e de la lune, ou même plutôt, c'est-à-dire, en même temps que chez les juifs ou chez les hérétiques, *quarto decimans* (Fleury, *Hist. ecclési.* ann. 196.) Pour cet effet, on a eu plus d'égard à la pleine lune qu'à la nouvelle lune; on n'a pas craint qu'il arrivât que la fête de Pâque fût célébrée plus tard que le XXI^e de la lune; mais on redoutoit la célébration qui auroit pu tomber le XIV^e de la lune, quand il se trouve un dimanche, parce que c'est le jour que choisissent les juifs pour immoler l'agneau pascal.

Cette remarque avoit déjà été faite par Clavius, qui observe que c'étoit l'ancien usage de l'église, pag. 55 & 322. Cela auroit dû prévenir le reproche astronomique fait par Cassini au *calendrier* grégorien, si ce n'est que Cassini ne trouva pas cette raison suffisante pour avoir fait mettre entre le *calendrier* & l'Astronomie une semblable différence. Elle nuit à l'exactitude du *calendrier*, relativement à l'usage qu'en on peut faire pour trouver les nouvelles lunes véritables.

Pour trouver l'épacte & les fêtes mobiles dans une année quelconque, on commencera par chercher le nombre d'or. Ce nombre, pris au haut de la table étendue des épactes, marquera la colonne dans laquelle doit se trouver l'épacte.

Pour savoir dans quelle ligne de la table, & vis-à-vis de quelle lettre il faut chercher l'épacte,

on prendra dans la table de l'équation des épactes, la lettre qui convient au siècle où l'on se trouve, & ce sera dans cette ligne qu'il faudra prendre l'épacte répondante au nombre d'or.

Pour avoir une règle particulière dans ce siècle-ci & le suivant, où l'on emploie la ligne C, on part de l'épacte XVIII, qui a lieu la dernière année de chaque cycle lunaire, on ajoute 11 pour chaque année & un de plus, parce que la première année du cycle l'épacte augmente de 11, & l'on ôte 30 autant de fois qu'on le peut. Ainsi, on multipliera par 11 le nombre d'or de l'année courante; on ajoutera 19; on divisera cette somme par 30, & l'on aura pour reste l'épacte de l'année. On peut aussi multiplier par 11 le nombre d'or diminué d'une unité, & diviser le produit par 30: le reste de la division est l'épacte cherché.

Ainsi, pour avoir l'épacte de 1762, on multiplie le nombre d'or 19 par 11 on a 209; on y ajoute 19, ce qui fait 228; l'on divise cette somme par 30; le quotient est 6, mais il reste 4, qui forme l'épacte cherché. On peut la trouver encore autrement; on multiplie par 11 le nombre 62 de l'année; on ajoute 9 au produit (c'est l'épacte de 1700); & de plus, autant d'unités que le nombre d'or 1 est revenu de fois depuis 1700; ce qui est arrivé en 1710, 1729 & 1748, parce que dans ces années-là l'augmentation est plus forte d'une unité; la somme 694 étant divisée par 30, le quotient est 23, & le reste 4 est l'épacte de 1762: cette règle ne sert que pour le XVIII^e siècle.

L'épacte de l'année indique tous les jours de pleine lune dans le *calendrier* perpétuel: ainsi, pour avoir la nouvelle lune pascalale, qui ne peut arriver qu'après le 7 de mars, il faut voir à quel jour répond l'épacte de l'année, à compter du 8 de mars inclusivement, & ce sera celui de la nouvelle lune pascalale; le quatorzième jour, à compter de la nouvelle lune inclusivement, sera le jour de la pleine lune pascalale, & le premier dimanche après cette pleine lune exclusivement, c'est-à-dire, le premier jour où l'on trouvera la lettre dominicale de l'année, sera le jour de Pâque.

Les limites pascalales, sont le 22 mars, le 25 avril; ainsi, en 1598, 1693 & 1761, la fête de Pâque est arrivée le 22 mars; elle s'y trouvera encore en 1818, 2285, 2437, 2505, &c. Au contraire, cette fête n'est tombée qu'au 25 avril; en 1546, en 1666 & en 1714; & cela arrivera encore en 1836, 1943, 2038, 2190, &c.

La septuagésime est toujours neuf semaines avant Pâque, ou le 64^e jour, y compris celui de Pâque; le mercredi des cendres le 47^e avant le jour de Pâque, en comptant l'un & l'autre.

On trouve la fête de l'Ascension, en comptant 40 jours après Pâque; la Pentecôte, en comptant 50; la Trinité 57 jours; & la fête Dieu 61 jours après Pâque; celle-ci arrive toujours le même quatrième du mois que le samedi saint.

N n ij

Le *calendrier réformé ou corrigé*, est celui où sans s'embarrasser de tout l'appareil des nombres d'or, des épactes, des lettres dominicales, on détermine la pleine lune de Pâque & les fêtes mobiles qui en dépendent, par les calculs astronomiques, suivant les tables du soleil & de la lune, appelées *tables rudolphines*, ou *tables de Kepler*.

Ce *calendrier* fut introduit dans les états protestans d'Allemagne en 1700; l'on retrancha tout d'un-coup onze jours du mois de février, de manière qu'en 1700, février n'eut que dix-huit jours; par ce moyen, le style corrigé revint à celui du *calendrier* grégorien. Les protestans d'Allemagne ont ainsi reçu, du moins pour un certain tems, la forme de l'année grégorienne, jusqu'à ce que la quantité réelle de l'année tropique étant déterminée par observation d'une manière encore plus exacte, les catholiques romains puissent convenir avec eux d'une forme d'année exacte & commode.

CALENDRIER perpétuel. On appelle ainsi une suite de *calendriers* relatifs aux différents jours où la fête de Pâque peut tomber; & comme cette fête n'arrive jamais plus tard que le 25 avril, ni plus tôt que le 22 mars, le *calendrier perpétuel* est composé d'autant de *calendriers* particuliers qu'il y a de jours depuis le 22 mars inclusivement, jusqu'au 25 avril inclusivement; ce qui fait 35 *calendriers*.

On trouve un *calendrier perpétuel* fort utile & fort bien entendu, dans l'excellent ouvrage de l'art de *vérifier les dates*, par des Bénédictins de la congrégation de S. Maur, Dom Clement & Dom Durand.

La seconde édition, en 1770, a été donnée par Dom Clement, & la troisième en 1783; dans celles-ci, il a trouvé le moyen de réduire les 35 *calendriers* à sept.

CALENDRIER ou almanach, est une table des 12 mois ou des 365 jours de l'année. L'on y marque les jours de la semaine, les fêtes mobiles ou fixes, les noms des saints, dont on fait l'office à chaque jour dans l'église; il y en a une table dans le martyrologe romain, & une dans le livre que nous venons de citer.

On y met le lever & le coucher du soleil & de la lune, & les phases de la lune, l'entrée du soleil dans les signes des équinoxes & des solstices, & les éclipses.

Quelquefois on y ajoute les longitudes, latitudes & déclinaisons du soleil, de la lune & des autres planètes; le commencement & la fin du crépuscule, les phénomènes remarquables qui arrivent dans le ciel, comme conjonctions, oppositions, éclipses d'étoiles ou de satellites. Voyez **ÉPHÉMÉRIDE**, **CONNAISSANCE DES TEMS**.

CALENDRIER russe, est le nom qu'on donne à un *calendrier* propre pour les gens de la cam-

pagne, dans lequel ils apprennent les tems où il faut semer, planter, tailler la vigne, &c. Ces sortes de *calendriers* sont ordinairement remplis de beaucoup de règles fausses & de prédictions hasardées sur la pluie & les saisons fondées sur les influences prétendues, & sur les aspects de la lune & de planètes. Mais les gens instruits distinguent avec soin les règles qui sont fondées sur des expériences exactes & répétées, d'après celles qui ne sont fondées que sur le préjugé & l'ignorance. (D. L.)

On se sert aussi du mot *calendrier* pour désigner le catalogue ou les listes que l'on gardoit anciennement dans chaque église, & où étoient les saints que l'on y honoroit en général ou en particulier, avec les évêques de cette église, les martyrs, &c.

Il ne faut pas confondre les *calendriers* avec les martyrologes; car chaque église avoit son *calendrier* particulier, au lieu que les martyrologes regardent toute l'église en général: ils contiennent les martyrs & les confesseurs de toutes les églises. De tous les différents *calendriers*, on en a formé un seul martyrologe, en sorte que les martyrologes sont postérieurs aux *calendriers*.

Il y a encore quelques-uns de ces *calendriers* qui existent, particulièrement un de l'église de Rome fort ancien, qui fut fait vers le milieu du quatrième siècle; il contenoit les fêtes des papes comme celles des chrétiens: ces derniers étoient alors en assez petit nombre. Le père Mabillon a fait imprimer aussi le *calendrier* de l'église de Carthage, qui fut fait vers l'an 483. Le *calendrier* de l'église d'Ethiopie, & celui des Coptes, publiés par Ludolphe, paroissent avoir été faits après l'année 760. Le *calendrier* des syriens, imprimé par Genesbrard, est fort imparfait; celui des mofcovites, publié par le père Papbrock, convient pour la plus grande partie avec celui des grecs, publié par Genesbrard. Le *calendrier* mis au jour par Dom Dachy, sous le titre d'*année solaire*, ne diffère en rien du *calendrier* de l'église d'Arras. Le *calendrier* que Beckius publia à Augsbourg en 1687, est, selon toute apparence, celui de l'ancienne église d'Augsbourg, ou plutôt de Strasbourg, qui fut écrit vers la fin du dixième siècle. Le *calendrier mosarabique*, dont on fait encore usage dans les cinq églises de Tolède; le *calendrier ambrosien* de Milan, & ceux d'Angleterre, avant la réformation, ne contiennent rien que l'on ne trouve dans ceux des autres églises occidentales, c'est-à-dire, les saints que l'on honore dans toutes ces églises en général, & les saints particuliers aux églises qui faisoient usage de ces *calendriers*. (CHAMBERS.)

CALER un quart de cercle (Astron.), c'est mettre son plan dans une situation exactement verticale par le moyen du fil à-plomb qui doit passer le limbe, sans appuyer, & sans être trop en l'air, & qui doit battre légèrement sur le milieu du

point de la division, auquel on veut qu'il réponde. C'est ordinairement par le moyen des vis du pied, que l'on *cale un quart de cercle*, & pour que ce mouvement ne le fasse pas chancier, on fait porter chacune des quatre vis sur une cognelle dont la surface inférieure a des aspérités qui se gripent sur le pavé. Quelquefois aussi l'on se sert du niveau à bulle d'air pour *caler les quarts de cercles*, tels sont ceux qu'à fait longtemps le célèbre Birk in Angleterre, dans lesquels la joncture tornde autour du centre, le fil vertical restant toujours sur le premier point de la division; mais la chalcure du soleil faisant varier le niveau, peut occasionner des erreurs. (D. L.)

CALIPPIQUE, nom d'une période de 76 ans, propre à corriger l'erreur du cycle lunaire.

CALISTO (*Astr.*) Voyez OURSE.

CAMELEON ou CHAMELEON (*Astron.*), l'une des douze constellations méridionales, figurées dans les anciennes cartes de Bayer; elle est sur le colure des équinoxes & au-dessus du cercle polaire antarctique; elle n'est composée que de neuf étoiles dans Bayer; mais il y en a un beaucoup plus grand nombre dans le catalogue de la Caille; celle qu'il a marquée α , & qu'il a observée avec soin, avoit au commencement de 1750, 126° 8' 38" d'ascension droite, & 76° 7' 12" de déclinaison australe. (D. L.)

CAMELEOPARD (*Astron.*) Voy. GIRAFFE.

CAMMARUS (*Astron.*) Voyez CANCER.

C A N

CANCER, *écrevisse*; quatrième signe du zodiaque: c'est aussi le nom d'une constellation.

Le *cancer* a été appelé *cammarus*, qui en grec signifie écrevisse; *astacus* du mot grec *astax*, (*cancer marinus*). Il paroît que ce nom est venu de ce que le soleil arrivé à sa plus grande déclinaison, sembloit retourner sur ses pas quand il étoit dans ce signe. Suivant les poëtes, l'écrevisse fut placée dans le ciel par Jupiter, pour aviner ses amours, en retardant par sa piquette la suite d'une nymphe, fille de Garamanthé. Ampelius dit que cette écrevisse fut placée dans le ciel par Junon, après qu'elle eut été écartée par Hercule en voulant l'incommoder dans le combat contre l'hydre de lerne. On fait que Junon, toujours ennemie d'Hercule, poursuivoit par-tout ce héros, & suscitoit des obstacles à toutes ses entreprises.

M. Dupuis a expliqué ingénieusement cette fable, en faisant voir que le lever héliaque des premières étoiles de l'hydre étoit accompagné de celui du *cancer*, avant que la queue de l'hydre eût achevé de disparaître, ou avant que le second travail d'Hercule fût consommé. Mais le travail

d'Hercule, qui répond à la constellation du *cancer*, est son voyage en Hesperie pour enlever des pommes d'or ou des brebis à toison d'or; il s'explique par le coucher de la constellation d'Hercule.

Les deux ânes, qui sont deux étoiles de la constellation du *cancer*, marquées γ & δ dans nos catalogues, représentent, suivant les poëtes, ceux qui, dans la guerre de Jupiter contre les géans, contribuèrent à sa victoire, ou par leurs cris, ou parce qu'ils servoient de monture à Vulcain, & aux satyres qui venoient au secours de Jupiter. On voit entre ces deux étoiles un amas d'étoiles appelé *l'étable*, *prafpe*, à cause des deux ânes, qui en sont tout proches: c'est ce que nous appelons la *nébuleuse du cancer*; mais ce n'est pas une véritable nébuleuse dans le sens qu'on y attache aujourd'hui.

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de 83 dans le catalogue britannique; mais elles font peu remarquables: la plus belle marquée β , n'est que de 3^e à 4^e grandeur.

On représente le *cancer* par deux figures placées l'une auprès de l'autre, & assez semblables à celles dont on se sert pour exprimer soixante-neuf en Arithmétique 69.

Tropique du cancer, est un des petits cercles de la sphère, parallèle à l'équateur, & qui passe par le commencement du signe du *cancer*. Ce tropique est dans l'hémisphère septentrional, & est éloigné de l'équateur de 23° 28': c'est celui que le soleil paroît décrire le jour du solstice d'été.

CANICULAIRES: *jours caniculaires*, marquent proprement un certain nombre de jours qui précèdent, & qui suivent celui où la canicule se leve; autrefois le matin avec le soleil, c'est-à-dire, les jours de la plus grande chaleur. Les égyptiens & les éthiopiens commencent leur année aux *jours caniculaires*. Dans nos almanachs de provinces, on les compte ordinairement depuis le 22 juillet jusqu'au 23 août: c'est le tems que le soleil emploie à parcourir le signe du lion.

Mais il y en a qui comptent les *jours caniculaires* jusqu'à la fin d'août. Varenus, *pag. 275*, édit. 1712.

CANICULE, *s. f.* (*Astron.*) c'est le nom de la belle étoile du grand chien, qu'on appelle aussi simplement *l'étoile du chien*; les grecs la nommoient *enue*, *siurus*. Voyez SIKRUS.

Pline & Galien donnent aussi à la *canicule* le nom de *procyon*, quoiqu'un effet *procyon* soit le nom d'une autre étoile dans le petit chien. Voyez PROCYON.

Quelques auteurs anciens nous disent, après Hippocrate & Pline, *lib. 2, c. 40*, que le jour où la canicule se leve la mer bouillonne, le vin tourne, les chiens entrent en rage, la bile s'augmente & s'irrite, & tous les animaux tombent en langueur & dans l'abattement; que les maladies

qu'elle cause le plus ordinairement sont les fièvres ardentes, & continues, les dysenteries & les phrénésies. On sent bien que ce sont les effets de la chaleur, qu'on attribuoit à l'astre qui annonçoit les chaleurs.

C'est actuellement le 20 août qu'arrive le lever héliaque de sirius, & cependant alors ce qu'on appelle les jours *caniculaires*, sont près de finir.

Les romains étoient si persuadés de la malignité de la *canicule*, que pour en écarter les influences ils lui sacrifioient tous les ans un chien roux; le chien avoit en la préférence dans le choix des victimes, à cause de la conformité des noms. Ce n'est pas la seule occasion où cette conformité ait donné naissance à des branches de superstition; la *canicule* passoit ou pour la chienne d'Erigone, ou pour le chien que Jupiter donna à Minos, que Minos donna à Procris, & que Procris donna à Céphale.

CANON, en Géométrie & en Algèbre, signifie une règle générale pour la solution de plusieurs questions d'un même genre; ce mot est aujourd'hui peu usité. On se sert plus communément des termes *méthode* & *formule*. Voyez MÉTHODE & FORMULE.

CANON *naturel des triangles*; c'est une table qui contient tout ensemble les sinus, les tangentes & les sécantes des angles; on la nomme de la sorte, parce qu'elle sert principalement à la résolution des triangles. Voyez TRIANGLE.

CANON *artificiel des triangles*; c'est une table où se trouvent les logarithmes des sinus & des tangentes, &c. Voyez SINUS, TANGENTE, LOGARITHME.

CANOPUS (Astron.) étoile de la première grandeur, située dans l'hémisphère austral, à l'extrémité la plus australe de la constellation appelée *argos*, ou le navire. On l'appelle aussi *canobus*, *canopus*, *Ptolemaeon*, *Suel* (Bayet); mais, Plin. dit *canopus*. Ce nom est celui du pilote de Mécidas, roi de Troie. Selon M. Caillard, il vient du mot *canis*, qui en langue copte signifie de l'or, & le copte désire du grec.

C'est, après sirius, la plus belle étoile du ciel; on la voit de l'île de Rhodes rassembler l'horizon; elle annonçoit aux égyptiens l'entrée du soleil dans le verseau; de-là vint ce qu'on appelloit *Regnum canopicum*. Voyez mon *Astronomie*, t. 4, p. 443. (D. L.)

C A P

CAPABLE, (Géom.) on dit qu'un segment de cercle est capable d'un angle, lorsque ce segment est tel qu'on y peut inscrire cet angle; en sorte que les deux côtés de l'angle se terminent aux extrémités du segment, & que le sommet de l'angle soit sur la circonférence du segment. On fait que tous les angles inscrits dans un même segment sont égaux; ainsi, le segment *EFD* (pl. Géom.

C A R

fig. 21), est capable de l'angle *EFD*, ou de son égal *EHD*. On a plusieurs méthodes pour décrire un segment capable d'un angle donné; en voici une assez simple. Faites un triangle isocèle, dont l'angle au sommet *EFD* soit égal à l'angle donné; ou, ce qui est la même chose, faites les angles *FED*, *FDE*, égaux chacun à la moitié de 180 degrés moins la moitié de l'angle donné; & par les points *F*, *D*, décrivez l'arc de cercle *EFD*. Voyez CERCLE. (O)

CAPOT, terme de jeu de Piquet. On dit de celui qui ne fait aucune levée ou main, qu'il est capot.

Le capot vaut quarante points. Voyez PIQUET. Celui qui gagne seulement les cartes, n'en compte que dix.

CAPRICORNE (Astron.) caper, dixième signe du zodiaque; on l'appelle aussi le bouc, la chèvre amalthée, le signe de l'hiver, la porte du soleil; car on regardoit les deux tropiques comme les deux portes du ciel. Par l'une, le soleil montoit dans les régions supérieures; par l'autre, il redescendoit à la région la plus basse du ciel. Quelques poètes disent que cette constellation représente la chèvre amalthée, dont le lait servoit aux nymphes qui prirent soin de Jupiter sur le mont Ida, & que Jupiter par reconnaissance plaça ensuite parmi les astres; mais c'est une confusion; la chèvre amalthée est celle qui est entre le bras du cocher. V. CHERÈRE. D'autres expliquent la forme bizarre du capricorne, qui est moitié bouc & moitié poisson, en forme d'équipage, par le moyen d'une autre fable. Les dieux étant à table dans un endroit de l'Egypte, Typhon, le plus terrible des géans, parut subitement, & causa une si grande frayeur, que tous les dieux cherchèrent leur sûreté dans la fuite, & se changèrent en différentes formes. Pan, le dieu des chasseurs, des pasteurs & de toute la nature, se plongea dans le Nil jusqu'à moitié du corps; prit la forme d'un poisson par derrière, & celle d'une chèvre par sa partie antérieure, & Jupiter voulut conserver la mémoire de cet événement, en plaçant dans le ciel cet animal monstrueux; ces origines sont si absurdes, qu'on ose à peine les rapporter. Mais M. Dupuis fait voir que ce signe indiquoit l'élevation du soleil après la saison des pluies; il croit que dans l'origine le capricorne fut placé au solstice d'été; on y réunissoit autrefois un capricorne & un poisson, parce que le débordement du Nil commençoit sous ce signe, & les indiens l'appellent encore poisson. Astron. t. iv, p. 363.

Il y a 51 étoiles du capricorne dans le catalogue britannique; mais il y en a beaucoup plus dans ceux de Mayer & la Caille. (D. L.)

C A R

CARACTÈRE, f. m. signe dont on se sert dans les Mathématiques pour abréger le discours & pour simplifier les calculs.

Les *caractères numériques* sont ceux qu'on emploie pour exprimer les nombres; ce sont des *lettres* ou des *figures*, que l'on appelle autrement *chiffres*. Les espèces de *caractères* qui sont principalement en usage aujourd'hui, sont le commun & le romain; on peut y joindre le grec, & un autre nommé le *caractère françois*, ainsi que les lettres des autres alphabets, dont on s'est servi pour exprimer les nombres.

Le *caractère commun* est celui que l'on appelle ordinairement le *caractère arabe*, parce que l'on suppose qu'il a été inventé par les astronomes arabes, quoique les Arabes eux-mêmes l'appellent le *caractère indien*, comme s'ils l'avoient emprunté des peuples de l'Inde.

Il y a dix *caractères arabes*; savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dont le dernier s'appelle en latin *cyphra*. En France, on donne en général le nom de *chiffre* à tout *caractère* qui sert à exprimer les nombres.

On se sert du *caractère arabe* presque dans toute l'Europe, & presque dans toutes les circonstances où il peut avoir lieu, en fait de commerce, de mesure, de calculs astronomiques, &c.

Le *caractère romain* est composé de lettres majuscules de l'alphabet romain, d'où probablement il est venu son nom; on peut-être de ce que les anciens Romains en faisoient usage sur leurs monnoies, & dans les inscriptions de leurs monuments publics, érigés en l'honneur de leurs divinités & de leurs hommes illustres, de même que sur leurs tombeaux, &c.

Les lettres numériques qui composent le *caractère romain*, sont au nombre du sept; savoir, I, V, X, L, C, D, M.

Le *caractère I* signifie un; V, cinq; X, dix; L, cinquante; C, un cent; D, cinq cents; & M, un mille.

Le I, répété deux fois, fait deux, II; trois fois, trois, III; quatre s'exprime ainsi, IV. I, mis devant V ou X, retranche une unité du nombre exprimé par chacune de ces lettres.

Pour exprimer six, on ajoute I à V, VI; pour sept, on y en ajoute deux, VII; & pour huit, trois, VIII; on exprime neuf, en mettant I devant X, IX, conformément à la remarque précédente.

On peut faire la même remarque par rapport à X devant L ou C; ce X indique alors qu'il faut retrancher dix unités du nombre suivant: ainsi, XL signifie quarante, & XC, quatre-vingt-dix; une L suivie d'un X, signifie soixante LX, &c. On a des exemples quelquefois quatre cents par CD, mais cela est rare.

Outre la lettre D, qui exprime cinq cent, on peut encore exprimer ce nombre par un I devant un C renversé de cette manière IC; de même au lieu de M, qui signifie un mille, on se sert quelquefois de I entre deux C, l'un droit & l'autre renversé en cette sorte CIC: suivant cette con-

vention, on peut exprimer six cent par IC, & sept cent par IC, &c.

L'addition de C & C devant & après, augmente IC en raison décuple; ainsi, CCIC signifie 1000; CCCIC, 10000, &c.

Ceci est la manière commune de marquer les nombres, anciennement usitée par les Romains, qui exprimoient aussi tout nombre de mille par une ligne tirée sur un nombre quelconque moindre que mille. Par exemple, V signifie 5000; LX, 60000; pareillement M est 1000000; MM est 2000000, &c.

Outre cela, 1.^e certaines libertés ou variations ont été admises, au moins dans quelques écrits modernes; par exemple, IIX signifie 8; IHCIX, 89: 2.^e certains *caractères* ont été en usage, qui semblent avoir du rapport aux lettres; par exemple M, par lequel on exprime mille, 1000, a été formé de CX ou CI, dont la moitié, c'est-à-dire I, étoit prise pour 500; de même, afin d'avoir peut-être plus de commodité pour écrire, IC semble avoir été changé en D. Nous ignorons au reste comment les Romains faisoient leurs calculs par le moyen de ces nombres. Ils avoient sans doute une arithmétique comme nous, & peut-être ne seroit-il pas impossible de la retrouver; mais ce seroit une recherche de pure curiosité. Le *caractère arabe*, qui a prévalu par-tout, nous en exempte.

Chiffres grecs. Les Grecs avoient trois manières d'exprimer les nombres. 1.^e La plus simple étoit pour chaque lettre en particulier, suivant la place dans l'alphabet, afin d'exprimer un nombre depuis 1 jusqu'à 24; c'est de cette manière que sont distingués les livres de l'Iliade d'Homère. 2.^e Il y avoit une autre manière qui se faisoit par une division de l'alphabet en huit unités: α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ. 8 dizaines: ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π. 8 centaines: ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. 8 mille. N. B. Ils exprimoient mille par un point ou un accent sous une lettre: par exemple, α 1000, ε 2000, &c. 3.^e Les Grecs avoient une troisième manière qui se faisoit par six lettres capitales, en cette manière, I [la pour mille] 1, II [deux] 2, III [trois] 3, IV [quatre] 4, V [cinq] 5, VI [six] 6, VII [sept] 7, VIII [huit] 8, IX [neuf] 9, X [dix] 10, XI [onze] 11, XII [douze] 12, XIII [treize] 13, XIV [quatorze] 14, XV [quinze] 15, XVI [seize] 16, XVII [dix-sept] 17, XVIII [dix-huit] 18, XIX [dix-neuf] 19, XX [vingt] 20, &c. & quand la lettre n'en renfermoit quelques-unes, excepté 1, cela montrait que la lettre renfermée étoit le quintuple de sa propre valeur, comme

[α] 50, [μ] 500, [κ] 5000, [Μ] 50000.

Chiffres hébraïques. L'alphabet hébreu étoit divisé en neuf unités, α 1, β 2, &c. en neuf dizaines, γ 10, δ 20, &c. en neuf centaines, ε 100, ζ 200, &c. η 500, θ 600, ι 700, κ 800, λ 900. Les mille s'exprimoient quelquefois par les unités qui leur étoient avant les cent, γ 100, δ 200, &c. de même devant les dizaines, ε 100, ζ 200. Mais en général, on exprimoit mille par le mot מלך, & 2000 par מלך, &c. précédés des autres

lettres numériques, servoit à déterminer le nombre de nulle ; par exemple, $\square 583, 3000, &c.$

Le caractère français, ainsi appelé à cause que les François l'ont inventé, & en font principalement usage, est plus ordinairement nommé *chiffre de compte ou de finance*.

Ce n'est proprement qu'un chiffre romain en lettres non majuscules ; ainsi, au lieu d'exprimer 56 par *LVI*, en chiffre romain, on l'exprime en six petits caractères, par *56*, & ainsi des autres, &c.

On en fait principalement usage dans les chambres des comptes, dans les comptes que rendent les trésoriers, les receveurs, &c., & autres personnes employées dans l'administration des revenus.

En *Algèbre*, les premières lettres de l'alphabet *a, b, c, d, &c.*, sont les signes ou les caractères qui expriment les quantités données ; & les dernières lettres *x, y, z, &c.*, sont les caractères des quantités cherchées. Voyez QUANTITÉ ; voyez aussi Partielle ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE, où nous avons expliqué pourquoi l'Algèbre se sert de lettres pour désigner les quantités, soit connues, soit inconnues.

Observez que les quantités égales se marquent par le même caractère. Les lettres *m, n, r, f, t, &c.*, sont les caractères des exposans indéterminés des rapports & des puissances ; ainsi, $x^m, y^n, z^t, &c.$ désignent les puissances indéterminées de différentes espèces ; m, n, r, t , les différens multiples ou sous-multiples des quantités x, y, z , selon que m, n, r représentent des nombres entiers ou rompus.

Est le signe de ce qui existe réellement, & on l'appelle *signe affirmatif ou positif* ; il fait comprendre que les quantités qui en sont précédées, ont une existence réelle & positive. Voy. POSITIF.

C'est aussi le signe de l'addition ; & en lisant, on prononce plus ; ainsi, $9 + 3$ se prononce neuf plus trois, c'est-à-dire, 9 ajouté à 3, ou la somme de 9 & 3 ; ce qui fait 12. Voyez ADDITION.

Quand le signe — précède une quantité simple, il exprime une négation ou bien une existence négative ; il fait voir, pour ainsi dire, que la quantité qui en est précédée, est moindre que rien. Car on peut dire, par exemple, d'un homme qui a 20000 livres de dettes, & qui n'a rien d'ailleurs, que sa fortune est au-dessous de rien de la valeur de 20000 livres, puisque si on lui donnoit 20000 livres, il seroit obligé de payer ses dettes, & il ne lui resteroit rien ; ce qu'on peut exprimer ainsi, la fortune de cet homme est — 20000 livres. Au reste, nous donnerons plus au long & plus exactement l'idée des quantités négatives à l'article NÉGATIF.

Si on met ce signe entre des quantités, c'est le signe de la soustraction ; & en le lisant, on prononce moins ; ainsi, $14 - 2$ se lit 14 moins 2, ou diminué de 2, c'est-à-dire, le reste de 14,

après que l'on en a soustrait 2 ; ce qui fait 12. Voyez SOUSTRACTION.

Est le signe de l'égalité ; ainsi, $9 + 3 = 14 - 2$, signifie que 9 plus 3 sont égaux à 14 moins 2.

Harriot est le premier qui a introduit ce caractère. En sa place, Descartes se sert de *x*. Avant Harriot, il n'y avoit aucun signe d'égalité. Wolf & quelques autres auteurs se servent du même caractère = pour exprimer l'identité des rapports, ou pour marquer les termes qui sont en proportion géométrique, ce que plusieurs auteurs indiquent autrement.

Le signe $\times$ est la marque de la multiplication ; il fait voir que les quantités qui sont de l'un & de l'autre côté de ce signe, doivent être multipliées les unes par les autres ; ainsi, 4×6 se lit 4 multiplié par 6, ou bien le produit de 4 & 6 = 24, ou le rectangle de 4 & de 6. Cependant, dans l'Algèbre, on omet assez souvent ce signe, & l'on met simplement les deux quantités ensemble ; ainsi, $b \times d$ exprime le produit des deux nombres marqués par b & d , lesquels étant posés valoir 2 & 4, leur produit est 8 signifié par bd .

Wolf & d'autres auteurs prennent pour signe de multiplication un point (.) placé entre deux multiplicateurs ; ainsi 6. 2 signifie le produit de 6 & 2, c'est-à-dire 12. Voyez MULTIPLICATION.

Quand un des facteurs ou tous les deux sont composés de plusieurs termes, on les distingue par une parenthèse que l'on tire dessus ; ainsi, le produit de $a + b - c$ par d s'écrit $d \times (a + b - c)$.

Guido Grandi, & après lui Leibnitz, Wolf & d'autres, pour éviter l'embarras des lignes, au lieu de ce moyen, distinguent les multiplicateurs composés en les renfermant dans une parenthèse de la manière suivante $(a + b - c) d$.

Le signe $\div$ exprimoit autrefois la division ; ainsi, $a \div b$ désignoit que la quantité a est divisée par la quantité b . Mais aujourd'hui, en Algèbre, on exprime le quotient sous la forme d'une fraction ; ainsi, $\frac{a}{b}$ signifie le quotient de a divisé par b .

Wolf & d'autres prennent pour indiquer la division, le signe $:$; ainsi $8 : 4$ signifie le quotient de 8 divisé par 4, = 2.

Si le diviseur ou le dividende, ou bien tous les deux sont composés de plusieurs lettres ; par exemple, $a + b$ divisé par c , au lieu d'écrire le quotient sous la forme d'une fraction de cette manière $\frac{a+b}{c}$, Wolf renferme dans une parenthèse les quantités composées, comme $(a + b) : c$. Voyez DIVISION.

> est le signe de majorité ou de l'excès d'une quantité sur une autre. Quelques-uns se servent du caractère $\square$ ou de celui-ci $\succ$.

< est le signe de minorité. Harriot introduisit le premier ces deux caractères, dont tous les auteurs modernes ont fait usage depuis.

D'autres

D'autres auteurs emploient d'autres signes; quelques-uns se servent de celui-ci $\square$; mais aujourd'hui on n'en fait aucun usage.

On est le signe de similitude, recommandé dans les *miscellanea berolinensia*, & dont Leibnitz, Wolf & d'autres ont fait usage, quoiqu'en général les auteurs s'en servent rarement. Voyez SIMILITUDE.

D'autres auteurs emploient ce même caractère, pour marquer la différence entre deux quantités, lorsque l'on ignore laquelle est la plus grande. Voyez DIFFÉRENCE.

Le signe $\sqrt{\quad}$ est le caractère de radicalité; il fait voir que la racine de la quantité qui en est précédée, est extraite ou doit être extraite; ainsi, $\sqrt{25}$ ou $\sqrt[2]{25}$ signifie la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5; & $\sqrt[3]{25}$ indique la racine cubique de 25. Voyez RACINE, RADICAL.

Ce caractère renferme quelquefois plusieurs quantités; ce que l'on distingue en tirant une ligne dessus: ainsi, $\sqrt{b+d}$ signifie la racine carrée de la somme des quantités b & d .

Wolf, au lieu de ce signe, renferme dans une parenthèse les quantités composées, & affecte le rout de l'exposant de la racine: ainsi, pour désigner la racine carrée de $a+b-c$, il écrit $(a+b-c)^{\frac{1}{2}}$. Voyez EXPOSANT.

Le signe $::$ est le caractère de la proportion arithmétique; ainsi, 7 : 3 :: 13 : 9, fait voir que trois est surpassé par 7 autant que 9 l'est par 13, c'est-à-dire de 4. Voyez PROPORTION.

Le signe $:$ est le caractère de la proportion géométrique; ainsi, 8 : 4 :: 30 : 15, ou 8 : 4 :: 30 : 15, montre que le rapport de 30 à 15 est le même que celui de 8 à 4, ou que les quatre termes sont en proportion géométrique, c'est-à-dire, que 8 est à 4 comme 30 est à 15. Voy. PROPORTION.

Au lieu de ce caractère, Wolf se sert du signe d'égalité = qu'il préfère au premier, comme plus scientifique & plus expressif. D'autres désignent ainsi la proportion géométrique, $a | b || c | d$. Tout cela est indifférent.

Le signe $..$ est le caractère de la proportion géométrique continue; il montre que le rapport est toujours le même sans interruption; ainsi, $.. 2, 4, 8, 16, 32$, sont dans la même proportion continue; car 2 est à 4 comme 4 est à 8, comme 8 est à 16, &c. Voyez PROPORTION & PROGRESSION.

En Géométrie, $\parallel$ est le caractère du parallélisme, qui montre que deux lignes ou deux plans doivent être à égale distance l'un de l'autre. Voyez PARALLÈLE.

Δ est le caractère d'un triangle. Voy. TRIANGLE.

$\square$ est le signe d'un carré; $\equiv$ marque l'égalité des

états d'une figure.

Mathématiques, Tome I, 1.^{re} Partie.

$\square$ signifie un rectangle; $<$ est le signe d'un angle.

O caractérise un cercle; $\sphericalangle$ marque un angle droit.

$\sphericalangle$ exprime l'égalité des angles; $\perp$ est le signe d'une perpendiculaire.

$^{\circ}$ exprime un degré; ainsi, 75 $^{\circ}$ signifie soixante & quinze degrés.

$'$ est le signe d'une minute ou d'une prime; ainsi, 50' dénote cinquante minutes. $''$, $'''$, $'''$, $'''$, sont les caractères des secondes, des tierces, des quartses, &c., de degrés; ainsi, 5'', 6'', 18'', 20'', signifient 5 secondes, 6 tierces, 18 quartses, 20 quintes. Les quartses & les quintes s'expriment aussi par iv & par v .

Au reste, plusieurs des caractères de Géométrie, dont nous venons de parler, sont peu usités aujourd'hui.

Dans les calculs différentiel & intégral, la lettre d , placée au-devant d'une quantité variable x , veut dire la différence de cette quantité. Ainsi, dx signifie la différence de x , ou la différentielle de x ; c'est la notation ordinaire. Les Anglois désignent la même chose par la lettre x surmontée d'un point, en cette sorte $\dot{x}$; & ils appellent fluxion ce que les autres nations appellent différence d'après Leibnitz.

Le signe $\int$, placée au-devant d'une différentielle, signifie l'intégrale de cette différentielle. Ainsi, $\int dx$ veut dire l'intégrale de dx . Les Anglois désignent la même chose par $Fl. x$, qui veut dire la fluente de la fluxion x .

Voy. DIFFÉRENTIEL, INTÉGRAL, FLUXION, FLUENTE.

CARACTÉRISTIQUE, f. f. La caractéristique d'un logarithme est son exposant, c'est-à-dire, le nombre entier qu'il renferme; ainsi, dans ce logarithme, 1, 000 000, 1 est l'exposant; de même 2 est l'exposant dans celui-ci, 2, 4523, &c.

En général, on appelle en Mathématiques, caractéristique, une marque ou caractère par lequel on désigne quelque chose. V. CARACTÈRE. Ainsi, d est la caractéristique des quantités différentielles, suivant M. Leibnitz; & suivant M. Newton, la caractéristique des fluxions est un point. V. FLUXION, DIFFÉRENTIEL.

Dans la haute Géométrie, on appelle triangle caractéristique d'une courbe, un triangle rectiligne rectangle, dont l'hypoténuse fait une partie de la courbe, qui ne diffère pas sensiblement d'une ligne droite, parce que cette portion de courbe est supposée infiniment petite. Ce triangle a été appelé caractéristique, à cause qu'il sert ordinairement à distinguer les lignes courbes. Voyez COURBE.

Supposons, par exemple, la demi-ordonnée $p m$ (pl. d'Anal. fig. 18) infiniment proche d'une autre demi-ordonnée $P M$; alors $P p$ sera la différentielle de l'abscisse; & abaissant une perpendiculaire $M R$.

= Pp , Rm fera la différence de la demi-ordonnée. Tirant donc une tangente TM , en ce cas l'arc infiniment petit Mm ne différera pas d'une ligne droite; par conséquent MmR est un triangle rectiligne rectangle, & constitue le triangle caractéristique de cette courbe, autrement appelé triangle différentiel. En effet, l'équation différentielle qui est entre les petits côtés de ce triangle, est l'équation qui désigne & caractérise la courbe. Voyez TRIANGLE DIFFÉRENTIEL. (O)

CARDINAUX (*figures*), adj. pl. (*Astronomie*). Points cardinaux de l'horizon, sont l'orient, l'occident, le septentrion & le midi; ceux du zodiaque sont les premiers degrés des signes où le soleil est censé entrer au commencement de chaque saison; savoir, le bélier, le cancer, la balance & le capricorne.

CARNABONS (*Astronomie*), nom que l'on donne quelquefois à la constellation du serpentaire.

CARRÉ (*Astronomie*), se dit de trois constellations qui se font remarquer par quatre étoiles principales disposées en quadrilatère. On dit le carré de la grande ourse, le carré de Pégase & le carré d'Orion. (D. L.)

CARREAU (*France*), sorte de jeu dont M. de Buffon a donné le calcul en 1733, avant que d'être de l'Académie des Sciences. Voici l'extrait qu'on trouve de son mémoire sur ce sujet, dans le volume de l'Académie pour cette année-là.

Dans une chambre cartée de carreaux égaux & supposés réguliers, on jette en l'air un louis ou un écu, & on demande combien il y a à parier que la pièce ne tombera que sur un seul carreau ou franchement.

Supposons que le carreau donné soit carré; dans ce carré inscrivez-en un autre qui en soit distant par-tout de la longueur du demi-diamètre de la pièce; il est évident que toutes les fois que le centre de la pièce tombera sur le petit carré ou sur sa circonférence, la pièce tombera franchement; & qu'au contraire elle ne tombera pas franchement, si le centre de la pièce tombe hors du carré inscrit: donc la probabilité que la pièce tombera franchement, est à la probabilité contraire, comme l'aire du petit carré est à la différence de l'aire des deux carrés.

Donc pour jouer à jeu égal, il faut que le grand carré soit double du petit, c'est-à-dire, que le diamètre de la pièce étant 1, & x le côté du grand carré, on aura $x^2 : (x-1)^2 :: 2 : 1$; d'où l'on tire facilement la valeur de x , qui sera incommensurable avec le diamètre de la pièce.

Si la pièce, au lieu d'être ronde, étoit carrée, &, par exemple, égale au carré inscrit dans la pièce circulaire dont nous venons de parler, il fante aux yeux que la probabilité de tomber franchement deviendrait plus grande: car il pourroit arriver que la pièce tombât franchement hors du petit carré: le problème devient alors un peu

plus difficile, à cause des différentes positions que la pièce peut prendre; ce qui n'a point lieu quand la pièce est circulaire, car toutes les positions sont alors indifférentes. Voici donc un problème simple une idée qu'on peut se former de ces différentes positions.

Sur un seul plancher formé de planches égales & parallèles, on jette une baguette d'une certaine longueur, & supposée sans largeur; on demande la probabilité qu'elle tombera franchement sur une seule planche. Que l'on conçoive le point du milieu de la baguette à une distance quelconque du bord de la planche, & que de ce point, comme centre, on décrive un demi-cercle dont le diamètre soit perpendiculaire aux côtés de la planche; la probabilité que la baguette touchera franchement, sera à la probabilité contraire, comme le secteur circulaire renfermé au-dedans de la planche est au reste de l'aire du demi-cercle; d'où il est aisé de tirer la solution cherchée. Car nommant x la distance du centre de la baguette à l'un des côtés de la planche, X le secteur correspondant, dont il est toujours facile de trouver la valeur en x , & A l'aire du demi-cercle; la probabilité cherchée sera à la probabilité contraire, comme X d x est à $f d x$ ($A-X$). Voy. JEU, PART. (O)

CARTE, f. f. (*Astronomie géographique*). figure plane qui représente la figure de la terre, ou une de ses parties, suivant les loix de la perspective.

Une carte est donc une projection de la surface du globe ou d'une de ses parties, qui représente les figures & les dimensions, ou au moins les situations des villes, des rivières, des montagnes, &c. Voyez PROJECTION.

Cartes universelles, sont celles qui représentent toute la surface de la terre, ou les hémisphères. On les appelle ordinairement mappemonde. Voyez MAPPEMONDE.

Cartes particulières, sont celles qui représentent quelques pays particuliers, ou quelques portions de pays.

Ces deux espèces de cartes sont nommées souvent cartes géographiques, ou cartes terrestres, pour les distinguer des hydrographiques ou marines, qui ne représentent que la mer, ses îles, & ses côtes.

Les conditions requises pour une bonne carte, sont 1.^o que tous les lieux y soient marqués dans leur juste situation, eu égard aux principaux cercles de la terre, comme l'équateur, les parallèles, les méridiens, &c. 2.^o que les grandeurs de différents pays aient entre elles les mêmes proportions sur la carte, qu'elles ont sur la surface de la terre: 3.^o que les différents lieux soient respectivement sur la carte aux mêmes distances les uns des autres, & dans la même situation que sur la terre elle-même.

Pour les principes de la construction des cartes, & les loix de projection, voyez PERSPECTIVE & PROJECTION de la sphère. Voici l'application de ces principes à la construction des cartes.

Construction d'une carte, l'œil étant supposé placé dans l'axe. Supposons, par exemple, qu'il faille représenter l'hémisphère boréal tel qu'il doit paraître à un œil situé dans un des points de l'axe, comme dans le pôle austral, & en prenant le plan de l'équateur pour celui où la représentation doit se faire; nous imaginerons pour cela des lignes tirées de chaque point de l'hémisphère boréal à l'œil, & qui coupent le plan en autant de points. Tous ces derniers points joints ensemble, formeront par leur assemblage la carte requise.

Ici l'équateur sera la limite de la projection; le pôle de la terre se présentera ou se projettera au centre; les méridiens de la terre seront représentés par des lignes droites qui iront du centre de l'équateur ou du pôle de la carte, à tous les points de l'équateur; les parallèles de latitude formeront de petits cercles, dont les centres seront le centre même de l'équateur ou de la projection.

La meilleure manière de concevoir la projection d'un cercle sur un plan, c'est d'imaginer un cône dont le sommet placé à l'endroit où nous supposons l'œil, soit radieux ou envoie des rayons, dont la base soit le cercle qu'il faut représenter, & dont les côtés soient autant de rayons lancés par le point lumineux; la représentation du cercle ne sera alors autre chose que la section de ce cône, par le plan sur lequel elle doit se faire; & il est clair que, selon les différentes positions du cône, la représentation sera une figure différente.

Voici maintenant l'application de cette théorie à la pratique. Prenez pour pôle le milieu *P* (Pl. de géog. fig. 2.) de la feuille de laquelle vous voulez faire votre carte; & de ce point comme centre, décrivez, pour représenter l'équateur, un cercle de la grandeur que vous voulez donner à votre carte. Ces deux choses peuvent se faire à volonté; & c'est d'elles que dépend la détermination de tous les autres points ou cercles. Divisez votre équateur en 360 parties, & tirez des droites du centre à chaque commencement de degré; ces droites seront les méridiens de votre carte, & vous prendrez pour premier méridien celle qui passera par le commencement du premier degré ou par zéro. Voyez MÉRIDIEN.

Constructions des parallèles sur la carte. Marquez par les lettres *AB, BC, CD, DA*, les quatre quarts de l'équateur, compris, le premier depuis zéro jusqu'à 90; le second, depuis 90 jusqu'à 180; le troisième, depuis 180 jusqu'à 270; & le quatrième, depuis 270 jusqu'à zéro; & de tous les degrés d'un de ces quarts de cercle *BC*, comme aussi des points qui marquent $23^{\circ} 30'$ à $66^{\circ} 30'$, tirez des droites occultes au point *D*, qui marquent celui où ces lignes coupent le demi-diamètre *APC*: ensuite du point *P* comme centre, décrivez différents arcs qui passent par les différents points de *P*; ces arcs seront les parallèles de latitude; le parallèle $23^{\circ} 30'$ sera le tropique du cancer; & celui de

$66^{\circ} 30'$ sera le cercle polaire arctique. Voyez PARALLÈLE & TROPIQUE.

Les méridiens & les parallèles ayant été ainsi décrits, on écrira les différents lieux au moyen d'une table de longitude & de latitude, comptant la longitude du lieu sur l'équateur, à commencer du premier méridien, & continuant vers le méridien du lieu; & pour la longitude du lieu, on la prendra sur le parallèle de la même latitude. Il est évident que le point d'intersection de ce méridien & de ce parallèle représentera le lieu sur la carte, & l'on s'y prendra de même pour y représenter tous les autres lieux.

Quant à la moitié de l'écliptique qui passe dans cet hémisphère, ce grand cercle doit le représenter par un arc de cercle; de façon qu'il ne s'agit plus que de trouver sur la carte trois points de cet arc. Le premier point, c'est-à-dire, celui où l'écliptique coupe l'équateur, est le même que celui où le premier méridien coupe l'équateur & il le distingue par cette raison par le signe *aries*. Le dernier point de cet arc de cercle, ou l'autre intersection de l'équateur & de l'écliptique, c'est-à-dire, la fin de *virgo*, sera dans leur point opposé de l'équateur à 180 degrés. Le milieu de l'arc est le point où le méridien de 90 degrés coupe le tropique du cancer. Ainsi, nous avons trois points de cet arc, qui donneront l'arc entier. Voyez CERCLE & CORDE.

Les cartes de cette première projection ont la première des qualités requises ci-dessus; mais elles manquent de la seconde & de la troisième, car les degrés égaux des méridiens sont représentés sur ces cartes par des portions de ligne droite inégales.

On peut par cette méthode représenter dans une carte presque toute la terre, en plaçant l'œil, par exemple, dans le pôle antarctique, & prenant pour plan de projection celui de quelque cercle voisin, par exemple, celui du cercle antarctique. Il ne faut ici, de plus qu'à la première projection, que continuer les méridiens, tirer des parallèles du côté de l'équateur, & achever l'écliptique; mais ces cartes seroient trop embrouillées & trop difformes pour qu'on pût en faire usage.

On se contente pour l'ordinaire de tracer les deux hémisphères séparément, ce qui rend la carte beaucoup plus nette & plus commode. Si l'on veut avoir par le moyen de cette carte la distance de deux lieux *A, B*, (fig. 3, n. 2, géog.) situés sous le même méridien *P B*, on décrira les arcs de cercle *AE, BD*; on verra combien la partie *E D* contient de divisions ou de degrés, & on aura le nombre de degrés depuis *E* jusqu'en *D*. Or, comme un degré de la terre contient 25 lieues, il faudra prendre 25 fois ce nombre de degrés pour avoir la distance de *A* en *B*.

M. de Maupertuis a démontré dans son discours sur la parallaxe de la lune, que les loxodromiques, dans cette projection, devenoient des spirales logarithmiques. Voyez LOXODROMIQUE & SPIRALE

LOGARITHMIQUE. Supposons donc que *AG* (fig. 3. n. 4. *grog.*) soit une portion de spirale logarithmique, ou projection de la loxodromique, & qu'on veuille savoir la distance *AG* des deux lieux placés sur le même rhumb; il est certain que *AG* sera *AB* en raison constante, c'est-à-dire, dans le rapport du sinus total au cosinus de l'angle du rhumb, ou de l'angle de la loxodromique avec le méridien: donc, connoissant *AB* par la méthode précédente, & sachant de plus, comme on le suppose, l'angle du rhumb, on connoitra *AG*, c'est-à-dire, on connoitra de combien de lieues sont éloignés l'un de l'autre les deux endroits dont les points *A*, *G*, sont la projection.

Cette projection est la plus aisée de toutes: mais on préfère pour l'usage celle où l'œil est placé dans l'équateur. C'est en effet de cette dernière sorte qu'on fait ordinairement les cartes. Au reste, comme la situation de l'écliptique, par rapport à chaque lieu de la terre, change continuellement, ce cercle ne doit point avoir lieu, à proprement parler, sur la surface de la terre: mais on s'en sert pour représenter, conformément à sa situation, quelques momens marqués; par exemple, celui où le commencement d'*aries* & de *libra* seroit dans l'intersection du premier méridien & de l'écliptique.

Construction des cartes, supposant l'œil placé dans le plan de l'équateur. Cette méthode de projection, quoique plus difficile, est cependant plus juste, plus naturelle, & plus commode que la première. Pour la concevoir, nous supposons que la surface de la terre soit coupée en deux hémisphères par la circonférence entière du premier méridien; nous proposons de représenter chacun de ces hémisphères dans une carte particulière, l'œil sera placé dans un point de l'équateur, éloigné de 90 degrés du premier méridien, & nous prendrons pour plan transparent ou la représentation doit se faire, celui du premier méridien. Dans cette projection, l'équateur devient une droite, aussi bien que le méridien éloigné de 90 degrés du premier: mais les autres méridiens, ou parallèles aux équateurs, deviennent des arcs de cercle ainsi que l'écliptique. Voyez PROJECTION STÉRÉOGRAPHIQUE DE LA SPHÈRE.

Voici la méthode pour les construire. Du point *E* comme centre, (fig. 4.) décrivez un cercle de la grandeur que vous voulez donner à votre carte; il représentera le premier méridien, qui est aussi le même que celui de 180 degrés, car tirant le diamètre *BD*, il partagera le méridien en deux demi-cercles, dont le premier *BAD* conviendra à *vero*, & l'autre *BCD* à 180 degrés. Ce diamètre *BD* représentera le méridien de 90 degrés; ainsi, le point *B* sera le pôle arctique, & le point *D*, le pôle antarctique. Le diamètre *AC* perpendiculaire à *BD*, sera l'équateur. Divisez les quarts de cercle *AB*, *BC*, *CD*, *DA*, en 90 degrés chacun; & pour trouver les arcs des mé-

ridiens & des parallèles, vous vous y prendrez de cette sorte. Il faudra, par la méthode donnée ci-dessus, & démontrée à l'article PROJECTION STÉRÉOGRAPHIQUE DE LA SPHÈRE, diviser l'équateur en ses degrés, savoir en 180°, parce que celui de la carte ne représente en effet que la moitié de l'équateur. Par ces différentes divisions & par les deux pôles, vous décrirez des arcs de cercles *B 10 D*, *B 20 D*, & ces arcs représenteront les méridiens.

Pour décrire les parallèles, il faudra diviser de la même sorte le méridien *BD* en 180 degrés, & par chacune de ces trois divisions, & les divisions correspondantes des quarts de cercles *AB*, *BC*, décrire les arcs de cercles; on aura de cette manière les parallèles de tous les degrés, avec les tropiques, les polaires & les méridiens.

L'écliptique peut se marquer de deux façons; car la situation sur la terre peut être telle que ses intersections avec l'équateur répondent perpendiculairement au point *T*: en ce cas, la projection de ce demi-cercle, depuis le premier degré du cancer jusqu'au premier du capricorne, sera une droite qu'on déterminera en comptant un arc de 23° 30' de *A* vers *B*, & tirant par l'extrémité *F* de cet arc un diamètre. Ce diamètre représentera l'écliptique pour la situation dont nous parlons; & l'on pourra, comme ci-dessus, le diviser en degrés, & y marquer les nombres, signes, &c. Mais si l'écliptique est placée de façon que son intersection avec l'équateur réponde au point *A*, la projection sera en ce cas un arc de cercle qui passera par les points d'intersection *A* & *C* de l'écliptique & de l'équateur, pris sur la droite qui marque la projection de l'équateur; & par celui qui marque l'intersection du tropique du cancer, & du méridien de 90 degrés pris sur la droite, qui sert de projection à ce méridien. Ces points suffiront pour décrire cet arc de cercle.

Il ne reste plus, pour rendre la carte parfaite, qu'à prendre dans les tables les longitudes & les latitudes des différens lieux, & à placer ces lieux conformément sur la carte; ce qu'on fera selon qu'on l'a enseigné dans la construction des cartes de la première espèce. On pourroit, dans cette projection, représenter sur une seule carte presque tout le globe de la terre; il ne faudroit pour cela que prendre pour plan de projection, au lieu du plan du premier méridien, le plan de quelque autre petit cercle parallèle à ce premier méridien, & fort proche de l'œil; car par ce moyen on pourra décrire tous les méridiens & les parallèles à l'équateur en entier, sans qu'ils sortent des limites de la carte. Mais comme cela rendroit la carte confuse & embrouillée, on ne le fait que rarement; & il paroit plus à propos de représenter les deux hémisphères en entier sur deux cartes différenes.

Un des avantages de cette projection est, qu'elle représente d'une manière un peu plus vraie que la précédente, les longitudes & les latitudes des

lieux, leurs distances de l'équateur & du premier méridien. Ses inconvénients sont : 1.^o qu'elle rend les degrés de l'équateur inégaux, ces degrés devenant d'autant plus grands qu'ils sont plus près de *DAB* ou de son opposé *BCD* : ce qui fait que des espaces inégaux sur la terre sont représentés comme égaux sur la carte, & réciproquement ; défaut qu'on n'éviteroit que par d'autres, peut-être plus grands. 3.^o Que les distances des lieux, & leurs situations mutuelles ne peuvent pas se bien déterminer dans les cartes de cette projection.

Construction des cartes sur le plan de l'horizon, ou dont un lieu donne quelconque à volonté doit être le centre ou le milieu. Supposons, par exemple, qu'on veuille décrire la carte dont le centre soit la ville de Paris, nous supposons la latitude de $48^{\circ} 50' 10''$; l'ail sera placé dans le nadir ; la carte transparente sera le plan de l'horizon, ou quelque autre plan parallèle à celui-là, en supposant qu'on veuille représenter dans la carte plus qu'un hémisphère : prenez le point *E*, fig. 4, pour Paris, & de ce point comme centre, décrivez le cercle *ABCD* pour représenter l'horizon que vous divisez en quatre quarts de cercle, & chacun d'eux en 90 degrés. Que le diamètre *BD* soit le méridien ; *E*, celui du nord ; *D*, celui du sud ; la ligne tirée de l'est de l'équinoxe, à l'ouest de l'équinoxe, marquera le premier vertical ; *A*, le côté de l'est ; *C*, celui de l'ouest, c'est-à-dire deux points du premier vertical, éloignés de part & d'autre de 9 degrés du zénith. Tous les verticaux sont représentés par des droites tirées du centre *E*, aux différens degrés de l'horizon. Divisez *BD* en 180 degrés par les méthodes précédentes, & le point de *EB* qui représentera $48^{\circ} 50' 10''$, à compter depuis *B*, fera la projection du pôle boreal, que nous marquerons par la lettre *P*. Le point de *BD* qui représentera $48^{\circ} 50' 10''$ de l'arc *DC*, en allant de *C* vers *D*, sera l'intersection de l'équateur avec le méridien de Paris, que vous marquez par la lettre *Q*. De ce point *Q*, en allant vers *P*, vous écrirez les nombres 1, 2, 3, &c. comme aussi en allant de *Q* vers *D*, & en allant de *B* vers *P*, il faudra marquer les degrés de cette forte, 48, 47, 46, &c.

Vous prendrez ensuite les points correspondans des degrés égaux ; & de leur distance sine pour diamètre, vous décrirez des cercles qui représenteront les parallèles ou cercles de latitude avec l'équateur, les tropiques & le cercle polaire. Pour les méridiens, vous décrirez par les points *A*, *P*, *C* un cercle qui représentera le méridien de 90 degrés de Paris, & dont le centre sera le point *M*, & *P* *N* le diamètre ; & avant d'avoir divisé *KL* en degrés par les méthodes précédentes, vous décrirez par les points *P*, *N*, & par les points de division de la ligne *KL*, des cercles dont les portions renfermées dans le cercle *BADC* représenteront les méridiens.

Les cartes rectilignes sont celles où les méridiens & les parallèles sont tous-à-la-fois représentés par des droites ; ce qui est réellement impossible par les loix de la perspective, parce qu'on ne peut point assigner de position pour l'ail & le plan de projection, telle que les cercles de longitude & de latitude deviennent tout-à-la-fois des lignes droites. Dans la première méthode que nous avons donnée ci-dessus, les méridiens étoient des droites, mais les parallèles étoient des cercles. Dans la plupart des autres espèces de projections, les méridiens & les parallèles sont des courbes. Il y a une espèce de projections où les méridiens sont des droites, & les parallèles des hyperboles : c'est lorsque l'ail seroit supposé placé dans le centre de la terre, & que la projection se feroit sur une parallèle au méridien ; mais cette projection est plutôt de pure curiosité que d'usage.

Construction des cartes particulières. Les cartes particulières de grandes étendues de pays, comme les cartes d'Europe, se projettent de la même manière que les cartes générales, observant seulement qu'il est à propos de faire choix de différentes méthodes pour différentes pratiques : par exemple, l'Afrique & l'Amérique par où passe l'équateur, ne se projetteroient pas convenablement par la première méthode, mais par la seconde ; l'Europe, l'Asie se projetteroient mieux par la troisième ; & les pays voisins des pôles, & qu'on nomme les zones froides, par la première.

Ainsi, pour commencer, tirez sur votre plan ou papier une droite, que vous prendrez pour le méridien du lieu sur lequel l'ail est imaginé placé, & divisez-la comme ci-dessus en degrés, qui seront les degrés de latitude ; prenez ensuite dans les tables la latitude des deux parallèles qui en terminent les deux extrémités ; il faudra marquer dans le méridien ces degrés de latitude, & tirer par ces mêmes degrés des perpendiculaires qui serviront à la carte de limite nord & sud. Cela fait, il faudra tirer des parallèles dans les différens degrés des méridiens, & placer les lieux jusqu'à ce que la carte soit complète.

Des cartes particulières de moindre étendue. Les géographes suivent une autre méthode dans la construction des cartes qui doivent représenter une plus petite portion de la terre. Premièrement on tire une droite au bas du plan, qui puisse représenter la longitude, & qui serve de borne à la partie méridionale du pays qu'on veut décrire. On prend dans cette ligne autant de parties égales que le pays comprend de degrés de longitude ; au milieu de cette ligne, on lui élève une perpendiculaire dans laquelle on prend autant de parties que le pays contient de degrés de latitude. On détermine de quelle grandeur ces parties doivent être par la proportion d'un degré de grand cercle aux degrés des parallèles qui terminent le pays dont on fait la carte. Par l'extrémité de cette perpendiculaire, on tire une autre droite perpen-

diculaire ou parallèle à celle d'en-bas, sur laquelle les degrés de longitude doivent se représenter comme dans la ligne d'en-haut, c'est-à-dire, presque égaux les uns aux autres, à moins que les latitudes des deux extrémités ne soient fort différentes l'une de l'autre : car si la parallèle la plus basse est située à une distance considérable du cercle équinoxial, ou que la latitude de la limite boréale soit beaucoup plus grande que celle de l'australe, les parties ou degrés de la ligne supérieure ne seront plus égaux aux parties ou degrés de l'inférieure ; mais ils seront moindres, suivant la proportion du degré de la partie septentrionale, au degré de la partie méridionale. Après qu'on aura ainsi déterminé, soit sur la ligne supérieure, soit sur l'inférieure, les parties qu'on doit prendre pour les degrés de longitude, on tirera, par les points de division des parallèles, des droites qui représenteront les méridiens ; & par les différents degrés de la perpendiculaire élevée au milieu de la première ligne transversale, on tirera des lignes parallèles à cette première ligne transversale, lesquelles représenteront les parallèles de latitude. Enfin, on placera les lieux suivant la méthode qui a été déjà enseignée, aux points dans lesquels les méridiens ou cercles de longitude concourent avec les parallèles ou cercles de latitude.

Pour les cartes de province ou de pays de peu d'étendue, comme de paroisses, de terres, &c., on se sert d'une autre méthode plus sûre & plus exacte qu'aucune des précédentes. Les angles de position ou ceux sur lesquels doivent tomber les lieux, y sont déterminés par des instrumens propres à cet effet, & rapportés ensuite sur le papier. Cela fait un art à part, qu'on appelle *arpentage*. Voyez LEVÉE DES PLANS.

Les figures 10 & 11 de la Géographie représentent des cartes particulières de quelque portion de la terre ; la figure 10 est la représentation d'une portion assez considérable, où les méridiens, comme on le voit, sont des lignes convergentes. La fig. 11 est la représentation d'une portion peu étendue, où les méridiens & les parallèles sont des lignes droites sensiblement parallèles. L, K, I , sont trois lieux placés sur la carte. Si l'on connoît les lieux K, I , & leur distance au lieu L , on connoîtra sûrement la position du lieu L ; car il n'y a qu'à décrire des centres K, I , & des distances LK, LI , qu'on suppose données, deux arcs de cercle qui se couperont au point cherché L .

L'usage des cartes se déduit facilement de leur construction. Les degrés des méridiens & des parallèles marquent les longitudes & les latitudes des lieux ; & l'échelle des lieux qui y est jointe, la distance des uns aux autres. La situation des lieux, les uns par rapport aux autres, comme aussi par rapport aux points cardinaux, paroît à la seule inspection de la carte, puisque le haut en est

toujours tourné vers le nord, le bas vers le sud, la droite vers l'est & la gauche vers l'ouest, à moins que la boussole qu'on mettez souvent sur la carte, ne marque le contraire.

CARTE marine, est une projection de quelques parties de la mer sur un plan, pour l'usage des navigateurs. Voyez PROJECTION.

Le P. Fourmier rapporte l'invention des cartes marines à Henri, fils de Jean, roi de Portugal ; elles diffèrent beaucoup des cartes géographiques terrestres, qui ne sont d'aucun usage dans la navigation. Toutes les cartes marines ne sont pas non plus de la même espèce ; car il y en a qu'on nomme cartes planes ; d'autres, réduites ; d'autres, cartes de Mercator ; d'autres, cartes du globe, &c.

Les cartes planes sont celles où les méridiens & les parallèles sont représentés par des droites parallèles les unes aux autres.

Ptolémée les rejette dans la Géographie, à cause des erreurs auxquelles elles sont sujettes, auxquelles pouvoient être utiles dans des voyages courts. Leurs défauts sont, 1.^o que puisque tous les méridiens se rencontrent en effet dans les pôles, il est absurde de les représenter, sur-tout dans de grandes cartes, par des droites parallèles ; 2.^o que les cartes planes représentent les degrés des différents parallèles égaux à ceux de l'équateur, & par conséquent les distances des lieux de l'est à l'ouest, plus grandes qu'elles ne sont ; 3.^o que dans une carte plane, le vaisseau paroît, sans qu'on garde le même rhumb de vent, faire voile dans un grand cercle du globe ; ce qui est pourtant très-faux.

Malgré ces défauts des cartes planes, elles sont cependant assez exactes, lorsqu'elles ne représentent qu'une petite portion de la mer ou de la terre ; & elles peuvent être en ce cas d'un usage fort simple & commode.

Construction d'une carte plane. 1.^o Tirez une droite comme AB (pl. de navigation, fig. 9.), & divisez-la en autant de parties égales qu'il y a de degrés de latitude dans la portion de mer qu'il faut représenter ; 2.^o joignez-y en une autre BC à angles droits, & divisez-la en autant de parties égales les unes aux autres & à la première, qu'il y a de degrés de longitude dans la portion de mer que vous voulez représenter ; 3.^o achevez le parallélogramme $ABCD$, & partagez son aire en petits carrés ; les droites parallèles à AB, CD , seront les méridiens ; & les parallèles à $AD & BC$, les cercles parallèles. 4.^o vous y placerez, au moyen d'une table de longitudes & de latitudes, les côtes, les îles, les baies, les bancs de sable, les rochers, de la manière qui a été prescrite ci-dessus pour les cartes particulières.

Il s'ensuit de-là 1.^o que la latitude & la longitude du lieu ou est un vaisseau, étant données, on pourra aisément représenter son lieu dans la carte ; 2.^o qu'étant donné dans la carte les lieux $F & G$ d'où le vaisseau part & où il va, la ligne FG ,

tirée de l'un à l'autre, fait avec le méridien AB un angle AFG égal à l'inclinaison du rhumb; & puisque les portions $F1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30$, entre des parallèles équidistans sont égales, & que l'inclinaison de la droite FG à tous les méridiens ou à toutes les droites parallèles à AB est la même, la droite FG représente donc le rhumb. On peut prouver de la même manière, que cette carte représente véritablement les milles de longitude.

Il s'ensuit de-là qu'on peut le servir utilement des cartes planes pour diriger un vaisseau dans un voyage qui ne soit pas de long cours, ou même dans un voyage assez long, pourvu qu'on ait soin qu'il ne se glisse point d'erreur dans la distance des lieux F & G ; ce qu'on corrigera de la manière suivante.

Construction d'une échelle pour corriger les erreurs des distances dans les cartes planes. 1.^o Transportez cinq degrés de la carte à la droite AB , fig. 10, & divisez-les en 300 parties égales ou milles géographiques; 2.^o décrivez sur cette droite un petit cercle ACB , qu'il faudra diviser en 90 parties égales; si l'on veut savoir en conséquence combien cinq degrés sont de milles dans le parallèle de cinquante, qu'on prenne au compas l'intervalle AC égal à cinquante, & qu'on le transporte au diamètre AB , sur lequel il marquera le nombre de milles qu'on veut savoir.

Il s'ensuit de-là que si un vaisseau fait voile sur un rhumb à l'est ou à l'ouest hors de l'équateur, les milles correspondans aux degrés de longitude se trouvent comme dans l'article précédent; s'il fait voile sur un rhumb collatéral, alors on peut supposer toujours la course de l'est à l'ouest dans un parallèle moyen entre le parallèle du lieu d'où le vaisseau vient & de celui où il va.

Il est vrai que cette réduction par une parallèle moyenne arithmétique n'est pas exacte; cependant on s'en sert souvent dans la pratique, parce que c'est une méthode commode pour l'usage de la plupart des marins. En effet, elle ne produira point d'erreur considérable, si toute la course est divisée en parties tout de chacune ne passe pas un degré; ce qui fait qu'il est convenable de ne pas prendre le diamètre du demi-cercle ACB de plus d'un degré, & de le diviser au plus en milles géographiques. Pour l'application des cartes planes à la navigation, voyez NAVIGATION.

Carte réduite ou carte de réduction: c'est celle dans laquelle les méridiens sont représentés par des droites convergentes vers les pôles, & les parallèles par des droites parallèles les unes aux autres, mais inégales. Il paroît donc, par leur construction, qu'elles doivent corriger les erreurs des cartes planes.

Mais puisque les parallèles y devoient couper les méridiens à angles droits, il s'ensuit aussi que ces cartes sont défectueuses à cet égard, puisqu'elles représentent les parallèles comme inclinés aux méridiens; c'est ce qui a fait imaginer une autre

espèce de cartes réduites, dans lesquelles les méridiens sont parallèles, mais les degrés inégaux; on les appelle cartes de Mercator.

Carte de Mercator: c'est celle dans laquelle les méridiens & les parallèles sont représentés par ces droites parallèles, mais où les degrés des méridiens sont inégaux, & croissent toujours à mesure qu'ils s'approchent du pôle dans la même raison que ceux des parallèles décroissent sur le globe; au moyen de quoi ils conservent entr'eux la même proportion que sur le globe.

Cette carte tire son nom de celui de l'auteur qui l'a proposée le premier, & qui a fait la première carte de cette construction; savoir, de Mercator: mais il n'est ni le premier qui en ait eu l'idée (car Ptolomée y avoit pensé quinze cents ans auparavant), ni celui à qui l'on en doit la perfection, M. WRIGHT étant le premier qui l'ait démontrée, & qui ait enseigné une manière aisée de la construire, en étendant la ligne méridienne par l'addition continue des sécantes.

Construction de la carte de Mercator. 1.^o Tirez une droite, & divisez-la en parties égales qui représentent les degrés de longitude, soit dans l'équateur, soit dans les parallèles qui doivent terminer la carte; élevez de ces différens points de division des perpendiculaires qui représentent les différens méridiens, de façon que des droites puissent les couper toutes sous un même angle, & par conséquent représenter les rhumbs; & vous ferez le reste comme dans la carte plane, avec cette condition de plus, que pour que les degrés des méridiens soient dans la proportion convenable avec ceux des parallèles, il faut augmenter les premiers; car les derniers restent les mêmes, à cause du parallélisme des méridiens. Voyez DEGRÉ.

Décrivez donc dans l'équateur CD & de l'intervalle d'un degré (pl. navig. fig. 11.), le quart de cercle DLE , & élevez en D la perpendiculaire DG ; faites l'arc DL égal à la latitude, & par le point L tirez CG ; cette droite CG sera le degré du méridien propre à être transporté sur le méridien de la carte; le reste se fera comme dans les cartes planes. Supposons qu'on demande dans la pratique de construire une carte plane de Mercator, depuis le quarantième jusqu'au cinquantième degré de latitude boréale, & depuis le sixième jusqu'au dix-huitième degré de longitude; tirez d'abord une droite qui représente le quarantième parallèle de l'équateur, & divisez-la en douze parties égales, pour les douze degrés de longitude que la carte doit contenir; prenez ensuite une ligne des parties égales, sur l'échelle de laquelle ces parties sont égales à chacun des degrés de longitude; & à chacune de ses extrémités élevez des perpendiculaires pour représenter deux méridiens parallèles, qu'il faut diviser au moyen de l'addition continue des sécantes, lesquelles on démontre croître dans la même proportion que les degrés de longitude décroissent. Voyez SÉCANTE.

Ainsi, pour la distance de 40 degrés de latitude à 41 degrés, prenez 131 & demi parties égales de l'échelle, qui font la sixième de 40 deg. 30' ; pour la distance de 41 deg. à 42 deg., prenez 133 & demi parties égales de l'échelle, qui font la sixième de 41 deg. 30', & ainsi de suite jusqu'au dernier degré de votre *carte*, qui contiendra 154 de ces parties égales, lesquelles font la sixième de 49 deg. 30', & doivent donner par conséquent la distance de 49 degrés de latitude à 50. Par cette méthode, les degrés de latitude se trouveront évidemment augmentés dans la proportion suivant laquelle les degrés de longitude décroissent sur le globe.

Le méridien étant divisé, il faudra y ajouter la boussole ou le compas de mer : choisissant pour cela quelque endroit convenable dans le milieu, on tirera par cet endroit une parallèle au méridien divisé, laquelle sera le rhumb du nord ; & au moyen de celle-ci, on aura les 31 autres points de compas : enfin, on rapportera les villes, les ports, les côtes, les îles, &c., au moyen d'une table de latitude & de longitude, & la *carte* sera finie.

Dans la *carte* de Mercator, l'échelle change à proportion des latitudes : si par conséquent un vaisseau fait voile entre le 40^{me} & le 50^{me} degrés de latitude, les degrés des méridiens entre ces deux parallèles devront servir d'échelle pour mesurer le chemin du vaisseau ; d'où il s'ensuit que, quoique les degrés de longitude soient égaux en longueur sur la *carte*, ils doivent néanmoins contenir un nombre inégal de milles ou de lieues, & qu'ils décroîtront à mesure qu'ils approcheront plus près du pôle, parce qu'ils sont en raison inverse d'une quantité qui croît continuellement.

Cette *carte* est très-bonne, quoique fautive en apparence : on trouve par expérience qu'elle est fort exacte, & qu'il est en même-temps fort aisé d'en faire usage. En effet, elle a toutes les qualités requises pour l'usage de la navigation. La plupart des marins, dit Chambers, paroissent cependant éloignés de s'en servir, & aiment mieux s'en tenir à leur vieille *carte plane*, qui est, comme on l'a vu, très-fautive.

Pour l'usage de la *carte plane* de Mercator dans la navigation, voyez NAVIGATION.

Carte du globe. C'est une projection qu'on nomme de la sorte à cause de la conformité qu'elle a avec le globe même, & qui a été proposée dans ces derniers temps par MM. Senex, Willon & Harris : les méridiens y sont inclinés, les parallèles à égales distances les uns des autres & courbes, & les rhumbs décrits font en spirales comme sur la surface du globe. Cette projection est encore peu connue ; nous n'en pouvons dire que peu de chose, jusqu'à ce que sa construction & ses usages aient une plus grande publicité.

Cartes composées par rhumbs & distances. Ce sont celles où il n'y a ni méridiens ni parallèles, mais

qui ne montrent la situation des lieux que par rhumbs & par l'échelle des milles.

On s'en sert principalement en France, & surtout dans la Méditerranée.

On les trace sans beaucoup d'art, & il seroit par conséquent inutile de vouloir rendre un compte exact de la manière de les construire ; on ne s'en sert que dans de courts voyages. (O)

Les *cartes géographiques* les plus célèbres sont celles de Guillaume de l'île, premier géographe du roi de France, mort en 1726, de M. d'Anville, de M. Buache, de M. Robert de Vaugondy, de M. Bellin, celles de Homann à Nuremberg, les *cartes* gravées à la calcographie de Rome, les *cartes* marines de Hollande, celle de M. Bonne, &c.

CARTE hydrographique. L'invention des *cartes hydrographiques* est l'ouvrage du prince don Henri de Portugal. Il y avoit long-temps que celles de géographie étoient connues ; mais des *cartes* construites suivant le même principe eussent été inutiles dans la navigation. Le prince dont nous parlons & ses mathématiciens prêtèrent, par les raisons qu'on verra bientôt, de développer la surface du globe terrestre, en étendant les méridiens en lignes droites & parallèles entr'elles. Pour prendre une idée claire de ce développement, qu'on imagine que les parallèles du globe terrestre soient en même-temps flexibles & extensibles, & les méridiens seulement flexibles ; qu'on déploie ensuite toute la surface de ce globe, en étendant les méridiens en lignes droites & parallèles, on aura la surface terrestre développée en un rectangle, dont la longueur sera la circonférence de l'équateur, & la largeur celle d'un demi-méridien. Ce sont-là les premières *cartes* qu'employèrent les navigateurs, & qu'on nomme *plates*, parce qu'elles sont en quelque sorte formées de la surface du globe aplatie.

Le motif pour lequel on s'est abstenu de désigner les méridiens par les lignes droites & parallèles, est celui-ci : c'étoit afin que la trace du vaisseau qui auroit parcouru un certain rhumb de vent, pût se marquer dans la *carte* par une ligne droite ; car s'ils eussent été inclinés les uns les autres, ou des lignes courbes comme dans les *cartes* ordinaires de géographie, cette trace n'auroit pu être qu'une ligne courbe : ce qui n'auroit point répondu à l'intention du navigateur.

Mais il y a dans ces sortes de *cartes* deux inconvénients ; l'un consiste en ce que la proposition des degrés des parallèles & de ceux des méridiens n'y est point conservée. Ils y sont représentés comme égaux, quoiqu'ils soient réellement d'autant plus inégaux, qu'on approche davantage du pôle.

C'est-là le défaut que Ptolémée reprochoit dans sa *Géographie*, aux *cartes* de Marin de Tyr, qui étoient précisément comme celles qu'on vient de décrire. De-là naît une erreur sur l'estime du chemin, qui paroît plus grand qu'il n'est réellement dans tous les rhumbs obliques, & dans ceux d'est

d'est & d'ouest. A la vérité, les navigateurs ont des méthodes pour prévenir cette erreur; mais les réductions qu'ils pratiquent, à moins qu'il n'y ait pas une grande différence en latitude, sont ou peu exactes ou fort laborieuses.

Le second & le plus essentiel défaut des cartes plates, est que le rhumb qu'elles indiquent, en tirant une ligne d'un lieu à un autre, n'est point le véritable, excepté lorsque ces lieux sont sous le même méridien ou le même parallèle. Je m'étonne que cette erreur ait échappé à la plupart des auteurs de navigation; car lorsqu'ils veulent enseigner le rhumb de vent convenable pour aller d'un lieu à un autre, ils ordonnent de les joindre par une ligne droite, & d'examiner à quel rhumb de la rose des vents cette ligne est parallèle, on quel angle elle fait avec les méridiens. Il est cependant facile de se convaincre que cet angle n'est point celui du véritable rhumb. Il suffit pour cela de faire attention que le rapport des degrés du méridien & des parallèles n'étant point conservé, les deux côtés du triangle rectangle qui déterminent l'angle du rhumb, ne sont point dans leur vrai rapport; ainsi, l'angle qu'on trouve par ce moyen ne sauroit être le véritable. On peut encore le montrer par un exemple fort simple: nous supposons deux lieux, l'un sous l'équateur & le premier méridien, l'autre à la latitude de 89 degrés, avec une longitude de 90 degrés. Il est visible que le véritable rhumb pour aller de l'un à l'autre, différerait à peine du méridien; cependant, si l'on cherchoit ce rhumb suivant la méthode précédente, on trouveroit un angle presque demi-droit. L'angle qu'indiquent les cartes plates est donc faux. Heureusement les navigateurs ne cherchent jamais à faire des courtes ailli considérables en suivant un seul rhumb. Les divers obstacles qu'ils rencontrent en mer, comme les côtes, les endroits dangereux par les bancs ou les écueils, les obligent de partager leur route en une multitude de petites portions. C'est par cette raison que l'erreur que nous venons de relever leur a échappé; car elle est d'autant moindre, que la distance est moins considérable; & il leur est d'ailleurs familier d'attribuer aux courans, à la dérive, &c., la plupart de celles qu'ils commettent dans leur estime, quoiqu'il y en ait parmi elles, qui sont, comme celle-ci, des erreurs de théorie.

On remarquoit, dès le milieu du seizième siècle, le premier des défauts dont je viens de parler, & l'on semoit dès-lors la nécessité de chercher quelque autre manière de représenter la surface du globe terrestre qui en fût exempte. Mercator, fameux géographe des Pays-Bas, en donna la première idée, en remarquant qu'il faudroit étendre les degrés des méridiens, d'autant plus qu'on s'éloigneroit davantage de l'équateur; mais il s'en tint là, & il ne parut pas avoir connu la loi de cette augmentation. Edouard Wrigth la dévoila le premier, & il montra qu'en supposant le méridien

Mathématiques, Tome 1, 1^{re} Partie.

divisé en petites parties, par exemple, de dix en dix minutes, il falloit que ces petites parties fussent de plus en plus grandes en s'éloignant de l'équateur dans le même rapport que les sécantes de leur latitude. Ceci mérite d'être développé: voici le raisonnement par lequel on a découvert ce rapport.

Puisque le degré des parallèles qui décroît réellement est toujours représenté par la même ligne, si l'on veut conserver le rapport du degré du méridien avec celui du parallèle adjacent, il faut augmenter celui du méridien en même raison que l'autre décroît. Mais on sait que le degré du parallèle décroît comme le cosinus de la latitude, c'est-à-dire, qu'un degré d'un parallèle quelconque est à celui du méridien ou de l'équateur, comme le cosinus de la latitude au sinus total. D'un autre côté, le cosinus d'un arc est au sinus total, comme celui-ci à la sécante: il faudroit donc que chaque petite partie du méridien, comprise entre deux parallèles très-voisins, soit à la partie semblable de l'équateur, comme la sécante de la latitude au sinus total; & par exemple, le degré compris entre les parallèles qui passent par les 30 & 31 degrés de latitude, sera au degré de l'équateur, comme la somme des sécantes des petites parties dans lesquelles on aura divisé ce degré, à autant de fois le rayon. Si donc on additionne continuellement les sécantes de minute en minute, par exemple, jusqu'à un certain parallèle, cette somme des sécantes représentera la distance de ce parallèle à l'équateur, dans les cartes réduites, sans erreur sensible. Wrigth publia cette invention en 1599; dans un livre imprimé à Londres. Dans cet ouvrage, Wrigth calcule l'accroissement des parties du méridien par l'addition continue des sécantes de dix en dix minutes. Cela est à-peu-près suffisant dans la pratique de la navigation; mais les géomètres qui ne se contentent pas d'approximations, quand ils peuvent atteindre à l'exactitude rigoureuse, ont depuis recherché le rapport précis de cet accroissement. Pour cela, ils ont supposé, en suivant les traces du raisonnement de Wrigth, que le méridien fût divisé en parties infiniment petites; & ils ont démontré que cette somme des sécantes infinies en nombre, comprises entre l'équateur & un parallèle quelconque, suit le rapport du logarithme de la tangente du demi-complément de la latitude de ce parallèle. On a dressé sur ce principe des tables plus exactes de l'accroissement des parties du méridien, pour guider les constructeurs des cartes hydrographiques. On trouve ces cartes dans divers traités modernes de navigation, comme ceux de M. Bouguer, de M. Robertson, &c.

Cette sorte de cartes remplit parfaitement toutes les vues des navigateurs. A la vérité, les parties de la terre y sont représentées toujours en croissant du côté des pôles, & d'une manière tout-à-fait disforme; mais cela importe peu, pourvu

P p

qu'elles fournissent un moyen facile & sûr de se guider dans sa route. Or c'est l'avantage propre aux *cartes* dont nous parlons. Les rhumbs de vent-y sont représentés comme dans les premières par des lignes droites, & ces lignes indiquent, par l'angle qu'elles forment avec le méridien, le véritable angle du rhumb. On a enfin sur ces lignes la vraie distance des lieux ou la longueur du chemin parcouru, pourvu que pour les mesurer, on se serve de l'arc du méridien compris entre les mêmes parallèles; comme d'échelle; & ce qui donne une solution en même-temps aisée & exacte de tous les problèmes de navigation. On nomme ces cartes, *cartes réduites*, ou *par latitude croissante*. Elles commencèrent à s'introduire chez les navigateurs vers l'an 1630; & ce furent, suivant le P. Fournier, des pilotes Dieppois qui en firent usage les premiers. Quoi qu'il en soit, ce sont, sans contredit, les meilleures; nous dirons plus, les seules bonnes pour des navigations de long cours; & il seroit à désirer que ce fussent les seules qu'on vît entre les mains des navigateurs. (+)

CARTE itinéraire. (*Géogr.*) L'étendue des conquêtes des Romains, & la distance où étoient de l'Italie les pays dans lesquels on envoyoit des armées, dont les marches devoient être réglées d'avance, firent sentir la nécessité d'avoir des *cartes itinéraires*, sur lesquelles les stations des troupes & la distance d'une station à l'autre, pussent être marquées distinctement. Nous voyons par plusieurs passages de Pline, que sur les *cartes itinéraires* d'Agrippa, on marquoit les distances avec une précision assez grande pour rendre sensible la différence de quelques milles, qui se trouvoit entre la mesure d'un pays donnée par les géographes Grecs, & celle qu'en donnoient ces *cartes*. Sous les empereurs, on distribuoit de semblables *cartes* aux généraux que l'on envoyoit en expédition, aux magistrats chargés de régler la marche des troupes, & même à ceux qui avoient l'inspection des voitures publiques.

Les copies des ces *cartes*, distribuées aux généraux & aux magistrats, ne contenoient qu'un pays particulier; & l'usage que l'on faisoit de ces copies obligeant à les renouveler continuellement, il est visible que l'on en devoit conserver des prototypes ou des originaux. M. Fréret croit que la géographie de l'anonyme des Ravennais, écrite après la destruction de l'empire d'occident, a été manifestement composée sur une semblable *carte itinéraire*, de laquelle l'auteur avoit copié les routes, mais en omettant les distances. On doit conclure de-là, selon M. Fréret, qu'il s'étoit conservé quelques copies de ces *cartes itinéraires* dans les bibliothèques, même après la destruction de l'empire d'occident; cependant il n'est fait aucune mention de ces *cartes itinéraires* dans les écrivains du moyen âge. (+)

CARTES célestes (*Astron.*) sont celles dans les-

quelles on représente les constellations, & les étoiles qui les composent. Le plus bel ouvrage que l'on ait en ce genre, est l'*Atlas céleste*, gravé à Londres, en 1729, en 28 feuilles, d'après le grand *Catalogue britannique* de Flamsteed. Ce sont ces figures que les astronomes suivent toujours, excepté pour les constellations australes de l'abbé de la Caille; elles coûtent à Londres deux guinées. On en trouve une réduction in-4° à Paris chez Fortin, qui est très-suffisante pour l'usage; & M. Bode en a donné une à Berlin, qui est faite avec beaucoup de soin en 1781.

On supplée aussi à ce grand ouvrage par le moyen des planisphères publiés à Paris, en 1764, par M. Robert de Vaugondy, de ceux du P. Chrysologue de Gy, capucin, ou des deux planisphères gravés à Londres par Senex; ils font en deux feuilles chacun. L'un y trouve aussi toutes les constellations & toutes les étoiles du *Catalogue britannique*, placées, dans l'un, suivant les longitudes & les latitudes; dans l'autre, suivant les ascensions droites & les déclinaisons. Les planisphères de Senex coûtent trois schillings, c'est-à-dire trois livres dix sols la feuille, à Londres; il suffit d'avoir ou les deux feuilles projetées sur l'équateur, ou les deux feuilles projetées sur l'écliptique. Celui de M. de Vaugondy a l'avantage de renfermer les constellations nouvelles du pôle austral; mais il est gravé à contre-sens des autres, & représente la convexité du globe céleste, au lieu de sa concavité. Celui du P. Chrysologue renferme aussi une partie des nouvelles constellations.

Parmi les ouvrages plus anciens, dont on peut aussi tirer avantage pour connoître les constellations, il y a, 1.° l'*Uranométrie* de Bayer, dont nous avons deux éditions; la première parut en 1603, à Augsbourg, en 15 feuilles; 2.° les *cartes* du P. Pardies, jointes, en six feuilles, publiées en 1673; 3.° les quatre *cartes* du ciel, d'Augustin Royer, imprimées en 1679; 4.° celles d'Hévélius, contenues dans un ouvrage assez rare, qui parut à Dantzick en 1690, intitulé : *Firmamentum Sobiescianum*, en 54 feuilles.

De toutes les *cartes célestes*, celle dont les astronomes font le plus d'usage, est la *carte* qui représente le zodiaque, & dans laquelle on voit toute la zone céleste qui environne l'écliptique, avec 8 degrés de chaque côté de l'écliptique. Nous avons deux fort bons *zodiaques*; celui qui fut dessiné & gravé par Jean Senex, de la société royale de Londres, sur la fin du siècle dernier, en deux grandes feuilles, sous les yeux de Halley; & celui qui a été gravé en France par Dheulland, & publié vers l'an 1755; celui-ci avoit été entrepris dès l'année 1741 par M. le Monnier, & exécuté par d'Heulland, graveur; il est accompagné d'un catalogue gravé en 30 pages, de toutes les étoiles zodiacales, dont Flamsteed avoit donné les longitudes pour 1690; ces longitudes ont été réduites à 1755. Ce *zodiaque* se trouve chez

Dezauche, géographe de la Marine, rue des Noyers.

Ce *zodiaque françois* n'est qu'en une feuille, parce qu'on l'a gravé sur une plus petite échelle & sur une plus grande planche que celui de Senex, cela n'empêche pas qu'il ne soit aussi commode que le *zodiaque anglois*; il a, même l'avantage de représenter les étoiles qui sont jusqu'à 10 degrés de latitude au nord & au sud de l'écliptique, au lieu que celui de Senex ne renfermoit que 8 degrés de latitude.

Au défaut des *cartes célestes*, on peut se servir des globes, pour reconnoître les constellations.

On trouve une différence remarquable entre les *cartes* de différents auteurs. Hévélius reproche à Bayer d'avoir représenté sur les *cartes*, le ciel tel que nous le voyons, étant placés comme nous le sommes au dedans de la sphère, au lieu que les anciens le représentoient comme on le voit par dehors sur la convexité des globes célestes, ou comme si l'on étoit au-dessus de la sphère étoilée. Hévélius se plaint de ce que, par ce changement de disposition, Bayer a fait que les étoiles qui sont à notre droite quand on regarde le globe, sont à notre gauche en regardant les *cartes célestes* de Bayer, *Hévélius Firmamentum Sobieski*. Mais les astronomes n'ont point adopté à cet égard le sentiment d'Hévélius; ils aiment mieux, ce me semble, les *cartes célestes* sur lesquelles on voit la concavité du ciel, que ces globes où l'on ne voit que la convexité, & pour lesquels il faut se retourner en idée autrement que quand on regarde le ciel; cela me paroit beaucoup plus commode pour le spectateur: cependant il y en a qui veulent encore représenter les constellations à l'envers, & mettre l'occident à la droite, entr'autres, M. Robert de Vaugondy, dans le *Planisphere* qu'il a publié en 1764.

Il se trouve encore une différence entre les *cartes célestes* de divers auteurs. Schikardus (*in Astroscopia*, pag. 39,) reprocha le premier à Bayer, que la plupart de ses figures étoient retournées de droite à gauche, par rapport aux anciens catalogues, ce qui produisoit une différence entre les dénominations anciennes des parties droites ou gauches, & celles de Bayer; Flamsteed a eu raison, ce me semble, de corriger Bayer en cela, comme il l'a fait, du moins pour certaines constellations; car il a laissé Orion tel que Bayer l'avoit mis.

Il en est de même d'Hévélius, qui a voulu s'en tenir aux anciens. La constellation d'Orion qui, dans les *cartes* de Bayer & de Flamsteed, est tournée vers le ciel ou vers le haut de la sphère, regarde au contraire le centre du globe dans celles d'Hévélius; l'épaule orientale a est dans Bayer & Flamsteed l'épaule gauche; dans Hévélius, comme dans les anciens, c'est l'épaule droite; l'étoile β , ou *rigel*, qui est sur le pied droit dans Bayer, est sur le pied gauche dans Hévélius; dans l'un, ce

giant paroit à genoux, & élevant le pied droit; dans l'autre, il semble monter en levant le pied gauche; dans Bayer, il tient sa massue élevée à l'orient de la main gauche; dans Hévélius, il la tient de la main droite; toutes ces différences font voir la nécessité des lettres par lesquelles on est convenu de désigner les étoiles, & l'inconvénient qu'il y auroit à se servir dans les catalogues des mots de droite & de gauche; il vaut beaucoup mieux se servir des mots *oriental* & *occidental*. En effet, quoique Flamsteed ait suivi en général les *cartes* de Bayer, il y a cependant encore des différences; par exemple, Orion, dans les *cartes* de Bayer, a la tête tournée à gauche; dans celle de Flamsteed, il l'a tournée du côté droit, en sorte que les étoiles α & γ , qui sont à la tempe gauche dans Bayer, sont sur la tempe droite dans Flamsteed. Voyez l'explication de mon globe céleste, à Paris chez Lattre. (D. L.)

CARTE MILITAIRE, (Géograph.) est la carte particulière d'un pays ou d'une portion de pays, ou d'une frontière, ou des environs d'une place, d'un poste, sur laquelle sont exprimés tous les objets qu'il est essentiel de connoître pour former & exécuter un projet de campagne. On y voit les marches qu'une armée peut faire, les lieux où elle peut camper, les divers postes qu'elle doit occuper; les défilés & leur longueur; les rivières, les ruisseaux, leur largeur, leur profondeur, les gués, la nature du fonds, la hauteur des bords, les ponts, les passages, les moulins, les canaux, les étangs; les villages, les hameaux, les châteaux, les métairies & autres lieux qui sont bons à occuper; les montagnes, leur hauteur, leur pente, leurs escarpemens; les vallons, les ravins, leur largeur, leur profondeur; les fossés, les champs clos, les bois les marais; la nature des plaines, les cantons de fourrages; la distance d'un lieu à un autre, le nombre des maisons & écuries de chaque lieu, les différents chemins, leur qualité, &c. Si la carte représente quelque partie de mer, on y distingue la nature de la côte, les hauteurs de haute & de basse mer, de morte-eau comme de vive-eau; les fondes des anes, des haies, des rades; les dangers de toute espèce, les différents batteries établies pour la descente des mouillages, des passes; les retranchemens, les épaulemens pratiqués dans les parties où l'ennemi peut tenter une descente; les camps, les postes qui doivent couvrir les principaux établissemens & l'intérieur du pays, &c. Tous ces détails peuvent être compris dans une *carte militaire*, & à l'aide d'une légende ou d'un mémoire, se faire sentir aisément; mais il y a très-peu de gens capables d'un tel travail: il n'y en a pourtant pas de plus important pour pouvoir régler & conduire les opérations d'une campagne. On ne sauroit donc former trop de sujets pour une partie si profonde & si essentielle. C'est aussi dans cette vue que notre ministère n'a pas discontinué depuis la paix d'employer des

officiers de l'état-major de l'armée, avec des ingénieurs-géographes, sur les frontières & sur les côtes du royaume.

L'usage des *cartes militaires* étoit connu des anciens; Végèce ne nous laisse aucun doute à cet égard. « Un général, dit cet auteur, doit avoir des tables dressées avec exactitude, qui lui marquent non-seulement la distance des lieux par le nombre de pas, mais la qualité des chemins, les routes qui abrègent, les logements qui s'y trouvent, les montagnes & les rivières. On assure que les plus habiles généraux, non contents de ces simples mémoires, ont fait lever les plans du théâtre de la guerre, afin de déterminer plus sûrement leur marche sur le tableau même des lieux. » On ne fait si ces plans étoient aussi parfaits que nos *cartes topographiques*, mais au moins devoient-ils donner beaucoup de facilités aux généraux pour leurs opérations.

Nous avons aujourd'hui un grand nombre de *cartes* qui, quoiqu'elles ne contiennent pas, à beaucoup près, tous les détails nécessaires, ne laissent pas de pouvoir être très-utiles à un officier qui seroit chargé de reconnaître un pays, ou qui l'entreprendroit pour son instruction: telles sont celles de la France, dressées par MM. de l'Académie royale des Sciences; celles des pays-bas, par Fricx; celles du théâtre de la guerre dernière en Hesse & pays circonvoisins, par M. de la Rozière, copiées à Paris par les géographes Baurain, & Julien; celles des campagnes de M. le prince Ferdinand de Brunswick, en Westphalie, par le colonel Bawr, maréchal-général des logis de l'armée Hanovrienne; celles de la Bavière, par Finck; celles de la Prusse, par le major Muller, & quantité d'autres *cartes* particulières de différents pays de l'Allemagne, publiées à Nuremberg, à Augsbourg, à Berlin; celles du théâtre de la guerre en Italie, par les ingénieurs du prince Eugène; celles de la Savoie & du Piémont, publiées par Jaillot, &c.

La plupart des *cartes* qu'on vient d'indiquer, ayant été levées géométriquement, peuvent servir à confirmer des *cartes militaires*; en faisant d'avance des extraits des campagnes qui auront été faites dans les pays qu'elles représentent, en dessinant sur une plus grande échelle les parties des pays qu'on devra reconnaître, en cherchant les lieux élevés pour mieux découvrir le terrain, en questionnant les gens de la campagne, en parcourant le pays de tout sens, & en voyant par soi-même tous les objets qui méritent attention.

Lorsqu'on n'a point de *cartes* particulières, qu'on n'a pas le tems d'en lever, ou que l'occasion ne permet pas d'opérer, on a recours aux *cartes générales*. On y prend les positions qui paroissent le mieux déterminées; on les trace à grand point sur des feuilles séparées, & on fait une *carte à vue* qu'on accompagne d'un mémoire. Il n'y a point d'officier d'état-major qui ne doive savoir

cette méthode, qui est on ne peut pas plus nécessaire, sur-tout en campagne. (M. D. L. R.)

* CARTE MILITAIRE, *Reconnaissance militaire*. La connoissance généralisée d'un pays suffit pour calculer les avantages des principales positions qu'il offre à une armée, & pour déterminer d'avance celles qui répondent le mieux aux projets qu'elle peut méditer; mais quand il est question des opérations successives des troupes, de l'ouverture des marches, de l'emplacement des camps, de la sûreté des communications & de tous les objets quelconques subordonnés à la nature du terrain, c'est par des *cartes militaires* que l'on parvient à éclairer ses mouvements. Ces *cartes* sont levées dans un plus ou moins grand détail, suivant que le tems a pu le permettre, & que les circonstances l'ont exigé. Lorsque, pendant la paix, on leve le plan d'une frontière ou d'une partie de côte, à l'effet de rechercher quels moyens de défense la nature particulière du local peut présenter pour pouvoir en faire l'application au besoin, il est évident que ce travail peut & doit être exécuté dans le plus grand détail & avec l'exactitude la plus scrupuleuse; mais lorsque dans le tumulte de la guerre, sous les yeux même de l'ennemi, il s'agit de rendre compte d'un pays ou il faut tout de suite faire mouvoir, manœuvrer une nombreuse armée, l'établir dans un camp ou dans des quartiers; c'est par le moyen d'une *carte* figurée à vue avec la plus grande célérité, & d'un mémoire qui instruit des choses que le dessin seul ne peut rendre intelligibles, qu'on parvient à remplir cet objet important. C'est à ce genre d'ouvrage qu'on donne particulièrement le nom de *reconnaissance militaire*. A la manière dont il est exécuté, on distingue l'intelligence & la sagacité de l'officier qui en est chargé; s'il est doué du talent de bien discerner quels éclaircissements particuliers exigent le besoin du moment, il se gardera de s'appesantir sur des détails dont la connoissance est inutile pour concourir au but que l'on se propose, & d'employer à cela un tems d'autant plus précieux qu'il est alors limité. Une expérience plus ou moins éclairée l'instruit à pénétrer dans les vues du général, & son travail ne porte que sur des objets qu'il est absolument nécessaire de savoir.

Il résulte de ce que l'on vient d'avancer qu'il y a deux espèces de *cartes militaires*, savoir celles qui sont levées géométriquement & à l'aide des instrumens utiles pour cela, & celles qui sont simplement faites à vue, auxquelles appartient proprement le nom de *reconnaissance*. Entre ces deux espèces, on peut cependant en considérer une troisième, qui se rapproche plus ou moins de l'une ou de l'autre; telle seroit une *carte* dont les principaux points seroient calculés ou arrêtés à la planchette, d'après une base exactement mesurée, & dont tout le détail auroit été rempli à vue. Ces différents genres de plans topogra-

phiques ont cela de commun, qu'ils exigent de la part des personnes qui s'en occupent, une grande facilité de figurer le terrain, laquelle ne s'acquiert que par l'usage.

L'article *levée des plans topographiques* dans lequel on considère l'art de lever des plans d'une manière générale & applicable à toute sorte d'objets, indique les procédés les plus simples & les plus expéditifs pour dresser des cartes de toutes les différentes espèces dont on vient de faire mention; on y renvoie le lecteur. Mais comme l'usage le plus répété que l'on fasse aujourd'hui de cet art, est sans contredit pour le service des armées, sur-tout depuis que la défense des frontières est moins appuyée sur la multiplicité des places fortes, que sur les ressources d'une tactique habile & approfondie; on va rechercher dans cet article quelles sont les connoissances qu'un officier doit joindre à l'art de figurer les terrains, & examiner de quelle nature il faut que soient les comptes détaillés qui doivent accompagner une *carte* ou une *reconnaissance*.

Il y a encore des éclaircissements accessoirs, lesquels qu'on point un rapport immédiat avec la guerre, & qu'on pourroit rassembler dans un mémoire particulier, lorsque l'on est chargé en tems de paix de lever une *carte militaire*; on terminera cet article par en faire une exposition succincte.

Tout officier qui se destine à ce genre de travail, doit réunir aux études particulières qu'il exige, une théorie assez étendue sur la guerre, pour donner à ses talens leur juste application, & les élever à leur vrai point d'utilité. Plus il est en état de pénétrer dans les motifs d'un général; plus ses opérations deviennent essentielles aux entreprises que l'on se propose. Il ajoute à ses figures plus ou moins rapides, des observations lumineuses qui développent tout ce qu'il n'a pu exprimer, & ses rendemens de vive voix complètent l'instruction qu'on a droit d'attendre de lui.

Celui qui ne fait que représenter un terrain, est un ouvrier mécanique dont on ne peut interroger que les plans; celui qui n'a que l'art de composer un mémoire, n'offre que des détails isolés, qui donnent difficilement une idée claire de l'ensemble; il faut nécessairement la réunion de l'un & l'autre moyen pour remplir avec succès l'objet d'une *reconnaissance militaire*.

L'habitude de juger le terrain militairement, est le fruit de réflexions plus complètes que l'on ne pense; il faut le voir en géomètre pour en évaluer l'étendue; il faut le voir en tacticien, pour y appliquer les mouvemens d'une armée, en raison des formes qu'il présente; il faut le voir en mécanicien, pour y découvrir à propos la possibilité de créer ou d'induire des obstacles.

La Théorie des fortifications, la science de l'artillerie, l'examen des différens ordres sur lesquels se forment les armées, l'analyse de

leurs rapports avec l'attaque & la défense, la combinaison des armes, des manœuvres & des circonstances; voilà les sources où l'on doit puiser, pour apprendre à évaluer d'une manière aussi prompte que sûre, tout le parti que l'on peut tirer d'un terrain.

Les écrits des Xénophon, des Polibe, des César, des Végèce, des Saxe, des Puységur, des Folard, des Feuquières & des auteurs modernes qui marchent sur leurs traces, présentent d'abondantes lumières à ceux qui veulent acquérir des connoissances militaires. L'industrie de l'homme, mise en action par les intérêts les plus grands, y fait voir & l'origine & les effets de ces ressources ingénieuses qu'elle fait joindre à la nature pour en multiplier les forces. La raison s'y trouve guidée par l'expérience de tous les tems, & elle s'approprie sans effort des vérités que la pratique ne découvre jamais ou qu'elle achète par des erreurs sans nombre.

Il ne suit point de-là que l'art de rendre compte d'un pays exige que l'on s'appesantisse minutieusement sur les détails de toutes les parties de la guerre; on ne doit les approfondir que d'une manière relative au besoin que l'on en peut avoir; on les généralise & l'on en extrait, pour ainsi dire, l'esprit essentiel qui appartient à la carrière que l'on embrasse.

Ce n'est point du simple exercice des armes, ou du talent de rompre de petits corps de troupes dans tous les sens possibles que l'on s'occupera principalement; c'est de la grande tactique; c'est de l'art de disposer une armée & de la faire manœuvrer de la manière la plus favorable à l'effet que l'on veut produire. On évitera avec soin l'adoption exclusive de ces systèmes, qui plient tous les terrains à leurs méthodes & à leurs organisations particulières; on appréciera chaque ordre d'après ses avantages & ses inconvéniens absolus & relatifs, & l'on parviendra à se convaincre que leur degré de supériorité dépend du moment, du local & d'une infinité d'autres données, que l'habitude de juger fait seule saisir avec justesse. Il est nécessaire de bien connoître les différentes manières de former & de déployer les colonnes, ainsi que la composition actuelle des régimens, bataillons, escadrons, &c., & l'étendue de ces corps en bataille. C'est en s'exerçant à représenter sur le papier les mouvemens combinés de ces différens masses, que l'on s'accoutume à tracer des tableaux exacts & intelligens des opérations des armées.

Soit que l'on travaille, à la guerre ou pendant la paix, à faire des *reconnaissances militaires*, ce sont toujours les mêmes vues qui doivent diriger dans les mémoires intrinsèques que l'on y joint; on suppose en tems de paix ce qu'exige quand les armées sont rassemblées, & l'on raisonne en conséquence de ces suppositions, pour bien faire connoître toutes les ressources dont chaque lieu est

susceptible. Les détails dans lesquels nous allons entrer, appartiennent donc à tous les momens, & l'on y trouvera ce que chaque circonstance particulière peut exiger.

Les eaux & les montagnes sont les objets toujours subsistans que la nature oppose à l'attaque pour favoriser la défense; l'art qui agit plus ou moins sur ces deux obstacles, dispose absolument de tous les autres.

Les moyens que présentent les alpes & les pyramides pour s'y maintenir, sont fort différens de ceux que fournissent les vastes plaines de la Flandre. Là des chaînes entièrement escarpées forment des murs impénétrables, dont les points accessibles sont toujours disputés au moyen de très-peu de troupes; ici les rivières & les canaux sont les principales barrières qu'une armée puisse opposer à l'ennemi. Il faut pour en empêcher le passage qu'elle calcule sa position & ses mouvemens sur l'étendue du front à défendre, sur la profondeur du lit, la largeur & l'escarpement de ses bords, sur l'épaisseur des haies & des bois adjacens, & enfin sur les stratagèmes que l'on peut employer pour lui faire prendre le change.

Ces deux manières de faire la guerre sont entièrement différenes, mais elles tiennent aux mêmes principes, & elles se réunissent plus ou moins l'un & l'autre à l'art des fortifications pour la défense de tous les pays.

C'est donc de la connoissance la plus exacte des lieux où l'on doit opérer, que dépend l'exécution d'un système quelconque de mouvemens. Il faut que celui qui est chargé de reconnoître, joigne à sa carte un mémoire local qui fasse mention de tout ce qui peut concerner les montagnes, les plaines, les rivières, les ruisseaux, les chemins, les villes, les châteaux, les moulins, &c., & qui indique les différens moyens dont on pourroit se servir pour augmenter leur degré d'avantages, ou pour affoiblir leurs inconvéniens.

On divise un mémoire en autant de chapitres qu'il y a d'espèce d'objets à parcourir; on expose ensuite quels sont les camps que pourroient occuper les armées, en faisant voir avec soin leurs ressources en tout genre, & l'on finit par un état des subsistances & des autres secours que peut fournir le pays dont on fait la description.

Comme les terrains que l'on a à reconnoître militairement en tems de paix sont toujours sur les côtes ou sur les frontières en première & seconde ligne, on peut, à la suite d'un mémoire local, supposer de la part de l'ennemi des entreprises sur les points qui sont les plus exposés à ses attaques. On fait valoir alors tout ce que le pays peut présenter d'obstacles, & on suit l'ennemi dans ses succès pour lui opposer à chaque pas de nouvelles difficultés. Cette manière de mettre en mouvement toutes les parties de son tableau, fait sentir la valeur des détails & réa-

pirule de la façon la plus instructive ce que l'on a dit en traitant de tous les objets en particulier.

Des Montagnes.

Lorsque l'on parlera de la nature des hautes montagnes, on distinguera les chaînes principales qui servent d'enceinte à un pays, des différens rameaux qui en descendent ou qui en favorisent les issues; on fera connoître les hauteurs relatives de toutes leurs parties, les rochers, les bois, les vallons que l'on y rencontre, & comme c'est à la naissance des vallons que se trouvent ces cols ou ports qui facilitent les moyens de les franchir; on s'attachera à en exprimer parfaitement les détails, & à mettre sous les yeux tout ce qui peut concourir à les protéger.

Si la suite de montagnes que l'on a à décrire est assez étendue pour que l'on s'occupe d'un plan de défense, on dira comment une armée pourroit s'y établir, quelles seroient ses communications, où elle seroit des abatis, sur quels points elle placeroit des redoutes, quels chemins elle auroit à détruire, & l'on exposeroit généralement toutes les ressources dont elle seroit à même de disposer pour se retrancher avec sûreté.

Le choix des positions dans les montagnes demande le coup d'œil le plus militaire; la moindre faute peut devenir irréparable quand on a à faire à un ennemi éclairé; il faut lui ôter toute possibilité de vous tourner, de vous forcer ou de vous renfermer; les obstacles sont fortement marqués, on doit seulement les saisir avec intelligence, & joindre l'art à la nature pour les fortifier particulièrement, & les lier à la ligne totale de défense.

Il sera fort essentiel encore, en imaginant le pays au pouvoir de l'ennemi, de faire connoître comment on pourroit parvenir à le traverser. Au sein des montagnes les plus escarpées, on découvre toujours quelques routes praticables, qui, au moyen d'attaques simulées sur d'autres points, peuvent servir au passage des troupes. Les guides ne remplacent jamais à cet égard les cartes & les mémoires; leur ignorance, leur imposture & leur manière de voir tout-à-fait étranger aux rapports militaires, exposent à une infinité de dangers, dont le moindre est toujours de voir échouer les projets.

Les montagnes qui ne sont que des plaines élevées, exigent des comptes aussi exacts & des observations peut-être plus judicieuses. Dans les premières, tout est caractérisé, la nature bien développée indique elle-même les moyens de défense; dans celle-ci, les traits beaucoup moins prononcés laissent bien plus à l'arbitraire, & la manière d'en profiter varie comme les degrés d'expérience. L'essentiel est d'exposer avec clarté tout ce qui est contenu dans les différentes masses entourées par des rivières, des ruisseaux ou d'autres obstacles,

de décrire les vallons qu'elles forment, les plaines qu'elles renferment, & de bien faire connaître les rapports qui les lient les unes aux autres, & tous les détails qui leur servent d'issues. Les avantages de chaque portion de terrain, outre sa force absolue, dépendent beaucoup de tout ce qui l'avoiisine, & c'est dans le système supposé des mouvements de l'ennemi, que l'on fait encore mieux finir toutes ces relations.

Des Eaux.

La largeur des rivières & des ruisseaux, leur rapidité, leur profondeur, leur fond vaseux ou couvert de graviers, les différentes hauteurs de leurs rives, les tems de leurs crues & les changements de toutes ces données dans l'étendue de leur cours : voilà les premiers objets de l'article des eaux. On y détaillera avec soin les endroits où elles sont guéables, la quantité de bateaux que l'on peut y trouver, la solidité des ponts qui les traversent, les parties où l'on pourroit en jeter de nouveaux, & le genre de travaux que l'on pourroit faire pour conserver ces communications. Les villes, les villages, les châteaux, les moulins, les écluses, les bois, les haies, &c. qui appartiennent à une rivière ou à ses bords, doivent être décrits avec la plus grande exactitude, ou récapitulés avec des renvois aux articles dans lesquels il en est fait mention. La nature des lacs & des terrains marécageux, les moyens de les dessécher, s'ils en sont susceptibles, la manière d'arrêter des inondations, ou de les occasionner, l'ordre des écluses dont on se sert pour naviguer sur les canaux, tous ces détails méritent, ainsi que beaucoup d'autres, la plus grande attention, & c'est à celui qui reconnoît à réunir tous les renseignements utiles qui appartiennent à son travail.

Une carte bien levée & un mémoire qui calcule avec précision le fort & le faible de tout ce qui concerne une rivière, mettent à même de juger de ce qu'il faut faire pour en empêcher le passage; on sera le maître cependant de supposer des entreprises sur leurs points les plus intéressans, & de s'exercer à déployer tous les efforts & toutes les règles qu'un ennemi peut tenir contre un corps de troupes destiné à les défendre. Cette méthode d'analyser ainsi tous les obstacles en les menaçant tous également, & en mettant en œuvre tous les moyens capables de les forcer, oblige de planer sur leur ensemble, & accommode à voir les objets de la manière la plus militaire.

Des Villes.

On a environné les villes de murs pour se soustraire à des tentatives imprévues; on a élevé des remparts pour se créer des asyles contre les entreprises soutennues d'un ennemi; l'expérience a disposé leurs contours en parties saillantes &

rétrantes, pour qu'elles se défendent mutuellement, & le besoin de s'opposer à de nouvelles armées a développé les ressources d'un art qui n'a de bornes que celles du génie. Le mérite d'une simple enceinte, quand la ville est bien située, est de servir de poste & de retarder quelque tems les efforts des assaillans, pour donner le moyen de lui préparer de nouveaux obstacles. La destination d'une place de guerre est toujours la résistance d'un petit nombre d'hommes contre les attaques d'un plus grand nombre & de couvrir par sa situation une étendue déterminée de pays. C'est à celui qui fait un mémoire local & militaire à examiner ce que l'on doit attendre de chaque ville en particulier, & si elle répond aux vues qui ont dirigé son emplacement, & la construction des ouvrages qui la défendent. Une juste évaluation de la bonté primitive de ses parties, ainsi que l'exposition détaillée de leur état actuel, mettent à même de juger de son degré de force réelle, & des changements ou réparations qu'il y auroit à faire pour en augmenter la défense. On se rappellera dans ces examens, que le vrai but des fortifications est de compenser ce qui manque à la quantité de bras, & l'on ne présentera point de ces projets qui supposent des armées entières pour défendre une ville de guerre. Il est inutile de se renfermer si l'on est en état de tenir la campagne, & l'art des savantes manœuvres, du choix des positions, l'emporte de beaucoup sur l'art de hérifier la terre de bastions, & d'enchaîner des armées pour les rendre absolument passives.

Des Villages.

Après avoir traité des villes & donné leur description, sans la surcharger de ces détails qui sont nécessairement connus, lorsqu'elles nous appartiennent, on fera voir tout ce que les villages, les haies qui les couvrent, les murs qui entourent leurs jardins, & les grandes fermes qui s'y renferment peuvent présenter d'intéressant. Souvent un seul cimetière devient, par sa position, par son enceinte & par le secours de l'art, un ouvrage de fortification où l'on peut se défendre avec beaucoup d'avantage. Chaque local particulier a des moyens de défense qui lui appartiennent, & qu'il faut avoir l'art d'appréhender & le soin d'indiquer. Des chariots placés à propos, des abatis de bois bien disposés servent quelquefois à disputer long-tems un terrain qui eût été emporté tout de suite.

A cet article on ajoutera un détail complet des châteaux forts & des maisons isolées, environnées de fossés & de murs, qui sont répandus dans la campagne, & l'on mettra à portée de juger de la valeur de tous les postes en ce genre que peut offrir un pays.

Des Chemins.

Il ne suffit pas de présenter les difficultés de

une espèce dont chaque lieu peut être susceptible, la connoissance exacte des communications & du tems que l'on emploie à les parcourir, est indispensable à un général pour combiner les mouvemens des troupes. On donnera donc un état circonstancié de toutes les chaussées que l'on aura reconnues, des chemins intermédiaires qui pourroient être intéressans par les points essentiels où ils conduisent, & des chemins en corniches ou en tourniquets qui le trouvent dans les montagnes. Les suites de hauteurs qui bordent une route, ont des relations avec elle qu'il est nécessaire d'exposer; il faut savoir si elle est commandée par la campagne ou si elle la commande elle-même; enfin la largeur, les encaiffemens, les pas dangereux, les réparations à faire aux ponts pour le transport de l'artillerie, sont autant de détails qu'il ne faut point omettre.

Pour faire marcher une armée d'un lieu à un autre, il n'y a souvent qu'un seul chemin, & l'on est obligé alors de reconnoître & d'ouvrir des passages aux différentes colonnes. Cet inconvénient doit être prévu, & d'après les suppositions de marche qui seront dictées par le local lui-même, on indiquera la trace des colonnes sur lesquelles l'armée pourroit se porter.

Lorsqu'il sera question sur la frontière ou sur la côte de pratiquer quelque nouvelle route, on examinera quelle doit être la direction pour qu'elle réponde aux vues du commerce sans présenter des issues trop favorables à l'ennemi, ou les moyens d'intercepter nos communications; on cherchera à la rendre la plus militaire possible, en la plaçant du côté où il seroit aisé de lui en ôter la disposition, & où l'on pourroit se l'approprier soi-même avec le plus d'avantage.

Des Bois & des Haies,

Les forêts, les bois & les haies qui couvrent la campagne sont des obstacles trop conséquens pour ne pas encastrer la nature. Des haies telles que celles de Bretagne & de Normandie sont seules autant de parapets d'un excellent profil, qui peuvent servir à dissiper le terrain pied-à-pied, & à ralentir singulièrement ou même rendre impossible la marche d'un ennemi; elles offrent en beaucoup d'endroits une suite de postes que l'on peut défendre avec très-peu de monde, car celui qui voudroit les forcer ne pouvant juger de la quantité d'hommes en état de lui résister, ne marche & n'attaque qu'avec incertitude, il redoute à chaque instant des surprises & la crainte de se voir taper la retraite l'oblige de se retirer; ou donne le tems aux troupes d'arriver & de tomber sur lui avec avantage. C'est sur-tout sur les côtes que l'on peut employer avec succès de semblables retranchemens. De simples paysans conduits avec intelligence, peu en arrière assez long-tems l'effort d'un ennemi pour rendre son attaque inutile, lui

faire manquer son entreprise, ou tout au moins laisser le loisir de rassembler contre lui des forces plus puissantes.

Il faut faire savoir si les bois sont fourrés ou s'ils sont clairs, quelle est l'espèce des arbres qui les composent, & dans quel sens on peut les traverser. Leur position, leur étendue & leur différence épaiscur décident ensemble la manière d'en faire usage. Ici ils offrent une barrière impénétrable en contrant des ruisseaux & des vallons; là ils servent à appuyer les ailes d'un camp & à en étendre le front; ailleurs leur proximité met à portée d'en employer les arbres à faire des abattis & des palissades pour augmenter la force d'un retranchement; par-tout ils fournissent à de petites troupes les moyens de se poster avantageusement pour attaquer à l'improviste, ou pour se défendre avec avantage contre des forces supérieures.

Des Côtes.

La description des côtes renferme une infinité d'objets, tous plus essentiels les uns que les autres; tantôt elles sont hérissées de rochers plats qui rendent leur abord plus ou moins dangereux; tantôt elles sont bordées de falaises qui en interdisent absolument l'accès. Quelques-unes de leurs parties, entièrement développées & découvertes, présentent la plus grande facilité pour la descente; d'autres, par leurs formes rentrantes, offrent des anfrs & des ports pour mettre les vaisseaux à l'abri des grands vents. L'art a profité des caps & des pointes pour y établir des forts ou de simples batteries qui flanquent les endroits accessibles. Les îles adjacentes sont devenues des ouvrages avancés qui servent de barrières aux tentatives de l'ennemi; tout présente dans une étendue un peu considérable de côtes, une variété d'accidens qui demande l'ordre le plus suivi & les notions les plus exactes, d'après ses propres observations & les rapports des marins éclairés. La nature des vents qui sont nécessaires pour l'entrée & la sortie des ports, ainsi que tous les avantages & inconvénients de chacun d'eux doivent être spécifiés. On expose tout ce qui caractérise les endroits accessibles & les tems de marée qui sont plus ou moins favorables à leur approche. On rend compte de l'état actuel de tous les forts qui protègent la côte, des batteries, des corps de garde & de toutes les pièces d'artillerie qui peuvent s'y trouver; on indique quels sont les lieux où l'on pourroit faire de nouvelles constructions d'une position plus resserrée aux parties qui sont à défendre; on recueille avec soin les différens projets qui ont été faits pour améliorer tel ou tel port, relativement à la guerre & au commerce, & pour le mettre à l'abri de toute insulte, soit du côté de la mer, soit du côté des terres. On en donne une analyse, & l'on conclut soi-même par l'exposé de ce que l'on croit le plus propre à remplir ces différentes

différentes vues; on calcule les forces que peuvent fournir dans un moment de surprise les canonniers gardes-côtes, en attendant que les troupes réglées se soient portées, s'il en est besoin, sur les points attaqués. Les effets que produisent les marées sur les rivières qui ont leur embouchure dans la mer, l'ordre & le tems des différens changemens qu'elles leur font éprouver, & l'influence qu'elles ont sur leur passage, exigent que l'on en rende un compte exact. Enfin mille autres détails qu'une rade, un chenal, un mouillage, &c., peuvent présenter à une vue exercée, & qu'une instruction aussi générale que la nôtre ne nous permet pas de parcourir, servent à compléter cet article, & à fonder d'une manière sûre le vrai système de défense, qui appartient à une partie de côtes quelconque.

Des Camps.

Dans un mémoire relatif à une *carte militaire*, il ne sera point question de traiter des camps, de faire mention de tous les emplacements que peut occuper une armée. On n'aura pour objet que de réunir le plus de lumières possibles sur ces positions essentielles que l'on peut prendre dans un pays, lorsqu'on y propose quelque entreprise, ou sur celles qui serviraient à en défendre l'entrée, en couvrant à-la-fois tous les endroits par où l'on tenteroit d'y pénétrer. Ce n'est donc que de ces deux sortes de camps que l'on aura à parler. Dans les premiers, tout doit être relatif aux points qu'il faut attaquer. On s'y établit pour observer les mouvemens de l'ennemi, on lui donne de la jalousie sur toutes les parties environnantes, & l'on profite de ses moindres fautes pour se porter en avant & opérer l'exécution de ses projets. Dans les seconds, tout se rapporte aux points qu'il faut défendre; on cherche, pour en protéger l'ensemble, à n'avoir que des cordes à parcourir, tandis que l'ennemi est obligé de décrire des arcs; on augmente les obstacles au front & des flancs par des bataillons & des retranchemens, & l'on se ménage une retraite assurée sur ses derrières, en cas que l'on fût près d'être tourné. Il est nécessaire dans les uns & dans les autres, de bien développer les moyens d'établir les subsistances & d'empêcher qu'elles ne soient interceptées. On emploie, autant qu'il est possible, les ruisseaux pour couvrir le front des camps, & les marais ou les bois impraticables pour en appuyer les ailes. La description la plus exacte doit par conséquent expliquer tout ce qui concerne ces différentes barrières, afin de mettre une armée à l'abri de toute surprise. Il faut faire savoir qu'elle est la profondeur d'un camp, quel est son champ de bataille, si les eaux dont on peut disposer sont d'une bonne qualité, & si elles ne sont point de nature à nuire. Aucune obscurité ne doit régner sur les notions que l'on donne, car c'est des bonnes positions & de l'art d'en tirer parti, que dépend le succès des

Mathématiques, Tome I, 1.^{re} Partie.

campagnes: toute erreur, à cet égard, est capable d'entraîner les plus grands inconvénients, & l'on ne sauroit mettre trop d'exactitude dans les reconnoissances que l'on en fait, & dans les comptes que l'on en rend.

Des productions du Pays.

Toutes les ressources qu'un pays peut offrir en grains, en vins, en bestiaux, en bois, en fourrages, &c., doivent être comprises dans un état clair & précis que l'on puisse consulter avec confiance; on y joindra le nombre d'habitans dont les bras peuvent être appliqués aux travaux de force, ainsi que la quantité de voitures & de bêtes de charge dont on seroit à même de disposer, & cet article terminera la partie locale du mémoire.

C'est à l'insouciance à créer le reste de l'ouvrage, elle appellera à son secours toutes les connoissances qui peuvent donner plus d'effort à sa marche; elle n'opposera point un ennemi faible & ignorant à un général éclairé, qui profiteroit à chaque moment de ses fautes; il en est des suppositions sur le papier comme des exercices d'un camp de manœuvres. On ne présente de vrais images de la guerre, qu'autant que les forces opposées combinent tous leurs mouvemens d'après les formes du terrain. L'ennemi n'aura de succès qu'en raison de sa supériorité, & ses avantages serviront à développer l'art qu'une résistance éclairée fait employer à transformer chaque objet en obstacles.

Des Quartiers d'hiver.

Les différens mémoires qui accompagnent une suite de portions de cartes, sont les études d'un tableau général, que l'on pourra tracer ensuite, pour former un système complet de défense, sur toute l'étendue d'une côte ou d'une frontière. C'est dans ce tableau qu'entrera naturellement, si l'on s'en occupe, l'examen de tout ce qui peut regarder l'établissement des quartiers d'hiver. On se rappellera, en exposant les moyens, qu'il doit y avoir des communications assurées entre tous les quartiers d'une armée, qu'ils ne doivent pas couvrir une trop grande étendue de pays, pour que les troupes soient à portée de se secourir réciproquement, & de se rassembler, s'il est possible sur un champ de bataille, avant que l'ennemi puisse tenter de les enlever séparément. Il faut déterminer les villes où l'on pourroit établir les magasins, & les fortifications qu'elles demanderoient pour éviter les surprises, & tenir avec sûreté pendant un certain nombre de jours contre les attaques les plus vives. Enfin on y donnera un état circonstancié des travaux à faire dans chaque quartier, & de tous les forts & autres ouvrages nécessaires à construire sur les rivières, les marais & autres obstacles qui intercepteroient les communications.

L'utilité qui résulte des travaux faits en tems de paix est certainement réelle sous le rapport des notions en tout genre que peuvent en recueillir les généraux, mais leur vrai point de vue doit être de former des sujets qui connoissent eux-mêmes tous les détails d'un pays, & qui acquièrent l'habitude de voir tous les terrains d'une manière militaire & avec la plus grande célérité possible.

La lenteur à la guerre est incompatible avec ce que l'on attend d'un officier chargé de reconnoître. Il ne s'agit pas de plaire par des dessins finis & des mémoires bien écrits, il est question d'éclaircir par des croquis rapides, & par des notes aussi simples que judicieuses. Il est donc essentiel de s'exercer souvent en ce genre de travail pour en contracter l'habitude, sans négliger cependant la perfection du dessin qui est la base des bonnes esquisse, comme celle des ouvrages achevés.

Des Langues.

Les langues étrangères, & sur-tout l'allemand, devroient faire partie de la masse des connoissances que l'on se propose d'acquérir en entrant dans cette carrière. Les yeux ne faillissent, pour ainsi dire, que la surface, & qu'un seul instant des objets; mais ces objets peuvent changer d'un moment à l'autre. C'est des gens du pays qu'on parvient à connoître ces succès. Eh ! comment les consulter & en tirer habilement ce que leur propre intérêt les engage souvent à cacher, si l'on ne peut le faire que par le secours d'un interprète ?

Tel est le cercle que la théorie & la pratique doivent tracer autour de chaque élève. L'étendue du rayon dépend de son application & de son aptitude. Nous n'avons considéré ses talens que relativement aux fonctions militaires qui appartiennent à son état; mais il ne faut point de-là que nous voulions fixer des bornes à l'effort dont ils sont susceptibles en tout autre sens. Nous nous permettrons même, avant de terminer cet article, de jeter un coup-d'œil sur les recherches aussi agréables qu'utiles, auxquelles il pourroit se livrer en mettant à profit les momens dont il jouiroit.

Des Travaux accessoires.

Rien ne l'empêcheroit, en tems de paix, de joindre, à ses travaux ordinaires, des mémoires particuliers sur tout ce que le commerce, la politique, les arts, la nature & les momens anciens pourroient lui offrir d'intéressant dans les pays où il seroit employé. La nécessité de parcourir successivement tous les points d'une surface, lui fait appervoir une infinité d'objets qui doivent échapper aux recherches rapides du voyageur & aux yeux rarement éclairés de l'habitant.

Le commerce soumettroit à ses observations le projet d'un canal de navigation, le choix de son emplacement, la direction d'une chaussée, l'établissement d'une manufacture, l'exploitation d'une

mine, l'amélioration de la culture, le dessèchement des marais, le défrichement des landes, & tous les moyens généralement quelconques qui peuvent concourir à augmenter son énergie.

La politique offriroit à ses jugemens les différens objets d'échanges que les puissances voisines seroient dans le cas de se proposer sur les frontières. Il détermineroit leur valeur absolue & les relations encore plus conséquentes qui les lient à la guerre & au commerce, & ses remarques mettroient à même de compenser avantageusement par des accessoires essentiels des pertes apparentes qui sembleroient n'appartenir qu'à une négligence de vérification.

Les arts lui apprendroient tout ce que peut l'industrie appliquée aux besoins de l'homme, & ils s'accoutumeroient à bien analyser l'organisation d'une machine utile, & à calculer si ses effets répondent à l'emploi des forces & du tems.

Quelle variété d'aspects lui présente la nature, & pour le récréer & pour l'instruire ! Il parcourt tour-à-tour les différentes espèces de métaux, de fossiles, de pierres, de terres, les propriétés particulières des eaux, les productions rares en tout genre, les inscriptions respectées par les tems; & en consignait toutes les découvertes dans son ouvrage, il en forme une collection de matériaux précieux où le naturaliste & l'historien peuvent puiser à l'envi des lumières. Qui mieux que lui rencontrera ces premières empreintes de la nature qu'elle se plaît à receler au milieu des rochers & des hautes montagnes que la main des hommes n'a pu désigner; son œil exercé les cherche & les saisit, & il s'empresse d'en enrichir la somme des momens que les observateurs ont déjà rassemblés.

Non-seulement tous ses pas sont utiles, mais son jugement se perfectionne, & l'habitude de voir les objets sous tous leurs rapports possibles, donne encore plus d'effort à ses dispositions militaires. La guerre, qui est un métier pour les uns & un art pour les autres, devient la plus vaste science quand le génie préside à ses opérations. Tous les talens, toutes les connoissances humaines sont les instrumens qu'elle emploie pour préparer & pour assurer ses succès. (*Par M. J. O. R., Ingénieur-Général Milit.*)

CARTES. *Problème sur les cartes. (Arithmétique.)* Pierre tient huit cartes dans ses mains qui sont : un as, un deux, un trois, un quatre, un cinq, un six, un sept & un huit, qu'il a mêlées : Paul parie que les tirant l'une après l'autre, il les devinera à mesure qu'il les tirera.

L'on demande combien Pierre doit parier contre un que Paul ne réussira pas dans son entreprise ?

Par l'énoncé de la question, on suppose que Paul parie de tirer toutes les cartes l'une après l'autre, sans les remettre dans le jeu après les avoir tirées, & sans manquer une seule fois à deviner juste la carte qu'il tirera.

Dans ce cas, en suivant les règles ordinaires des probabilités, l'espérance de Paul au premier coup est $\frac{1}{2}$, au second $\frac{1}{2}$; d'où il s'ensuit que son espérance pour les deux premiers coups est $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$; & en effet, il est aisé de voir que le premier coup ayant huit cas possibles, & le second sept, la combinaison des deux aura 8×7 coups, dont il n'y en a qu'un seul qui fasse gagner Pierre, celui où il devinera juste deux fois de suite. Par la même raison, l'espérance de Paul pour trois coups sera $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$; pour quatre, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$; & pour sept (car il n'y en peut avoir huit, attendu qu'après sept tirages il ne reste plus de cartes à tirer, & il n'y a plus de jeu), elle sera $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$; donc l'enjeu de Pierre sera à celui de Paul comme $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 1$ est à 1, c'est-à-dire, comme $56 \times 720 = 1$ est à 1; ou comme 40320 est à 1.

Si Paul parloit d'amener ou de deviner juste à un des sept coups seulement, son espérance seroit $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, & par conséquent l'enjeu de Pierre à celui de Paul, comme $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ est à 1.

Si Paul parloit d'amener juste dans les deux premiers coups seulement, son espérance seroit $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, & le rapport des enjeux celui de $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ à 1.

Si l'on parloit d'amener juste dans deux coups quelconques, son espérance seroit $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$, &c.

Autre Problème.

On demande combien il y a à parier contre un que tirant cinq cartes dans un jeu de piquet, composé de trente-deux, l'on ne tirera pas une quinte majeure indéterminée, sans nommer en quelle couleur, soit en cœur, soit en carreau, en pique ou en trefle?

Pour résoudre la question proposée, il faut d'abord chercher en combien de façons trente-deux cartes peuvent être prises cinq à cinq, & on trouvera par les règles connues des combinaisons, que ce nombre de fois est le produit des cinq nombres 28, 29, 30, 31, 32; ce produit étant divisé par le produit de cinq autres nombres 1, 2, 3, 4, 5, ou par 120: c'est-à-dire, que le nombre de fois cherché est le produit des nombres 28, 29, 31, 8, ou 201376. Maintenant, comme il y a quatre quintes majeures, il faut ôter ce nombre 4 de 201376, ce qui donnera 201372, & il y aura à parier 4 contre 201372, ou 1 contre 50343, qu'on ne tirera pas une quinte majeure à volonté.

Si l'on agissoit d'une quinte quelconque, comme il y a en tout seize quintes, savoir, quatre de chaque couleur, le pari seroit 16 contre 201376 moins 16, ou de 16 contre 201360, ou de 1 contre 12585, (O)

* CARTES, f. f. (Jeux) petits scuillets de carton oblongs, ordinairement blancs d'un côté, peints

de l'autre de figures humaines ou autres, & dont on se sert à plusieurs jeux, qu'on appelle par cette raison *jeux de cartes*. Voyez LANQUENET, BRELAND, PHARAON, OMBRE, PIQUET, BASSETTE, &c. Entre ces jeux il y en a qui sont purement de hazard, & d'autres qui sont de hazard & de combinaison. On peut compter le lanquenet, le breland, le pharaon, au nombre des premiers; l'ombre, le piquet, le médiator, au nombre des seconds. Il y en a où l'égalité est très exactement conservée entre les joueurs, par une juste compensation des avantages & des désavantages; il y en a d'autres où il y a évidemment de l'avantage pour quelques joueurs, & du désavantage pour d'autres; il n'y en a presque aucun dont l'invention ne montre quelque esprit; & il y en a plusieurs qu'on ne joue point supérieurement, sans en avoir beaucoup, du moins de l'esprit du jeu.

Le père Ménétrier, jésuite, dans sa *bibliothèque curieuse & instructive*, nous donne une petite histoire de l'origine du jeu de cartes. Après avoir remarqué que les jeux sont utiles, soit pour délasser, soit même pour instruire; que la création du monde a été pour l'Étre suprême une espèce de jeu; que ceux qui montrent chez les romains les premiers éléments, s'appelloient *ludi magistri*; que Jésus-Christ même n'a pas dédaigné de parler des jeux des enfans: il distribue les jeux en jeux de hazard, comme les dés; (Voyez DÉS) en jeux d'esprit, comme les échecs; (Voyez ÉCHECS) & en jeux d'hazard & d'esprit, comme les cartes. Mais il y a des jeux de cartes, ainsi que nous l'avons remarqué, qui sont de pur hazard.

Selon le même auteur, il ne paroît aucun vestige de cartes à jouer avant l'année 1592, que Charles VI. tomba en phrénésie. Le jeu de cartes a dû être peu commun avant l'invention de la gravure en bois, à cause de la dépense que la peinture des cartes eût occasionnée. Le P. Ménétrier ajoute que les allemands, qui eurent les premiers des gravures en bois, gravèrent aussi les premiers des moules de cartes, qu'ils chargèrent de figures extravagantes: d'autres prétendent encore que l'impression des cartes est un des premiers pas qu'on ait fait vers l'impression en caractères graves sur des planches de bois, & crient à ce sujet les premiers essais d'imprimerie faits à Harlem, & ceux qu'on voit dans la bibliothèque Bodléienne. Ils pensent que l'on se seroit plutôt aperçu de cette ancienne origine de l'imprimerie, si l'on eût considéré que les grandes lettres de nos manuscrits de 900 ans paroissent avoir été faites par des enlumineurs.

On a voulu par le jeu de cartes, dit le P. Ménétrier, donner une image de la vie paitible, ainsi que par le jeu des échecs, beaucoup plus ancien, on en a voulu donner une de la guerre. On trouve dans le jeu de cartes les quatre états de la vie;

tous les termes imaginaires se détruiront, & qu'il ne restera qu'une suite infinie de termes composés de quantités toutes réelles. Ainsi, la valeur de x est en effet réelle. La difficulté est de sommer cette série; c'est à quoi on n'a pu parvenir jusqu'à présent. Cependant M. Nicole l'a sommée dans quelques cas particuliers, qu'il a par conséquent soustraits, pour ainsi dire, au cas *irréductible*. Voyez les *Mém. académ.* 1738, & suiv.

Lorsque l'une des trois racines réelles & inégales est commensurable, alors l'équation n'est plus dans le cas *irréductible*, parce que l'un des diviseurs du dernier terme donne la racine commensurable. Voyez DIVISEUR & RACINE.

Mais quand la racine est incommensurable, il faut, pour trouver l'expression réelle de la racine, ou sommer la série susdite, ou dégager de quelque autre manière l'expression trouvée de la formule imaginaire qui la désigne pour ainsi dire. C'est à quoi on travaille inutilement depuis deux cents ans.

Cette racine du cas *irréductible*, si difficile à trouver par l'Algèbre, se trouve aisément par la Géométrie. Voyez CONSTRUCTION. Mais quoiqu'on ait la valeur linéaire, on n'en est pas plus avancé pour son expression algébrique. Voyez INCOMMENSURABLE.

Cet inconvénient du cas *irréductible* vient de la méthode qu'on a employée jusqu'ici pour résoudre les équations du troisième degré; méthode imparfaite, mais la seule qu'on ait pu trouver jusqu'à présent. Voici en quoi consiste l'imperfection de cette méthode. On suppose $x = y + z$, y & z étant deux quantités indéterminées; ensuite on a tout-à-la-fois $x^3 = 3yzx - y^3 = 0$, & $x^3 +$
 $- z^3$

$gx + r = 0$. On compare ces équations terme à terme, & cette comparaison terme à terme enferme une supposition tacite, qui amène une forme irréductible sous laquelle x est exprimée; à la rigueur on a $gx + r = 3yzx - y^3 = -z^3$; voilà la seule conséquence rigoureuse qu'on puisse tirer de la comparaison des deux équations; mais outre cela, on veut encore supposer que la première partie de $gx + r$, c'est-à-dire gx soit égale à $-3yzx$ première partie du second membre. Cette supposition n'est point absolue ni rigoureusement nécessaire, on ne l'a fait que pour parvenir plus aisément à trouver la valeur de y & de z , qu'on ne pourroit pas trouver sans cela; d'ailleurs comme y & z sont l'une & l'autre indéterminées, on peut supposer $-3yzx = gx$ & $-y^3 = -z^3 = r$. Mais cette supposition même fait que les deux quantités y & z , au lieu d'être réelles comme elles devroient, se trouvent chacune imaginaires. Il est vrai qu'en les ajoutant ensemble, leur somme est réelle; mais l'imaginaire qui s'y trouve toujours, & qu'on ne peut en chasser, rend inutile l'expression de x qui s'en tire.

En un mot l'équation $x = y + z$ ne donne à la

rigueur que cette équation $gx + r = -3yzx - y^3 = -z^3$, on $gy + z + r = 3yzx - 3yzx - y^3 = -z^3$ & toutes les fois que l'on voudra de cette équation en faire deux autres particulières, on sera une supposition tacite qui pourra entraîner des inconvénients impossibles à éviter, comme il arrive ici, où y & z se trouvent imaginaires.

Il faudroit voir si, par quelque moyen, on ne pourroit pas couper l'équation susdite en deux autres, qui donnassent à y & à z une forme réelle & facile à trouver; mais cette opération paroît deroit être fort difficile, si elle n'est pas impossible.

J'ai fait voir dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences de Prusse* de 1746, que l'on pouvoit toujours trouver par la trisection d'un arc de cercle, une quantité $c + c\sqrt{-1}$, égale à la racine cube de $a + b\sqrt{-1}$; & que si $c + c\sqrt{-1} = \sqrt[3]{a + b\sqrt{-1}}$, on a $\sqrt[3]{a - b\sqrt{-1}} = c - c\sqrt{-1}$. Voy. IMAGINAIRE. Don il s'ensuit que dans le cas où un arc de cercle peut être divisé géométriquement, c'est-à-dire par la règle & le compas, en trois parties égales, on peut assigner la valeur algébrique de c & de c , ce qui pourroit fournir des vies pour résoudre en quelques occasions des équations du troisième degré qui tomberoient dans le cas *irréductible*. Voyez le *Mémoire* que j'ai cité.

Quoi qu'il en soit, la racine étant incommensurable dans le cas *irréductible*, l'expression réelle de cette racine, quand on la trouveroit, n'empêcheroit pas de recourir aux approximations. On a donné à l'article APPROXIMATION la méthode générale pour approcher de la racine d'une équation, & nous y avons indiqué les auteurs qui ont donné des méthodes particulières d'approximation pour le cas *irréductible*. Voyez aussi CASCADE.

Puisque nous en sommes sur cette matière des équations du troisième degré, nous croyons qu'on ne nous saura pas mauvais gré de faire ici quelques remarques nouvelles qui y ont rapport, & dont nos lecteurs pourront tirer de l'utilité.

On fait que toute équation du troisième degré a trois racines. Il faudroit donc, pour résoudre d'une manière complète, une équation du troisième degré, trouver une méthode qui fût trouver à-la-fois les trois racines, comme on trouve à-la-fois les deux racines d'une équation du second degré. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé cette méthode, il y a bien de l'apparence que la théorie des équations du troisième degré restera imparfaite; mais la trouvera-t-on, cette méthode? c'est ce que nous n'osons ni nier ni prédire.

Examinons présentement de plus près la méthode dont on se sert pour trouver les racines d'une équation du troisième degré. On a d'abord une équation du troisième degré y^3 , &c. telle qu'on l'a vue ci-dessus, & qui a par conséquent six racines,

qu'on peut aisément prouver être toutes inégales : on a ensuite une équation du troisième degré $x^3 = y^3 - r$; & comme y^3 a deux valeurs différentes à cause de l'équation $y^3 + ry^3$, &c. $x=0$, & que x est élevé au troisième degré, il s'ensuit que cette équation doit donner aussi six valeurs différentes de x , trois pour chaque valeur de y^3 ; or chacune des six valeurs de x étant combinée avec chacune des six valeurs de y , on aura trente-six valeurs différentes pour $x + y$; donc x paroît avoir trente-six valeurs différentes. Cependant l'équation étant du troisième degré, x ne doit avoir que trois valeurs : comment accorder tout cela ?

Je réponds d'abord que les trente-six valeurs prétendues de $y + x$ doivent se réduire à dix-huit. En effet, il ne faut pas combiner indifféremment chaque valeur de x avec toutes les valeurs de y , mais seulement à toutes les valeurs de y qui correspondent à la valeur qu'on a supposée à y^3 .

Par exemple, on a $y^3 = -\frac{r}{27} \pm \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}$; d'où l'on tire $x^3 = -\frac{r}{27} \mp \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}$; le signe + qui précède le signe radical dans la valeur de y^3 , répond au signe — qui précède le signe radical dans la valeur de x^3 , & le signe — au signe + ; ce qui est évident, puisque $x^3 = -r - y^3$; donc pour chacune des trois valeurs de y qui répondent au signe + placé devant le signe radical, il y a trois valeurs de x qui répondent au signe — placé devant le signe radical : ce qui fait neuf valeurs de $y + x$; & en y ajoutant les neuf autres valeurs pour le cas du signe —, placé avant le signe radical dans l'expression de y^3 , cela fait 18 au lieu de 36 qu'on auroit en combinant indifféremment les signes. Mais ce n'est pas tout.

Quoique chacune des valeurs de y & de x , employées & combinées comme on vient de le prescrire, paroisse donner une valeur de $y + x$, il faut encore rejeter celles dans lesquelles le produit

xy ne sera pas égal à $-\frac{r}{27}$; car c'est une des conditions de la solution, comme on l'a vu plus haut, que $xy = -\frac{r}{27}$; il est vrai que les dix-huit valeurs de y & x satisfont à la condition que $-27y^3x^3 = r^3$. Mais cette condition $-27y^3x^3 = r^3$ est beaucoup plus étendue que la condition que $xy = -\frac{r}{27}$, quoique d'abord elle paroisse la même. Par exemple, $u = b$ ne donne qu'une valeur de x ; mais $u^3 = b^3$ donne trois valeurs de u . Pour le prouver, soit $u^3 - b^3 = 0$, & divisons par $u - b$, il viendra $u^2 + bu + b^2 = 0$, ce qui donne

$$u = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{bb}{4}\right)} ; \text{ ainsi, } u^3 = b^3 \text{ donne } u = b, u = b \times \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}\right) \text{ \& } u = b \times \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{-3}}{2}\right). \text{ Donc, quelque, } u^3 = b^3 \text{ les}$$

dix-huit valeurs de $y + x$, on ait $27y^3x^3 = -r^3$; il ne faut prendre que celles où $xy = -\frac{r}{27}$. Cela posé.

Soient ces quatre équations :

$$I. \left\{ y^3 = -\frac{r}{27} + \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)} \right.$$

$$II. \left\{ x^3 = -\frac{r}{27} - \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)} \right.$$

$$III. \left\{ y^3 = -\frac{r}{27} - \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)} \right.$$

$$IV. \left\{ x^3 = -\frac{r}{27} + \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)} \right.$$

Et soit $a + b\sqrt{-1} = 1$ la racine cubique de $-\frac{r}{27} + \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}$, on aura $a - b\sqrt{-1} = 1$ la racine de $-\frac{r}{27} - \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}$; ce qui donnera :

Racines de la première équation.

$$1. y = a + b\sqrt{-1}.$$

$$2. y = (a + b\sqrt{-1}) \cdot \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}\right).$$

$$3. y = (a + b\sqrt{-1}) \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{-3}}{2}\right).$$

Racines de la seconde.

$$4. x = a - b\sqrt{-1}.$$

$$5. x = (a - b\sqrt{-1}) \cdot \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}\right).$$

$$6. x = (a - b\sqrt{-1}) \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{-3}}{2}\right).$$

Racines de la troisième.

Sont les mêmes que de la seconde.

Racines de la quatrième.

Sont les mêmes que de la première.

Donc, 1.^o la combinaison des racines de la troisième équation avec celles de la quatrième, donnera le même résultat que celle des racines des deux premières.

2.^o Il ne faudra combiner ensemble que les valeurs de y & de x , & dont le produit sera $= -\frac{r}{27}$, c'est-à-dire $ay + bx$; car $a + b\sqrt{-1} = 1$ étant $= \sqrt{-\frac{r}{27} + \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}}$ & $a - b\sqrt{-1} = \sqrt{-\frac{r}{27} - \sqrt{\left(-\frac{r}{27} + \frac{r^2}{4}\right)}}$, on aura $aa + bb = \sqrt{-\frac{r}{27} - \frac{r}{27}} = -\frac{r}{27}$. D'où il s'ensuit,

3.^o Qu'il faudra combiner la racine marquée

(1) avec la racine marquée (4), ce qui donnera $y = 2a$.

4. Qu'il faudra combiner la racine marquée (2) avec la racine marquée (6), ce qui donnera $-a + b\sqrt{3}$.

5. Qu'il faudra combiner la racine marquée (3) avec la racine marquée (5), ce qui donnera $-a + b\sqrt{3}$.

Voilà les trois racines de l'équation, & il est visible par les règles que nous avons établies, que toutes les autres valeurs de $y + z$ donneront des expressions fautes de la racine x , & que toutes les trois racines sont ici réelles.

On peut trouver aisément par la même méthode les trois valeurs de x dans tout autre cas que le cas irréductible. Par exemple, si q est positif, ou si q est négatif & < 0 , alors il faudra supposer

$$\sqrt{-\frac{r}{4}} + \sqrt{-\left(-\frac{r}{12} + \frac{p}{4}\right)} = a + b,$$

$$\sqrt{-\frac{r}{4}} - \sqrt{-\left(-\frac{r}{12} + \frac{p}{4}\right)} = a - b; \text{ l'on}$$

trouvera en ce cas une racine réelle & deux imaginaires, ou une racine réelle & deux autres réelles, égales entr'elles. C'est ce qu'il est inutile d'expliquer, plus en détail : il ne faut pour s'en convaincre, que faire un calcul semblable à celui que nous avons fait pour trouver les trois racines dans le cas irréductible. (O)

CASCADE, Méthode des cascades (Algèbre.) est le nom que M. Rolle, géomètre de l'Académie des Sciences, a donné autrefois à une méthode qu'il avoit imaginée pour résoudre les équations. Il la publia en 1699 dans son traité d'Algèbre. Par cette méthode on approche toujours de la valeur de l'inconnue, par des équations successives qui vont toujours en baissant d'un degré, & de-là est venu le nom de cascades. Voyez EQUATION.

On trouve dans l'Analyse démontrée de P. Reynaud, liv. VI. une méthode par laquelle on approche des racines d'une équation, en résolvant des équations qui vont toujours en baissant d'un degré ; & cette méthode paroît avoir beaucoup de rapport à celle de M. Rolle. En voici l'idée. Soit, par exemple, une équation du troisième degré $x^3 - px^2 + qx + r = 0$ dont les trois racines soient réelles & positives a, b, c , a étant la plus petite, & c la plus grande ; soit multipliée cette équation par les termes d'une progression arithmétique 3, 2, 1, 0 ; elle deviendra l'équation du second degré $3x^3 - 2px^2 + qx + r = 0$, dont les deux racines sont réelles, & sont telles que la plus petite est entre a & b , & la plus grande entre b & c ; ainsi, cherchant les deux racines de cette équation du second degré, on aura les limites entre lesquelles b est renfermé ; & on pourra trouver ensuite cette racine b par approximation :

la racine b étant trouvée, on connoitra les autres a, c .

Pour démontrer cette méthode, soit $x^3 - px^2 + qx + r = y$, l'équation d'une courbe de genre parabolique. Voyez ce mot. L'équation $3x^3 - 2px^2 + qx + r = 0$, sera l'équation des points qui donneront les maxima de y . Voyez MAXIMUM. Et ces points, comme il est aisé de le voir, seront situés de manière qu'ils seront l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté du point qui donnera la racine moyenne de l'équation $x^3 - px^2 + qx + r = 0$, c'est-à-dire du second point où la courbe coupera son axe. Voyez RACINE ; voyez aussi dans les Mém. acad. 1741. deux Mémoires de M. l'abbé de Gua sur le nombre des racines, où il fait usage des courbes de genre parabolique.

En voilà assez pour faire sentir comment on parvient à trouver au-moins par approximation les racines d'une équation, en changeant cette équation en une autre d'un degré inférieur. On trouve dans le livre VI. du P. Reynaud, tout le détail de cette méthode, qui est extrêmement pénible, peu commode, & très-imparfaite dans la pratique, sur-tout lorsqu'il y a des racines imaginaires. Voy. LIMITES. (O)

CASE, f. f. (jeu de Triac), se dit de deux dames posées sur la même ligne ou flèche où l'on joue. S'il n'y a qu'une dame sur la flèche, elle fait la demi-case.

On appelle *case du diable* celle de la seconde flèche du grand-jan ; on ne lui donne guère ce nom que lorsque c'est la seule qui soit à faire, parce qu'il ne reste alors dans le petit-jan que cinq dames, & que tous les coups que l'on joue sans remplir, avancent ces dames, les font même passer, & mettent dans le cas, ou de ne point faire son plein, ou de ne pas tenir long-temps. Voyez TRIAC.

CASER, v. n. au Triac, c'est accouper deux dames, ou les placer sur la même flèche.

CASSINOÏDE (Astron.), nom que l'on a donné quelquefois à une courbe proposée par Cassini pour représenter le mouvement du soleil. Cette courbe est telle, que le produit des deux lignes tirées des foyers à la circonférence est constant ; au lieu que dans l'ellipse c'est la somme qui est constante. Voyez les Éléments d'Astronomie de M. Cassini le fils, pag. 149.

L'analogie entre ces deux courbes fait que l'on appelle quelquefois la cassinoïde, ellipse cassinoïde, quoiqu'elles ne soient pas du même genre.

CASSIOPEE (Astron.), constellation boréale, composée de 54 étoiles principales dans le catalogue de Flamsteed.

Suivant les grecs, une reine d'Ethiopie, femme de Céphée, donna son nom à cette constellation ; elle y est représentée comme dans un trône, tenant une palme à la main. On a appelé quelquefois cette constellation *cassiopea mollis*, sili-

quasrum, solum, mulier sedis, mulier habens palmam delibutam; elle est aussi appelée *cerva*, *canis*; car les arabes ne peignent qu'un chien ou une biche à la place d'une reine; & les syriens un sanglier.

M. Dupuis croit que c'est pour cela que le troisième travail d'Hercule, ou l'entrée du soleil dans la balance, est marqué par la défaite du sanglier d'Erinanthé; c'étoit l'emblème du coucher de *castor* pour le lever du soleil.

Il parut en 1572 une nouvelle étoile dans cette constellation, qui surpassoit d'abord jupiter en éclat & en grandeur; mais elle diminua peu-à-peu, & disparut entièrement au bout de dix-huit mois. Ce phénomène extraordinaire exerça tous les astronomes de ce tems-là, & fut la matière de plusieurs ouvrages; les uns prétendirent que c'étoit une comète, d'autres ajoutèrent de plus que c'étoit la même que celle qui avoit paru à la naissance de Jésus-Christ, & qu'elle annonçoit son second avènement. Tycho les réfuta, & composa sur cette fameuse étoile un grand ouvrage *De nova stella anni 1572*. Voyez ÉTOILES NOUVELLES. (D. L.)

CASTOR, en *Astronomie*, est le nom d'une des deux belles étoiles de la constellation des gémeaux. Voyez GÉMEAUX.

C A T

CATABIBAZON, en *Astronomie*, est le nœud descendant de la lune, celui qu'on appelloit aussi *anabibazon* & *queue du dragon*. Voyez LUNE. (O)

CATACAUSTIQUE, f. f. (*Opt.*) est la caustique formée par des rayons réfléchis; on la nomme ainsi pour la distinguer de la *diacaustique*. Voyez CAUSTIQUE, DIACAUSTIQUE, RÉFLEXION, CATOPTRIQUE, &c. (O)

CATACOUSTIQUE, f. f. qu'on appelle aussi *cataphonique*, est la science qui a pour objet les sons réfléchis; ou cette partie de l'acoustique qui considère les propriétés des échos, ou en général les sons qui ne viennent pas directement du corps sonore à l'oreille, mais qui ne la frappent qu'après qu'ils y ont été renvoyés par quelque autre corps. Ce mot *catacoustique* est analogue au mot *catoptrique*, qui signifie la science qui a pour objet les rayons de lumière réfléchis, & leurs propriétés; ainsi, la *catacoustique* est à l'acoustique proprement dite, ce que la *catoptrique* est à l'optique. Voyez ACOUSTIQUE, ECHO & SON.

CATADIOPTRIQUE, adj. (*Optique.*) On donne ce nom à ce qui appartient à-la-fois à la *catoptrique* & à la *dioptrique*, c'est-à-dire, à ce qui appartient à la théorie de la lumière réfléchie & de la lumière rompu. Voyez CATOPTRIQUE & DIOPTRIQUE. Par exemple, un instrument ou lunette qui réfléchit & rompt en même tems les rayons, est appelé *télescope catoptrique*. Voyez TÉLESCOPE. (O)

C A T

CATADUPES (*Hydrod.*), nom que les anciens donnoient à ce que nous appellons aujourd'hui *cataractes*. Voyez CATARACTE.

CATALOGUE d'étoiles (*Astron.*) est la table des positions des différentes étoiles par longitudes & latitudes, ascensions droites & déclinaisons pour une certaine époque: on en trouvoit un abrégé au mot ÉTOILE.

Le plus ancien catalogue est celui qui nous a été conservé par Ptolémée dans son *Almageste*, & qui renferme 1022 étoiles, dont les positions sont à-peu-près pour l'année 63 de l'ère chrétienne: quoiqu'il les ait appliquées à l'année 137; on ne croit pas que Ptolémée en fût l'auteur. Il est plus probable qu'il ne fit que réduire à l'année 137 de J. C. celui d'Hipparque, qui étoit pour l'année 130 avant J. C. en retranchant 2° 45' de toutes les longitudes; *Almag. VIII.* 2°. Copernic se contenta de même de réduire à son tems le catalogue de Ptolémée, sans faire, à ce sujet, de nouvelles observations.

Parmi les arabes, Albategnius & Ulug-Beg; parmi les européens, Tycho-Brahé & Hévélius tirent des catalogues plus exacts & plus amples. Mais le plus grand & le plus fameux de tous, est le catalogue britannique de Flamsteed, qui parut à Londres en 1712, dans son *Historia Caelit*, publiée d'abord en un seul volume in-folio, & en trois volumes en 1725, & je l'ai fait réimprimer en 1783 dans le huitième volume des éphémérides. C'est sans comparaison le catalogue le plus parfait & le plus ample qu'on ait fait: on y trouve les longitudes, latitudes, ascensions droites, & les déclinaisons de 2919 étoiles, pour le commencement de 1690, déterminés par des observations exactes & assidues; que Flamsteed, astronome royal à Greenwich, avoit faites depuis 1676 jusqu'à 1705, avec un arc mural placé dans le méridien.

Dans le recueil de *Tables astronomiques*, publié sous la direction de l'Académie de Berlin, en 1776, il y a un catalogue de 4535 étoiles, au lieu de 2919 que contient le catalogue britannique; mais on a ajouté les autres d'après les catalogues d'Hévélius, de la Caille & de Bradley.

Ce fut la première fois que les astronomes purent compter sur des positions d'étoiles, au point de s'en servir sans examen, pour en conclure celles des planètes. Ce catalogue a été la base de tous les calculs & de toutes les théories des astronomes jusqu'au tems où M. le Monnier & l'abbé de la Caille entreprirent de dresser de nouveaux catalogues pour l'année 1750, comme nous allons le dire.

On ne pourroit guère compter aujourd'hui sur les positions d'étoiles tirées du catalogue britannique, si ce n'est à une ou deux minutes près, parce que bien des étoiles ont des mouvements propres, qui sont encore inconnus, en sorte qu'il y en a plusieurs qui s'écartent un peu du mouvement commun

commun & de la loi générale : c'est ce qui a déterminé les astronomes à en former de nouveaux.

Le premier catalogue d'étoiles de la Caille, fut publié en 1757, dans un livre fort rare actuellement, qui a pour titre, *Astronomie fundamenta* : j'ai inséré ce catalogue dans mon *Astronomie* ; il est composé de 397 étoiles principales, dont il avoit déterminé les positions avec une exactitude inconnue jusqu'alors. Il donne dans le même livre les observations qui avoient servi à dresser ce catalogue ; savoir, les hauteurs correspondantes de toutes ces étoiles prises au nombre de dix à douze pour chaque étoile, & les distances au zénith, mesurées aussi à plusieurs reprises avec deux instrumens de six pieds de rayon : ces 397 étoiles lui coûtèrent plus de tems & de peine, que n'auroient fait 4000, en suivant la méthode de Flamsteed ; aussi M. de la Caille y avoit travaillé pendant dix ans, & tous les astronomes ont regardé ces positions d'étoiles comme le vrai fondement actuel de l'Astronomie, & comme un prodige de travail.

Ce premier catalogue a été suivi de celui de 1942 étoiles australes ; elles étoient choisies sur le nombre d'environ dix mille, que M. de la Caille observa au cap de Bonne-Espérance & aux îles de France & de Bourbon, depuis 1751 jusqu'en 1754, en les comparant aux étoiles primitives du catalogue précédent. On n'a point encore osé entreprendre de calculer les 8000 étoiles restantes. Ce second catalogue est imprimé dans les *Mémoires de l'Académie* pour 1752, pag. 539, & dans le *Recueil* des observations des dix mille étoiles australes, intitulé : *Cælum australe*, que M. Maraldi nous a procuré en 1763. Il se trouve à Paris chez Desaint, prix 15 livres ; il y en a peu d'exemplaires.

Le troisième catalogue de M. de la Caille, est celui des étoiles zodiacales, au nombre d'environ 600, qu'il observa à Paris pendant l'hiver de 1762, avec une lunette méridienne. Ce dernier ouvrage, qui lui coûta la vie, est resté imparfait ; cependant la plus grande partie est achevée, & M. Bailly en ayant fini les calculs, il l'a publié à la tête du volume des *Ephémérides*, que M. de la Caille avoit calculées pour les années 1765 - 1774 ; mais les calculs n'ayant été faits qu'une fois, il s'y trouve diverses imperfections.

Dans le même tems, M. le Monnier s'occupoit aussi du projet d'établir les fondemens de l'Astronomie par un nouveau catalogue d'étoiles ; il en a publié les principaux résultats dans les trois premiers livres de ses *Observations*, imprimées au Louvre, in-folio.

M. Mayer, qui faisoit à Götingue de semblables observations, a laissé un catalogue de 998 étoiles, fort exact, qui est imprimé dans ses *Œuvres posthumes*, & dans la *Connaissance des tems*, de 1778.

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie.

Il nous reste à décrire un catalogue des étoiles boréales plus récent que le catalogue *britannique*, & aussi détaillé que celui que M. de la Caille a fait pour les étoiles australes. Cet astronome infatigable, songeoit à l'entreprendre & à s'établir pour quelques tems dans une des villes méridionales de France, où l'on jouit d'un plus beau ciel qu'à Londres & à Paris ; une mort prématurée a privé l'Astronomie de cet important ouvrage. M. Dagelet, professeur à l'Ecole Militaire, a eu le courage de l'entreprendre, & il en est occupé actuellement. (Août 1781.)

On a publié en Angleterre, en 1771, dans le *naucal Almanac* de 1773, un catalogue précieux de 387 étoiles, dont les ascensions droites, les déclinaisons, les longitudes & les latitudes ont été calculées d'après les observations du célèbre docteur Bradley, mort en 1762, & réduites à 1760. C'est une partie intéressante des observations faites pendant un grand nombre d'années à l'observatoire royal de Greenwich avec d'excellens instrumens ; mais qui sont encore entre les mains des héritiers de l'auteur. Ce catalogue a été imprimé par Fortin, dans son édition de *Atlas de Flamsteed* : on en trouve l'étrange dans le huitième volume des *Ephémérides*. (D. L.)

CATARACTE, f. f. (*Hydrod.*) chute ou précipice dans le canal ou lit d'une rivière, qui a pour cause des rochers ou d'autres obstacles qui arrêtent le courant, & font tomber l'eau avec beaucoup de bruit & une grande impetuosité.

M. de Maupertuis, dans la relation de son voyage au nord pour la mesure de la terre, parle des *cataractes* du fleuve de Torneo, & de la manière dont les gens du pays les franchissent dans des nacelles fort minces. On peut voir aussi dans le tome I de l'*Histoire ancienne* de M. Rollin, la description abrégée des *cataractes* du Nil, & de l'impetuosité avec laquelle les peuples du pays s'y exposent.

Strabon appelle aussi *cataractes* ce qu'on appelle aujourd'hui *cascade* ; & ce que nous appelons présentement *cataracte*, les anciens l'appelloient *catadupes*.

Dans presque tous les fleuves, dit M. de Buffon, la pente va en diminuant jusqu'à leur embouchure, d'une manière assez insensible ; mais il y en a dont la pente est très-brusque dans certains endroits, ce qui forme ce qu'on appelle une *cataracte*, qui n'est autre chose qu'une chute d'eau plus vive que le courant ordinaire du fleuve. Le Rhin, par exemple, a deux *cataractes* ; l'une à Bilsfeld, & l'autre auprès de Schaffhouse. Le Nil en a plusieurs, & entr'autres deux qui sont très-violentes, & qui tombent de fort haut entre deux montagnes : la rivière Vologre, en Moscovie, a aussi deux *cataractes* auprès de Ladoga ; le Zaïre, fleuve de Congo, commence par une forte *cataracte* qui tombe du haut d'une montagne. Mais la plus fameuse *cataracte* est celle de la rivière de Niagara, R r

en Canada; elle tombe de cent cinquante-six pieds de hauteur perpendiculaire, comme un torrent prodigieux; & elle a plus d'un quart de lieue de largeur: la brume ou le brouillard que l'eau fait en tombant, se voit de cinq lieues, & s'élève jusqu'aux nues; il s'y forme un très-bel arc-en-ciel lorsque le soleil donne dessus. Au-dessous de cette *cataraëte*, il y a des tournoiemens d'eau si terribles, qu'on ne peut y naviger jusqu'à six milles de distance; & au-dessus de la *cataraëte*, la rivière est beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est dans les terres supérieures. *V. Transf. philos. abr. vol. vj, part. ij, pag. 119.* Voici la description qu'en donne le P. Charlevoix; 14 Mon premier soin fut de visiter la plus belle cascade qui soit peut-être dans la nature; mais je reconnus d'abord que le baron de la Hontan s'étoit trompé sur sa hauteur & sur sa figure, de manière à faire juger qu'il ne l'avoit point vue.

Il est certain que si l'on mesure sa hauteur par les trois montagnes qu'il faut franchir d'abord, il n'y a pas beaucoup à rabattre des six cents pieds que lui donne la carte de M. de l'Isle, qui sans doute n'a avancé ce paradoxe que sur la foi du baron de la Hontan & du P. Hennepin: mais après que je fus arrivé au sommet de la troisième montagne, j'observai que dans l'espace de trois lieues que je fis ensuite jusqu'à cette chute d'eau, quoiqu'il fallût quelquefois monter, il faut encore plus descendre; & c'est à quoi ces voyageurs paroissent n'avoir pas fait assez d'attention. Comme on ne peut approcher la cascade que de côté, ni la voir que de profil, il n'est pas aisé d'en mesurer la hauteur avec les instrumens: on a voulu le faire avec une longue corde attachée à une longue perche; & après avoir souvent réitéré cette manœuvre, on n'a trouvé que cent quinze ou cent vingt pieds de profondeur. Mais il n'est pas possible de s'assurer si la perche n'a pas été arrêtée par quelque rocher qui avançoit; car quoiqu'on l'eût toujours retirée mouillée, aussi-bien qu'un bout de la corde à quoi elle étoit attachée, cela ne prouve rien, puisque l'eau qui se précipite de la montagne rejaillit fort haut en écume. Pour moi, après l'avoir considérée de tous les endroits d'où on peut l'examiner à son aise, j'estime qu'on ne sauroit lui donner moins de cent quarante ou cent cinquante pieds.

Quant à la figure, elle est en fer à cheval, & elle a environ quatre cents pas de circonférence; mais précieusement dans son milieu, elle est partagée en deux par une île fort étroite & d'un demi-quart de lieue de long qui y aboutit. Il est vrai que ces deux parties ne tarlent pas à se rejoindre; celle qui étoit de mon côté, & qu'on ne voyoit que de profil, a plusieurs pointes qui avançoient: mais celle que je découvrois en face me parut fort unie. Le baron de la Hontan y ajouta un torrent qui vient de l'ouest: il

fallut que dans la fonte des neiges les eaux sauvages viennent le décharger là par quelque ravine, &c. *pag. 322, &c., tom. iij.*

Il y a, continue M. de Buffon, une *cataraëte* à trois lieues d'Albanie, dans la nouvelle York, qui a environ cinquante pieds de hauteur; & de cette chute d'eau, il s'élève aussi un brouillard dans lequel on aperçoit un léger arc-en-ciel, qui change de place à mesure qu'on s'en éloigne ou qu'on s'en approche. *Voyez Transf. philos. abr. vol. vj, pag. 119.*

En général, dans tous les pays où le nombre d'hommes n'est pas assez considérable pour former des sociétés policées, les terrains sont plus irréguliers & le lit des fleuves plus étendu, moins égal & rempli de *cataraëtes*. Il a fallu des siècles pour rendre le Rhône & la Loire navigables; c'est en contenant les eaux, en les dirigeant & en bécotant le fond des fleuves, qu'on leur donne un cours assuré. Dans toutes les terres où il y a peu d'habitans, la nature est brute & quelquefois difforme. *Hist. nat. de MM. de Buffon & Daubenton, tom. j.*

Il est dit dans la Genèse, à l'occasion du déluge, que les *cataraëtes du ciel furent ouvertes*. Il y a apparence que le mot de *cataraëtes* en cet endroit, signifie un grand réservoir d'eau.

M. Newton a donné le nom de *cataraëte* à la courbe que décrivent, selon lui, les particules d'un fluide qui s'échappe d'un vase par un trou horizontal. *Voyez HYDRODYNAMIQUE (O)*

CATHETE, en Géométrie, se prend généralement pour désigner une ligne qui tombe perpendiculairement sur une autre ligne ou sur une surface. *Voyez PERPENDICULAIRE.*

Les deux petits côtés d'un triangle rectangle sont deux *cathètes*. *Voyez RECTANGLE.*

Ce mot est principalement en usage dans la catoptrique, ou dans la partie de l'optique qui considère les propriétés des rayons de lumière réfléchis.

CATOPTRIQUE, s. f. science de la vision réfléchie, ou la partie de l'optique qui enseigne les loix que suit la lumière réfléchie par les miroirs. *Voyez MIROIR & RÉFLEXION; voyez aussi VISION, LUMIÈRE & OPTIQUE.* Vous trouverez à ces articles les principes & les loix de la catoptrique. Ce mot vient du grec *κατοπτρον*, *speculum*; formé de *κατα* & *οπτρον*, *videtur*, je vois.

La catoptrique traite non-seulement de la réflexion des rayons de lumière & des loix que suit cette réflexion; elle traite aussi des phénomènes qui en résultent par rapport à la vision, & cette partie est extrêmement curieuse. Cependant les principes n'en sont pas encore bien développés, sur-tout par rapport à ce qui concerne le lieu de l'image & la grandeur apparente. Sur quoi voyez *PAROLE APPARENT.*

Les principaux auteurs qui ont traité de la catoptrique, sont parmi les anciens, Euclide avant

J. C., Alhazen & Vitellion dans les onze & douzième siècles; & parmi les modernes, le P. Tacquet, le P. Fabri, dans son livre, intitulé: *Synopsis optica*; & Jacques Grégoire, dans son *Optica promota*; & sur-tout le célèbre Isaac Barrow dans ses *Leçons optiques*. Ce dernier ouvrage est sans contredit le meilleur; l'auteur semble y avoir démontré les loix de la *catoptrique* par des principes plus exactes & plus lumineux que les auteurs qui l'ont précédé; cependant il ne traite que des propriétés des miroirs sphériques, soit concaves, soit convexes, & il ne dit rien des miroirs plans. Les propriétés de ces derniers miroirs sont démontrées fort au long dans le premier livre de la *Catoptrique* du P. Tacquet, imprimé dans le recueil de ses œuvres, in-folio. M. Smith, dans son *Optique*, a aussi traité avec beaucoup d'étendue des loix de la *catoptrique*.

Catoptrique se prend aussi adjectivement pour ce qui a rapport à la *catoptrique*, ou ce qui s'étend par des rayons réfléchis. Ainsi, on dit *cadran catoptrique*, *télescope catoptrique*, &c. Voyez CADRAN, TÉLESCOPE, &c. (O)

C A U

CAUDA LUCIDA, (*Astron.*) la queue du lion, est une étoile de la première ou seconde grandeur. Sa longitude, en 1750, étoit de 168° 9', la latitude de 12° 17'. Voyez LION.

CAUSES finales (*Méch.*). Le principe des *causes finales* consiste à chercher les *causes* des effets de la nature par la fin que son auteur a dû se proposer en produisant ces effets. On peut dire plus généralement, que le principe des *causes finales* consiste à trouver les loix des phénomènes par des principes métaphysiques.

Ce mot a été fort en usage dans la philosophie ancienne, où l'on rendoit raison de plusieurs phénomènes, tant bien que mal, par les principes métaphysiques, tant bons que mauvais. Par exemple, l'on disoit: *L'eau monte dans les pompes, parce que la nature a horreur du vuide*; voilà le principe métaphysique absurde par lequel on expliquoit ce phénomène. Aussi le chancelier Bacon, ce génie sublime, ne paroit pas faire grand cas de l'usage des *causes finales* dans la physique. *Causarum finalium*, dit-il, *investigatio sterilis est, & tanquam virgo. Deo consecrata, nil parit. De augm. scient. lib. ij, cap. 5.* Quoi! ce grand génie parloit ainsi, il avoit tant doute en vue le principe des *causes finales*, employé même d'une manière plus raisonnable que ne l'employoient les scholastiques; car l'horreur du vuide, par exemple, est un principe plus que stérile, puisqu'il est absurde. Bacon avoit bien senti que nous voyons la nature trop en petit pour pouvoir nous mettre à la place de son auteur; que nous ne voyons pas quelques effets qui tiennent à d'autres, & dont nous n'apercevons que la

chaîne; que la fin du Créateur doit presque toujours nous échapper, & que c'est s'exposer à bien des erreurs que de vouloir la démêler, & sur-tout expliquer par-la les phénomènes. Descartes a suivi la même route que Bacon, & sa philosophie a proscrit les *causes finales* avec la scholastique. Cependant un grand philosophe moderne, M. Leibnitz, a essayé de ressusciter les *causes finales*, dans un écrit imprimé *Ad. erud.* 1681, sous le titre de *Unicum optica, catoptrica, & dioptrica principium*. Dans cet ouvrage, M. Leibnitz se déclare hautement pour cette manière de philosopher, & il en donne un essai, en déterminant les loix que suit la lumière.

La nature, dit-il, agit toujours par les voies les plus simples & les plus courtes; c'est pour cela qu'un rayon de lumière dans un même milieu va toujours en ligne droite tant qu'il ne rencontre point d'obstacle; s'il rencontre une surface solide, il doit se réfléchir de manière que les angles d'incidence & de réflexion soient égaux, parce que le rayon obligé de se réfléchir, va dans ce cas d'un point à un autre par le chemin le plus court qu'il est possible. Cela se trouve démontré par-tout. Voyez MIROIR & RÉFRACTION. Enfin si le globe lumineux rencontre une surface transparente, il doit se rompre de manière que les sinus d'incidence & de réflexion soient en raison directe des vitesses dans les deux milieux, parce que dans ce cas, il ira d'un point à un autre, dans le tems le plus court qu'il est possible.

M. de Fermat, avant M. Leibnitz, s'étoit servi de ce même principe pour déterminer les loix de la réfraction; & il ne faudroit peut-être que ce que nous venons de dire, pour démontrer combien l'usage des *causes finales* est dangereux.

En effet, il est vrai que dans la réflexion sur les miroirs plans & convexes, le chemin du rayon est le plus court qu'il est possible; mais il n'en est pas de même dans les miroirs concaves; & il est aisé de démontrer que souvent ce chemin, au lieu d'être le plus court, est le plus long. J'aroue que le père Tacquet, qui a adopté dans sa *Catoptrique* ce principe du plus court chemin pour expliquer la réflexion, n'est pas embarrassé de la difficulté des miroirs concaves. Lorsque la nature, dit-il, ne peut pas prendre le chemin le plus court, elle prend le plus long, parce que le chemin le plus long est unique déterminé, comme le chemin le plus court. On peut bien appliquer ici ce mot de Cicéron: *Nilum tam absurdum excogitari potest, quod dictum non sit ab aliquo philosophorum*.

Voilà donc le principe des *causes finales* en défaut sur la réflexion. C'est bien pis sur la réfraction; car en premier lieu, pourquoi dans le cas de réflexion, la nature suit-elle tout à-la-fois le plus court chemin & le plus court tems; au lieu que dans la réfraction, elle ne prend que le

plus court tems, & laisse le plus court chemin ? On dira qu'il a fallu choisir, parce que dans le cas de la réfraction, le plus court tems & le plus court chemin ne peuvent s'accorder ensemble. A la bonne heure ; mais, pourquoi préférer le tems au chemin ? En second lieu, suivant MM. Fermat & Leibnitz, les sinus font en raison directe des vitesses, au lieu qu'ils doivent être en raison inverse. Voyez RÉFRACTION & AETION. Reconnoissons donc l'abus des *causes finales* par le phénomène même que leurs partisans se proposent d'expliquer à l'aide de ce principe.

Mais s'il est dangereux de se servir des *causes finales* à priori pour trouver les loix des phénomènes, il peut être utile, & il est au moins curieux de faire voir comment le principe des *causes finales* s'accorde avec les loix des phénomènes, pourvu qu'on ait commencé par déterminer ces loix d'après des principes de mécanique clairs & incontestables. C'est ce que M. de Maupertuis s'est proposé de faire à l'égard de la réfraction en particulier, dans un *Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des Sciences*, 1744. Nous en avons parlé au mot AETION. Il fait à la fin & au commencement de ce mémoire, des réflexions très-judicieuses & très-philosophiques sur les *causes finales*. Il a depuis étendu ces réflexions, & porté plus loin leur usage dans les *Mémoires de l'Académie de Berlin*, 1746, & dans la *Cosmologie*. Il montre dans ces ouvrages l'abus qu'on a fait du principe des *causes finales*, pour donner des preuves de l'existence de Dieu par les effets les moins importants de la nature, au lieu de chercher en grand des preuves de cette vérité si incontestable. Vey. l'article COSMOLOGIE. Ce qui appartient à la sagacité du Créateur, dit M. de Fontenelle, semble être encore plus au-dessus de notre faible portée, que ce qui appartient à sa puissance. *Eloge de M. Leibnitz*. Voyez aussi des réflexions très-sages de M. Mairan sur le principe des *causes finales*, dans les *Mém. acad.* 1723. (O)

CAUSE, f. f. (*Méch.*) se dit de tout ce qui produit du changement dans l'état d'un corps, c'est-à-dire, qui le met en mouvement ou qui l'arrête, ou qui altère son mouvement.

C'est une loi générale de la nature, que tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement, jusqu'à ce qu'il survienne quelque *cause* qui change cet état.

Nous ne connoissons que deux sortes de *causes* capables de produire ou d'altérer le mouvement dans les corps ; les unes viennent de l'action mutuelle que les corps exercent les uns sur les autres, à raison de leur impenétrabilité ; telles sont l'impulsion & les actions qui en dérivent, comme la traction. Voyez ces deux mots. En effet, lorsque un corps en pousse un autre, cela vient de ce que l'un & l'autre corps sont impenétrables : il en est de même lorsqu'un corps en tire un autre ; car la traction, comme celle d'un cheval attaché à une

voiture, n'est proprement qu'une impulsion. Le cheval pousse la courroie attachée à son poitrail ; & cette courroie étant attachée au char, le char doit suivre.

On peut donc regarder l'impenétrabilité des corps comme une des *causes* principales des effets que nous observons dans la nature ; mais il est d'autres effets dont nous ne voyons pas aussi clairement que l'impenétrabilité soit la *cause*, parce que nous ne pouvons démontrer par quelle impulsion mécanique ces effets sont produits, & que toutes les explications qu'on en a données par l'impulsion, sont contraires aux loix de la mécanique, ou démenties par les phénomènes. Telles sont la pesanteur des corps, la force qui retient les planètes dans leurs orbites, &c. Voyez PESANTEUR, GRAVITATION, ATTRACTION, &c.

C'est pourquoi, si l'on ne veut pas décider absolument que ces phénomènes aient une autre *cause* que l'impulsion, il faut au moins se garder de croire & de soutenir qu'ils aient l'impulsion pour *cause* ; il est donc nécessaire de reconnoître une classe d'effets, & par conséquent de *causes* dans lesquelles l'impulsion ou n'agit point, ou ne se manifeste pas.

Les *causes* de la première espèce, savoir, celles qui viennent de l'impulsion, ont des loix très-connuës ; & c'est sur les loix que sont fondées celles de la percussion, celles du *dynamique*, &c. Voyez ces mots.

Il n'en est pas de même des *causes* de la seconde espèce. Nous ne les connoissons pas ; nous ne savons donc ce qu'elles sont que par leurs effets : leur effet seul nous est connu, & la loi de cet effet ne peut être donnée que par l'expérience, puisqu'elle ne sauroit l'être à priori, la *cause* étant inconnue. Nous voyons l'effet ; nous concluons qu'il a une *cause* ; mais voilà jusqu'où il nous est permis d'aller. C'est ainsi qu'on a découvert, par l'expérience, la loi que suivent les corps pesans dans leur chute, sans connoître la *cause* de la pesanteur.

C'est un principe communément reçu en mécanique, & très-juste, que les effets sont proportionnels à leurs causes. Ce principe cependant n'est guère plus utile & plus second que les axiomes. Voyez AXIOME. En effet, je voudrais bien savoir de quel avantage il peut être.

1.^o S'il s'agit des *causes* de la seconde espèce, qui ne sont connues que par leurs effets, il ne peut jamais servir de rien. Car si l'on ne connoît pas l'effet, on ne connoît rien du tout ; & si l'on connoît l'effet, on n'a plus besoin du principe, puisque deux effets différens étant donnés, on n'a qu'à les comparer immédiatement, sans s'embarasser s'ils sont proportionnés ou non à leurs causes.

2.^o S'il s'agit des *causes* de la première espèce, c'est-à-dire, des causes qui viennent de l'impul-

donc, ces causes ne peuvent jamais être autre chose qu'un corps qui est en mouvement, & qui en pousse un autre. Or, non-seulement on a des loix de l'impulsion & de la percussion, indépendamment de ce principe, mais il seroit même possible, si l'on s'en servoit, de tomber dans l'erreur. Je l'ai fait voir, article 119 de mon *Traité de dynamique*, & je vais le répéter ici en peu de mots.

Soit un corps M qui choque avec la vitesse u un autre corps en repos m , il est démontré, voyez PERCUSSION, que la vitesse commune aux deux corps après le choc sera $\frac{Mu}{M+m}$. Voilà, si l'on veut, l'effet; la cause est dans la masse M , animée de la vitesse u . Mais quelle fonction de M & de u prendra-t-on pour exprimer cette cause? sera-ce Mu , ou M^2u , ou M^2u^2 , ou Mu^3 , &c., & ainsi à l'infini? D'ailleurs, laquelle de ces fonctions qu'on prenne pour exprimer la cause, la vitesse produite dans le corps m variera à mesure que m variera, & ne sera point par conséquent proportionnelle à la cause, puisque M & u restant constants, la cause reste la même. On dira peut-être que je ne prends ici qu'une partie de l'effet, savoir, la vitesse produite dans le corps m , & que l'effet total est $\frac{Mu}{M+m} + \frac{Mu}{M+m}$, c'est-à-dire, la somme des deux quantités de mouvement, laquelle est égale & proportionnelle à la cause Mu . A la bonne heure; mais l'effet total dont il s'agit, est composé de deux quantités de mouvement qu'il faut que je connoisse séparément; & comment les connoîtrai-je avec ce principe, que l'effet est proportionnel à sa cause? Il faudroit donc diviser la cause en deux parties pour chacun des deux effets partiels: comment le tirer de cet embarras?

Il seroit à souhaiter que les mécaniciens reconnussent enfin bien distinctement que nous ne connoissons rien dans le mouvement que le mouvement même, c'est-à-dire, l'espace parcouru & le tems employé à le parcourir, & que les causes métaphysiques nous sont inconnues; que ce que nous appelons causes, même de la première espèce, n'est tel qu'improprement; ce sont des effets desquels il résulte d'autres effets. Un corps en pousse un autre, c'est-à-dire, ce corps est en mouvement, il en rencontre un autre, il doit nécessairement arriver du changement à cette occasion dans l'état des deux corps, à cause de leur impénétrabilité; on détermine les loix de ce changement par des principes certains, & l'on regarde en conséquence le corps choquant comme la cause du mouvement du corps choqué. Mais cette façon de parler est impropre. La cause métaphysique, la vraie cause nous est inconnue. Voyez IMPULSION.

D'ailleurs quand on dit que les effets sont proportionnels à leurs causes, ou l'on a point d'idée claire de ce qu'on veut dire, ou l'on veut dire que ces

deux causes, par exemple, sont entr'elles comme leurs effets. Or, si ce sont deux causes métaphysiques dont on veut parler, comment peut-on avancer une pareille assertion? Les effets peuvent se comparer, parce qu'on peut trouver qu'un espace est double ou triple, &c., d'un autre parcouru dans le même tems; mais peut-on dire qu'une cause métaphysique, c'est-à-dire, qui n'est pas elle-même un effet matériel, & pour ainsi dire palpable, soit double d'une autre cause métaphysique? C'est comme si l'on disoit qu'une sensation est double d'une autre; que le blanc est double du rouge, &c. Je vois deux objets, dont l'un est double de l'autre: peut-on dire que mes deux sensations sont proportionnelles à leurs objets?

Un autre inconvénient du principe dont il s'agit, c'est le grand nombre de paralogismes dans lesquels il peut entraîner, lorsqu'on fait mal démêler les causes qui se compliquent quelquefois plusieurs ensemble, pour produire un effet qui paroît unique. Rien n'est si commun que cette mauvaise manière de raisonner. Concluons donc que le principe dont nous parlons est inutile, & même dangereux. Il y a beaucoup d'apparence que si l'on ne s'étoit jamais avisé de dire que les effets sont proportionnels à leurs causes, on n'eût jamais disputé sur les forces vives. Voyez FORCE. Car tout le monde consent des effets. Que n'en restoit-on là? Mais on a voulu subtiliser, & on a tout brouillé, au lieu d'éclaircir tout. (O)

CAUSTIQUE, *c. f.* dans la *Géométrie transcendante*, est le nom que l'on donne à la courbe que touchent les rayons réfléchis ou réfractés par quelque autre courbe. Voyez COURBE. Si une infinité de rayons de lumière inégalement proches tombent sur toute l'étendue d'une surface, & que ces rayons soient supposés réfléchis ou réfractés suivant les loix de la réflexion & de la réfraction, la suite des points de concours des rayons réfléchis ou rompus infiniment proches, formera un polygone d'une infinité de côtés ou une courbe qu'on appelle caustique; cette courbe est touchée par les rayons réfléchis ou rompus, puisque ces rayons ne sont que le prolongement des petits côtés de la caustique.

Chaque courbe a ses deux caustiques, ce qui fait diviser les caustiques en catacaustiques & diacaustiques; les premières sont formées par réflexion, & les autres par réfraction.

On attribue ordinairement l'invention des caustiques à M. Schirnhaufen; il les proposa à l'Académie des Sciences en l'année 1682; elles ont cette propriété remarquable, que lorsque les courbes qui les produisent sont géométriques, elles sont toujours rectifiables.

Ainsi, la caustique formée des rayons réfléchis par un quart de cercle, est égale aux $\frac{1}{2}$ du diamètre. Cette rectification des caustiques a été antérieure au calcul de l'infini, qui nous a fourni celle de plu-

figures autres courbes. *V. RECTIFICATION.* L'Académie nomma un comité pour examiner ces nouvelles courbes; il étoit composé de MM. Cassini, Mariotte & de la Hire, qui évoquèrent en doute la description ou génération que M. Tschirnhausen avoit donnée de la *caustique* par réflexion du quart de cercle: l'auteur refusa de leur découvrir la méthode, & M. de la Hire perdit à soutenir qu'on pouvoit en soupçonner la génération de fausseté. Quoi qu'il en soit, M. Tschirnhausen la proposoit avec tant de confiance, qu'il l'envoya aux actes de Leipzig, mais sans démonstration. M. de la Hire a fait voir depuis dans son *traité des Epicycloïdes*, que M. Tschirnhausen s'étoit effectivement trompé dans la description de cette *caustique*. On trouve dans l'*Analyse des infinités petits* de M. le marquis de l'Hôpital, une méthode pour déterminer les *caustiques* de réflexion & de réfraction d'une courbe quelconque, avec les propriétés générales de ces sortes de courbes, que le calcul des infinités petits rend très-aisées à découvrir & à entendre.

Le mot *caustique* vient du grec *καίω*, je brûle, parce les rayons étant ramassés sur la *caustique* en plus grande quantité qu'ailleurs, peuvent y brûler, si la *caustique* est d'une fort petite étendue. Dans les miroirs paraboliques, la *caustique* des rayons parallèles à l'axe est un point qu'on nomme le *foyer* de la parabole.

Dans les miroirs sphériques d'une étendue de 20 à 30 degrés, la *caustique* des rayons parallèles à l'axe est d'une très-petite étendue, ce qui rend les miroirs sphériques & paraboliques capables de brûler.

Si plusieurs rayons partent d'un point & tombent sur une surface plane, les rayons réfléchis prolongés se réunissent en un point, & pour trouver ce point, il n'y a qu'à mener du point d'où les rayons partent une perpendiculaire à la surface plane, prolonger cette perpendiculaire jusqu'à ce que la partie prolongée lui soit égale, & le point cherché sera à l'extrémité de cette partie prolongée. *Voyez Miroir.*

Cette proposition peut faire naître sur les *caustiques* une difficulté capable d'arrêter les commençans, & qu'il est bon de lever ici. On fait que dans la Géométrie des infinités petits, une portion de courbe infiniment petite est regardée comme une ligne droite dont la tangente est le prolongement. Supposons donc un petit côté de courbe prolonge en tangente, & imaginons deux rayons infiniment proches qui tombent sur ce petit côté; il semble, d'après ce que nous venons de dire, que pour trouver le point de concours des rayons réfléchis, il suffise de mener du point d'où les rayons partent une perpendiculaire à cette tangente, & de prolonger cette perpendiculaire d'une quantité égale. Cependant le calcul & la méthode de M. de l'Hôpital font voir que l'extrémité de cette perpendiculaire n'est pas un point de la *caus-*

tique. Comment donc accorder tout cela? Le voici. En considérant la petite portion de courbe comme une ligne droite, il faudroit que les perpendiculaires à la courbe, tirées aux deux extrémités du petit côté, fussent exactement parallèles, comme elles le seroient si la surface totale au lieu d'être courbe étoit droite: or cela n'est pas; les perpendiculaires concourent à une certaine distance, & forment par leur concours ce qu'on appelle le *rayon de la développée*. *Voyez DÉVELOPPÉE.* Ainsi, il faut avoir égard à la position de ces perpendiculaires concourantes pour déterminer la position des rayons réfléchis, & par conséquent leur point de concours, qui est tout autre que si la surface étoit droite. En considérant une courbe comme un polygone, les perpendiculaires à la courbe ne doivent pas être les perpendiculaires aux côtés de la courbe; ce sont les lignes qui divisent en deux également l'angle infiniment obtus que forment les petits côtés; autrement, au point de concours de deux petits côtés, il y auroit deux perpendiculaires, une pour chaque côté. Or cela ne se peut, puisqu'à chaque point d'une courbe il n'y a qu'une perpendiculaire possible. Les rayons incidents & réfléchis doivent faire avec la perpendiculaire des angles égaux. D'après cette remarque sur les perpendiculaires, on peut déterminer les *caustiques* en regardant les courbes comme polygones; & on ne trouvera plus aucune absurdité ni contradiction apparente entre les principes de la Géométrie de l'infini. *Voyez DIFFÉRENCIEL, INFINI, &c. (O)*

CAZIMI, (*Astron.*) ce mot arabe est employé par les astronomes de ces pays pour marquer le disque du soleil; lorsqu'ils disent qu'une telle planète est en *cazimi*, c'est comme s'ils vouloient dire qu'elle ne paroît point éloignée de 16 minutes du centre du soleil, le demi-diamètre de cet astre étant de 16 minutes.

CEG

CEGINUS, f. m. (*Astr.*) est une étoile de la troisième grandeur, dans l'épaule gauche du bouvier marquée γ; la latitude est 49° 33' $\frac{1}{2}$, la longitude en 1750, 6 signes 14° 9' (O).

CÉLÉRITÉ, f. f. (*Mécanique*) est proprement la vitesse d'un corps en mouvement, ou cette affection du corps en mouvement, par laquelle il est mis en état de parcourir un certain espace dans un certain temps. *Voy. VITESSE, ESPACE; voyez aussi MOUVEMENT.*

Ce mot s'emploie presque toujours dans un sens figuré. On se sert rarement du mot de *célrité* pour exprimer la vitesse d'un corps en mouvement; mais on s'en sert souvent dans l'usage ordinaire; lorsqu'on dit, par exemple, qu'une telle affaire demande expédition & *célrité*, &c. Ce

mot vient du latin *celerius*, qui signifie la même chose. (O)

CÉLIOGRAPHIE (*Astron.*) nom que Bianchini a donné à la description des taches de vémins, ce mot vient de *καίω*, *καίω*, *καίω*, *καίω*, *καίω*. Voyez son ouvrage intitulé, *hesperi & phosphori nova phenomena*.

CEN

CENTAURE, (*Astron.*) constellation méridionale, *centaurus*, *femivir*, *peleron*; Chiron; Phyllirides, *pelethronius*, *pholos*, *minotaurus*, *acris venator*; chez les Arabes *albert*: ils peignent un ours sur un cheval. Les centaures étoient un peuple de nomades ou de pâtres, errants aux environs du mont Ossa, qu'on disoit avoir inventé l'art de dompter les chevaux; de-là vient la fable qui les faisoit demi-hommes & demi-chevaux. Les anciens croient qu'il existoit véritablement une race d'hommes de cette forme, & l'on en trouvoit un à Rome conservé dans le miel. (Plin., VIII, 3, Ererat., Dcf. de la chron., pag. 143.) On appela aussi *centaures* les gardes de Saturne, & en général ceux qui passèrent pour inventeurs de l'art d'exercer les chevaux, ou de garder les troupeaux à cause des mots *κίρπος*, *επέρων*, & *καίω*, *ταύρου*. De-là vient que l'on attribue à plusieurs héros de la fable la constellation du centaure: d'autres ont dit que c'étoit le centaure Chiron, représenté moitié homme & moitié cheval, parce qu'il avoit su rendre l'art de la médecine utile aux hommes & aux chevaux; enfin d'autres prétendent que c'est le symbole de la volupté qui rend l'homme semblable aux animaux; mais nous ignorons totalement la première origine de l'allégorie qui a fait placer un centaure dans les constellations. On lui mettoit dans les mains une outre pleine de vin, symbole des vendanges, qui arrivoient tant que le soleil étoit près de cette constellation, comme l'observe M. Dupuis. (*Astron. T. IV. pag. 484 & 488.*) On en a fait le septième travail d'Hercule, ou son triomphe sur un taureau furieux, parce que le soleil dans le signe du verseau faisoit disparaître ce monstre minotaure ou cette constellation.

Le centaure ne renferme que cinq étoiles dans le catalogue britannique, mais il y en a un grand nombre dans le catalogue de la Caille, une entre autres de la première grandeur, qui avoit en 1750 21° 42' 19" d'ascension droite, & 59° 47' 8" de déclinaison australe, en sorte qu'elle passe à près de 19 degrés au-dessous de notre horizon. (D. L.)

CENTIÈME, adj. (*Arith.*), partie d'un tout supposé divisé en cent parties égales.

CENTRAL, adj. (*Mécanique*) se dit de ce qui a rapport à un centre. Voyez CENTRE.

C'est ainsi que nous disons *ellipse centrale*, *feu central*, *force centrale*, *régie centrale*, &c. Voyez les articles FEU, ÉCLIPSE, &c.

Forces centrales, sont des forces ou puissances par lesquelles un corps mùt tend vers un centre de mouvement, ou s'en éloigne.

C'est une loi générale de la nature, que tout corps tend à s'éloigner en ligne droite; par conséquent, un corps qui se meut sur une ligne courbe, tend parfaitement à s'échapper par la tangente de cette courbe: ainsi, pour l'empêcher de s'échapper suivant cette tangente, il faut nécessairement une force qui l'en détourne & qui le retienne sur la courbe. Or, c'est cette force qu'on appelle *force centrale*. Par exemple un corps *A* (*Mécan. fig. 24*) qui se meut sur le cercle *BEA*, tend à se mouvoir au point *A* suivant la tangente *AG*, & il le mouvroit effectivement suivant cette tangente, s'il n'avoit pas une *force centrale* qui le pousse vers le point *C*, & qui lui feroit parcourir la ligne *AM* dans le même tems qu'il parcourroit *AE*; de sorte qu'il décrit la petite portion de courbe *AD*.

Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que la *force centrale* soit toujours dirigée vers un même point; elle peut changer de direction à chaque instant, il suffit que sa direction soit différente de celle de la tangente, pour qu'elle oblige le corps à décrire une courbe. Voyez CENTRE DE MOUVEMENT; voyez aussi FORCE.

Les *forces centrales* se divisent en deux espèces, eu égard aux différentes manières dont elles sont dirigées par rapport au centre, savoir en *centripètes* & en *centrifuges*. Voyez ces mots.

Loix des *forces centrales*. Le célèbre M. Huygens est le premier qui ait découvert ces loix. Mais outre qu'il les a données sans démonstration, il ne s'est appliqué qu'à déterminer les loix des *forces centrales* dans le cas où le corps décrit un cercle. Plusieurs auteurs ont démontré depuis les loix données par M. Huygens, & le célèbre M. Newton a étendu la théorie des *forces centrales* à toutes les courbes possibles.

Parmi les auteurs qui ont démontré les propositions de M. Huygens, personne ne l'a fait plus clairement, & d'une manière plus simple, que le marquis de l'Hôpital dans les *Mémoires de l'Académie* de 1701. 1.^{re} Il commence par enseigner la manière de comparer la *force centrale* avec la pesanteur; & il donne là-dessus la règle générale suivante, qui renferme toute la théorie des *forces centrales*.

Supposons qu'un corps d'un poids déterminé se meuve uniformément autour d'un centre avec une certaine vitesse, il faudra trouver de quelle hauteur il devroit être tombé pour acquiescir cette vitesse; après quoi on fera cette proportion: comme le rayon du cercle que le corps décrit est au double de cette hauteur, ainsi son poids est à la *force centrifuge*. Il est visible que par cette proportion on peut toujours trouver le rapport de la *force centrale* d'un corps à son poids; & que par conséquent on pourra facilement comparer les *forces centrales* entr'elles. Mais si on veut se contenter

de comparer les *forces centrales* entr'elles sans les comparer avec la pesanteur ; on peut se servir de ce théorème, que les *forces centrales* de deux corps sont entr'elles comme le produit de leurs masses multipliées par les quarrés de leurs vitesses, divisées par rayons ou par les diamètres des cercles qu'ils décrivent. On peut démontrer cette proposition sans calcul, d'après M. Newton, de la manière suivante. Imaginons les cercles que ces corps décrivent comme des polygones réguliers semblables, d'une infinité de côtés ; il est certain que les forces avec lesquelles chacun des corps frappe un des angles de ces polygones, sont comme des produits de leurs masses par leurs vitesses. Or, dans un même tems, ils rencontrent d'autant plus d'angles qu'ils vont plus vite, & que le cercle est d'un rayon plus petit : donc le nombre des coups dans un même tems, est comme la vitesse divisée par le rayon, donc le produit du nombre des coups par un seul coup, c'est-à-dire la *force centrale*, sera comme le produit de la masse multipliée par le quarré de la vitesse, divisé par le rayon.

Donc, si deux corps M, m , décrivent les circonférences C, c , de deux cercles avec des vitesses V, v , pendant les tems T, t , & que les *forces centrales* de ces corps soient F, f , & les rayons des cercles qu'ils décrivent R, r , on aura $F : f :: \frac{M \times VV}{R} :$

$\frac{m \times vv}{r}$, de plus on a $V : v :: \frac{C}{T} : \frac{c}{t}$; donc

on aura encore $F : f :: \frac{MR}{Tt} : \frac{mr}{t^2}$.

2.^o Il est aisé de conclure de-là, que si deux corps de poids égal décrivent des circonférences de cercles inégaux dans des tems égaux, leurs *forces centrales* seront comme les diamètres AB & HL (Planc. Méchan. fig. 24.) ; car si $m = M$ & $t = T$, on aura $F : f :: R : r$; & par conséquent si les *forces centrales* de deux corps qui décrivent des circonférences de deux cercles inégaux, sont comme leurs diamètres, ces corps feront leurs révolutions dans des tems égaux.

3.^o La *force centrale* d'un corps qui se meut dans une circonférence de cercle, est comme le quarré de l'arc infiniment petit AE , divisé par le diamètre AB ; car cet arc infiniment petit décrit dans un instant, peut représenter la vitesse, puisqu'il lui est proportionnel. Ainsi puisqu'un corps décrit dans des tems égaux, par un mouvement uniforme, des arcs égaux AB , la *force centrale* par laquelle le corps est poussé dans la circonférence du cercle, doit être constamment la même.

4.^o Si deux corps décrivent par un mouvement uniforme différentes circonférences, leurs *forces centrales* seront en raison composée de la double de leur vitesse, & de la réciproque de leur diamètre ; d'où il s'ensuit que si les vitesses sont égales, les *forces centrales* seront réciproquement comme les diamètres ; & si les diamètres AB & HL sont

égaux, c'est-à-dire si les mobiles se meuvent dans la même circonférence, mais avec des vitesses inégales, les *forces centrales* seront en raison double des vitesses.

Si les *forces centrales* de deux corps qui se meuvent dans des circonférences différentes, sont égales, les diamètres AB & HL seront en raison double des vitesses.

5.^o Si deux corps qui se meuvent dans des circonférences inégales sont animés par des *forces centrales* égales, le tems employé à parcourir la plus grande circonférence sera au tems employé à parcourir la plus petite, en raison soûdouble du plus grand diamètre AB , au moindre HL : c'est pourquoi on aura $T : t :: D : d$; c'est-à-dire que les diamètres des cercles dans les circonférences desquels ces corps sont emportés par une même *force centrale*, sont en raison double des tems.

Il s'ensuit aussi de-là, que le tems que des corps poussés par des *forces centrales* égales emploient à parcourir des circonférences inégales, sont proportionnels à leurs vitesses.

Les *forces centrales* sont en raison composée de la directé des diamètres & de la réciproque des quarrés des tems employés à parcourir les circonférences entières.

6.^o Si les tems dans lesquels les corps parcourent les circonférences entières ou des arcs semblables, sont comme les diamètres des cercles, les *forces centrales* seront alors réciproquement comme ces mêmes diamètres.

7.^o Si un corps se meut uniformément dans la circonférence d'un cercle avec la vitesse qu'il acquiert en tombant de la hauteur FA , nous avons dit que la *force centrale* sera la gravité comme le double de la hauteur FA est au rayon CA ; & par conséquent, si on nomme G la gravité du corps, la *force centrifuge* sera $\frac{2FA \times G}{CA}$. Par-là

on connoitra quelle doit être la force centrifuge & la vitesse d'un corps attaché à un fil, pour qu'il ne rompe point ce fil en circulant horizontalement ; car, supposons qu'un poids de trois livres, par exemple, rompe le fil, & que le poids du corps soit de deux livres, on aura G égal à deux livres, & $\frac{2FA \times 2}{CA}$ devra être plus petit que trois livres,

d'où l'on tire $FA < \frac{3CA}{4}$; ainsi, la vitesse que le corps doit avoir pour ne point rompre le fil, doit être plus petite que celle qu'il acquerrait en tombant d'une hauteur égale aux $\frac{3}{4}$ du rayon. Si le corps circuloit verticalement, il faudroit que $\frac{2FA \times G}{CA} + G \text{ fût } < \text{trois livres.}$

8.^o Si un corps grave se meut uniformément dans la circonférence d'un cercle, & avec la vitesse qu'il

qu'il peut acquies en tombant d'une hauteur égale à la moitié du rayon : la force centrale sera alors égale à la gravité ; réciproquement si la force centrale est égale à la gravité, le corps se mouvra dans la circonférence du cercle avec la même vitesse qu'il auroit acquise en tombant d'une hauteur égale à la moitié du rayon.

9.° Si la force centrale est égale à la gravité, le tems qu'elle emploiera à faire parcourir la circonférence entière, sera le tems dans lequel un corps grave tomberoit de la moitié du rayon, comme la circonférence est au rayon.

10.° Si deux corps se meuvent dans des circonférences inégales & avec des vitesses inégales, de sorte que les vitesses soient entr'elles en raison réciproque de la soudoublée des diamètres, les forces centrales seront en raison réciproque de la doublée des distances au centre des forces.

11.° Si deux corps se meuvent dans des circonférences inégales avec des vitesses qui soient entr'elles réciproquement comme les diamètres, les forces centrales seront en raison inverse des cubes de leurs distances au centre des forces.

12.° Si les vitesses de deux corps qui se meuvent dans des circonférences inégales, sont en raison inverse de la soudoublée des diamètres, les tems qu'ils emploieront à faire leur révolution entière ou à parcourir des arcs semblables, seront en raison inverse de la triplée des distances du centre des forces : c'est pourquoi si les forces centrales sont en raison inverse de la doublée des distances du centre, les tems que les corps emploieront à faire leur révolution entière ou à parcourir des arcs semblables, seront en raison inverse de la triplée des distances.

13.° Ces différentes loix sont aisées à déduire de la formule que nous avons donnée dans l'article 1. pour la comparaison des forces centrales entr'elles. Or, pour comparer les forces centrales sur des courbes, autres que des cercles, il faut prendre au lieu des rayons des cercles, les rayons de la développée de ces courbes, qui changent à chaque point, & qu'on trouve par des méthodes géométriques ; d'où l'on voit que quand un corps décrit une courbe, autre qu'un cercle, la valeur de la force centrale change à chaque instant, au lieu qu'elle est toujours la même quand le corps décrit un cercle. Il faudra de plus diviser la quantité trouvée par le rapport du sinus total au cosinus de l'angle que la direction de la force centrale fait avec la tangente.

14.° Si un corps tend à se mouvoir suivant AD (fig. 25.) & qu'il soit en même tems sollicité par une force centripète vers un point fixe C , placé dans le même plan, il décrira alors une courbe dont la concavité sera tournée vers C , & dont les différentes aires comprises entre deux rayons quel-

Mathématiques. Tome I, 1.° Partie.

conques AC & CB , seront proportionnels aux tems employés à parcourir ces aires, c'est-à-dire à parvenir de l'extrémité d'un de ces rayons à l'extrémité de l'autre. Car sans la force centrale qui pousse suivant BF , le corps parcourroit dans des tems égaux $BD = AB$: mais à cause de la force centrale, il décrira la diagonale BE du parallélogramme $FBD E$ dans le même tems qu'il a décrit AB . Or le triangle $CBA = CBD$, à cause de $BD = AB$: & à cause des parallèles DE, FB , on a $CBE = CBD$. Donc $CBE = CBA$. Donc, &c.

15.° Quelles différentes que soient des forces centrales dans des cercles, on pourra toujours les comparer ensemble : car elles seront toujours en raison composée de celle des quantités de matière que contiennent les mobiles, de celles de leur distance au centre, & enfin de l'inverse de la doublée des tems périodiques. Si l'on multiplie donc la quantité de matière de chaque mobile par la distance du centre, & qu'on divise le produit par le carré du tems périodique, les quotiens qui résulteront de ces opérations seront entr'eux dans la raison des forces centrales : c'est une suite de l'article 1.

16.° Si les quantités de matières sont égales, il faudra diviser les distances par les carrés des tems périodiques, pour déterminer le rapport des forces centrales.

17.° Lorsque la force par laquelle un corps est sollicité vers un point, n'est pas par-tout la même, mais qu'elle augmente ou diminue à proportion de la distance du centre ; cette nouvelle condition fait décrire alors au mobile différentes courbes plus ou moins composées. Si la force décroît en raison inverse des carrés des distances à ce point, le mobile décrira alors une ellipse, qui est une courbe ovale, dans laquelle se trouvent deux points qu'on nomme foyers, dont l'un est alors occupé par le point C , vers lequel se dirige la force dont nous parlons ; de façon qu'à chaque révolution le corps s'approche une fois de ce point, & s'en éloigne une fois. Le cercle appartient aussi à cette espèce de courbe, de sorte que dans ce cas le mobile peut aussi décrire un cercle. Le mobile peut aussi, en lui supposant une plus grande vitesse, décrire les deux autres sections coniques, la parabole & l'hyperbole ; lesquelles ne renourent point sur elles-mêmes. Si la force croît en même tems que la distance, & en raison de la distance même, le corps décrira encore une ellipse ; mais le point vers lequel se dirigera la force sera alors le centre de l'ellipse ; & le mobile à chaque révolution s'approchera deux fois & s'éloignera deux fois de ce point. Il peut arriver encore en ce cas que le corps se meuve dans un cercle. Voyez ORBITE, PLANÈTE, TRAJECTOIRE & PROJECTILE. Voyez aussi les principes mathém. de

M. Newton, *liv. I. & les éléments de méchan. de Volf.*

Les courbes peuvent être considérées, ou comme courbes rigoureuses, ou comme polygones infinis; or l'expression de la force centrale est différente dans les deux cas: ce paradoxe singulier sera expliqué à l'article COURBE.

Règle centrale; c'est une règle ou une méthode qui a été découverte par Thomas Baker, géomètre anglais; au moyen de laquelle on trouve le centre & le rayon du cercle qui peut couper une parabole donnée dans des points, dont les abscisses représentent les racines réelles du troisième ou du quatrième degré, qu'on se propose de construire. Voyez CONSTRUCTION.

La règle centrale est sur-tout fondée sur cette propriété de la parabole; que si on tire dans cette courbe une perpendiculaire à un diamètre quelconque, le rectangle formé des segments de cette ligne, est égal au rectangle fait de la portion correspondante du diamètre, & du paramètre de l'axe.

La règle centrale est préférable, selon Baker, à la méthode de Descartes pour construire les équations, en ce que, dans cette dernière, on a besoin de préparer l'équation, en lui ôtant le second terme; au lieu que dans celle de Baker on n'a point cet embarras, puisqu'elle donne le moyen de construire, par l'intersection d'un cercle & d'une parabole, toute équation qui ne passe pas le quatrième degré, sans en faire évanouir ni changer aucun terme. Voyez *transactions philosophiq. n.º 157.* Mais il est très-facile, en suivant l'esprit de la méthode de Descartes, de construire par le moyen du cercle & de la parabole, toutes les équations du troisième & du quatrième degré, sans en faire évanouir le second terme. Voyez la solution de ce problème dans l'article 386 des sections coniques de M. de l'Hôpital. (O)

CENTRE, f. m. (Géométrie.) dans un sens général marque un point également éloigné des extrémités d'une ligne, d'une figure, d'un corps, ou le milieu d'une ligne, ou un plan par lequel un corps est divisé en deux parties égales.

CENTRE d'un cercle: c'est le point du milieu du cercle, situé de façon que toutes les lignes menées de là à la circonférence, sont égales. Euclide démontre que l'angle au centre est double de celui de la circonférence, c'est-à-dire que l'angle qui est fait de deux lignes qui sont tirées des deux extrémités d'un arc de cercle au centre, est double de l'angle que font deux lignes tirées des extrémités d'un même arc, & qui aboutissent à la circonférence. Voyez CIRCONFÉRENCE & ANGLE. (E.)

CENTRE d'une section conique: c'est le point où concourent tous les diamètres. Voyez DIAMÈTRE, voyez aussi SECTIONS CONIQUES. Ce point est dans l'ellipse en-dehors de la figure, & dans l'hyper-

bole au - dehors. Voyez ELLIPSE & HYPERBOLE.

CENTRE d'une courbe d'un genre plus élevé: c'est le point où deux diamètres concourent. Voyez DIAMÈTRE.

Lorsque tous les diamètres concourent en un même point, M. Newton appelle ce point *centre général*. Voyez COURBE. M. l'abbé de Gua, dans ses usages de l'analyse de Descartes, a donné une méthode pour trouver les centres généraux des courbes, & des remarques importantes sur la définition des centres généraux donnée par M. Newton.

M. l'abbé de Gua appelle *centre général d'une courbe* un point de son plan, tel que toutes les droites qui y passent aient de part & d'autre de ce point des portions égales terminées à la courbe; & il observe, 1.º que cette définition convient assez à l'acception ordinaire du mot *centre*. 2.º Que la définition de M. Newton est comprise dans la sienne. 3.º Que ce n'est qu'en se servant de sa définition, qu'on peut parvenir aux conditions que M. Newton a assignées pour les courbes, qui ont, selon ce grand géomètre, un *centre général*; d'où il parait s'ensuivre que M. Newton a en en vue plutôt la définition de M. l'abbé de Gua, que la sienne propre, lorsqu'il a déterminé ses *centres*. Voyez l'ouvrage cité de M. l'abbé de Gua, pages 17 & suivantes.

M. Cramer, dans son introduction à l'analyse des lignes courbes, donne une méthode très-exacte pour déterminer les centres généraux. Dans l'extrait que le *journal des sçavans* de 1740 a donné de l'ouvrage de M. l'abbé de Gua, on trouve à la fin une remarque assez importante sur la méthode de cet habile géomètre pour trouver les centres généraux. (O)

CENTRE de gravité, (Mécanique): point situé dans l'intérieur d'un corps, de telle manière que tout plan qui y passe, partage le corps en deux segments qui se font équilibre, c'est-à-dire dont l'un ne peut pas faire mouvoir l'autre.

D'où il s'ensuit que si on empêche la descente du centre de gravité, c'est-à-dire si on suspend un corps par son centre de gravité, il restera en repos.

La gravité totale d'un corps peut être conçue réunie à son centre de gravité. Les droites qui passent par le centre de gravité s'appellent *diamètres de gravité*; ainsi, l'intersection de deux diamètres de gravité détermine le centre. Voyez DIAMÈTRE.

Tout plan qui passe par le centre de gravité, ou ce qui est la même chose, dans lequel ce centre se trouve, s'appelle *plan de gravité*; & ainsi l'intersection commune de deux plans de gravité, est un diamètre de gravité.

Dans les corps homogènes qui peuvent se diviser en parties égales & semblables, le centre de gravité est la même chose que le centre de figure ou le point du milieu du corps; c'est pourquoi,

si on coupe une droite en deux parties égales, le point de section sera le centre de gravité.

Centre commun de gravité de deux corps, c'est un point situé dans la ligne droite qui joint les centres de gravité de ces deux corps, de manière que s'il étoit soutenu, le système des deux corps resteroit en repos, & la gravité de l'un de ces deux corps ne pourroit prévaloir sur celle de l'autre; ainsi le point de suspension dans la balance ordinaire ou dans la romaine, c'est-à-dire le point sur lequel les deux poids sont équilibrés, est le centre commun de gravité des deux poids.

LOIX DU CENTRE DE GRAVITÉ: 1.^o Si on joint (Pl. Méchan. fig. 26.) les centres de gravité de deux corps A & B , par une droite AB , les distances BC & CA du centre commun de gravité C aux centres particuliers de gravité B & A , seront entre elles en raison réciproque des poids. Voyez BALANCE & LEVER.

Donc si les poids A & B sont égaux, le centre commun de gravité C sera dans le milieu de la droite AB . De plus puisque A est à B comme BC est à CA , il s'ensuit que $A \times AC = B \times BC$, ce qui fait voir que les forces des corps en équilibre, doivent être estimées par le produit de la masse & de la distance du centre de gravité, ce qu'on appelle ordinairement moment des corps. Voyez MOMENT.

De plus, puisque $A : B :: BC : CA$, on en peut conclure que $A + B : A :: BC + CA : BC$; ce qui fait voir que pour trouver le centre commun de gravité C de deux corps, il n'y aura qu'à prendre le produit de l'un de ces deux poids par la distance AB des centres particuliers de gravité AB , & le diviser par la somme des poids A & B . Supposons; par exemple, $A = 12$, $B = 4$, $AB = 24$, on aura donc $BC = \frac{24 \times 12}{16} = 18$; si le poids A est donné, ainsi que la distance AB des centres particuliers de gravité, & le centre commun de gravité C , on aura le poids de $B = \frac{A \times AC}{BC}$,

c'est-à-dire, qu'on le trouvera, en divisant le moment du poids donné par la distance du poids qu'on cherche, au centre commun de gravité: supposons $A = 12$, $BC = 18$, $AC = 6$, & on aura $B = \frac{6 \times 12}{18} = 4$.

2.^o Pour déterminer le centre commun de gravité de plusieurs corps donnés a, b, c, d , (même figure) trouvez dans la ligne AB le centre commun de gravité des deux premiers corps a & b que je supposerai en F ; concevez ensuite un poids $a + b$ appliqué en F , & trouvez dans la ligne FE le centre commun de gravité des deux poids $a + b$, & c que je supposerai en G ; enfin supposez un poids $a + b + c$ appliqué en G , égal aux deux poids $a + b + c$, & trouvez le centre commun de gravité de ces poids $a + b + c$ & de d , lequel je

supposerai en H , & ce point H sera le centre commun de gravité de tout le système des corps $a + b + c + d$; & on peut trouver de la même manière le centre de gravité d'un plus grand nombre de corps tels qu'on voudra.

3.^o Deux poids D & E (fig. 27.) étant suspendus par une ligne CE qui ne passe point par leur centre commun de gravité, trouver lequel des deux corps doit emporter l'autre?

Il faudra pour cela multiplier chaque poids par la distance du centre de suspension, celui du côté duquel se trouvera le plus grand produit, sera la prépondérance, & la différence entre les deux sera la quantité dont il l'emportera sur l'autre.

Les moments des poids D & E , suspendus par une ligne qui ne passe point par le centre de gravité, étant en raison composée des poids D & E , & des distances du point de suspension, il s'ensuit encore que le moment d'un poids suspendu précisément au point C , n'aura aucun effet par rapport aux autres poids D & E .

4.^o Soient plusieurs corps, a, b, c, d , (fig. 28) suspendus en C par une droite CO qui ne passe point par leur centre de gravité: on propose de déterminer de quel côté sera la prépondérance, & qu'elle en sera la quantité.

On multipliera pour cela les poids c & d par leur distance CE & CD du point de suspension, & la somme sera le moment de leur poids ou leur moment vers la droite: on multipliera ensuite les poids a & b par leurs distances AC & AD ; & la somme sera le moment vers la gauche; on soustraira l'un de ces moments de l'autre, & le reste donnera la prépondérance cherchée.

5.^o Un nombre quelconque de poids a, b, c, d , étant suspendus en C par une ligne CO qui ne passe point par leur centre commun de gravité, & la prépondérance étant vers la droite: déterminer un point F , où la somme de tous les poids étant suspendue, la prépondérance continueroit à être la même que dans la première situation.

Trouvez le moment des poids c & d , c'est-à-dire $c \times CE$ & $d \times CD$; & puisque le moment des poids suspendus en F doit être précisément le même, le moment trouvé des poids c & d sera donc le produit de CF par la somme des poids; & ainsi ce moment étant divisé par la somme des poids, le quotient donnera la distance CF , à laquelle la somme des poids doit être suspendue, pour que la prépondérance continue à être la même qu'auparavant.

6.^o Trouver le centre de gravité d'un parallélogramme & d'un parallépipède.

Tirez les diagonales AD & EG (fig. 29) ainsi que CB & HF ; & puisque chacune des diagonales AD & CB divise le parallélogramme $ACDB$ en deux parties égales & semblables, chacune d'elles passe donc par le centre de gravité;

done le point d'intersection I est le centre de gravité d'un parallélogramme.

De même puisque les plans $CBFH$ & $ADGE$ divisent le parallélogramme en deux parties égales & semblables, ils passent l'un & l'autre par son centre de gravité; & ainsi leur intersection IK est le diamètre de gravité, & le milieu en est le centre.

On pourra trouver de la même manière le centre de gravité dans les prismes & les cylindres, en prenant le milieu de la droite qui joint leurs bases opposées.

Dans les polygones réguliers, le centre de gravité est le même que celui du cercle circonscrit ou inscrit à ces polygones.

7.^e Trouver le centre de gravité d'un cône & d'une pyramide. Le centre de gravité d'un cône est dans son axe AC (fig. 30); si l'on fait donc $AC = a$, $CD = r$, p la circonférence dont le rayon est r , $AP = x$, $Pp = dx$, le poids de l'élément du cône sera $\frac{p r x^2 dx}{2a^3}$, & son moment sera $\frac{p r x^3 dx}{2a^3}$; &

par conséquent l'intégrale des moments sera $\frac{p r x^4}{6a^3}$, laquelle, divisée par l'intégrale des poids $\frac{p r x^3}{3a^3}$, donne la distance du centre de gravité de la portion AMN au sommet A , $= \frac{6a^3 p r x^4}{8a^3 p r x^3} = \frac{3}{4} x$

$= \frac{3}{4} AP$; d'où il s'ensuit que le centre de gravité du cône entier est éloigné du sommet des $\frac{3}{4}$ de AC ; & on trouve de la même manière la distance du centre de gravité de la pyramide au sommet de cette pyramide $= \frac{3}{4} AC$.

8.^e Déterminer le centre de gravité d'un triangle BAC (fig. 31). Tirez la droite AD au point milieu D de BC ; & puisque le triangle DAB est égal au triangle DAC , on pourra donc diviser chacun de ces triangles en un même nombre de petits poids, appliqués de la même manière à l'axe commun AD , de façon que le centre de gravité du triangle BAC sera situé dans AD . Pour déterminer ce point précis, soit $AD = a$, $BC = b$, $AP = x$, $MN = y$, & on aura $AP^2 : MN^2 :: AD^2 : BC^2$,
 $x^2 : y^2 :: a^2 : b^2$

ce qui donnera $y = \frac{bx}{a}$; d'où il s'ensuit que le moment $y x dx = \frac{b x^2 dx}{a}$, & $\int y x dx = \frac{b x^3}{3a}$,

intégrale qui, étant divisée par l'aire AMN du triangle, c'est-à-dire, par $\frac{b x^2}{2a}$ donne la distance

du centre de gravité au sommet $= \frac{2a b x^3}{1 \cdot 2 b x^2} = \frac{2}{3} x$;

& ainsi substituant a pour x , la distance du centre total de gravité au sommet sera $= \frac{2}{3} a$.

9.^e Trouver le centre de gravité de la portion de parabole SAH , (fig. 32.) si la distance du sommet

A se trouve être $= \frac{1}{4} AE$ par les méthodes précédentes.

10.^e Le centre de gravité d'un arc de cercle, est éloigné du centre de cet arc, d'une droite qui est troisième proportionnelle à cet arc, à sa corde, & au rayon. La distance du centre de gravité d'un secteur de cercle au centre de ce cercle, est à la distance du centre de gravité de l'arc au même centre, comme 2 est à 3.

Les centres de gravité des segments des conoïdes, des paraboloides, des sphéroïdes, des cones tronqués, &c., demandent des calculs un peu plus compliqués, mais se trouvent d'ailleurs de la même manière. Voyez le cours de M. Wolf.

11.^e Déterminer mécaniquement le centre de gravité d'un corps. Placez le corps donné HI (fig. 33) sur une corde tendue ou sur le bord d'un prisme triangulaire FG , & avancez-le plus ou moins, jusqu'à ce que les parties des deux côtés soient en équilibre; le plan vertical passant par KL , passera par le centre de gravité; changez la situation du corps & avancez-le encore plus ou moins sur la corde ou sur le bord du prisme, jusqu'à ce qu'il reste en équilibre sur quelques lignes MN , & l'intersection des deux lignes MN & KL déterminera sur la base du corps le point O correspondant au centre de gravité.

On peut faire la même chose en plaçant le corps sur une table horizontale, & le faisant déborder hors de la table le plus qu'il sera possible sans qu'il tombe, & cela dans deux positions différentes en longueur & en largeur: la commune intersection des lignes, qui dans les deux situations correspondront au bord de la table, déterminera le centre de gravité; on peut aussi en venir à bout, en plaçant le corps sur la pointe d'un style, jusqu'à ce qu'il reste en équilibre. On a trouvé dans le corps humain que le centre de gravité est situé entre les fesses & le pubis, de façon que la gravité du corps est ramassée en entier dans l'endroit où la nature a placé les parties de la génération; d'où M. Wolf prend occasion d'admirer la sagesse du Créateur, qui a placé le membre viril dans l'endroit qui est le plus propre de tous à la copulation; réflexion aussi fautive qu'indécemment, puisque cette loi n'a point lieu dans la plupart des animaux.

12.^e Toute figure superficielle ou solide, produite par le mouvement d'une ligne ou d'une surface, est égale au produit de la quantité qui l'engendre, par la ligne que décrit son centre de gravité. Voyez l'article CENTROBARIQUE.

Ce théorème est regardé comme une des plus belles découvertes qu'on ait faites dans les derniers tems, & il est le fondement de la méthode centrobarique; Pappus en eut, à la vérité la première idée; mais c'est le P. Guldin, Jésuite, qui l'a portée à sa perfection. Leibnitz a prouvé que cette proposition a encore lieu, si l'axe ou le centre changeoient continuellement durant le mouvement. On en tire trop de corollaires, pour qu'il soit possible

de les rapporter tous ici en détail. Voyez dans les mémoires de l'Académie de 1714, un écrit de M. Varignon sur ce sujet. (CHAMBERS.)

* (Mouvement du centre de gravité.) Lorsque plusieurs corps se meuvent semblablement en ligne droite, soit dans un même plan, soit dans des plans différens : leur centre de gravité commun se meut aussi de la même manière, ou demeure en repos.

Je vais démontrer cette proposition d'une manière générale, & sans décomposer, comme on fait ordinairement, les mouvemens en d'autres qui soient parallèles à des lignes données de position. Commençons par quelques définitions.

I. On dit que deux corps M & N (fig. 34.) décrivent semblablement les droites MQ , NS , lorsque ces lignes & leurs parties correspondantes sont parcourues en tems proportionnels; c'est-à-dire, si l'on a $MQ : NS :: MP : NR :: PQ : RS$, & que les tems employés à parcourir les lignes entières MQ , NS soient entr'eux comme les tems employés à parcourir les parties correspondantes MP & NR , ou PQ & RS , des deux mêmes lignes.

Par où l'on voit que si les tems employés à parcourir les lignes entières MQ & NS sont égaux, les tems employés à parcourir leurs parties correspondantes MP & NR , PQ & RS , seront aussi égaux.

Il est clair que tous les mouvemens uniformes sont semblables; car en désignant le tems employé à parcourir une ligne par la lettre initiale T mise au-devant de cette ligne, on a dans ces mouvemens, $MQ : MP :: T.MQ : T.MP$; & $NS : NR :: T.NS : T.NR$. Donc, si on a $MQ : MP :: NS : NR$, on aura $T.MQ : T.MP :: T.NS : T.NR$. D'où il suit que les droites entières MQ , NS , & leurs parties homologues MP , NR , seront parcourues de la même manière. Mais dans ce qui suit, nous envisageons les mouvemens semblables sous un point de vue plus général; ces mouvemens peuvent être uniformes ou variés suivant une loi quelconque, pourvu qu'ils soient assésins à la condition énoncée ci-dessus, laquelle est le caractère de leur similitude. Ensuite on fixera dans chaque cas particulier la signification des mots *semblablement* ou *mouvemens semblables*, par rapport à l'espèce particulière de mouvemens qu'on aura en vue.

J'avertis qu'en parlant des espaces parcourus par des corps, je supposerais, pour abréger le discours, ou que chaque corps eût assez petit pour pouvoir être censé concentré en un seul & même point, qu'il est par conséquent permis de prendre pour son centre de gravité; ou que ces espaces sont réellement ceux que parcourent les centres de gravité des corps, quelle que soit la grandeur de ces corps.

II. LEMME. Si dans un quadrilatère quelconque $ABCD$ (Fig. 35 & 36), dont les quatre côtés

peuvent être situés ou non situés dans un même plan, on divise les côtés opposés, ou les deux diagonales & deux côtés opposés, de manière que l'on ait les deux proportions quelconques,

$$AF : FB :: DH : HC,$$

$$AE : ED :: BG : GC,$$

qu'ensuite on tire les droites FH , EG : ces lignes se couperont en un point O , & on aura ces deux suites de proportionnelles,

$$EO : OG :: AF : FB :: DH : HC,$$

$$FO : OH :: AE : ED :: BG : GC.$$

1.^e Menez & prolongez indéfiniment les droites BD , FE , GH . Les deux droites BD , FE sont situées dans le même plan ABD , & par conséquent elles se rencontreront en un point; de même les deux droites BD , GH se rencontreront, comme étant situées dans le même plan CBD .

Par le point D , menez parallèlement à AB , la droite DI , qui rencontre FE au point I ; & parallèlement à BC , la droite DL , qui rencontre GH au point L . Les triangles semblables AEF , DEI donnent $AE : ED :: AF : DI = \frac{AF \times ED}{AE}$.

De même, à cause des triangles semblables CHG , DHL , on a $DL = \frac{CG \times DH}{CH}$. Donc $DI : DL ::$

$$\frac{AF \times ED}{AE} : \frac{CG \times DH}{CH} :: \frac{AF \times CH}{DH} : \frac{CG \times AE}{ED} :: FB : BG,$$

parce qu'en vertu de l'hypothèse, $FB = \frac{AF \times CH}{DH}$, & $BG = \frac{CG \times AE}{ED}$. D'où il suit, par les principes de la Géométrie, que les trois lignes BD , FI , GL iront concourir en un même point K ; & cela, quand même les droites AD , BC ne seroient pas dans un même plan. Donc les quatre lignes FK , GK , EG , FH sont dans un même plan; & par conséquent les deux lignes EG , FH se coupent en quelque point O .

2.^e Ayant tiré la droite indéfinie FGM , menez CM parallèle à AB ; & du point H , tirez aux points I , M , les droites HI , HM qui sont dans un même plan, lequel contient la droite CD , & les parallèles CM , DI . Les triangles semblables CGM , BGF , l'hypothèse & les triangles semblables DEI , AEF , donnent cette suite de rapports égaux, $CM : BF :: CG : GB :: DE : AE :: DI : AF$. Ainsi, $CM : BF :: DI : AF$, ou alternando $CM : DI :: BF : AF :: CH : HD$. Donc les deux triangles CHM , DHI sont semblables, puisque les angles $C&D$ sont égaux comme formés par des côtés parallèles chacun à chacun, & que ces angles sont compris entre côtés proportionnels. Donc les trois points

M, H, I , sont placés sur une seule & même ligne droite.

Les triangles semblables CGM, BGF , l'hypothèse & les triangles semblables DEI, AEF donnent cette suite de rapports égaux, $GM : GF :: CG : GB :: DE : AE :: EI : EF$. D'où il résulte, par la Géométrie, que les droites IM, EG sont parallèles.

Maintenant, les parallèles EG, IM , les triangles semblables DHI, CHM , & l'hypothèse donnent $FO : OG :: IH : HM :: DH : HC :: AF : FB$. Ainsi, on aura $EO : OG :: AF : FD :: DH : HC$.

3.^e On aura par des considérations semblables, $FO : OH :: FE : EI :: AE : ED :: BG : GC$.

III THÉORÈME. Si deux corps $A & B$, (Fig. 37 & 38) décrivent semblablement & en même tems les droites AD, BC , situées ou non situées dans un même plan, & que le centre de gravité de leur système se meuve; ce centre aura un mouvement semblable à ceux des corps $A & B$.

Ayant mené les droites AB, CD , divisez ces lignes aux points F, H , de manière que l'on ait $B : A :: AF : FB :: DH : HC$: le point F sera le centre de gravité du système des deux corps au moment qu'ils commencent à parcourir les deux droites AD, BC ; & le point H sera le centre de gravité du système, au moment où ils acheveront de parcourir les mêmes lignes. Ainsi, il faut démontrer que si l'on tire la droite FH , le centre de gravité du système sera continuellement sur cette ligne, & qu'il la décrira avec un mouvement semblable à ceux des corps $A & B$.

Divisez les droites AD, BC , aux points indéterminés $E & G$, de manière qu'on ait $AE : ED :: BG : GC$; & menez la droite EG . Les deux corps ayant des mouvements semblables, arriveront en même tems aux deux points $E & G$. Or, à cause des deux proportions $AF : FB :: DH : HC$, & $AE : ED :: BG : GC$, les droites FH, EG se coupent au point O , & on a les deux suites de proportions, $EO : OG :: AF : FB :: DH : HC :: B : A, FO : OH :: AE : ED :: BG : GC$. D'où il suit que le centre de gravité du système arrive en O , lorsque les corps arrivent en $E & G$; & que ce centre se meut d'un mouvement semblable à ceux des mêmes corps.

IV. COROLLAIRE I. En regardant les deux corps $A & B$ comme réunis au centre de gravité de leur système, & ne formant qu'un seul & même corps qui décrit la droite FH ; si l'on combine ce corps avec un autre qui se meut de la même manière, on verra, par la démonstration précédente, que le centre de gravité du nouveau système se mouvra d'un mouvement semblable à ceux des corps dont le système est composé. La même chose se démontrera, en allant de proche en proche, pour un système composé de quatre corps, de cinq

corps, & en général d'un nombre quelconque de corps.

Ainsi, on peut dire en général que si dans un système composé d'un nombre quelconque de corps, tous les corps se meuvent semblablement & en même tems, le centre de gravité de tout le système se mouvra de la même manière.

V. COROLLAIRE II. Si les droites AD, BC décrites par les deux corps $A & B$, sont dans un même plan, la droite FH décrite par le centre de gravité de leur système, sera aussi dans ce même plan; & si l'on a un troisième corps qui se meut comme les deux premiers & dans le même plan qu'eux, le centre de gravité du système des trois corps se mouvra aussi semblablement, & dans le même plan. Ainsi de suite, pour un système composé d'un nombre quelconque de corps qui se mouvroient tous semblablement, en même tems, & dans un même plan.

VI. COROLLAIRE III. Supposons que les droites AD, BC , (fig. 39 & 40) décrites par les deux corps proposés $A & B$, soient parallèles, & par conséquent dans un même plan. Les droites BA, CD , qui sont situées dans ce plan, étant prolongées s'il est nécessaire, se rencontreront en un point S ; & puisqu'on a $B : A :: AF : FB :: DH : HC$, on aura composendo $AF : AF + FB$, ou $AB :: DH : DH + HC$, ou DC ; & alternando, $AF : DH :: AB : DC$. Or, à cause des parallèles AD, BC , on a $AB : DC :: SA : SD :: SB : SC$. Donc $AF : DH :: SA : SD :: SB : SC$; & par conséquent les droites AD, BC, FH sont parallèles.

Il en sera de même en général pour un nombre quelconque de corps. Si tous ces corps décrivent semblablement & en même tems des droites parallèles, qui peuvent d'ailleurs être ou n'être pas toutes dans un même plan, le centre de gravité de leur système décrira semblablement, en même tems une droite parallèle aux chemins parcourus par tous les corps.

VII. COROLLAIRE IV. Soient deux corps $A & B$ (fig. 41 & 42) qui décrivent semblablement & en même tems les côtés homologues & parallèles chacun à chacun, de deux polygones semblables $ADEP, BCGM$. Il est clair, par ce qui précède, que le centre de gravité F de leur système décrira semblablement & en même tems les côtés FH, HN, NO , d'un polygone, lesquels seront parallèles respectivement aux droites $AD & BC, DE & CG, EP & GM$. Or, puisque les deux polygones $ADEP, BCGM$ sont semblables, & qu'on a par conséquent $AD : BC :: DE : CG :: EP : GM$; il s'en suit que toutes les lignes AB, DC, EG, PM iront concourir en un même point S . Donc les trois polygones $ADEP, BCGM, FHN O$ sont composés d'un même nombre de triangles semblables SAD, SBC, SFH , &c. Donc ces trois polygones sont sem-

blables. Ainsi, le centre de gravité du système décrit le contour d'un polygone semblable à ceux que décrivent les corps *A* & *B*.

Qu'un troisième corps *I* décrive le contour d'un polygone *IRVT* semblable à ceux dont on vient de parler : il est clair, toujours par les mêmes principes, que le centre de gravité du système des trois corps *A*, *B*, *I*, décrira le contour d'un polygone semblable aux précédents. Ainsi de suite pour un nombre quelconque de corps.

VIII. COROLLAIRE V. Si l'on imagine que les côtés des polygones de l'article précédent deviennent infiniment petits, mais que leur nombre augmente à l'infini ; alors tous ces polygones deviendront des courbes semblables, dont les parties infiniment petites & correspondantes seront parallèles chacune à chacune. Ainsi, lorsque plusieurs corps parcourent semblablement & en même tems les contours des courbes semblables & composées d'éléments correspondants, parallèle chacun à chacun, le centre de gravité du système décrit de la même manière une courbe semblable aux précédentes, & qui leur est parallèle élément à élément.

IX. REMARQUE. On a fait attention sans doute dans l'énoncé du Théorème de l'article III, à ces paroles : *que le centre de gravité de leur système se meuve*. Cette restriction a été mise, parce qu'il peut se faire que le centre de gravité demeure immobile.

En effet, supposons deux corps *A* & *B* (fig. 42) qui décrivent semblablement, en même tems & en sens contraires, les droites *AD*, *BC*, qui leur soient réciproquement proportionnelles, en sorte qu'on ait *A :: B :: BC :: AD* ; le centre de gravité demeurera en repos. Car si l'on tire les droites *AB*, *CD* qui se coupent en *F*, & que par le point *F* on mène la droite *EFK*, qui rencontre *AD* & *BC* aux points *E* & *K*, on aura cette suite de proportionnelles : *A :: B :: BC :: AD :: BF :: AF :: CF :: DF :: BK :: AE :: KC :: ED*. D'où il suit que le point *F* est le centre de gravité du système au commencement & à la fin du mouvement, & lorsque les deux corps sont arrivés aux points correspondants *E* & *K* de leurs chemins. Donc le centre de gravité ne change pas de place.

En regardant maintenant le corps *A* comme le système de plusieurs corps qui vont dans un sens, & le corps *B* comme le système de plusieurs corps qui vont dans un sens opposé ; nous pouvons conclure en général que, si un système est composé d'un nombre quelconque de corps qui vont en partie dans un sens, en partie dans le sens opposé, & que les centres de gravité des deux parties du système décrivent semblablement & en même tems des droites parallèles, réciproquement proportionnelles aux sommes de corps qui composent ces deux parties, le centre de gravité du système général demeurera en repos.

Il résulte donc, de tout ce qui précède, que lorsque plusieurs corps se meuvent semblablement,

& en même tems ; ou le centre de gravité de leur système se meut, & alors il se meut de la même manière que tous les corps ; ou bien il demeure en repos.

X. M. d'Alcibert a démontré, dans son *Vaincu de Dynamique*, que la même proposition a lieu, dans le cas où les corps d'un système agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque. Voyez ce Traité. (L. B.)

* CENTRE de mouvement : point autour duquel ionnent, ou peuvent être censés tourner plusieurs corps qui composent un même système.

* CENTRE d'oscillation. On appelle pendule composée l'assemblage de plusieurs corps liés solidement entr'eux, & qui oscillent autour d'un même axe fixe ; & centre d'oscillation le point de ce pendule où il faudroit placer un petit corps, de masse insensible (qu'on appelle pendule simple), pour que ce dernier pendule, oscillant seul & librement, fût ses oscillations dans le même tems que le pendule composé. Voyez les Loix des Oscillations des pendules simples, au mot PENDULE.

PROBLÈME. Déterminer la longueur *EQ* (fig. 44) d'un pendule simple qui fasse ses oscillations dans le même tems qu'un pendule composé, c'est-à-dire, qu'un système de corps *A*, *B*, *C* (fig. 45), liés entr'eux par des verges inflexibles sans pesantur, ou attachés solidement à un plan matériel sans pesantur & sans inertie, qui oscille autour du point fixe *O* ?

Considérons d'abord chacun des corps *A*, *B*, *C*, comme s'il étoit seul ; & décomposons la pesantur en deux forces, l'une dirigée suivant la verge à laquelle il est appliqué, l'autre perpendiculaire à la même verge. Il est clair que les forces de la première espèce sont détruites par la résistance du point *O* ; & que celles de la seconde, que je représente par *Aa*, *Bb*, *Cc*, sont les seules qui feroient osciller les corps. Je mène la verticale *OK*, & je nomme *g* la gravité, c'est-à-dire, l'espace que la pesantur feroit parcourir en un instant à un corps tombant librement ; *t*, le sinus total ; *m*, le sinus de l'angle *AOK* ; *n*, le sinus de l'angle *BOK* ; *q*, le sinus de l'angle *COK*. Les forces *Aa*, *Bb*, *Cc* étant supposées de même nature que la gravité *g*, on aura $Aa = g \times \frac{AE}{t}$, $Bb = g \times \frac{BF}{t}$, $Cc = g \times \frac{CF}{t}$.

Maintenant, comme les corps *A*, *B*, *C*, forment un même système, & qu'ainsi aucun d'eux ne peut se mouvoir sans agir sur les autres, soit pour accélérer, soit pour retarder leurs mouvements, il y a nécessairement équilibre entre les mouvements perdus d'une part, & les mouvements gagnés, d'autre part. Je suppose que le corps *A*, qui auroit parcouru *Aa*, s'il n'avoit été lié, parcouru simplement *Ae*, à cause de la réaction des autres corps ; que le corps *B*, au lieu de parcourir *Bb*, parcouru *Bc* ; que le corps *C*, au lieu de parcourir *Cc*, parcouru *Cd*. On voit que *A* × *ga* est la quantité de mouvement perdue par le corps *A* ; que *B* × *gc* est la quantité de mouvement gagnée

par B ; que Cx est la quantité de mouvement gagnée par C . Or ces quantités de mouvement doivent être regardées comme des forces qui se font équilibre, en agissant aux extrémités des bras de levier OA , OB , OC . Par conséquent on a l'équation (M), $A \times g \times OA = B \times b \times OB + C \times c \times OC$.

Les corps A , B , C , conservant toujours entr'eux la même position, les arcs Ag , Bh , Ci sont évidemment semblables; donc, si l'on suppose $OA=a$, $OB=b$, $OC=c$, $Ag=f$: on aura $Bh = \frac{f \cdot b}{a}$; $Ci = \frac{f \cdot c}{a}$; $ga = gm - f$; $bh = \frac{f \cdot b}{a} - gn$; $ci = \frac{f \cdot c}{a} - gq$. Substituant pour ga , bh , ci , OA , OB , OC , leurs valeurs dans l'équation (M), elle deviendra $A(gm - f) = B\left(\frac{f \cdot b}{a} - gn\right) + C\left(\frac{f \cdot c}{a} - gq\right)$; d'où l'on tire $f = \dots\dots\dots$

$$\frac{g(Aa^2 + nBb^2 + Cc^2)}{Aa^2 + Bb^2 + Cc^2}.$$

Soit H le centre de gravité du système; & des points A , B , C , H , menons perpendiculairement à OK les droites AV , BE , CK , HD : on aura par la propriété du centre de gravité, $A \times AV + B \times BE + C \times CK = (A+B+C) \times HD$. Mais $AV=ma$, $BE=nb$, $CK=gc$, $HD=rh$, en nommant h la droite OH , r le sinus de l'angle HOK ; donc $Ama + Bnb + Cgc = (A+B+C)rh$, & par conséquent $f = gr \times \frac{Aa^2 + Bb^2 + Cc^2}{Aa^2 + Bb^2 + Cc^2}$.

Nous voyons, par cette expression de la force accélératrice simple f du corps A , que, si l'on fait l'angle QEM du pendule simple (fig. 44), égal à l'angle HOK du pendule composé (fig. 45); nous voyons, dis-je, qu'en décomposant les arcs semblables décrits par les points Q & A , en un même nombre d'éléments correspondants chacun à chacun, deux éléments correspondants seront parcourus en tems égaux, & par conséquent les arcs entiers seront aussi parcourus en tems égaux, si la force accélératrice simple du point Q , qui est gr , & celle du point A , qui est f , sont entr'elles comme les arcs, ou comme les rayons EQ , OA . La durée égale de mouvements, ou le synchronisme du pendule simple & du pendule composé, est donc fondé sur la proportion, $gr :: \frac{gr \cdot h(A+B+C)}{Aa^2 + Bb^2 + Cc^2} :: EQ$:

$$a; \text{ ce qui donne } EQ = \frac{Aa^2 + Bb^2 + Cc^2}{(A+B+C)h}.$$

Ainsi, pour avoir l'expression de la longueur du pendule simple qui fait ses oscillations dans le même tems que le pendule composé, il faut multiplier chaque corps du pendule composé par le carré de sa distance à l'axe de rotation; & ajouter ensemble tous ces produits, & diviser la somme par le produit de la somme de tous les corps multipliée par la distance du centre de gravité du système à l'axe de rotation,

On observera que les deux angles QEM , HOK , doivent être fort petits, si l'on veut que non-seulement les oscillations correspondantes, ou de même amplitude, des deux pendules, soient de même durée, mais encore que les oscillations soient, au moins sensiblement, de même durée, quoique les amplitudes soient différentes.

Nous observerons encore que, si les verges ont les liens qui retiennent les corps du système avoient de la pesanteur ou de l'inertie, on pourroit les décomposer en une infinité de petits corps, qu'on regarderoit comme formant un même système auquel on appliqueroit la règle précédente, qui est absolument générale, quel que soit le nombre de corps élémentaires du pendule composé.

COROLLAIRE. Si l'on porte la longueur EQ (fig. 44), de O en t (fig. 45), le point t sera ce qu'on appelle le centre d'oscillation du pendule composé. Ce point peut être regardé comme chargé de tous les corps qui composent le système, & il fait ses oscillations de la même manière & dans le même tems que le pendule simple dont EQ ou Ot est la longueur.

On doit remarquer que le point t est différent du centre de gravité H , & que $Ot > OH$, ce qu'on démontrera, en comparant l'expression de Ot avec celle de OH .

Appliquons cette théorie à quelques exemples.

Trouver le centre d'oscillation d'une ligne droite AB (fig. 46), qui oscille autour de son extrémité A ?

Soient $AB = a$, $AP = x$, $Pp = dx$; & nommons S la somme des produits des éléments Pp par les carrés de leurs distances au point A . On aura $S = \int x^2 dx$, intégration où (après l'avoir effectuée), il faudra faire $x = a$; ce qui donne $S = \frac{a^3}{3}$. Divisant cette quantité par le produit de la ligne AB , multipliée par la distance de son centre de gravité au point A , c'est-à-dire, par $a \times \frac{a}{2}$,

on aura $\frac{2}{3}a$ pour la distance du centre d'oscillation au point A .

Trouver le centre d'oscillation d'un triangle isocèle ABC (fig. 47), qui oscille autour d'un axe MX , passant par le sommet A , perpendiculaire à la hauteur AH , & situé dans le plan du triangle?

Soient $AH = a$, $BC = c$, $AP = x$, $Pp = dx$; & nommons S la somme des produits des éléments NN' par les carrés de leurs distances à l'axe MX . On aura $NN' = \frac{bx}{a}$; $NN' \cdot n = \frac{bx \cdot dx}{a}$;

$S = \int \frac{bx^2 dx}{a}$, intégration où (après l'avoir effectuée), il faut faire $x = a$. Ainsi, $S = \frac{ba^3}{6}$. Divisant cette quantité par le produit de l'aire du triangle, multipliée par la distance de son centre de gravité au sommet A , c'est-à-dire par $\frac{a^2}{2} \times \frac{1}{3}$, on aura

à pour la distance du centre d'oscillation du triangle à l'axe MX .

Trouver le centre d'oscillation d'un triangle isocèle ABC (fig. 48), qui oscille autour d'un axe MX , passant par le sommet A , & perpendiculaire tout à-la-fois à la hauteur AH , & au plan du triangle?

Ce cas est fort différent du précédent, & quelques auteurs s'y font trompés.

Soient $AH=a$; $BC=b$; $AP=x$; $PP=dx$. Prenons sur PN la partie indéterminée $PQ=z$, & $Qz=dz$. Il faut d'abord chercher la somme des produits des éléments Qz par les carrés de leurs distances à l'axe MX . Or, en nommant Z cette somme, on a $Z = \int dx (xx + z^2)$, intégration dans laquelle il n'y a que z de variable, & où (après l'avoir effectuée), il faut faire $z = \frac{b}{2}$; puis doubler Z , pour avoir la somme des produits des éléments de la ligne NN' par les carrés de leurs distances à l'axe MX ; d'où il suit que cette dernière somme est $\frac{b^3}{6} + \frac{b^3}{12a^2}$.

Mainenant, nommons S la somme des produits des éléments NN' par les carrés de leurs distances à l'axe MX , on aura $S = \int dx \left(\frac{b^3}{6} + \frac{b^3}{12a^2} \right)$, où il faudra faire $x=a$, après avoir effectué l'intégration. Ainsi $S = \frac{b^3}{6} + \frac{b^3}{4a}$.

Divisant cette quantité par le produit de l'aire du triangle multipliée par la distance de son centre de gravité à l'axe MX , c'est-à-dire, par $\frac{ab}{6} \times \frac{2}{3}a$, on aura $\frac{1}{4}a + \frac{b^2}{16a}$ pour la distance du centre d'oscillation du triangle à l'axe MX .

Le procédé est le même pour les autres figures & pour les solides. (L. B.)

* CENTRE DE PERCUSSION. On appelle centre de percussion un point dans lequel la masse d'un système de corps A, B, C (fig. 49), (qu'il faut regarder comme attachés solidement, à des distances invariables les uns des autres, sur un plan matériel, sans frottement & sans inertie, mobile autour de l'axe O), étant supposée réunie & agissant perpendiculairement à l'extrémité d'un levier égal à la distance de ce point à l'axe O , donneroit le plus grand coup possible à un obstacle qu'on lui opposeroit.

PROBLÈME. Déterminer le centre de percussion d'un système de corps liés entr'eux par des verges inflexibles sans pesanteur, qui oscille autour d'un axe fixe.

Il est d'abord évident que le centre de percussion est placé dans la direction de la résultante des mouvements de rotation de tous les corps A, B, C . Ainsi, il s'agit de trouver la position & la quantité de cette résultante.

Mathématiques. Tome I, 1.^{re} Partie,

Les corps A, B, C , étant forcés de se mouvoir tous à-la-fois, par une cause quelconque, prennent des vitesses proportionnelles à leurs distances AO, BO, CO , à l'axe de rotation. Par conséquent leurs quantités de mouvements, ou les forces qui les animent, peuvent être exprimées respectivement par les produits $A \times AO, B \times BO, C \times CO$; & ces forces agissent suivant les droites AN, BN, CN' , perpendiculaires aux distances OA, OB, OC . Soit N le point de concours de AN & de BN ; je mène la droite ON , sur laquelle, comme diamètre, je décris une demi-circonférence de cercle qui passera par les points A & B , puisque les angles OAN, OBN sont droits. Le point N étant nécessairement un de ceux par où passe la direction de la résultante des deux forces $A \times AO, B \times BO$, je suppose que ZN soit cette direction; du point Z où elle coupe la demi-circonférence $OABN$, au point O , je mène la droite ZO qui rencontre en H la droite AB qui joint les deux corps A & B . Cela posé, on fait, par la Mécanique, que les deux forces $A \times AO, B \times BO$ font entr'elles comme les sinus des angles BZN, ANZ , ou des angles BOZ, AOZ : on aura donc, $A \times AO :: B \times BO :: \sin. BOZ :: \sin. AOZ$. Or, si des points A & B on abaisse sur OZ les perpendiculaires AR, BS , & qu'on nomme 1 le sinus total, on a $\sin. BOZ = \frac{BS}{BO}$,

$\sin. AOZ = \frac{AR}{AO}$; donc on aura $A \times AO :$

$B \times BO :: \frac{BS}{BO} : \frac{AR}{AO}$, ou bien (à cause des triangles semblables BHS, AHR), $A \times AO :$

$B \times BO :: \frac{H}{BO} : \frac{AH}{OA}$; ce qui donne $A \times AH =$

$B \times BH$, & fait voir que le point H est le centre de gravité des deux corps A & B . La résultante des deux forces $A \times AO, B \times BO$, est donc perpendiculaire à la droite OHZ menée par le point O , & par le centre de gravité du système particulier des deux corps A & B . De plus, en nommant Z cette résultante, on a, par la mécanique, $Z :: B \times BO :: \sin. ANB :: \sin. ANZ :: \sin. AOB :: \sin. AOZ$, ou bien (en abaissant des points B & H les perpendiculaires BX, HV sur OA prolongée) $:: \frac{BX}{BO} : \frac{HV}{OH}$, ou bien (à cause des

triangles semblables BAX, HAV) $:: \frac{AB}{BO} : \frac{AH}{HO}$,

ou bien (à cause que le point H est le centre de gravité des deux corps A & B) $:: \frac{A+B}{BO} : \frac{B}{BH}$;

d'où l'on tire, en concluant du premier rapport au dernier, $Z = (A+B) \times OH$. Connoissant Z , on trouvera OZ , en observant que, si l'on considère les moments par rapport au point O , le moment de la résultante Z doit être égal à la somme des moments de ses deux forces composantes.

T. I.

fantes $A \times AO, B \times BO$; ce qui donne $(A+B) \times OH \times OZ = (A \times AO) \times AO + (B \times BO) \times BO$; & par conséquent $OZ = \frac{A \times (AO)^2 + B \times (BO)^2}{(A+B) \times HO}$. Voilà donc d'abord

la formule pour déterminer le centre Z de percussion du système des deux corps A & B .

Soit N' le point de concours de la force Z , & de la force $C \times CO$ du corps C ; ce point est nécessairement placé dans la direction de la résultante de ces deux forces, direction que je suppose être $Z'N'$. Je mène la droite ON' sur laquelle, comme diamètre, je décris une demi-circconférence de cercle qui passera par les points Z & C , puisque les angles OZN', OCN' sont droits. Ayant tiré la droite CH , du point Z' où $Z'N'$ rencontre la demi-circconférence $OZCN'$, je mène au point O la droite $Z'O$ qui rencontre CH en H' . Cela posé, on aura, $Z : C \times CO :: \sin. CN'Z' :: \sin. Z'N'Z' :: \sin. COZ' :: \sin. ZOZ'$, ou bien (en abaissant des points C & H les perpendiculaires CS', HR' , sur OZ') ::

$$\frac{CS'}{CO} :: \frac{HR'}{OH} :: \frac{CH}{CO} :: \frac{HH'}{OH}, \text{ ce qui donne, en concluant du premier rapport au dernier, } \frac{Z \times HH'}{OH} =$$

$= C \times CH'$, ou $(A+B) \times HH' = C \times CH'$, & ce qui fait voir que le point H' est le centre de gravité du système des trois corps A, B, C . Ainsi, la résultante des deux forces Z & $C \times CO$, ou des trois forces $A \times AO, B \times BO, C \times CO$, est perpendiculaire à la droite OZ' menée par le point O , & par le centre de gravité H' du système des trois corps A, B, C . Soit nommée Z' cette même résultante : on aura $Z' : C \times CO :: \sin. Z'N'C :: \sin. Z'N'Z' :: \sin. ZOC :: \sin. ZOZ'$, ou bien (en abaissant des points C & H' les perpendiculaires $CX', H'V'$, sur OZ' prolongée), :: $\frac{CX'}{CO} :: \frac{H'V'}{OH'}$, ou bien (à cause des triangles semblables $H'CX', H'H'V'$) :: $\frac{CH}{CO} :: \frac{HH'}{OH'}$, on bien

(à cause que le point H' est le centre de gravité du système des trois corps A, B, C), :: $\frac{A+B+C}{CO} :: \frac{C}{OH'}$; donc, en concluant du premier rapport au dernier, $Z' = OH' \times (A+B+C)$. Connaissant Z' , on connoîtra OZ' , par la considération que le moment de la résultante Z' , relativement au point O , doit être égal à la somme des moments des trois forces composantes $A \times AO, B \times BO, C \times CO$, relativement au même point; considération qui donne $(A+B+C) \times OH' \times ZO = (A \times AO) \times AO + (B \times BO) \times BO + (C \times CO) \times CO$; & par conséquent $Z'O = \frac{A \times (AO)^2 + B \times (BO)^2 + C \times (CO)^2}{(A+B+C) \times OH'}$.

Il est clair que la même méthode est applicable à un système composé de tant de corps qu'on

voudra, & qu'on trouvera toujours des résultats analogues aux précédents; en sorte qu'on peut conclure en général, 1.^o, que le centre de percussion d'un système quelconque de corps est placé sur la droite menée par le centre de rotation, & par le centre de gravité du système. 2.^o Que la distance du centre de percussion au centre de rotation, est égale au quotient qui résulte en divisant la somme des produits des corps multipliés chacun par le carré de sa distance à l'axe de rotation, par la somme de tous les corps multipliée par la distance du centre de gravité du système à l'axe de rotation.

On voit que le centre de percussion & le centre d'oscillation se confondent, puisqu'ils sont placés à la même distance de l'axe de rotation. On auroit pu les déterminer par la même méthode; mais, pour varier les usages des principes de la Mécanique, j'ai cru devoir les chercher chacun par des méthodes particulières. (L. B.)

*CENTRE de conversion: c'est ainsi que plusieurs auteurs appellent le point autour duquel un corps, libre d'ailleurs, tourne ou tend à tourner, lorsqu'il est poussé inégalement dans les divers points, ou par une puissance dont la direction ne passe pas par son centre de gravité.

Jean Bernoulli (voyez ses œuvres, tom. iv, pag. 265), appelle ce même point centre spontané de rotation, comme qui diroit centre volontaire de rotation, pour le distinguer du centre de rotation forcé. La méthode pour trouver le centre spontané de rotation est très-simple, au moyen du théorème suivant.

LEMME. Lorsqu'un corps est poussé suivant une direction qui ne passe pas par son centre de gravité, 1.^o ce centre est mu de la même manière que s'il se trouvoit sur la direction de la force imprimée; 2.^o le corps tourne, du moins au premier instant, comme si le centre de gravité étoit fixe, autour d'un axe mené par ce centre, perpendiculairement au plan passant par ce même point & par la direction de la force.

Soit un corps de figure quelconque (fig. 50) poussé par une force F dont la direction FK passe hors de son centre de gravité G . Par ce point & par la droite FK , soit mené le plan MRD qui divise le corps en deux parties, & soit tiré l'axe GV perpendiculaire à ce plan. Je prends FA pour représenter la force F ; & ayant divisé cette ligne FA en deux également au point B , sur FB comme diagonale, je construis le parallélogramme $FNB O$ dont le côté FN passe par le centre de gravité G , & dont le côté FO est perpendiculaire à FB . La moitié FB de la force F peut se décomposer en deux autres forces FN, FO . Soit prolongée FG de manière que $GT = FG$, & soit prise $TQ = FN$. Imaginons que la force FN est appliquée au point T de la direction, & quelle est représentée par TQ ; ensuite soit décomposée cette force en deux autres TP, TZ ,

l'une perpendiculaire, l'autre parallèle à KG .

Cela posé, il est clair que le corps est mu de la même manière que si an lieu d'être animé de la force primitive FA , il étoit animé des quatre forces BA , FO , TP , TZ . Or, 1.^o les deux forces BA , TP étant parallèles, égales, & passant à égales distances du centre de gravité, comme il est évident, elles ont pour résultante une force GE qui passe par le centre de gravité G , qui leur est parallèle & qui est égale à leur somme, puisqu'elles agissent dans le même sens. De plus, puisque $BA + TH = FA$, on aura aussi $GE = FA$: d'où il suit que le centre de gravité G est mu exactement de la même manière que s'il se trouvoit sur la direction de la force proposée FA .

2.^o Les deux forces FO , TZ sont évidemment égales, parallèles, & passent à égales distances du centre de gravité G , suivant des directions opposées; donc elles ne peuvent faire avancer ce centre ni suivant GK , ni suivant GS , ni suivant aucune autre direction; donc, en vertu de ces deux forces, le centre de gravité G doit demeurer immobile. Mais, d'un autre côté, ces deux mêmes forces ne se détruisent pas, puisqu'elles ne sont pas directement opposées; donc tout l'effet qu'elles peuvent produire est de faire tourner, au moins au premier instant, le corps dans le même sens autour de l'axe GV , en agissant perpendiculairement aux extrémités des bras de levier GH , GI ; donc si du point G comme centre, avec le rayon GH ou GI , on décrit un cercle, on pourra imaginer, relativement au mouvement de rotation, que la force TZ , au lieu d'agir suivant ITZ , à l'extrémité du rayon GI , agit suivant HFO , à l'extrémité du rayon GH . Alors le moment de la force qui fait tourner le corps dans le sens HA It est $(FO + TZ) \times GH$, ou $2 FO \times FK$, ou $2 BN \times FK$. Or, à cause des triangles semblables FKG , FBN , on a $BN \times FK = FB \times GK$, & par conséquent $2 BN \times FK = 2 FB \times GK = FA \times GK$, qui est l'expression du moment de la force proposée FA par rapport à l'axe GV : donc le corps tendra à tourner autour de cet axe, de la même manière que si le centre de gravité étoit fixe.

REMARQUE. Soit que le plan MRD partage ou non le corps en deux parties égales & semblables, le mouvement du centre de gravité est toujours le même. Mais le mouvement de rotation instantané autour de l'axe GV ne se perpétue que dans le premier cas; car lorsque les deux parties du corps ne sont pas égales & semblables, les forces centrifuges en vertu desquelles les molécules du corps tendent à s'écarter de l'axe GV , ne se font pas équilibrer; l'axe GV s'incline d'un côté ou d'autre, & le corps pirouette en différents sens autour de son centre de gravité. Tous ces mouvements peuvent être fournis au calcul par les principes précédents; mais je suppose ici que le plan perpendi-

culaire à l'axe de rotation partage le corps en deux parties égales & semblables, & alors le mouvement de rotation demeure toujours le même, comme le mouvement de translation du centre de gravité; ou si cette condition n'a pas lieu, je ne considère le mouvement de rotation autour de l'axe proposé, que pour le premier instant.

PROBLÈME. Déterminer le centre spontané de rotation d'un corps quelconque?

Représentons le corps par la baguette AB (fig. 51) que je suppose poussée perpendiculairement par une force F dont la direction PK ne passe pas par son milieu ou centre de gravité C . On voit par le lemme précédent, que le centre de gravité C se recouvrira de C en H , perpendiculairement à AB , de la même manière que si la force F passoit par C , & que la baguette fût transportée parallèlement à elle-même de AB en ab . Ainsi, en nommant M la masse du corps, V la vitesse CH , on aura $V = \frac{F}{M}$.

2.^o Imaginons que le point H est fixe, & que pendant que le point C parvient de C en H , la baguette ab tourne autour du point H & prend la position Nn . Du point H pour centre, avec le rayon donné HR , soit décrit l'arc Rr , & avec le rayon variable HT , l'arc Tt . En nommant R le rayon donné HR , u la vitesse angulaire R du point R , & le rayon variable HT : la vitesse angulaire T du point T sera représentée par $\frac{u}{R}$. Multiplions cette vitesse par la molécule de matière placée en T (molécule que j'appelle m); nous aurons $\frac{m \cdot u}{R}$ pour la quantité de mouvement angulaire de m , & $\frac{m \cdot r^2 \cdot u}{R}$ pour le moment de cette quantité de mouvement, par rapport au centre H de rotation. Donc le moment de la quantité de mouvement angulaire imprimé à toute la masse du corps sera exprimé par $\int \frac{m \cdot r^2 \cdot u}{R}$,

expression dans laquelle la fraction $\frac{u}{R}$ est une quantité constante pour tous les points du corps. Nommons S la quantité $\int m \cdot r^2$, prise dans toute l'étendue du corps; & la distance CK de la direction de la force F au centre de gravité C ; & considérons que la force F agissant à l'extrémité du bras du levier CK , produit le mouvement angulaire: nous aurons cette seconde équation $Fc = \frac{S \cdot u}{R}$, ou bien $u = \frac{F \cdot R}{S}$.

Maintenant, supposons que la baguette parvenue dans la position Nn coupe en Z la droite AB qui est sa position initiale; alors le point Z sera le centre spontané de rotation. Supposons que le rayon R qui est donné, mais arbitraire, devienne $= HZ$, & que les espaces CH , Z soient infiniment petits; il est clair qu'en vertu du mou-

vement de translation, le point τ de AB parcourt $\tau Z = CH = V$, & qu'en vertu du mouvement de rotation, il est ramené de Z en τ par l'espace $Z\tau = u$. La position du point τ sera donc déterminée par la condition qu'on ait $V = u$, c'est-à-dire, $\frac{F}{M} = \frac{F \cdot R}{S}$; d'où l'on tire $R = \frac{S}{M}$; ou $C\tau$

$= \frac{S}{M \wedge C R}$, expression de la distance du centre spontané de rotation au centre de gravité du corps.

On voit que la force F n'entre point dans cette valeur, & que par conséquent la position du centre spontané de rotation sera toujours la même, quelle que soit la quantité de la force F , pourvu seulement que la direction de cette force passe à la même distance CK du centre de gravité.

On doit remarquer qu'on général le centre spontané de rotation change à chaque instant: car ce point doit se trouver, 1.^o sur une droite perpendiculaire à FK . 2.^o A la distance $C\tau$ du centre de gravité C , de sorte qu'il est placé successivement sur tous les points de la circonférence d'un cercle décrit du centre C , avec le rayon $C\tau$. Mais il peut se faire que le centre spontané de rotation demeure toujours le même. Qu'on ait, par exemple, une ligne droite chargée de deux masses inégales, & qu'on imprime en sens contraire à ces masses, des vitesses qui leur soient réciproquement proportionnelles; le système tournera autour du centre de gravité qui demeurera immobile, & le centre spontané de rotation se confondra avec le centre de gravité.

On remarquera aussi que le centre spontané de rotation peut se trouver placé hors du corps: car on voit par l'expression $C\tau = \frac{S}{M \wedge C R}$ que S & M demeurant les mêmes, on peut faire augmenter $C\tau$ tant qu'on voudra, en diminuant la distance CK de la direction de la puissance au centre de gravité. (L. B.)

* **CENTRE des corps pesans**, est dans notre globe le même que le centre de la terre, vers lequel tous les corps graves ont une espèce de tendance. Il est cependant bon de remarquer que les corps graves ne tendroient véritablement vers un centre, que dans le cas où la terre seroit parfaitement sphérique; mais comme elle est un sphéroïde aplati vers les poles, ainsi que la théorie & les observations le démontrent, les corps pesans ne sauroient tendre vers un même point à la rigueur: il n'y a donc point à la rigueur de centre des corps pesans. Cependant, comme la terre diffère peu de la figure sphérique, il s'en faut peu que les corps pesans ne tendent tous vers un même point; & on prend dans le discours ordinaire le centre de la terre, pour le centre commun de tendance des graves.

CENTRE d'équilibre, dans un système de corps, est le point autour duquel ces corps seroient en équilibre, ou, ce qui est la même chose, un point tel que si le système étoit suspendu ou sou-

tenu par ce seul point, il resteroit en équilibre. Le point d'appui d'un levier est son centre d'équilibre. Voyez APPUI & LEVIER.

A cette occasion nous croyons devoir indiquer ici un principe d'équilibre trouvé par M. le marquis de Courtyron, de l'Académie des Sciences, & dont la démonstration a été lue à l'Académie le 13 juin 1750. Voici ce principe. De toutes les situations que prend successivement un système de corps animés par des forces quelconques, & liés les uns aux autres par des fils, des leviers, ou par tel autre moyen qu'on voudra supposer, la situation où le système a la plus grande somme de produits des masses par le quarré des vitesses, est la même que celle où il auroit fallu d'abord le placer pour qu'il restât en équilibre. En effet, une quantité variable devient la plus grande, lorsque son accroissement = 0; or pour un système de corps dont la force augmente continuellement, parce que le résultat des pressions agissantes fait accélération, aura atteint son maximum de forces lorsque la somme des pressions sera nulle; & c'est ce qui arrive lorsqu'il a pris la situation que demande l'équilibre.

L'auteur ne s'est pas borné à cette démonstration, qui, quoique vraie & exacte, est un peu métaphysique, & pourroit être chicanée par les adversaires des forces vives. Voyez FOKEN. Il en donne une autre plus géométrique & absolument rigoureuse: mais il faut renvoyer ce détail important à son mémoire même, qui nous paroit digne de l'attention des géomètres. (O)

CENTRE, (*Astron.*) On appelle centre une lunette, faire en sorte que l'axe optique passe par le centre de l'objectif, de manière que toutes les parties du champ soient semblables & semblablement situées par rapport à l'axe de la lunette. Le moyen le plus simple est de couvrir l'objectif avec un diaphragme que l'on fait promener sur la surface en la présentant au soleil de manière que la lumière réfléchie par la partie convexe, fasse un cercle concentrique & parallèle à celui de l'image fournie par la surface concave. (D. L.)

CENTRIFUGE, adj. (*Méchan.*) Force centrifuge, c'est celle par laquelle un corps qui tourne autour d'un centre, fait effort pour s'éloigner de ce centre.

C'est une des loix constantes de la nature, que tout mouvement est par lui-même rectiligne (voyez MOUVEMENT), & qu'un mobile ne s'éloignera jamais de la direction rectiligne de son premier mouvement, tant qu'il n'y sera pas obligé par quelque nouvelle force imprimée dans une direction différente: après cette nouvelle impulsion, le mouvement devient composé; mais il continue toujours en ligne droite, quoique la direction de la ligne ait changé. Voyez COMPOSITION.

Pour qu'un corps se meuve dans une courbe, il

fait qu'il reçoive à chaque moment une nouvelle impulsion, & dans une direction différente de la sienne, parce qu'une courbe ne peut se réduire à des lignes droites, à moins qu'elles ne soient infiniment petites; par conséquent si un corps attiré continuellement vers un centre, est lancé outre cela dans une direction qui ne passe point par ce centre, il décrira alors une courbe, dans chaque point *A* de laquelle (*planck. Méch. fig. 24.*) il tâchera de s'éloigner de la courbe, & de continuer son mouvement dans la tangente *AD*; ce qu'il seroit en effet si rien ne l'en empêchoit; en sorte que dans le même tems qu'il décrit l'arc *AE*, il s'éloignerait, par la force centrifuge, de la longueur de la ligne *DE* perpendiculaire à *AD*; ainsi, en supposant l'arc *AE* infiniment petit, la force centrifuge est proportionnelle à la ligne *DE* perpendiculaire à la ligne *AD*.

Un corps obligé à décrire un cercle, le décrit le plus grand qu'il peut, un plus grand cercle étant en quelque sorte moins circulaire, moins courbe ou moins différent de la droite qu'un plus petit. Voyez *COURBURE*. Un corps souffre donc plus d'altération dans son mouvement, & exerce plus vivement sa force centrifuge lorsqu'il décrit un petit cercle, que lorsqu'il en décrit un grand, c'est-à-dire, que la force centrifuge est toujours proportionnelle, toutes choses d'ailleurs égales, à la courbure du cercle dans laquelle le corps est emporté.

Il en est des autres courbes comme des cercles; car une courbe, quelle qu'elle puisse être, peut être regardée comme formée d'une infinité d'arcs de cercle infiniment petits, décrits de différens rayons, de façon que les endroits où la courbe est le plus courbe, sont ceux où la force centrifuge est plus grande, tout le reste d'ailleurs égal; & ainsi, dans une même courbe, la force centrifuge du corps qui la décrit, varie suivant les différens points où il se trouve.

On peut voir les loix & la théorie des forces centrifuges exposées plus en détail dans l'article des FORCES CENTRALES, au mot CENTRAL. (O)

CENTRIPÈTE, adj. (*Méch.*) Force centripète, c'est celle par laquelle un mobile poussé dans une droite *AG* (*fig. 24.*), est continuellement détourné de son mouvement rectiligne, & sollicité à se mouvoir dans une courbe.

Ainsi, en supposant l'arc *AE* infiniment petit, la force centripète est proportionnelle à la droite *DE* perpendiculaire à *AD*; d'où il s'ensuit que la force centripète ou centrale & la force centrifuge sont égales. Voyez l'article CENTRAL. (O)

CENTROBARIQUE, méthode centrobarique (en Méchanique); c'est une méthode pour mesurer ou déterminer la quantité d'une surface ou d'un solide, en les considérant comme formés par le mouvement d'une ligne ou d'une surface, & multipliant la ligne ou la surface génératrice par le chemin parcouru par son centre de gravité. Cette

méthode est renfermée dans le théorème suivant & ses corollaires.

Toute surface plane ou courbe, ou tout solide produit par le mouvement ou d'une ligne ou d'une surface, est égal au produit de cette ligne ou surface par le chemin du centre de gravité, c'est-à-dire, par la ligne que ce centre de gravité décrit. Voyez CENTRE DE GRAVITÉ. Voici la démonstration générale que certains auteurs ont cru pouvoir donner de ce théorème.

Supposons le poids de la ligne ou surface génératrice ramassé dans son centre de gravité; le poids total produit par son mouvement sera égal au produit du poids mu par le chemin du centre de gravité; mais lorsque les lignes & les figures sont regardées comme des corps pesans homogènes, leurs poids sont alors entr'eux comme leur volume, & par conséquent le poids mu devient alors la ligne ou figure génératrice, & le poids produit est la grandeur engendrée; la figure engendrée est donc égale au produit de la ligne ou de la figure qui l'engendre, par le chemin de son centre de gravité. Il ne faut pas être bien difficile à satisfaire en démonstration, pour le payer d'une preuve si insuffisante & si vague, qu'on trouve néanmoins dans *M. Wolf*, d'où *Chambers* a tiré une partie de cet article.

Pour mettre nos lecteurs à portée d'en trouver une meilleure preuve, considérons un levier chargé de deux poids, & imaginons un point fixe dans ce levier prolongé ou non: on fait (*voy. CENTRE & LEVIER*) que la somme des produits faits de chaque poids par sa distance à ce point, est égale au produit de la somme des poids par la distance de leur centre de gravité à ce point; donc si on fait tourner le levier autour de ce point fixe, il s'ensuit que les circonférences étant proportionnelles aux rayons, la somme des produits de chaque poids par le chemin ou circonférence qu'il décrit, est égale au produit de la somme des poids par la circonférence décrite par le centre de gravité. Cette démonstration faite par deux poids, s'applique également & facilement à tel nombre qu'on voudra.

Corollaire I. Puisqu'un parallélogramme *ABCD* (*pl. Méch. fig. 24*) peut être regardé comme produit par le mouvement de la droite *CD* mue toujours parallèlement à elle-même le long d'une autre droite *CA* & dans la direction de celle-ci, & que dans ce mouvement le chemin du centre de gravité est égal à la droite *EF* perpendiculaire à *CD*, c'est-à-dire, à la hauteur du parallélogramme; son aire est donc égale au produit de la base *CD*, ou de la ligne qui décrit le parallélogramme par la hauteur *EF*. Voyez PARALLÉLOGRAMME.

Ce corollaire pourroit faire naître quelque soupçon sur la vérité & la généralité de la règle précédente; car on pourroit dire que la ligne *CD* se mouvant le long de *CA*, le centre de gravité

de cette ligne, qui est son point de milieu, décrit une ligne égale & parallèle à CA , & qu'ainsi l'aire du parallélogramme $ACDB$ est le produit de CD par AC ; ce qui seroit faux. Mais on peut répondre que CA n'est point proprement la directrice de CD , quoique CD se meuve le long de CA ; que cette directrice est proprement la ligne EF , qui mesure la distance de AB à CD ; & que le chemin du centre de gravité par lequel il faut multiplier la ligne décrivant CD , n'est point le chemin absolu de ce centre, mais son chemin estimé dans le sens de la directrice ou le chemin qu'il fait dans un sens perpendiculaire à la ligne décrivant. Cette remarque est nécessaire pour prévenir les paralogismes dans lesquels on pourroit tomber, en appliquant sans précaution la règle précédente à la mesure des surfaces & des solides.

Coroll. II. On prouvera de la même manière que la solidité de tout corps décrit par un plan qui descend toujours parallèlement à lui-même le long de la droite AC , & suivant la direction de cette droite, doit se trouver en multipliant le plan décrivant par sa hauteur. Voyez PRISME & CYLINDRE.

Coroll. III. Puisque le cercle se décrit par la révolution du rayon CL (fig. 53) autour du centre C , & que le centre de gravité du rayon CL est dans son milieu F , le chemin du centre de gravité est donc ici une circonférence d'un cercle X décrit par un rayon soudouble, & par conséquent l'aire du cercle est égale au produit du rayon CL , par la circonférence que décrirait un rayon soudouble de CL ; ce qu'on fait d'ailleurs. Voyez CERCLE.

Coroll. IV. Si un rectangle $ABCD$ (plan. Méc. fig. 54) tourne autour de son axe AD , le rectangle décrira par ce mouvement un cylindre, & le côté BC la surface de ce cylindre; mais le centre de gravité de la droite BC est dans son milieu F , & le centre de gravité du plan qui engendre le cylindre, est dans le milieu G de la droite EF . Ainsi, le chemin de ce dernier centre de gravité est la circonférence d'un cercle décrit du rayon EG , & celui du premier la circonférence d'un cercle décrit du rayon EF ; donc la surface du cylindre est le produit de la hauteur BC par la circonférence d'un cercle décrit du rayon EF , & la solidité du cylindre est le produit du rectangle $ABCD$ qui sert à sa génération, par la circonférence d'un cercle décrit du rayon EG soudouble de EF , demi-diamètre du cylindre. Supposons, par exemple, la hauteur du plan qui engendre le cylindre, par conséquent celle du cylindre $BC = a$, le diamètre de la base $DC = r$, on aura donc $EG = \frac{1}{2}r$; & supposant que le demi-diamètre soit à la circonférence comme 1 est à m , la circonférence décrite par le rayon $\frac{1}{2}r$ sera $= \frac{1}{2}mr$; d'où il s'ensuit que multipliant $\frac{1}{2}mr$ par l'aire du rectangle $AC =$

$a r$, on aura la solidité du cylindre $= \frac{1}{2} m a r^2$; mais $\frac{1}{2} m a r^2 = \frac{1}{2} r \times m r \times a$: or $\frac{1}{2} m r^2 =$ l'aire du cercle décrite par le rayon EG . Il est donc évident que le cylindre est égal au produit de la base par la hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs.

De même puisque le centre de gravité de la droite AB (Pl. Méc. fig. 30.) est dans son milieu M , & qu'on décrit la surface du cône droit en faisant mouvoir le triangle ABC autour d'un des ses côtés AB pris pour axe, on en peut conclure que si $PM = \frac{1}{2}BC$, la surface du cône sera égale au produit de son côté APB par la circonférence du cercle décrit du rayon PM , c'est-à-dire d'un rayon soudouble du demi-diamètre de la base BC .

Supposons, par exemple, $BC = r$, $AB = a$, le rayon étant à la circonférence, comme 1 est à m ; on aura donc $PM = \frac{1}{2}r$, & la circonférence décrite de ce rayon $= \frac{1}{2}mr$; & ainsi multipliant $\frac{1}{2}mr$ par le côté AB du cône, le produit qui sera $\frac{1}{2}amr$ devra représenter la surface du cône: mais $\frac{1}{2}amr$ est le produit de $\frac{1}{2}a$ par mr ; donc la surface du cône droit est le produit de la circonférence de sa base par la moitié de son côté, ce qu'on fait d'ailleurs.

Coroll. V. Si le triangle ACB (Pl. Mécan. fig. 55.) tourne autour d'un axe, il décrit un cône: mais si on coupe CB en deux également au point D , qu'on tire la droite AD , & que $AO = \frac{1}{2}AD$, il est démontré que le centre de gravité sera alors situé en O ; donc la solidité du cône est égale au produit du triangle ACB par la circonférence du cercle décrit du rayon PO . Or AD est à AO , comme BD est à OP : D'ailleurs $AO = \frac{1}{2}AD$, & $DB = \frac{1}{2}CB$; donc $OP = \frac{1}{2}DB = \frac{1}{4}CB$. Supposons, par exemple, $CB = r$; $AB = a$, & la raison du rayon à la circonférence celle de 1 à m ; on aura donc $OF = \frac{1}{4}r$, la circonférence décrite de ce rayon $= \frac{1}{4}mr$, le triangle $ACB = \frac{1}{2}ar$, & par conséquent la solidité du cône $= \frac{1}{4}r \times \frac{1}{2}ar = \frac{1}{8}amr^2$; mais $\frac{1}{8}amr^2 = \frac{1}{8}r \times m r \times \frac{1}{2}a$, ou le produit de la base du cône par le tiers de sa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs.

Ce théorème si général & si beau sur le centre de gravité, peut être mis au nombre des plus curieuses découvertes qu'on ait faites en Géométrie. Il avoit été aperçu il y a long-temps par Pappus; mais le P. Guldin, jésuite, est le premier qui l'ait mis dans tout son jour, & qui en ait montré l'usage dans un grand nombre d'exemples.

Plusieurs autres géomètres s'en font servi aussi après Pappus & Guldin, pour mesurer les solides & les surfaces produites par une rotation autour d'un axe fixe, sur-tout avant qu'on eût les secours que le calcul intégral a fournis pour cela; & on peut l'employer encore à présent dans certains cas où le calcul intégral seroit plus difficile.

M. Leibnitz a observé que cette méthode seroit encore bonne, quand même l'axe ou le centre changeroit continuellement durant le mouvement. (O.)

M. Varignon a donné dans le volume de *l'Académie de 1714*, un Mémoire qui a pour titre, *Réflexion sur l'usage que la Mécanique peut avoir en Géométrie*. Il y démontre la propriété du centre de gravité, dont nous avons parlé dans cet article, & plusieurs autres propriétés encore plus générales & aussi curieuses. On peut se servir utilement de ces propriétés pour résoudre avec plus de facilité certains problèmes de Mécanique. Par exemple, si on demande quelle figure doit avoir une courbe *GAH* (fig. 36.) pour qu'en tournant autour de l'axe *GH* elle produise une surface courbe plus grande que celle que produiroit en tournant autour de *GH* toute autre ligne courbe qui passeroit par les mêmes points *G, H*, & qui seroit de la même longueur que la courbe qu'on cherche; on trouveroit sans aucun calcul, en se servant du théorème précédent, que la courbe *GAH* qu'on demande doit être celle que prendroit une chaîne chargée d'une infinité de petits poids, & qu'on attacheroit aux points *G & H*: car une chaîne qui est ainsi attachée, doit se disposer de manière que le centre de gravité des poids qui la composent, c'est-à-dire le centre de gravité de la courbe même, descende le plus bas qu'il est possible; d'où il s'ensuit que la courbe formée par cette chaîne aura son centre de gravité plus éloigné de l'horizontale *GH* que toute autre ligne courbe de la même longueur, & passant par les mêmes points: par conséquent le cercle décrit par le centre de gravité de la courbe formée par la chaîne, lorsque cette courbe tourne autour de *GH*, est plus grand que le cercle décrit par le centre de gravité de toute autre courbe de même longueur, & passant par les mêmes points *G, H*; donc la surface du solide produit par la première courbe, est plus grande que toute autre. On voit donc que le problème se réduit à trouver la courbe formée par la chaîne; courbe connue par les géomètres sous le nom de *chalconette*, & dont ils ont donné la construction il y a long-temps. Voyez *CHALONETTE*.

Le mot *céphéenne* est formé des mots *céphé*, *céphé*, centre, & *céphé*, poids, pesanteur. (O)
CÉPHEE, (*Astron.*) constellation boréale appelée aussi *vir regius*, *regulus*, *regulus*, (fils de Jalous), *nerius*, *senex æqueus*, *juvenis æqueus*. *Céphée* étoit roi d'Éthiopie ou de l'Inde, (Pline, liv. V, chap. 13, 21.) car les premiers grecs appellerent de ce nom d'Inde toutes les terres situées au-delà de mer méditerranée. *Céphée* étoit père d'Andromède, & les poètes disent que Persée obtint de Jupiter que *Céphée*, avec sa femme Cassiope & sa fille Andromède, fut placé parmi les astres. Ovid. IV, 670. (Voyez *ANDROMÈDE*.) Il y a des savans qui croient aussi que le centaure Chiron formant les constellations 1350 ans avant J. C. leur donna les noms des héros de son siècle ou des princes dont ils descendoient; voilà peut-être en effet pourquoi l'on y trouve Callisto, Orion, *Céphée*, Persée, Andromède, Cassiope, Hercule,

le vaisseau des Argonautes. (M. Fréret, défense de la Chronologie, pag. 20 & 501.)

Les étoiles de *Céphée* ne sont pas très-remarquables; il y en a 34 dans le catalogue britannique. (D. L.)

C E R

CERATIAS, L. m. (*Astron.*) selon certains auteurs, est une comète cornue, qui paroît souvent barbue & quelquefois avec une queue. Ils prétendent que quelques-unes de ces comètes ressemblent à la figure de la nouvelle lune: celles qui ont des queues, les ont crochues & recourbées ou vers le haut ou vers le bas; d'autres ont des queues d'une égale largeur ou épaisseur, &c. *Hevelii cometographia*. Harris.

CERBERE, (*Astron.*) constellation boréale, introduite par Hévélius, pour renfermer quatre étoiles, qui sont sur la main d'Hercule, ou aux environs. Flamsteed l'a adoptée dans son *catalogue britannique*, & elle est figurée dans son *Atlas céleste*.

Le triomphe d'Hercule sur cerbère s'explique suivant M. Dupuis, par le coucher du petit chien; on le peint avec les attributs du serpent ou de l'hydre qui se leve au-dessus de sa tête; Hercule approche alors de l'horizon, ce qui a fait imaginer la descente aux enfers. *Voyez mon ASTRONOME*, T. IV, pag. 494. (D. L.)

CERCLE de réflexion, (*Astron.*) est un instrument circulaire propre à observer les distances & les hauteurs en mer. *Voyez LE DICTIONNAIRE DE MARINE*.

CERCLE du haut solstice, c'est le nom que l'on a donné quelquefois au tropique du cancer.

CERCLE, sub. m. (*en Géométrie*) figure plane, renfermée par une seule ligne qui retourne sur elle-même, & au milieu de laquelle est un point situé de manière que les lignes qu'on en peut tirer à la circonférence sont toutes égales. *Voyez CENTRE*.

A proprement parler, le cercle est l'espace renfermé par la circonférence, quoique dans l'usage vulgaire on entende par ce mot la circonférence seule. *Voyez CIRCONFÉRENCE*.

Tout cercle est supposé divisé en 360 degrés, que l'on marque ainsi 360°; chaque degré se divise en 60 minutes ainsi marquées, chaque minute en 60 secondes marquées par'', chaque seconde en 60 tiers ainsi marquées'''. On a divisé le cercle en 360 parties, à cause du grand nombre de divisions dont le nombre 360 est susceptible. *Voyez DEGRÉ*, MINUTE, &c. DIVISEUR.

On trouve l'aire d'un cercle en multipliant la circonférence par le quart du diamètre, ou la moitié de la circonférence par la moitié du diamètre. On peut avoir l'aire, à-peu-près, en trou-

vant une quatrième proportionnelle à 1000, à 785, & au carré du diamètre.

Les cercles & les figures semblables qu'on peut y inscrire, sont toujours entr'elles comme les carrés des diamètres; ou, comme les Géomètres s'expriment, les cercles font entr'eux en raison doublée des diamètres, & par conséquent aussi des rayons.

Le cercle est égal à un triangle dont la base est la circonférence, & la hauteur le rayon. Les cercles font donc en raison composée de celles des circonférences & de celles des rayons.

Trouver la proportion du diamètre du cercle à sa circonférence. Trouvez en coupant continuellement les arcs en deux, les côtés des polygones inscrits, jusqu'à ce que vous arriviez à un côté qui soutienne un arc si petit que vous voudrez choisir. Ce côté étant trouvé, cherchez le côté du polygone circonscrit semblable; multipliez ensuite chacun de ces polygones par le nombre de ses côtés, ce qui vous donnera le périmètre de chacun d'eux; la raison du diamètre à la circonférence du cercle sera plus grande que celle du diamètre à la circonférence du polygone circonscrit, mais moindre que celle du diamètre au polygone inscrit.

La différence des deux étant connue, on aura aisément en nombres très-approchés, mais cependant non exacts, la raison du diamètre à la circonférence.

Ainsi, Wolf la trouve la même que celle de 1000000000000000 à 3 141 592 653 689 7932. Archimède a donné pour raison approchée celle de 7 à 22; Ludolphe de Ceulen a porté cette recherche à une plus grande exactitude, & il trouve qu'en prenant l'unité pour diamètre, la circonférence doit être plus grande que 3. 141 592 653 589 793 238 462 643 383 879.50, mais moindre que ne deviendrait ce même nombre si l'on changeoit seulement le zéro qui le termine en l'unité.

Mieux nous a donné la proportion la meilleure de toutes celles qui ont paru jusqu'à présent exprimées en petits nombres. Il suppose le diamètre de 113 parties, & la circonférence doit être à moins d'une unité près 355, suivant son calcul.

Circonscire un cercle à un polygone régulier donné. Coupez deux des angles du polygone E & D (planche Géom. fig. 23) en deux également; du point de concours F des lignes EF, DF, pris pour centre, & du rayon EF décrivez un cercle; ce sera celui que vous cherchez.

Inscrire un polygone régulier donné dans un cercle: Divisez d'abord 360 par le nombre des côtés, pour parvenir par-là à connoître la quantité de l'angle FED; cela étant fait, appliquez la corde ED de cet angle à la circonférence autant de fois que vous le pourrez, & vous aurez par-là inscrit le polygone dans le cercle.

Par trois points donnés A, B, C, qui ne sont point en ligne droite (fig. 24) décrire un cercle.

Des points A & C, & d'un même intervalle

pris à volonté, décrivez deux arcs de cercle qui se coupent en D & E; & pareillement des points C & B, décrivez-en deux autres qui se coupent en G & H; tirez ensuite les droites DE, GH: le point de leur intersection I sera le centre du cercle: par-là on peut venir à bout, en prenant trois points dans la circonférence d'un cercle ou d'un arc donné, de trouver le centre de ce cercle ou de cet arc, & de continuer l'arc si ce n'est pas un cercle entier.

Donc si trois points d'une circonférence viennent ou co-incident avec trois points d'une autre circonférence, les deux circonférences co-incideront en entier, & les cercles seront égaux.

Donc aussi tout triangle peut être inscrit dans un cercle. Voyez TRIANGLE.

On démontre en Optique qu'un cercle, s'il est fort éloigné de l'œil, ne peut jamais paroître véritablement cercle, à moins que le rayon visuel ne lui soit perpendiculaire & ne passe par son centre. Dans tous les autres cas, le cercle paroît oblong; & pour qu'il paroisse au contraire véritablement circulaire; il faut qu'il soit en effet oblong. Voyez PERSPECTIVE.

Les cercles parallèles ou concentriques sont ceux qui sont également éloignés les uns des autres dans toutes leurs parties, ou qui sont décrits d'un même centre; & par opposition, ceux qui sont décrits de centres différens sont dits excentriques, l'un par rapport à l'autre. Voyez CONCENTRIQUE, EXCENTRIQUE, &c.

La quadrature du cercle, ou la manière de faire un carré dont la surface soit parfaitement & géométriquement égale à celle d'un cercle, est un problème qui a occupé les mathématiciens de tous les siècles. Voyez QUADRATURE.

Plusieurs soutiennent qu'elle est impossible; elle est du moins d'une difficulté qui l'a fait passer pour telle jusqu'à présent. Archimède est celui des anciens géomètres qui a approché le plus de la quadrature du cercle. (CHAMBERS.)

Cercles des degrés supérieurs; ce sont des courbes dans lesquelles $AP^m : PN^m :: PN : PB$, ou $AP^m : PN^m :: PN^m : PB^m$ (Planche d'Analyse, fig. 9.)

Au reste, ce n'est que fort improprement que ces courbes ont été appelées cercles; car on est convenu d'appeler cercle, la seule figure dont l'équation est $AP \times PB = PN^2$: mais on peut imaginer des cercles de plusieurs degrés comme des paraboles de plusieurs degrés, quoique le nom de parabole ne convienne rigoureusement qu'à la parabole d'Apollonius. Voyez PARABOLE.

Coroll. I. Supposons $AP = x$, $PN = y$, $AP = a$, & nous aurons $BP = a - x$, & par conséquent $x : y :: y : a - x$, ce qui nous donne une équation

équation qui détermine les *cercles des degrés* supérieurs à l'infini; savoir, $y^{m+1} = ax^m - x^{m+1}$, & on pourroit avoir d'une manière à-peu-près semblable cette autre équation $y^m = (a-x)x^m$.

Coroll. II. Si $m = 1$, nous aurons $y^2 = ax - x^2$, & par conséquent il n'y aura que le *cercle ordinaire* ou celui du premier degré qui soit alors compris sous l'équation.

Si $m = 2$, on aura $y^3 = ax^2 - x^3$, équation qui appartient au *cercle* du second degré ou du second ordre.

* *COUPE-CERCLE, instrument de Mathém.* C'est une des pointes d'un compas: elle est tranchante, & divisée circulairement le papier ou le carton sur lequel on l'appuie. On donne le même nom en *Menuiserie* à un villobroquin qui est armé à son extrémité d'une couronne tranchante, au centre de laquelle il y a une pointe qui fixe le villobroquin, & qui perce un trou tandis que la couronne emporte une pièce circulaire. V. TRÉPAN.

CÈRES, (*Astron.*) nom de la constellation de la vierge.

CERVA, (*Astr.*) nom de la constellation de Cassiopée.

C H A

CHAÎNE, dans l'*Arpentage*, signifie une mesure composée de plusieurs pièces de gros fil-de-fer ou de laiton recourbées par les deux bouts: chacune de ces pièces a un pied de long, y compris les petits anneaux qui les joignent ensemble.

Les chaînes se font ordinairement de la longueur de la perche du lieu où l'on veut s'en servir, ou bien de quatre à cinq toises de long, & même plus longues, si l'on a des grandes stations à mesurer, comme de huit ou dix toises. On les distingue quelquefois, par un plus grand anneau, de toise en toise: ces sortes de chaînes sont fort commodes, en ce qu'elles ne se noient point comme celles qui sont faites de petites mailles de fer. Voyez les articles PERCHE, VERGE, &c.

En 1668, on plaça un nouvel échalot ou modèle de la toise fort juste, au bas de l'escalier du grand châtelet de Paris, pour y avoir recours en cas de besoin.

La chaîne sert à prendre les dimensions des terrains. C'est ce que le P. Merenne appelle l'*arpentement* des anciens. Voyez ACRE.

On emploie aussi au lieu de chaînes des cordes; mais elles sont sujettes à beaucoup d'inconvénients, qui proviennent soit des différents degrés d'humidité, soit de la force qui les tend.

Schwenkurus, dans la *Géométrie pratique*, nous dit qu'il a vu une corde de seize pieds de long, réduite en une heure de temps à quinze, par la seule chute d'une gelée blanche. Pour prévenir

Mathématiques. Tome I, L^{re} Partie.

ces inconvénients, Wolf conseille de tortiller en sens contraire les petits cordons dont la corde est composée, de tremper la corde dans de l'huile bouillante, & quand elle sera sèche, de la faire passer à-travers de la cire fondue, afin qu'elle s'en imbibé: une corde ainsi préparée ne se rallongera ni ne se raccourcira point du-tout, quand même on la garderoit un jour entier sous l'eau.

Usage de la chaîne dans l'arpentage. La manière d'appliquer la chaîne à la mesure des longueurs est trop connue, pour avoir besoin d'être décrite. Lorsqu'on enregistre les dimensions prises par la chaîne, il faut séparer la chaîne & les chaînons par des virgules; ainsi, une ligne longue de soixante-trois chaînes & cinquante-cinq chaînons, s'écrit en cette sorte, 63, 55. Si le nombre des chaînons n'est exprimé que par un seul caractère, on met alors un zéro au-devant: ainsi dix chaînes, huit chaînons, s'écrit en cette sorte, 10, 08.

Pour trouver l'aire d'un champ dont les dimensions sont données en chaînes & chaînons, voyez AIRE, TRIANGLE, QUARRÉ.

Pour prendre avec la chaîne un angle DAE, (Pl. d'Arpent. fig. 1.) vous mesurerez en partant du sommet A, une petite distance jusqu'en d & en e; ensuite vous mesurerez la distance d e. Pour tracer cela sur le papier, vous prendrez à volenti la ligne AE, & vous y rapporterez, au moyen de votre échelle, la distance mesurée sur le côté qu'elle représente. Voyez ECHELLE.

Ensuite prenant avec votre compas la longueur mesurée sur l'autre côté, du sommet A, comme centre, décrivez un arc d e; & du point e, comme centre, avec la distance mesurée d d, décrivez un autre arc a b: par le point où cet arc coupe le premier, tirez la ligne AD: par ce moyen l'angle est rapporté sur le papier; & l'on pourra, si l'on veut, en prendre la quantité sur une ligne des cordes. Voyez CORDE & COMPAS DE PROPORTION.

Pour lever le plan, ou pour faire le dessin d'un lieu, comme ABCDE, (fig. 2.) en se servant de la chaîne, on en fera d'abord une esquisse grossière; & mesurant les différents côtés AB, BC, CD, DE, on écrira la longueur de chaque côté le long de son côté correspondant dans l'esquisse; ensuite si on leve le plan en-dehors du lieu proposé, au lieu de mesurer les angles comme précédemment, on mesurera les diagonales AD, BD, & la figure se trouvera de la sorte réduite en trois triangles, dont tous les côtés seront connus, comme dans le premier cas, & pourront être rapportés sur le papier suivant la méthode ci-dessus.

Si on leve le plan en-dehors du lieu proposé, il faudra prendre en ce cas les angles de la manière suivante. Pour prendre, par exemple, l'angle BCD, on prolongera les lignes BC, CD, à des distances égales en a, b (par exemple de la longueur de cinq chaînes), & on mesurera la distance ab; on aura par-là un triangle isocèle cab, dans lequel l'angle a b c = BCD on opposé, &c.

V y

connu ; ainsi, l'on connoît l'angle BCD , & l'on pourra le tracer comme ci-dessus.

Trouver avec la chaîne la distance entre deux objets inaccessibles l'un par rapport à l'autre, de quelque point, comme C , (fig. 3.) dont la distance à chaque objet A & B , soit accessible en ligne droite. Mesurez la distance CA , que je suppose de cinquante chaînes, & prolongez-la jusqu'en D , c'est-à-dire, cinquante chaînes encore plus loin ; mesurez de même BC , que je suppose de trente chaînes, & prolongez-la jusqu'en E , trente chaînes encore plus loin ; vous formerez de la sorte le triangle CDE , semblable & égal au triangle ABC ; & ainsi mesurant la distance DE , vous aurez la distance inaccessible cherchée.

Trouver la distance d'un objet inaccessible, comme la largeur d'une rivière, par le moyen de la chaîne. Sur l'une des rives plantez bien perpendiculairement une perche haute de quatre ou cinq pieds, où il y ait dans une fente pratiquée en haut, une petite pièce de fil-de-fer, ou d'autre matière semblable, bien droite ; & longue de deux ou trois poncees ; vous ferez ensuite glisser cette petite pièce en haut ou en bas, jusqu'à ce que votre œil aperçoive ou rencontre l'autre rive, en regardant le long de ce fil-de-fer : vous tournerez ensuite la perche, en laissant toujours le fil-de-fer dans la même direction ; & regardant le long de ce fil, comme ci-dessus, remarquerez sur le terrain où vous pouvez opérer, l'endroit où aboutit votre rayon visuel ; enfin mesurez la distance qu'il y a de votre perche à ce dernier point ; ce sera la largeur de la rivière proposée. Voyez ARPENTAGE, RAPORTEUR, &c. (E)

CHAINETTE, dans la Géométrie transcendente, ligne courbe dont une chaîne ou une courbe prend la figure par son propre poids, lorsqu'elle est suspendue librement par ses deux extrémités ; soit que ces deux extrémités soient de niveau dans une même ligne horizontale, ou qu'elles soient placées dans une ligne oblique à l'horizon.

Pour concevoir la nature de cette courbe, supposons une ligne pesante & flexible, (PL. MÉCH. fig. 56.) dont les extrémités soient fixées aux points G , H ; elle se fléchira par son propre poids en une courbe GAH , qu'on nomme la chaîne ou caténaire.

Le P. REYNEAU, dans son *Analyse démontrée*, trouve ainsi l'équation de cette courbe. Soit A le sommet de la courbe, ou son point le plus bas ; que BD & bd soient parallèles à l'horizon ; fD perpendiculaire à BD ; Bd , perpendiculaire à AB ; & soient les points B , b , & les lignes BD , Bd , infiniment près l'un de l'autre : les loix de la mécanique nous apprennent que trois puissances qui se font mutuellement équilibre, sont entr'elles comme des parallèles aux lignes de leurs directions, terminées par leur concours mutuel ; par conséquent les lignes Df & df seront entr'elles comme les forces verticales & horizontales, qui tendent à

mettre la particule Dd dans la situation Dd : or la première de ces forces est le poids de la portion AD de la chaîne, & elle est représentée par AD . L'autre force est une force constante, n'étant autre chose que la résistance du point A : nommant donc AB , x , BD , y , l'arc AD ou son poids ; s , & la force constante a , on aura $d x \cdot dy :: s \cdot a$, & $dy = \frac{adx}{s}$. Donc $\frac{dy}{dx} = \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}}$, & $\sqrt{x^2 + a^2} = a \left(\frac{dx}{dy} \right)$.

Il semble que cette solution, quoiqu'assez simple, laisse encore de l'obscurité dans l'esprit ; mais ce même problème a été résolu de différentes manières : les plus élégantes sont celles que l'on trouve dans l'essai de M. Jean Bernoulli sur la manœuvre des vaisseaux, imprimé à Bâle, 1714 ; & dans un écrit de M. Daniel Bernoulli son fils, tome III des *Mémoires de l'Académie de Pétersbourg*.

Pour parvenir à l'équation de la chaînette, il faut d'abord décomposer toutes les puissances qui agissent sur un point quelconque, en deux autres, dont l'une soit parallèle à l'axe, & l'autre perpendiculaire à cet axe ; ce qui est toujours possible, puisqu'il n'y a point de puissance qui ne puisse se réduire à deux autres de position données ; ensuite on regardera la chaînette comme un polygone d'une infinité de côtés ; & supposant chaque puissance appliquée au point de concours des deux côtés, on décomposera, ce qui est toujours possible, chaque puissance en deux autres qui soient dans la direction de deux côtés contigus ; de cette manière on trouvera que chaque côté de la courbe est tiré à chacune de ses extrémités en sens contraires, par deux puissances qui agissent suivant la direction de ce côté. Or pour qu'il y ait équilibre, il faut que les deux puissances soient égales : égalant donc ces deux puissances ensemble, on aura l'équation de la chaînette. Voyez un plus long détail dans les ouvrages cités. Il nous suffit ici d'avoir exposé le principe. Si une courbe est pressée en chaque point par une puissance qui soit perpendiculaire à la courbe, on trouvera par ce principe que pour qu'il y ait équilibre, il faut que chaque puissance soit en raison inverse du rayon de la développée de la courbe, au point où la puissance agit.

Plusieurs auteurs ont trouvé qu'une voûte, pour être en équilibre, devoit avoir la même figure que la chaînette. En effet, imaginons cette voûte en équilibre, comme composée de petites sphères solides qui se touchent, & joignons les centres de ces sphères par des lignes droites ; imaginons ensuite que la direction de la pesanteur de ces sphères change tout-à-coup, & se fasse en sens contraire ; & que les sphères soient liées ensemble par des fils ou autrement, de manière qu'elles ne puissent pas obéir à l'impulsion verticale de la pesanteur : il est visible que l'équilibre ne sera point troublé, puisque des puissances qui sont en équilibre com-

invent d'y être, lorsque sans changer ces puiffances, on ne fait que leur donner à toutes des directions contraires. Il est visible de plus que dans ce cas la voûte deviendra une *chaînette* dont les pieds drois de la voûte seront les points fixes, & qu'il n'y aura d'autre différence que dans le renversement de la figure: donc la courbe de la *chaînette* est la même que celle de la voûte. Voyez VOÛTE. (O)

CHAISE marine, (*Alphon.*) c'est le nom d'une machine proposée en Angleterre vers 1760, par M. Irwin, pour suspendre un observateur dans un vaisseau par le moyen de deux axes, comme la lampe de Cardan; on pouvoit, par ce moyen, observer en mer des éclipses de satellites. Cette machine avoit été proposée en France par Besson, dans son COSMOLABE.

CHAMBRE obscure ou *chambre clofée*, en termes d'Optique, est une chambre fermée avec soin de toutes parts, & dans laquelle les rayons des objets extérieurs étant reçus à travers un verre convexe, ces objets font représentés distinctement, & avec leurs couleurs naturelles, sur une surface blanche placée en-dedans de la chambre, au foyer du verre. Outre ces expériences que l'on peut faire dans une chambre ainsi fermée, on fait des *chambres obscures*, ou machines portatives, dans lesquelles on reçoit l'image des objets extérieurs par le moyen d'un verre.

La première invention de la *chambre obscure* est attribuée à Jean-Baptiste Porta.

La *chambre obscure* sert à beaucoup d'usages différens. Elle jette de grandes lumières sur la nature de la vision; elle fournit un spectacle fort amusant, en ce qu'elle présente des images parfaitement semblables aux objets; qu'elle en imite toutes les couleurs & même les mouvemens, ce qu'aucune autre sorte de représentation ne peut faire. Par le moyen de cet instrument, sur-tout s'il est construit conformément à la dernière des trois manières de le construire dont on parlera plus bas, quelqu'un qui ne fait pas le dessin, pourra néanmoins dessiner les objets avec la dernière justesse & la dernière exactitude; & celui qui fait dessiner ou même peindre, pourra encore par ce même moyen le perfectionner dans son art.

La théorie de la *chambre obscure* est contenue dans les propositions suivantes tirées de l'Optique de Wolf.

Si un objet *AB* (*pl. d'Opt. fig. 16*) envoie des rayons à travers la petite ouverture *C*, sur une muraille blanche opposée à cet objet, & que la place où les rayons vont aboutir, derrière l'ouverture *C*, soit sombre; l'image de l'objet se peindra en *a b* sur la muraille de haut en-bas.

Car l'ouverture *C* étant fort petite, les rayons qui viennent du point *B*, tomberont sur *b*; ceux qui viennent des points *A* & *D*, tomberont sur *a* & *d*; c'est pourquoi, comme les rayons qui partent des différens points de l'objet, ne sont point confondus lorsque la muraille les réfléchit, ils

porteront avec eux les traits de l'objet qu'ils représentent sur la muraille. Mais comme les rayons *A C* & *B C* se coupent l'un l'autre à l'ouverture, & que les rayons qui partent des points d'en-bas vont aboutir en-haut, il faudra nécessairement que l'objet soit représenté dans une figure renversée.

Ainsi, comme les angles en *D* & en *d* sont drois, & que les angles en *C* sont égaux; *B & b*, *A* & *a* seront aussi égaux; conséquemment si la muraille sur laquelle l'objet est représenté est parallèle à l'objet, *a b : A B :: d c : C D*, c'est-à-dire, que la hauteur de l'image sera à la hauteur de l'objet, comme la distance de l'image à l'ouverture est à la distance de l'objet à cette même ouverture. Il est évident par cette démonstration qu'on peut faire une *chambre obscure*, en se contentant de faire en *C* un trou fort petit, sans y mettre de verre. Mais l'image sera beaucoup plus distincte, si on place un verre convexe en *C*; car lorsqu'il n'y a en *C* qu'un simple trou, les points *A*, *B*, *D*, &c. de l'objet ne peuvent se représenter en *a*, *b*, *d*, &c. que par de simples rayons *A b*, *D d*, *B a*; au lieu que si on place un verre en *C*, tous les rayons qui viennent du point *A* par ex. & qui tombent sur ce verre, font réunis au foyer, de sorte que le point *a* est beaucoup plus vif & plus distinct; & la réunion sera d'autant plus exacte & plus parfaite au foyer, que le verre sera portion d'une plus grande sphère; ainsi, moins le verre sera convexe, plus l'image sera distincte. Il est vrai aussi que le foyer sera d'autant plus éloigné, que le verre sera moins convexe, ce qui fait un inconvénient. C'est pourquoi il faut prendre le verre d'une convexité moyenne.

Construction d'une chambre obscure, dans laquelle les objets de dehors seront représentés distinctement & avec leurs couleurs naturelles, ou de haut en-bas, ou dans leur vraie situation. 1.^o Bouches tous les jours d'une chambre dont les fenêtres donnent des vues sur un certain nombre d'objets variés, & laissez seulement une petite ouverture à une des fenêtres. 2.^o Adaptez à cette ouverture un verre lenticulaire, plan, convexe, ou convexe des deux côtés, qui forme une portion de surface d'une assez grande sphère. 3.^o Tendez à quelque distance, laquelle sera déterminée par l'expérience même, un papier blanc ou quelques étoffes blanches, à moins que la muraille même ne soit blanche; au moyen de quoi vous verrez les objets peints sur la muraille de haut en-bas. 4.^o Si vous les voulez voir représentés dans leur situation naturelle, vous n'avez qu'à placer un verre lenticulaire entre le centre & le foyer du premier, ou recevoir les images des objets sur un miroir plan incliné à l'horizon sous un angle de 45 degrés, ou enfermer deux verres lenticulaires, au lieu d'un dans un tuyau de lumène. Si l'ouverture est très-petite, les objets pour-

ront fe peindre, même sans qu'il soit besoin de verre lenticulaire.

Pour que les images des objets soient bien visibles & bien distinctes, il faut que le soleil donne sur les objets : on les verra encore beaucoup mieux, si l'on a soin de se tenir auparavant un quart-d'heure dans l'obscurité. Il faut aussi avoir grand soin qu'il n'entre de la lumière par aucune fente, & que la muraille ne soit point trop éclairée.

Construction d'une chambre obscure portable. 1.^o Ayez une cassette ou boîte de bois (pl. d'Opt. fig. 17) de la figure d'un parallépipède, large d'environ dix poices, & longue de deux picds ou davantage, à proportion du diamètre que vous voudrez donner au verre lenticulaire.

2.^o Dans le plan *CAO* ajoutez un tuyau à lunette *EF*, avec deux verres lenticulaires; ou bien mettez l'image à une petite distance du tuyau avec trois verres lenticulaires convexes des deux côtés, dont les deux de dehors ou de devant auront de diamètre $\frac{2}{12}$ de pied, & celui de dedans $\frac{1}{12}$. En dedans de la boîte, à une distance raisonnable du tuyau, mettez un papier huilé *GH* dans une situation perpendiculaire, en sorte qu'on puisse voir à travers, les images qui viendront s'y peindre. Enfin en *I* faites un trou rond par où une personne puisse regarder commodément.

Alors si le tuyau est tourné vers l'objet, les verres étant arrêtés à une distance convenable, qui sera déterminée par l'expérience, l'objet sera peint sur le papier *GH* dans la situation naturelle.

On peut encore faire une chambre obscure portable de cette manière. 1.^o Au milieu d'une cassette ou boîte de même forme (pl. d'Opt. fig. 18), mettez une petite tourrette ronde où quatre *HI*, ouverte du côté de l'objet *AB*. 2.^o Derrière l'ouverture placez un petit miroir *abI* à une inclination de 45 degrés, pour réfléchir les rayons *Aa* & *Bb*, sur le verre convexe des deux côtés *G*, enfermé dans le tuyau *GL*. 3.^o A la distance de son foyer mettez une planche couverte d'un papier blanc *EF*, pour recevoir l'image *ab*: enfin faites en *NM* une ouverture oblongue pour regarder dans la boîte (O).

CHAMÉLEON. Voyez CAMÉLEON.

CHAMMA, nom que les astronomes arabes donnent au soleil.

CHAMP D'une lunette, est l'étendue des objets qu'on y peut voir à-la-fois; le champ est déterminé par la largeur de l'oculaire ou du diaphragme, que l'on met au foyer de l'objectif; car la longueur du foyer est au diamètre de cet anneau comme le rayon est au sinus de l'angle qui mesure le champ de la lunette; on le détermine par observation en comptant le nombre de minutes & de secondes qu'un astre met à le traverser. (D. L.)

"On voit donc que le champ d'une lunette est l'espace que cette lunette embrasse, c'est-à-dire ce que

l'on voit en regardant dans la lunette. C'est une perfection dans une lunette d'embrasser beaucoup de champ; mais cette perfection nuit souvent à une autre, c'est la netteté des objets: car les rayons qui tombent sur les bords du verre objectif, & d'où dépend le champ de la lunette, sont rompus plus inégalement que les autres, ce qui produit des couleurs & de la confusion. On remédie à cet inconvénient par un diaphragme placé au-dedans de la lunette, qui en interceptant ces rayons, diminue le champ; mais rend la vision plus distincte. (O.)

CHANCE, (jeu de hasard) est encore employé dans plusieurs jeux de cette espèce, mais particulièrement dans la taupe & tingué. Voyez l'article TAUPE & TINGUE.

CHANGEANTES, (Astron.) On désigne sous ce nom certaines étoiles qui sont sujettes à des diminutions & à des augmentations alternatives de lumière. Il y a plusieurs étoiles dans lesquelles on soupçonne de semblables variations; mais il n'y en a que deux où elles aient été discutées & observées avec assez de soin, pour qu'on puisse les prédire: l'une est la changeante de la baleine; l'autre est la changeante du cygne.

La changeante de la baleine, appelée o dans Bayer, fut aperçue le 13 août 1596, par David Fabricius. Boulliaud, dans un traité imprimé à Paris en 1667, dit que cette étoile revient à sa plus grande clarté au bout de 333 jours; mais Cassini en compte 334, *Elém. d'Astron.*, page 68. Elle paroît de la seconde grandeur plus belle que α & β de la baleine pendant l'espace de 15 jours, & diminue ensuite jusqu'à disparaître quelquefois totalement. Hévelius rapporte quelle fut quatre années entières sans paroître; savoir, depuis le mois d'octobre 1672, jusqu'au mois de décembre 1676. Elle n'emploie pas toujours un tems égal, depuis le commencement de son apparition jusqu'à sa disparition; mais tantôt elle augmente plus vite qu'elle ne diminue & tantôt elle s'accroît plus lentement. Cassini la trouva dans son plus grand éclat au commencement d'août 1703, & elle paroît alors de troisième grandeur comme Fabricius l'avoit jugée le 13 août 1596. Elle avoit en, dans cet espace de 39080 jours, 117 révolutions, ce qui donne la période moyenne de ses variations de 334 jours; mais il peut y avoir dans ces déterminations deux ou trois jours d'incertitude. Voyez Cassini, *Elémens d'Astron.*, page 68. Maraldi, *Mém. de l'Académie* 1719. *Philos. transact.* n^o 134 & 346. M. Herschel l'a trouvée dans son plus grand éclat les 10 ou 15 novembre 1779; elle étoit invisible le 7 février 1780. *Philos. transact.* 1780. On a observé dans le cygne trois étoiles changeantes: la plus remarquable des trois est celle qui est appelée x dans Bayer, & dont on observe encore les phases. Kirch fut le premier qui remarqua en 1686 ces variations de lumière; le 11 juillet il n'avoit pu appercevoir cette étoile, mais le 19

octobre, elle lui parut de cinquième grandeur. Au mois de février 1687, elle avoit encore disparu, on ne la voyoit pas même avec une lunette. Dans la suite Maraldi & Cassini ayant observé plusieurs fois les variations, trouvèrent la période de 405 jours. *M. Acad.* 1719. M. le Gentil a trouvé, par de nouvelles observations 405 jours & $\frac{1}{2}$; voici le tems de son plus grand éclat tels qu'il les a annoncés. Le 24 mai 1784, 4 juillet 1785, 13 août 1786, 22 septembre 1787, 1 novembre 1788, 20 décembre 1789; 30 janvier 1791, 10 mars 1792, 19 avril 1793, &c. La table de M. le Gentil continue jusqu'à la fin du siècle, *Mém. Acad.* 1759, pag. 247. On doit observer que ces retours sont aussi sujets à des inégalités physiques; car cette étoile fut presque invisible pendant les années 1699, 1700, 1701, même dans les tems où par les observations des années précédentes & suivantes, elle devoit être dans la plus grande clarté. Cassini, page 72.

Nous devons encore dire quelques mots de deux autres changeantes du cygne, l'une est située proche l'étoile γ , qui est dans la poitrine; elle fut découverte par Kepler en 1600; on ne la trouve point dans le catalogue de Tycho, quoiqu'il ait marqué plusieurs étoiles qui sont près de cette changeante, & qui paroissent même plus petites: Bayer & Janson l'ont regardée comme nouvelle. Pendant 19 ans qu'elle fut observée par Kepler, elle parut toujours de la même grandeur, n'étant pas tout-à-fait si grande que γ à la poitrine du cygne, mais plus grande que celle qui est dans le bec. Elle paroïssoit encore au témoignage de Liceti en 1621; mais elle disparut ensuite. Cassini l'observa de nouveau en 1655; elle augmenta pendant cinq années jusqu'à égaler les étoiles de la troisième grandeur: en 1677, 1682 & 1715, elle n'étoit encore que comme une étoile de la sixième grandeur. Cassini, *Elémens d'Astron.*, pag. 69. Maraldi, *Mém. Acad.* 1719. On trouve diverses observations d'Hévélius sur les changeantes de la baleine & du cygne dans les *transactions Philosophiques*, n.^o 134.

La troisième étoile changeante du cygne ne paroît plus actuellement; elle fut découverte le 20 juin 1670, par le P. Anthelme, chartreux, près de la tête du cygne, du côté de la flèche; elle étoit alors de troisième grandeur; mais, le 20 août, elle n'étoit plus que de cinquième grandeur, & elle se perdit bientôt entièrement: sa longitude étoit à $14^{\circ} 55'$ du versant, elle avoit $47^{\circ} 28'$ de latitude boréale; elle passoit par le méridien $17'$ avant la huitième de l'angle; son ascension droite étoit de $293^{\circ} 33'$, & sa déclinaison $26^{\circ} 33'$. Le P. Anthelme la revit le 17 Mars 1671, & la jugea de quatrième grandeur. Cassini y remarqua cette année-là plusieurs variations. Elle fut deux fois dans son plus grand éclat; d'abord le 4 avril, ensuite au commencement de mai; ce qu'on n'a vu arriver à aucune autre étoile. Par la comparaison des observations de ces deux années, il paroïssoit d'abord

qu'elle employoit environ 20 mois à revenir à la même phase; de sorte qu'on auroit dû la voir au mois de février 1672; cependant on ne put l'apercevoir au rapport d'Hévélius, que le 29 mars: elle n'étoit encore que de sixième grandeur & elle n'a pas reparu depuis 1672. Cassini, *Elém. d'Astr.*, pag. 71. Voyez mon *Astronomie liv. III, page 317*, où il y a encore plusieurs exemples de variations observées ou soupçonnées dans différentes étoiles, & où je rapporte l'hypothèse de Maupertuis sur la cause de ces variations. On auroit trouvé probablement beaucoup d'étoiles changeantes, si l'on eût observé souvent & avec soin les plus petites étoiles.

Cette année même 1783, on a découvert les diminutions de lumière de l'étoile *Algol* à la tête de Méduse, β de Persée; elle est ordinairement de seconde grandeur & devient de quatrième toutes les 69 heures, & cela dure quelques heures. Montanari avoit remarqué ces variations dans le dernier siècle, Maraldi les avoit aussi observées à Paris, comme on le voit dans l'histoire de l'Académie à l'année 1695; il ne put à la vérité observer aucune variation en 1692 & 1693, mais en 1694 l'étoile augmenta & diminua, elle parut de seconde & quatrième grandeur, peut-être que dans les années précédentes Maraldi n'y avoit pas regardé dans les jours & les heures où elle devoit avoir son moindre degré de lumière. Suivant une lettre de M. Herschel, la période de lumière de l'étoile *Algol* paroïssoit de 25 jours 20 heures 47 minutes; la première fois qu'il l'a vue dans la plus petite lumière, c'étoit le 3 mai 1783 à huit heures 57 minutes, jusqu'à 20 heures 10 minutes, à Windsor; sa lumière ne surpassoit que très-peu celle de β de Persée qui n'en est qu'à deux degrés & qui est marquée de 4^e grandeur. Le 20 mai depuis 14 heures 17 minutes jusqu'à 14 heures 30 minutes, elle lui parut encore de la grandeur de β de Persée, cependant elle n'a semblé un peu plus grosse dans les jours où j'ai observé son moindre éclat. La durée de cette période est de deux jours 20 heures 48 $\frac{1}{2}$ minutes. Ces variations de lumière ont été remarquées sur-tout par M. Goodricke, Gentilhomme d'York, à la fin de l'année 1782. On les explique ou par de grandes parties obscures, comme Riccioli, ou par une figure très-aplatie, comme Maupertuis, ou par l'interposition d'une grosse planète: c'est le sentiment de M. Goodricke. Nous parlerons de divers autres changements au mot ÉTOILE. (D. L.)

CHANGEMENT D'ORDRE, en *Arithmétique* & en *Algèbre*, est la même chose que permutation. Voyez PERMUTATION.

On demande, par exemple, combien de rangemens d'ordre peuvent avoir six personnes assises à une table: on trouvera 720. Voyez ALTERNATION & COMBINAISON. (O.)

CHAPE, f. f. (*Meck.*) Nom qu'on donne en général à des trous percés dans le bois, dans le fer, ou toute autre matière, & destinés à recevoir

les extrémités de l'estieu d'une poulle, d'une balance, d'un tour, &c.

On affecte particulièrement ce nom à ces bandes de fer recourbées en demi-cercle, entre lesquelles sont suspendues & tournent des poulies sur un pivot ou une goupille qui les traverse & leur sert d'axe, & va se placer & rouler dans deux trous pratiqués, l'un à l'une des ailes de la *chape*, & l'autre à l'autre aile. Tout cet assemblage de la *chape* & de la poulie est suspendu par un crochet, soit à une barre de fer, soit à tout autre appui solide. On voit de ces poulies encastrées dans des *chapes* au-dessus des puits. Voyez *POULIE*.

CHAPEAU, f. m. (*Méch.*) On appelle ainsi, dans certains batis de charpente, un assemblage de trois pièces de bois, dont deux posées verticalement & enmortoises avec une troisième sur ses extrémités, tiennent cette troisième horizontale.

Dans l'*hydraulique pratique*, le *chapeau* est une pièce de bois attachée avec des chevilles de fer sur les couronnes d'une file de pieux, soit dans un batardeau, soit dans une chaussée.

CHAPELET, f. m. (*Hydrod.*) Machine hydraulique, composée d'une suite de *godets* ou de *clapets* attachés à une corde ou chaîne sans fin, qui trempent alternativement dans l'eau d'un puits, & qui se remplissent ou se chargent avant que d'entrer dans un tuyau, d'où ils sortent par l'autre bout, & se vident dans un bassin ou creux quelconque destiné à recevoir l'eau.

Comme il est nécessaire que les *clapets* ou *godets* entrent un peu juste dans le tuyau montant, il y a quelquefois un frottement assez considérable dans cette machine.

La chaîne sans fin doit être écartée dans son chemin, & pour entrer verticalement dans le tuyau montant, & pour que les *godets* ou *clapets* vident l'eau dans le réservoir de décharge; ainsi, il faut qu'elle tourne & s'accroche sur deux hérissons ou rouets à crocs, placés à ses extrémités. De plus, son mouvement doit être un peu prompt, pour ne pas donner à l'eau le tems de redescendre par le tuyau montant. Voyez une plus ample description & l'usage de ces machines dans l'*architecture hydraulique* de Bélidor, & dans la *Physique* de Descartiers.

CHARA. (*Astron.*) Voyez *CHIENS DE CHASSE*.

CHARGE d'eau; (*Hydrod.*): hauteur verticale de l'eau au-dessus d'un orifice, ou d'un point quelconque.

CHARGE (*Jeu*) se dit des dés dont on a rendu une des faces plus pesante que les autres; c'est une friponnerie dont le but est d'amener le point soible ou fort à discrétion. On *charge* le dé en remplissant les points mêmes de quelque matière plus lourde en pareil volume que la quantité d'ivoire qu'on en a ôtée pour les marquer. On les *charge* d'une manière plus fine; c'est en transplant le centre de gravité hors du centre de masse; ce qui se peut, ce qui est même très-souvent contre

l'intention du tableur & des joueurs, lorsque la matière des dés n'est pas d'une consistance uniforme. Alors il est naturel que les dés s'arrêtent plus souvent sur la face dont le centre de gravité est le moins éloigné. *Exemple*: Si un dé a été coupé dans une dent, de manière qu'une des faces soit lüne de l'ivoire qui touchoit immédiatement à la concavité de la dent, & que la face opposée ait par conséquent été prise dans l'extrémité lisse de la dent; il est clair que cet endroit sera plus compact que l'endroit opposé, & que le dé sera *chargé* tout naturellement; on peut donc sans fourberie étudier les dés au triébrac, & à tout autre jeu de dés. La petite différence qui se trouve entre l'égalité de pesanteur en tout sens, ou, pour parler plus exactement, entre le sens de pesanteur & celui de masse, se fait sentir à la longue, & donne un avantage certain à celui qui l'a connu: or le plus petit avantage certain pour un des joueurs à l'exclusion des autres, dans un jeu de hazard, est presque le seul qui reste quand le jeu dure long-tems.

CHARIER, (*Hydrod.*) entraîne avec soi: les eaux tant de rivière que de fontaine charient naturellement du sable, du gravier. (*K*)

CHARIOT, (*Méch.*) Voyez *TRAINAU*.

CHARIOT, (*Astronomie*). Un *chariot* est une constellation qu'on appelle aussi la *grande ourse*; elle a en effet quelque ressemblance avec un chariot. Voyez *GRANDE OURSE*. (*O*)

CHARIVARI, f. m. (*Jeu*) se dit à l'ombre à trois, d'un hazard qui consiste à porter les quatre dames. On reçoit pour ce jeu de chacun une fiche, si l'on gagne; on la paie à chaque joueur, si l'on perd.

CHARNIERE, f. f. (*Méch.*) pièce sur laquelle tournent au moyen d'une visière ou d'un axe, les deux parties d'une boîte, les deux jambes d'un compas, &c.

CHASSE, f. f. (*Méch.*) On appelle *chasse* d'une balance la partie perpendiculaire au fléau, & par laquelle on soutient la balance quand on veut s'en servir. Voyez *BALANCE* & *FLÉAU*.

Les luneteurs appellent aussi *chasse* la monture d'une lunette dans laquelle les verres sont enfoncés; cette *chasse* est de corne, d'écaille, d'acier bien élastique, &c.

Ce même mot se prend aussi dans la Mécanique pour signifier l'espace libre qu'il faut accorder à une machine entière, ou à quelque'une de ses parties, pour en augmenter ou du moins en faciliter l'action. Trop ou trop peu de *chasse* nuit à l'action: c'est à l'expérience à déterminer la juste quantité. Voici un exemple simple de ce qu'on entend par *chasse*. La *chasse*, dans la scie à scier du marbre, est la quantité précise dont cette scie doit être plus longue que le marbre; à scier, pour que toute l'action du scieur soit employée sans lui donner un poids de scie superflu qu'il s'écarteroit, & qui ne seroit point appliqué si la *chasse* étoit trop longue: il est évident que dans ce cas, la

longueur des bras de l'ouvrier permettra plus de *chasse*. La *chasse* ordinaire est depuis un pied jusqu'à dix-huit pouces.

CHASSE, f. f. (*Jeu*) est un jeu de paume la distance qu'il y a entre le mur du côté où l'on sert, & l'endroit où tombe la balle du second bond. Cette distance se mesure par les carreaux : quand la *chasse* est petite, on dit une *chasse* à deux, à trois carreaux & demi, &c. C'est au garçon à examiner, annoncer & marquer fidèlement les *chasses*. Ce garçon en est appelé le *marqueur*. Voyez *Partie* PAUME.

CHASSIS, f. m. se dit généralement de tout assemblage de fer ou de bois assez ordinairement quarré, destiné à environner un corps & à le contenir. Le *chassis* prend souvent un autre nom, selon le corps qu'il contient, selon la machine dont il fait partie, relativement à une infinité d'autres circonstances. Il y a peu d'arts & même assez peu de machines considérables, où il ne se rencontre des *chassis* ou des parties qui en font la fonction sous un autre nom.

CHASSIS, (*Hydr.*) est un assemblage de bois ou de fer qui se place au bas d'une pompe, pour pouvoir par le moyen de deux coulisses pratiquées dans un dormant de bois, la lever au besoin, & vider les corps de pompe. (K)

CHATEAU, nom de la planète de Mercure.

CHATIERE, f. f. (*Hydrod.*) diffère de la pierre, en ce qu'elle est moins grande, & bâtie seulement de pierres sèches posées de champ des deux côtés, & recouverte de pierres plates appelées *couvertures*, en sorte qu'elles forment un espace vuide d'environ 9 à 10 pouces en quarré, pour faire écouler l'eau superflue d'un bassin, ou d'une très-petite source. Ces *châtieres* bâties ainsi légèrement sont fort sujettes à s'engorger. (K)

CHEF de l'épicycle ou *apogée* de l'épicycle, est la partie la plus éloignée de la terre.

CHE

CHELUB, nom de la constellation de Persée. **CHEMIN** de S. Jacques. Voyez VOYE LAETÈS.

CHENAL, f. m. (*Hydrod.*) c'est un courant d'eau en forme de canal, bordé le plus souvent des deux côtés de terres coupées en talus, & quelquefois revêtu de murs. Le *chenal* sert à faire entrer un bâtiment de mer ou de rivière dans le bassin d'une écluse. (K)

CHÈNE DE CHARLES II, (*Astron.*) constellation méridionale, introduite par Halley, en mémoire du *chêne royal*, sur lequel se retira Charles II. lorsqu'il eut été déshérité à Worcester, le 3 septembre 1651; voir ce qu'en raconte le célèbre Astronome, dans son *Histoire de la maison* des Stuart.

Le nom de *chêne* de Worcester à six heures

du soir, fit environ vingt-six milles sans s'arrêter, accompagné de cinquante ou de soixante de ses plus fidèles amis ; ensuite l'intérêt du sa sûreté personnelle lui fit prendre le parti de quitter ses compagnons, sans leur avoir communiqué ses desseins ; & se livrant à la conduite du comte de Derby, il se rendit sur les confins de Staffordshire à Botcebel, métairie écartée, dont un nommé *Penderell* étoit le fermier. Charles ne fit pas de difficulté de s'ouvrir à lui ; cet homme avoit des sentimens fort au-dessus de sa condition, quoique la peine de mort fût prononcée contre ceux qui donneroient une retraite au roi, & qu'on eût promis une grosse récompense à ceux qui le trahiroient, il promit & fut garder une fidélité inviolable. Ses frères, au nombre de quatre, & gens d'honneur comme lui, prêtèrent leur assistance : ils firent prendre à Charles des habits tels que les leurs, ils le menèrent dans un bois voisin, & lui mettant une hache entre les mains, ils s'ignèrent de l'employer à faire leur provision de fagots ; pendant quelques nuits le roi n'eut d'autre lit que de la paille, & sa nourriture fut celle qui se trouva dans la ferme. Pour se cacher mieux, il monta sur un grand *chêne*, dont les feuilles & les branches lui servirent d'asile pendant vingt-quatre heures ; il vit passer sous ses pieds plusieurs soldats, tous employés à chercher le roi, & qui la plupart témoignèrent une extrême envie de s'en saisir. Cet arbre reçut ensuite le nom de *chêne royal*, & fut regardé long-temps par tous les habitants du pays avec une extrême vénération.

On trouve aussi dans le *Journal des sçavans*, du 23 novembre 1676, l'extrait d'un livre anglais, intitulé : *Bejacobel*, du nom d'une des deux maisons qui servirent de retraite à Charles II ; ce livre a été traduit en français, on y trouve la figure des deux maisons & celle de ce fameux *chêne*, qu'on regarde comme un prodige, & qui étoit si gros & si touffu, que vingt hommes auroient pu s'y cacher.

L'abbé de la Caille se plaignoit de ce que Halley avoit pris des étoiles de la constellation du navire pour former la constellation de son protecteur ; (*Voyez le Journal du voyage* de la Caille 1753, in-12 ;) mais le monarque & l'astronome méritoient que cette constellation fût conservée, & j'ai représenté sur mon globe céleste, grave en 1773, ce même *chêne*, fixé contre le vaisseau, & passant sur routes les étoiles que Halley lui avoit assignées, elles sont au nombre de vingt-quatre dans le catalogue des étoiles australes de Halley ; la principale est une étoile de seconde grandeur, qui avoit au commencement de 1678, 6° 27' 25" de longitude, & 72° 15' de latitude australe ; cette constellation s'étend depuis 6° 13' jusqu'à 7° 64' de longitude, & depuis 51° jusqu'à 72° de latitude ; cet intervalle renferme un grand nombre d'autres étoiles du navire, dans le catalogue de *Certain australe* de la Caille. (D. L.)

CHENIB ou GENIB, nom de la belle étoile de Persée.

CHERCHE, f. f. (*Méch.*) On donne ce nom 1.^o aux différentes courbes selon lesquelles on pratique le renflement léger qui fait tant à l'élégance des colonnes. Voyez CONCHOÏDE DE NICOMÈDE. C'est en effet cette courbe qu'on suit pour les Ioniques & les Corinthiennes renflées à la manière de Vignole. 2.^o Au trait d'un arc surbaissé ou rampant, déterminé par plusieurs points ou intersections de cercles, ou d'autres courbes, ou de droites & de courbes. On dit aussi dans ce cas, *cercle*, de même que *cherche*. La *cherche* est *surbaissée*, quand elle a moins d'élévation que la moitié de sa base; & *surhaussée*, quand le rapport de la hauteur à la base est plus grand que celui de 2 à 1. 3.^o Au développement de plusieurs circonférences fait selon quelque ligne verticale; pour cet effet, il faut concevoir un fil élastique courbé circulairement, de manière que toutes les circonférences, ou tours tombent les uns sur les autres; si l'on fixe à terre la première circonférence, & qu'en prenant le bout du fil élastique on le tire en haut, on aura le développement appelé *cherche*, & l'on donnera à ce développement l'épithète de *ralongé*, & autres, selon le rapport qu'il y aura entre la circonférence la plus basse & celles qui s'élèveront en spirale au-dessus de cette circonférence. 4.^o Au profil d'un contour courbe, découpé sur une planche même, pour diriger le relief ou le creux d'une pierre, en indiquant au tailleur les parties qu'il doit enlever. Si la pierre doit être concave, la *cherche* est convexe; si au contraire la *cherche* est convexe, c'est que la pierre doit être concave.

CHERCHÉE, adj. *quantité cherchée*, (*Algeb. ou Géom.*) Les Géomètres ou les Algèbristes appellent ainsi la quantité qu'il s'agit de découvrir quand on propose un problème. Si l'on demande, par exemple, que l'on détermine le nombre, lequel multiplié par 12 produise 48, on trouveroit que le nombre 4 est la *quantité cherchée*. (*Numbers.*)

On distingue dans chaque problème les quantités connues, & la quantité ou les quantités cherchées. Ainsi, dans le problème précédent, 12 & 48 sont les quantités connues. Voyez PROBLÈME, EQUATION, &c. L'art des équations consiste à comparer & à combiner ensemble les quantités connues & les quantités cherchées, comme si les unes & les autres étoient connues; & à découvrir par le moyen de cette combinaison les quantités cherchées, c'est-à-dire à parvenir à une équation où la *quantité cherchée* soit exprimée sous une forme qui ne renferme que les quantités connues. Voyez ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE. (O)

CHESIL, nom hébreu d'une constellation, que les uns appliquent à Orion, les autres au scorpion ou aux Ouries. Voyez mon ASTRONOMIE, art. 611. (D. L.)

CHERCHEUR (*Aftron.*), petite lunette que l'on adapte aux télescopes ou aux fortes lunettes acromatiques dont le champ est petit, & cela pour trouver plus facilement les astres; on en voit un en E. E, fig. 224 des *planches d'Astronomie*. Le *chercheur* à un très-grand champ, & l'on y met l'astre fort aisément, ou le fait venir sur les fils qui se croisent au foyer du *chercheur*; & si son axe est exactement parallèle à celui du télescope, l'astre se voit au milieu du champ du télescope. (D. L.)

CHEVAL, (*Aftron.*) nom que l'on donne à la constellation de *Pégase*.

CHEVAL ou PETIT CHEVAL, constellation boréale située entre le dauphin & la tête de *Pégase*, on l'appelle aussi *equulus*, *equus minor*, *hinnulus*, *equi caput*, *sedio equina*, *sedio equi minoris*, *cylarus*, (ou cheval) *semi perfectus*. On appelle cette constellation le *petit cheval*, pour la distinguer de *Pégase* qui est le *grand cheval*: on n'en voit sur les cartes célestes que la moitié, comme si le reste du corps étoit caché dans les nuages, ainsi que le taureau dont on ne peint souvent que la moitié. Suivant la Mythologie, ce *cheval* est celui que Mercure avoit donné à Castor & qui se nommoit Cillarus, (*Virg. géorg. III. 90.*) ou celui dont Saturne prit la forme lorsqu'il fut surpris avec Philira fille de Jocus; mais comme tous les dieux & tous les héros de l'antiquité ont fait usage du *cheval*, on a donné à cette constellation une multitude d'origines différentes sur lesquelles on ne sauroit rien statuer. Voyez *Cassius*, *calum Astronomico poeticum*.

Cette constellation ne contient que dix étoiles, dont la plus belle est marquée de troisième grandeur dans Flamsteed, & de quatrième grandeur dans le catalogue de la Caille. Sa longitude au commencement de 1750, étoit de 10° 19' 37" 54", & sa latitude de 20° 8' 56" boréale. (D. L.)

CHEVALET du peintre, (*Aftron.*) constellation méridionale, qui contient 25 étoiles dans le *Calum australis* de M. de la Caille, où elle est appelée *apparatus sculptoris*, la plus belle est n.^o 6 de cinquième grandeur; son ascension droite pour 1750 est 11° 38' 58" avec 30° 43' 3" de déclinaison méridionale, en forte qu'elle passe plus de dix degrés au-dessus de l'horizon de Paris. (D. L.)

CHEVALET, f. m. (*Méch.*) On donne ce nom à une infinité d'instrumens dont l'énumération n'appartient pas à notre sujet. Le *chevalet* ordinaire est une longue pièce de bois horizontale, soutenue par quatre pieds, dont deux sont assemblés à un bout de la pièce, & les deux autres à l'autre bout.

CHEVALIER, f. m. (*Jeu.*) C'est le nom d'une pièce aux échecs. Voyez ECHecs.

CHEVELURE DE BÉRENICE, (*Aftronom.*) ancienne constellation boréale; il en est parlé dans l'ancienne

l'imagette de Ptolémée parmi les étoiles informes du Lyon, quoiqu'il n'en fasse pas une constellation; il dit qu'il y a un amas qu'on appelle les cheveux *maiores*, sans parler de *Bérénice*. Voyez à ce sujet M. Bailly, *T. II*, page 199. Proclus, dans sa sphère, nous dit que cette constellation avoit été célébrée par le poète Callimaque, (environ 236 ans avant l'ère vulgaire, &c.) en quoi il a été suivi par Catulle, par Hyginus, &c. Ptolémée Legus, premier de ce nom, roi d'Égypte, épousa *Bérénice* qui fut mère de Ptolémée Céraunus ou soudroyant, épousa *Bérénice* la sœur dont il eut Ptolémée Philopator, c'est cette *Bérénice*, femme de Ptolémée Evergete, qui ayant vu partir son mari pour l'Asie à la tête de son armée, fit vœu de couper ses cheveux s'il revenoit vainqueur; elle les consacra en effet dans le temple de Vénus; ces cheveux disparurent le lendemain: le roi témoigna du regret, & Conon son mathématicien, pour le distraire, lui montra sept étoiles qui n'appartenoient à aucune constellation, en lui disant c'est la chevelure de *Bérénice*; ce fut alors que le Poète Callimaque de Cyrène en fit l'objet d'une élegie qui donna de la célébrité à la nouvelle constellation. Catulle qui l'a suivi parle aussi de Conon.

Idem me ille Conon cœlesti numine vidit
E Bereniceo vertice cæsarium.

Il paroît que Virgile l'avoit également en vue lorsqu'il disoit dans sa troisième éclogue :

In medio duo signa Conon, & quis fuit alter
Descriptis radio totum qui gentibus orbem.

Conon & Callimaque attribuerent à cette constellation sept étoiles situées au nord de la queue du lion, formant une espèce de triangles; mais il y a aussi trois étoiles qui, dans Ptolémée, appartiennent à la constellation du lion, & que l'on doit rapporter à celle de la chevelure de *Bérénice*, savoir les étoiles 33, 34 & 37. On a appelé ces trois étoiles *tricus*, car en grec on appelle les cheveux *tricus*, ces étoiles qui, au tems de Ptolémée, appartenoient au lion, ont été attribuées quelquefois à la constellation de la vierge. (Steffler, in Procli *sphaeram commentarius*, fol. 120.) Bayer observe que plus anciennement on y peignoit une gerbe, (Voyez *Cælius*, page 134.) & chez les arabes elle a conservé le nom d'huzimeth ou gerbe de bled. La raison qui put donner lieu à cette ancienne dénomination tient à l'assemblage de toutes les constellations voisines; on y voit le moissonneur, le chariot, les bœufs, il falloit bien y mettre les gerbes de bled, & M. Dupuis fait voir que cette constellation, par son lever héliaque annonçoit les moissons. (Astron. *T. IV*, page 405.) (D. L.)

CHEVRE, (Astron.) *capella*, étoile brillante & de première grandeur dans la constellation du

Mathématicien. Tome I, 1.^{re} Partie.

cocher, que l'on appelle aussi *capra*, *ircus*, *cabrilla*, *amalethea*, *olenia*, à cause d'Olenus ville de Bœotie, où l'on disoit que cette chevre avoit été nourrie, en arabe, *alhaiot* ou *alhatod*; elle est située vers l'épaule gauche ou l'épaule précédente du Cocher: elle est la troisième de cette constellation dans les catalogues de Ptolémée & de Tycho, & la quatrième dans le catalogue Britannique. Sa longitude, en 1750, étoit de 78° 21' 51"; & sa latitude de 22° 51' 43". Voyez COCHER. Cette étoile est la plus belle de celles qui ne se couchent point à Paris. Les poètes disent que c'est la chevre Amalthée qui allaita Jupiter dans son enfance. Horace en parle en disant: *infans sydera capra*, Ovide dit aussi: *olenia fidus pluviale capella*, *Métam. III* 649.

CHEVRE, est aussi quelquefois le nom de la constellation du capricorne. (D. L.)

CHEVRE, f. f. (Mécan.) Machine composée de trois longues pièces de bois *R*, *R*, *B*, *R*, *C*, (Pl. Mécan. fig. 57.) lesquelles s'assemblent à genouillière au sommet *B*, & s'écartent par en-bas. Au point *B* est attachée une poulie sur laquelle passe une corde, qui d'un côté soutient le poids *M*, & de l'autre va s'envelopper sur un tour *T*. Des hommes appliqués aux extrémités des leviers *T*, *H*, *T*, *L*, font tourner le cylindre & obligent le poids *M* de monter.

CHEVREAUX, (Astron.) La constellation du cocher renferme aussi les chevreaux, que l'on représente portés sur le bras gauche du cocher; ils sont formés par trois étoiles α , β & γ , qui sont un triangle isocèle dont l'angle supérieur est fort aigu. Ce triangle, situé à trois degrés au midi de la chevre, sert même à distinguer cette étoile des autres de première grandeur.

Les poètes disent que ces chevreaux avoient été nourris du même lait que Jupiter. Autrefois le lever des chevreaux étoit suivi d'ouragans, ce qui a fait dire :

Quantus ab occasu veniens pluvialibus hædis
Verberat imber humum. Virg. IX. 668.
Non ulli tutum est hædis surgens æquor.

On verra la manière de les reconnaître au mot CONSTELLATION. (D. L.)

CHIENS (Astronomie), constellations célestes, au nombre de trois, deux anciennes au midi, une nouvelle du côté du nord.

Le grand chien est appelé *Canis major*, *magnus*, *alter*, *dexter*, *sequens*, *australior*, *æstifer*; Horace l'appelle *Sidus fervidum*, *invidum Agricolis*; Homère, *Asire* d'autonne; les Egyptiens, *Isis*, étoile d'Isis, *Sotis* ou *Seth*, *Anubis*; d'autres enfin l'appellent *Sirius*, la canicule, *Mara*; les Arabes, *Sera*, *Alchabor*, *Elchabar* ou *Kabir*, c'est-à-dire, le grand; dans les tables alphonsines, *Altemia*. Cette constellation contient 31 étoiles dans le ca-

X x

riologue britannique, & sur-tout une étoile de première grandeur, la plus belle de toutes les étoiles, appelée *Sirius* ou *Siris*, du nom d'Osiris, divinité égyptienne, ou à cause du Nil qu'on appelloit aussi *Siris* (Plin. liv. v. chap. 9), & qui paroissoit avoir avec le lever de cette étoile une correspondance remarquable. D'autres enfin tirent son nom du mot grec *σῆρς*, briller, parce qu'en effet c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Grecs prétendoient que le chien avoit été ainsi nommé, à cause du chien dont l'Aurore fit présent à Céphale, comme du plus prompt de tous les chiens; Céphale voulut en faire l'épreuve sur un renard, qu'on disoit surpasser tous les animaux à la course; ils coururent tous les deux si long-temps (& même sans se fatiguer), que Jupiter voulut récompenser ce chien, en le plaçant parmi les astres. Il s'appelloit *Lelaps*; & a donné aussi son nom à la constellation.

Le nom & la forme de chien que l'on donne à cette constellation, paroît plutôt venir d'Anubis, divinité égyptienne, qu'on représentoit avec une tête de chien; *semi-deusque canes*, dit Lucain (liv. viij. v. 832); & Virgile (*Æn. viij. 698*), *lratator anubis*, parce qu'il étoit le gradien d'Osiris & d'Isis, & qu'il avoit découvert les membres d'Osiris, déchiré par son frère Typhon, ou parce qu'il étoit grand chasseur; il est plus vraisemblable que c'est parce qu'il avertissoit les Egyptiens de la saison du débordement, comme un chien fidèle avertis son maître de l'arrivée des voleurs. Suivant Plutarque, ce chien signifie l'horizon. Les Egyptiens considéroient Anubis comme un gardien fidèle placé aux portes du jour & de la nuit, c'est-à-dire, aux limites de l'hémisphère éclairé qu'ils appelloient *Isis*, & de l'hémisphère obscur nommé *Nephtis*. Il paroît que les Egyptiens firent de cette étoile leur mercure Anubis; il étoit honoré en Ethiopie comme le chef des étoiles. *Astron. IV. 392*. Nous avons parlé, au mot *canicule*, du lever héliaque de *Sirius*, qui fut si célèbre dans l'antiquité; il arrivoit en été, comme on le voit dans Virgile:

*Jam rapidus torrens sitientes Sirius indos,
Ardebat cælo, & medium sol igneus orbem
Hauferat: ardens herba.*

Georg. IV, 415.

Et dans Manilius:

*Latratque canicula Flammans,
Et rabit igne suo, geminatus incendia solis.*

Manil. V, 205.

Il faut remarquer que *Sirius* est appelé *Canis dexter*, *astralior*; au lieu que le petit chien dont nous allons parler, est nommé *Canis sinister*, *septentrionalis*, parce que les Orientaux, dans leurs

adorations, tournoient la face au levant; & dans cette position, ils avoient le midi à la droite & le nord à la gauche: or Procyon est plus septentrional que *Sirius*.

Il a beaucoup disputé sur la signification d'un passage de Virgile, où il est parlé du chien à l'occasion de l'entrée du soleil dans le signe du taureau, ou du commencement de l'année qui, dans Hésiode, étoit marqué au lever des pleïades.

*Candidus auratis aperit cum cornibus anuum,
Taurus & adverso cedens Canis occidit astrum.*

Georg. I, 217.

Peut-être que *cedens* doit se rapporter à *taurus*, & non à *Canis*; c'est le taureau qui, en se couchant, cède la place à l'astre du chien qui est vis-à-vis, parce qu'en effet le taureau se coucheoit avant le chien, & que ces deux animaux se regardent dans le ciel. On peut dire aussi que c'est le chien qui cède au soleil, astre ennemi, parce que le soleil l'absorbe dans ses rayons; car c'est le sens du coucher héliaque de *Sirius*.

M. l'abbé de Lille, dans ses Géorgiques, traduit ainsi, en suivant, dit-il, l'interprétation de Macrobie:

Et quand l'astre du jour
Ouvrant dans le taureau sa brillante carrière,
Engloutit *Sirius* dans les flots de lumière.

Mais il convient que ce vers est le plus inintelligible de toutes les Géorgiques. Du tems de Servius, vers l'an 340; il y avoit quelques exemplaires où on lisoit *adverso*; ce n'étoit donc pas la leçon ordinaire: aussi Heinsius lit *adverso*, & le P. de la Rue adopte cette leçon, en appliquant ce mot au navire, constellation qui suit le chien, mais qui présente la poupe, *aversam partem*, & la partie postérieure, au lieu de la proue. Mais rien dans Virgile n'annonce ici le vaisseau.

Le P. Lacerda explique *adverso* par l'influence fâcheuse du grand chien; en effet, suivant Varro, au sixième des calendes de mai, *occidit Canis Sirius per se vehementer*, on célébroit les fêtes appelées *robigalia*. M. Costard cite un poète Anglois dont il adopte la traduction, & qui dit que le taureau effrayé suit un astre contraire; mais il ne dit pas comment il entend ce mot de contraire: pour moi, je préfère les deux explications que j'ai données plus haut.

On trouve dans les monuments un animal monstrueux à 3 têtes, de chien, de lion & de loup; il paroît que c'étoit pour indiquer les constellations qui, à l'équinoxe, occupoient l'orient, l'occident & le méridien, ou la route du soleil dans les signes supérieurs. V. l'explication de M. Duport dans mon *Astron. t. iv. p. 494 & 513*.

On voit aussi un chien hirsute de serpens, pour faire allusion à la constellation de l'hydre, dont la tête semble menacer celle du chien. *Id. p. 494*.

LE PETIT CHIEN contient 14 étoiles, dont une de première grandeur. Il est appelé Procyon ou *Antecanis*, *Canis minor*, *Catellus*, *Canis primus*, *Antecusor*, *Precedens*, *Spectentrionalis*, *Sinister*, *Canis Orionis*, *Canis Icarus*, sive *Erigonis*, *Mera*, *Fovea*, *Morus*; en arabe, *Algomeyfa*.

Cette constellation a été nommée le petit chien, suivant les poètes, à cause du chien d'Orion ou de celui d'Icare, appelé *Mera*, qui se précipita dans un puits après avoir vu périr son maître Icare; & Erigone, fille d'Icare, qui s'étoit pendue de désespoir: il est appelé chien d'Icare dans ces vers, où Ovide annonce qu'il se lève le 25 avril, les moissons commençant à s'annoncer & les chaleurs à se faire sentir; mais ce passage est encore sujet à des difficultés.

*Est Canis Icarium dicunt, quo silere molo
Tota sit tellus præcidi turque seges.*

Faît. IV, in fine.

D'autres prétendent que c'est le chien qu'Hélène avoit tendement lorsqu'elle fut enlevée par Paris; elle le perdit dans l'Euphrate, & conçut une si grande douleur, qu'elle pria Jupiter de le recevoir dans le ciel.

Le nom que lui donnent Bayer & Schillenus, de *Fovea*, qui signifie une fosse où l'on dépose le bled pour le garder, a pu venir de ce que cet astre indiquoit l'abondance & la moisson: mais il est plus vraisemblable que l'idée de fosse vient du mot grec *μύς*, qui signifie quelquefois magasin de bled, qu'on a confondu avec celui de Sirius. Ce dernier nom est approprié au grand chien; mais souvent le grand & le petit ont porté le même nom, entr'autres celui de *Mera*.

Le mot arabe *algomeyfa* signifie l'hyomère ou signeur sauvage, parce qu'apparemment les Arabes peignoient ici cet astre au lieu d'un chien, & c'est à quoi répond le latin *Morus*. M. Dupuis observe qu'on y peignit autrefois un singe.

CHIENS de chasse, (*Astron.*) les levriers, *cones venatici*, ou *Astero* & *Chara*, constellation boréale introduite par Hévelius dans son *Firmamentum Sobiescianum* (qui parut en 1690) pour rassembler les étoiles informes qui se trouvent entre la grande ourse & le bouvier; il explique lui-même dans son *Prodromus*, pag. 114, la raison de cette dénomination. Le bouvier ayant été représenté quelquefois comme un chasseur qui poursuit l'ours à la chasse, & qui élève les bras comme s'il excitait ses chiens de la voix & de la main, il a paru naturel de placer les chiens à côté de lui. Le nom d'*Astero*, fort connu des poètes, convenoit spécialement à une figure qui renferme plusieurs petites étoiles; l'autre a été appelée *Chara*, comme la chienne favorite du chasseur. Parmi les étoiles que renferme cette constellation, il y en a deux sous la queue de la grande ourse, qui étoient connus des anciens; Hévelius en observa & en détermina 21 qui étoient nou-

velles pour les astronomes. Flamsteed, dans son grand catalogue britannique, en a mis 24; la principale est de seconde ou troisième grandeur: c'est celle que Halley appelloit *Cœur de Charles II*, à l'honneur du roi, fondateur de l'observatoire royal d'Angleterre, & de la société royale de Londres; nous en parlerons ci-après. (D. L.)

CHIFFRE, f. m. (*Arithm.*) caractère dont on se sert pour désigner les nombres. Les différents peuples se sont servis de différents chiffres; on peut en voir le détail au mot CARACTÈRE. Les seuls en usage aujourd'hui, du moins dans l'Europe & dans une grande partie de la terre, sont les chiffres arabes au nombre de dix, dont le zéro (0) fait le dixième. Le zéro s'est appelé pendant quelque temps du nom de chiffre, *cyphra*, en forte que ce nom lui étoit particulier. Aujourd'hui on donne le nom de chiffre à tous les caractères servant à exprimer les nombres; & quelques auteurs refusent même le nom de chiffre au zéro, parce qu'il n'exprime point de nombre, mais sert seulement à en changer la valeur.

On doit regarder l'invention des chiffres comme une des plus utiles, & qui fut la plus d'honneur à l'esprit humain. Cette invention est digne d'être mise à côté de celle des lettres de l'alphabet. Rien n'est plus admirable que d'exprimer avec un petit nombre de caractères toutes sortes de nombres & toutes sortes de mots. On n'en auroit pu prendre plus ou moins de dix chiffres; & ce n'est précisément pas dans cette idée que consiste le mérite de l'invention, quoique le nombre de dix chiffres soit assez commode. Voyez BINAIRE & ÉCHELLES ARITHMÉTIQUES. Le mérite de l'invention consiste dans l'idée qu'on a eue de varier la valeur d'un chiffre en le mettant à différentes places; & d'inventer un caractère zéro qui se trouvant devant un chiffre, en augmentait la valeur d'une dizaine. Voyez NOMBRE, ARITHMÉTIQUE, NUMÉRATION. On trouve dans ce dernier article la manière de représenter un nombre donné avec des chiffres, & d'exprimer ou dénombrer un nombre représenté par des chiffres. (O)

CHIFFRER, expression populaire dont on se sert pour signifier l'art de compter.

CHILIADE, f. f. (*Arith.*) Assemblage de plusieurs choses qu'on compte par mille. Ainsi, une chiliale ou un mille c'est la même chose.

CHILIOGONE, f. m. (*Géom.*) C'est une figure plane & régulière de mille côtés, & d'autant d'angles. Quoique l'œil ne puisse pas s'en former une image distincte, nous pouvons néanmoins en avoir une idée claire dans l'esprit, & démontrer aisément que la somme de tous les angles est égale à 1995 angles droits: car les angles internes de toute figure plane sont égaux à deux fois autant d'angles droits moins quatre, que la figure a de côtés; ce qui peut se démontrer aisément en partageant la figure en autant de triangles qu'elle a de côtés. Ces

X xij

triangles aient chacun pour base un côté de la figure, & leur sommet à chacun sera dans un point placé au-dedans de la figure. Voyez TRIANGLE. (O)

CHOC, f. m. (Méch.), action par laquelle un corps en mouvement en rencontre un autre, & tend à le pousser : c'est la même chose que percussion. Voyez PERCUSSION & COMMUNICATION DU MOUVEMENT. (O)

CHOROBATE, f. m. (Méch.), espèce de niveau dont se servoient les anciens.

Le grand niveau qu'ils appelloient *chorobate*, étoit une pièce de bois de 20 pieds de longueur, soutenue par quelques pièces aux extrémités, & qui avoit dans la partie supérieure un canal qu'on remplissoit d'eau, avec quelques petits plombs qui pendoient aux côtés, pour s'assurer si cette pièce étoit de niveau. C'étoit-là toute la longueur de leurs nivellements ; car ils transportoient le *chorobate* de 20 en 20 pieds pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit fort défectueux : nos modernes en ont inventé de beaucoup meilleurs. Voy. NIVEAU, NIVELLEMENT, article de M. le chevalier de Jaucourt.

CHUTE, f. f. (Méch.), chemin que fait un corps pesant en s'approchant du centre de la terre. Voyez PESANTEUR.

Galilée est le premier qui ait découvert la loi de la chute des corps graves. Voyez Partide Accélération.

CHUTE d'eau (Hydrod.). On dit qu'un ruissseau, une rigole, un courant d'eau quelconque, forme une chute d'eau au-devant d'un moulin ou d'une machine hydraulique qu'il fait mouvoir.

CHUTE des graves à la surface de chaque planète. La vitesse des graves à la surface de la terre, 15 pieds $\frac{15}{1000}$, étant multipliée par la masse d'une planète & divisée par le carré de son rayon, en prenant pour unités la masse & le rayon de la terre, donne la vitesse des graves à la surface de chaque planète. Par exemple, la masse de Jupiter est 288 fois plus considérable que celle de la terre ; ainsi, les corps graves y seroient attirés 288 fois plus qu'ils ne le sont sur la terre, & descendoient 288 fois 15 pieds, si le rayon de Jupiter n'étoit environ 17 fois plus grand que celui de la terre, & le carré de la distance du centre à la surface 116 fois plus grand, ce qui rend la pesanteur 116 fois moindre : or 288 diminué 116 fois, ou divisé par 116, donne un peu moins de 2 $\frac{1}{2}$; ainsi, la pesanteur des corps tirés à la surface de Jupiter, est presque deux fois & demie celle des nôtres ; au lieu de décrire 15 pieds par seconde, ils en décrivent 37. On en trouvera la table au mot PLANÈTE.

CHUTE des planètes vers le soleil. Voy. DESCENTE.

CHUTE d'une planète dans l'Astrologie, ou

déjection, est le signe où elle a le moins d'influence ; il est opposé à celui de l'exaltation. (D. L.)

CIEL, dans l'Astronomie ancienne, signifie plus particulièrement un orbite ou une région circulaire du ciel éthéré.

Les anciens astronomes admettoient autant de cieux différents qu'ils remarquoient de mouvements différents dans les astres. Quelques-uns croyoient les cieux tous solides, ne pouvant pas s'imaginer qu'ils pussent sans cette solidité soutenir tous les corps qui y sont attachés : de plus, ils les faisoient de cristall, afin que la lumière pût passer à travers ; & ils leur donnoient une forme sphérique, comme étant celle qui convenoit le mieux à leur mouvement.

Ainsi, on comptoit sept cieux pour les sept planètes ; savoir, le ciel de la lune, de mercure, de vénus, du soleil, de mars, de jupiter & de saturne.

Le huitième, qu'ils nommoient le firmament, étoit pour les étoiles fixes ; aussi, le nom de huitième ciel est très-commun dans les auteurs. Il y en a qui comptoient un neuvième ciel, appelé *primum mobile*, le premier mobile, & qui entraînait tous les autres cieux jointur.

Alphonse, roi de Castille, ajouta deux cieux cristallins, pour expliquer quelques irrégularités qu'on avoit trouvées dans les mouvements célestes. On étoit enfin sur le tout un ciel empyrée, dont on fit le séjour de Dieu ; & ainsi l'on compléta le nombre de douze cieux. Riccioli a donné un grand détail de ces diverses opinions. *Aldrag. t. 1, p. 271 & suiv.*

On supposoit que les deux cieux cristallins étoient sans astres, qu'ils entouraient les cieux inférieurs, étoilés & planétaires, & leur communiquaient leur mouvement. Le premier ciel cristallin seroit à rendre compte du mouvement des étoiles fixes, qui les fait avancer d'un degré vers l'orient en soixante-dix ans ; d'où vient la précession de l'équinoxe. Le second ciel cristallin seroit à expliquer les mouvements de libration par lesquels on croyoit que la sphère céleste faisoit des balancements d'un pôle à l'autre pour la diminution de l'obliquité de l'écliptique.

Quelques-uns ont admis beaucoup d'autres cieux selon leurs différentes vues & hypothèses. Euclide en a admis vingt-trois ; Calippus, trente ; Régimontanus, trente-trois ; Aristo, quarante-sept, & Erastostène en comptoit jusqu'à soixante-dix.

Nous pouvons ajouter que les astronomes ne se mettoient pas fort en peine si les cieux qu'ils admettoient ainsi étoient réels ou non ; il leur suffisoit qu'ils pussent servir à rendre raison des mouvements célestes, & qu'ils fussent d'accord avec les phénomènes. *Chambers. (O)*

Parmi plusieurs rêveries des rabbins, on lit dans le talmud qu'il y a un lieu où les cieux & la terre se joignent ; que le rabbi Barchana s'y étant

rendu, il posa son chapeau sur la fenêtre du ciel, & que l'ayant voulu reprendre un moment après, il ne le retrouvait plus, les cieux l'avoient emporté; il faut qu'il attende la révolution des orbes pour le rattraper.

CIERGES (*Hydraulique*). Ce sont des jets élevés & perpendiculaires, fournis sur la même ligne par le même tuyau, qui étant proportionné à leur quantité, à leur fouche & à leur sortie, leur conserve toute la hauteur qu'ils doivent avoir. On a un bel exemple des *cierges* ou grilles d'eau en haut de l'orangerie de Saint-Cloud.

On prétend que les *cierges* d'eau sont plus éloignés les uns des autres que les grilles. (K)

CINQ, f. m. (*Arithmétique*), nom de nombre. Tout nombre scindé par 5 est divisible par 5, & tout multiple de 5 se termine par 5 ou par zéro; la démonstration en est facile à trouver.

CINQ (*Jeu de Carte*) est une carte marquée de cinq points. Le point est un cœur, on pique, ou trefle, ou carreau. Ainsi, il y a quatre cinq dans le jeu.

CIRCONFÉRENCE, f. f. (*Géom.*), se dit de la ligne courbe qui renferme un cercle ou un espace circulaire, & qu'on nomme aussi quelquefois *periphérie*. Voyez **CERCLE**. Ce mot est formé du latin *circum*, environ, & de *fero*, je porte.

Toutes les lignes tirées du centre à la *circonférence* du cercle, & qu'on appelle *rayons*, sont égales entr'elles. Voyez **RAYON**.

Une partie quelconque de la *circonférence* s'appelle *arc*; une ligne droite tirée de l'extrémité de cet arc à l'autre, s'appelle la *corde* de cet arc. Voyez **ARC** & **CORDE**.

La *circonférence* du cercle est supposée divisée en 360 parties égales, qu'on appelle *degrés*. Voyez **DÉGRÉ**.

L'angle à la *circonférence* est sous-double de celui qui est au centre. Voyez **ANGLE** & **CENTRE**.

Tout le cercle est égal à un triangle rectiligne, dont la base est égale à la *circonférence*, & la hauteur égale au rayon. Voyez **TRIANGLE**.

Les *circonférences* sont entr'elles comme leurs rayons. Voyez **RAYON**.

De plus, puisque la *circonférence* de tout cercle est à son rayon comme celle de tout autre cercle est au sien, la raison de la *circonférence* au rayon est donc la même dans tous les cercles.

Archimède donne pour raison approchée du diamètre à la *circonférence*, celle de 7 à 22. Cette proposition d'Archimède est démontrée dans plusieurs livres de Géométrie.

D'autres qui approchent plus de la vérité, la font de 100000000000000 à 31415926535897932.

Dans l'usage, Viète, Huyghens, &c., donnent la proportion de 100 à 314 pour des petits cercles, & celle de 10000 à 31415 pour les grands cercles; mais la proportion la plus juste en petits nombres

est celle de Mélius, savoir, de 113 à 355. Voyez **DIAMÈTRE**.

D'où il suit que le diamètre d'un cercle étant donné, on a aussi la *circonférence*, laquelle multipliée par le quart du diamètre, donne l'aire du cercle. Voyez **AIRE**. (*Chambers*.)

CIRCONFÉRENCE, se dit aussi en général du contour d'une courbe quelconque. V. **COURBE**. (E)

CIRCONPOLAIRE, adj. (*Astron.*) étoiles *circonpolaires*, ce sont celles qui sont près de notre pôle boréal, qui tournent autour de lui sans se coucher jamais par rapport à nous, c'est-à-dire, sans s'abaisser jamais au-dessous de notre horizon. Comme Paris est éloigné de l'équateur de 48° 50', on n'a qu'à prendre depuis le pôle arctique de 48° 50', & toutes les étoiles qui seront renfermées dans cette zone de 97° 40', ne se coucheront jamais à Paris.

Dans ce sens, toutes les étoiles comprises dans l'hémisphère boréal ou septentrional, seroient *circonpolaires* pour les habitants du pôle arctique, c'est-à-dire, ne se couchent jamais pour eux.

On trouve l'heure qu'il est la nuit par le moyen des étoiles *circonpolaires*. Voyez mon *Astronomie*, liv. iv. & **ÉTOILE**.

CIRCOSCRPTION, f. f. (*Géom.*), c'est l'action de circoncrire un cercle à un polygone, ou un polygone à un cercle, ou à toute figure courbe. Voyez **CIRCOSCRIBRE**.

La *circoscription* des polygones ne consiste que dans l'art de tirer des tangentes; car tous les côtés d'un polygone circonscrit à une courbe, sont des tangentes de cette courbe. Voyez **TANGENTE**. (E)

CIRCOSCRIBRE, en *Géométrie élémentaire*, c'est décrire une figure régulière autour d'un cercle, de manière que tous les côtés deviennent autant de tangentes de la *circonférence* du cercle. Voyez **CERCLE**, **POLYGONE**, &c.

Ce terme se prend aussi pour la description d'un cercle autour d'un polygone, de façon que chaque côté du polygone soit corde du cercle; mais dans ce cas, on dit que le polygone est *inscrit*, plutôt que de dire que le cercle est *circoscrit*.

Une figure régulière quelconque *ABCDE*, (*pl. de Géom. fig. 36.*), inscrite dans un cercle, se résout en des triangles semblables & égaux, en tirant des rayons du centre *F* du cercle auquel le polygone est inscrit, aux différents angles de ce polygone, & son aire est égale à un triangle rectangle, dont la base seroit la *circonférence* totale du polygone, & la hauteur une perpendiculaire *FH* tirée du centre du polygone sur l'un de ses côtés, comme *AB*.

On peut dire la même chose du polygone *circoscrit* *abcde* (*fig. 23*), excepté que la hauteur doit être ici le rayon *Fh*.

L'aire de tout polygone, qui peut être inscrit dans un cercle, est moindre que celle du cercle,

& celle de tout polygone qui y peut être circonscrit, est plus grande. Le périmètre du premier des deux polygones dont nous parlons, est plus petit que celui du cercle, & celui du second est plus grand. Voyez PÉRIMÈTRE, &c.

C'est de ce principe qu'Archimède est parti pour chercher la quadrature du cercle, qui ne consistait effectivement qu'à déterminer l'aire ou la surface du cercle. Voyez QUADRATURE.

Le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit. Voyez EXAGONE.

Circonscire un cercle à un polygone régulier donné, *ABCDE* (fig. 23), & réciproquement. Coupez pour cela en deux parties égales deux des angles du polygone, par exemple *A* & *B*; & du point *F*, où les lignes de section se rencontrent, pris pour centre, décrivez avec le rayon *FA* un cercle.

Circonscire un carré autour d'un cercle. Tirez deux diamètres *AB*, *DE* (fig. 37), qui se coupent à angles droits au centre *C*; & par les quatre points où ces deux diamètres rencontreront le cercle, tirez quatre tangentes à ce cercle, elles formeront par leur rencontre le carré demandé.

Circonscire un polygone régulier quelconque, par exemple un pentagone autour d'un cercle. Coupez en deux parties égales la corde *AE* de l'arc ou de l'angle qui convient à ce polygone (fig. 23), par la perpendiculaire *FO* passant du centre, & vous la continuerez jusqu'à ce qu'elle coupe l'arc en *g*. Par les points *A*, *E*, tirez des rayons *AE*, *EF*; & par le point *g* une parallèle à *AE*, qui rencontre ces rayons prolongés en *a*, *e*; alors *a* *e* sera le côté du polygone circonscrit. Prenez la corde *AB* = *AE*; tirez le rayon *FB*, & prolongez-le en *b* jusqu'à ce que *Fb* soit égal à *Fe*; tirez ensuite *ab*, ce sera un autre côté du polygone, & vous tracerez tous les autres de la même manière.

Inscire un polygone régulier quelconque dans un cercle. Divisez 360° par le nombre des côtés, pour trouver la quantité de l'angle *EAD*; faites un angle au centre égal à celui-là, & appliquez la corde de cet angle à la circonférence, autant de fois qu'elle pourra y être appliquée; ce sera la figure qu'il falloit inscrire dans le cercle. (Chambers.)

CIRCONSCRIT, adj. (Géomét.). On dit, en Géométrie, qu'un polygone est circonscrit à un cercle, quand tous les côtés du polygone sont des tangentes au cercle; & qu'un cercle est circonscrit à un polygone, quand la circonférence du cercle passe par tous les sommets des angles du polygone. Voyez CIRCONSCRIRE. (E)

Hyperbole circonscrite, dans la haute Géométrie, est une hyperbole du troisième ordre, qui coupe ses asymptotes, & dont les branches renferment au-dedans d'elles les parties coupées de ces asymptotes. Telle est la courbe ou portion de courbe *CE DH* (fig. 39, *Analyse*), dont les branches *CE*, *DH*, sont chacune au-dedans de

leurs asymptotes respectives *AF*, *AG*. Voyez COURBE. (O)

CIRCONVOLUTION, f. f. (Géom.). On dit quelquefois qu'une surface est produite par la circonvolution d'une ligne, qu'un solide est produit par la circonvolution d'une surface; au lieu de dire par la révolution.

CIRCUIT, f. m. (Géom.), contour ou périmètre d'une figure.

CIRCULAIRE, adj. (Géom. Mété. Astron. &c.) se dit de tout ce qui a rapport au cercle. Ainsi, on appelle arc circulaire un arc ou une portion de la circonférence du cercle; mouvement circulaire le mouvement d'un corps dans la circonférence d'un cercle, &c.

Les astronomes modernes ont prouvé que les corps célestes ne se mouvoient pas d'un mouvement circulaire, mais elliptique. Voyez PLANÈTE.

Nombres circulaires: ce sont ceux dont les puissances finissent par le caractère même qui marque la racine, comme cinq, dont le quart est 25, & le cube 125. Voyez NOMBRE. (Chambers.)

CIRCULATION, en Géométrie. Le P. Guldin, jésuite, appelle voie de circulation la ligne droite ou courbe que décrit le centre de gravité d'une ligne ou d'une surface, qui par son mouvement produit une surface ou un solide. Voyez l'article CENTROBARIQUE l'usage de la voie de circulation, pour déterminer les surfaces & les solides, tant curvilignes que rectilignes. Cette méthode sort ingénieuse en elle-même, n'est presque plus d'usage depuis la découverte du calcul intégral, qui fournit des méthodes plus aisées pour résoudre tous les problèmes de cette espèce. Voyez CENTRE DE GRAVITÉ. (O)

CIRCULATOIRE, adj. (Mété.). On dit quelquefois mouvement circulaire, vitesse circulaire, pour désigner le mouvement ou la vitesse d'un corps qui tourne autour d'un point.

CIRCULER, v. n. (Mété.), se dit proprement du mouvement d'un corps ou d'un point qui décrit un cercle; mais on a appliqué ce mot au mouvement des corps qui décrivent des courbes non circulaires; par exemple, au mouvement des planètes qui ne décrivent point des cercles autour du soleil, mais des ellipses. Voyez PLANÈTE. On l'a appliqué aussi au mouvement du sang, par lequel ce fluide est porté du cœur aux artères, & revient occuper les veines. En général ce mot circuler peut s'appliquer par analogie au mouvement d'un corps qui, sans sortir d'un certain espace, fait dans cet espace un chemin quelconque, en revenant de même en même point d'où il est parti. (O)

CISSOÏDE, f. f. (Géom.) courbe algébrique qui a été imaginée par Dioclès, ce qui l'a fait appeler plus particulièrement la cissoïde de Dioclès. Voyez COURBE.

Voici comme on peut concevoir la formation de la cissoïde.

Sur le diamètre AB (Pl. d'Anal. fig. 9), du demi-cercle AOB , tirez une perpendiculaire indéfinie BC ; tirez ensuite à volonté les droites AH , AC , dans les deux quarts de cercles OB , OA , & faites $Am = IH$, & dans l'autre quart de cercle $LC = AN$, & les points m & L seront à une courbe $AmOL$, qu'on appelle la *cissoïde de Dioclès*.

Propriétés de la cissoïde. Il s'ensuit de sa génération, 1.^o que si on tire les droites KI , $p m$, perpendiculaires à AB , on aura $Ap : KB :: Am : IH$; mais $Am = IH$, & par conséquent $Ap = KB$; d'où il s'ensuit que $AK = p B$, & $p N = IK$.

2.^o Il s'ensuit aussi que la *cissoïde* AmO coupe la demi-circonférence AOB en deux également au point O .

3.^o De plus $AK : KI :: KI : KB$; c'est-à-dire, que $AK : p N :: p N : Ap$; d'ailleurs AK , $p N :: Ap : p m$; donc $p N : Ap :: Ap : p m$; & par conséquent AK , $p N$, Ap & $p m$, sont quatre lignes en proportion continue; & l'on prouvera de la même manière que Ap , $p m$, AK , & KL sont en proportion continue.

4.^o Dans la *cissoïde*, le cube de l'abscisse Ap est égal à un solide formé du carré de la demi-ordonnée $p m$, & du complément $p B$ au diamètre du cercle générateur.

Et par conséquent lorsque le point p , tombe en B , & qu'on a $p B = 0$, on a $y^3 = \frac{a^3}{0}$, & par conséquent $0 : 1 :: a^3 y^3$; c'est-à-dire, que la valeur de y devient infinie; & qu'ainsi la *cissoïde* $AmOL$, quoiqu'elle approche continuellement & de plus près que toute distance donnée de la droite BC , ne la rencontre cependant jamais.

5.^o BC est donc l'asymptote de la *cissoïde*. Voy. ASYMPTOTE.

Les anciens faisoient usage de la *cissoïde*, pour trouver deux moyennes proportionnelles entre deux droites données. En effet, supposons qu'on cherche par exemple deux moyennes proportionnelles entre deux lignes données égales à AK & à $p m$, il n'y a qu'à supposer la *cissoïde* tracée; puis prenant sur l'axe AE une portion $= AK$, & tirant l'ordonnée de la *cissoïde* $= p m$, on trouvera les moyennes proportionnelles $p N$ & Ap . Voyez PROPORTIONNELLE.

On trouve dans la dernière section de l'application de l'Algèbre à la Géométrie, par M. Guiniée, les propriétés principales de la *cissoïde* expliquées avec beaucoup de clarté.

M. Neuton a donné dans ses *opuscules* la longueur d'un arc quelconque de la *cissoïde*. Ce problème se résout par le calcul intégral (O).

C L A

CLAPET, f. m. (Mécan.), est une espèce de soupape faite d'un rond de cuir, fortement serré,

entre deux platines de métal, par le moyen d'une ou de plusieurs vis. Le rond de cuir tient par une queue à une couronne de cuir, laquelle est fortement serrée entre le collet du rayon supérieur au *clapet* & le collet du rayon inférieur: c'est sur cette queue, qu'on fait beaucoup plus étroite que le *clapet*, que se fait le jeu du *clapet* comme sur une charnière.

La platine de métal qui est sur le cuir du *clapet*, est plus grande que l'ouverture du diaphragme que le *clapet* doit couvrir; & la platine de dessous qui doit le loger dans l'ouverture du diaphragme quand le *clapet* se ferme, est un peu plus petite que cette ouverture.

Le *clapet* étant ainsi construit, lorsqu'il est fermé, le cuir porte exactement sur les bords du diaphragme, & empêche l'eau de passer. La platine de métal qui est sur le cuir, le garantit du poids de la colonne d'eau, & en porte toute la charge que le cuir ne pourroit pas soutenir. La platine de métal qui est sous le cuir, sert à deux choses; 1.^o elle sert avec la platine supérieure, à comprimer le cuir pour le rendre plan; 2.^o elle empêche que l'eau qui pourroit s'infiltrer entre la platine supérieure & le cuir, n'enfoncé le cuir & ne le fassé passer par l'ouverture du diaphragme. Voyez Hist. & Méth. acad. 1739. Voy. aussi SOUPAPE. (O)

CLE (Fonçonnier), ce sont de fortes barres de fer ceintrées, dont on surmonte la boîte dans le fer d'un regard pour tourner les robinets. Ce fer est montant, & se divise en parties plates qui embrassent les branches d'un robinet, au moyen d'un boulon claveté qui passe à travers. (K)

CLEPSYDRE, f. f. (Hydrod.) : horloges d'eau dont les anciens se servoient pour mesurer le tems.

I. On donnoit à ces horloges différentes figures ornées & variées, soit pour en imposer aux yeux, soit pour former un spectacle agréable. M. Perault, dans ses Remarques sur Vitruve, entre, à ce sujet, dans des explications que l'on peut consulter. La question réduite aux principes de l'Hydrodynamique, est de savoir mesurer le tems que la surface d'un fluide employé à s'abaisser d'une hauteur proposée, dans un vase d'une certaine forme: elle dépend donc de la solution du problème général suivant.

II. PROBLÈME. Le vase ADEC (Pl. Hyd. fig. 13) étant d'abord rempli d'eau jusqu'en AC, déterminer le tems que cette eau sortant par le petit orifice DE, mettra à s'abaisser de la hauteur quelconque KP?

Imaginons le fluide partagé en une infinité de tranches horizontales, telles que MNm . L'orifice DE pouvant être regardée, au moins sensiblement, comme infiniment petit, il s'ensuit que, lorsque la surface du fluide est parvenue en MN , la hauteur due à la vitesse au sortir de l'orifice, est la verticale P.D. Donnons à la hauteur donnée

d'où tombe un corps grave pendant le tems donné t ; à la hauteur KD primitive & donnée du fluide; K l'aire de l'orifice; t le tems de la descente du fluide par la hauteur indéterminée KP ; x cette hauteur; X la section MN du vase, laquelle est une quantité dépendante de la figure du vase: on aura d'abord (Voyez Ecoulement.)

$$\frac{1}{2} K \sqrt{a} \cdot \sqrt{(h-x)} \text{ pour la quantité élémentaire}$$

d'eau qui sort pendant l'instant dt . Or cette même quantité = la tranche $MN \cdot dx = X dx$. On aura

$$\text{donc } dt = \frac{1}{2} X \frac{dx}{K \sqrt{a} \cdot \sqrt{(h-x)}}. \text{ D'où l'on}$$

voit que, connoissant la relation de t à x , on trouvera X , & par conséquent la figure du vase; ou que, si la figure du vase est donnée, on trouvera t , en intégrant l'équation précédente, après y avoir substitué pour X sa valeur donnée par la figure du vase.

III. COROLLAIRE I. Si on veut, par exemple, qu'en tems égaux la surface du fluide parcourue des parties égales de la hauteur KD , il faudra faire $t = nx$, n étant un nombre constant & donné: alors on aura $dt = n dx$, & par consé-

$$\text{quent } n = \frac{1}{2} K \sqrt{a} \cdot \sqrt{(h-x)}; \text{ d'où l'on tire } X =$$

$$\frac{1}{2} K \sqrt{a} \cdot \sqrt{(h-x)}; \text{ ce qui détermine la figure}$$

du vase.

La même hypothèse subsistant, si l'on suppose de plus que le vase soit un solide de révolution produit par le mouvement circulaire de la courbe AMD autour de l'axe KD , & qu'on prenne l'abscisse $DP = z$, l'ordonnée $PM = y$: on aura $X = \frac{\pi y^2}{2}$, π étant le rapport de la circonférence au diamètre; & $x = h - z$. Substituant ces valeurs dans l'expression qu'on a trouvée pour

$$X, \text{ on aura } y^2 = \frac{1}{\pi} K \sqrt{a} \cdot \sqrt{z}, \text{ ou (en faisant}$$

$$\frac{1}{\pi} K \sqrt{a} = m^2), y^2 = m^2 z. \text{ D'où l'on voit que}$$

la courbe AMD est une parabole du troisième genre.

IV. COROLLAIRE II. Supposons que le vase proposé ait la forme prismatique ou cylindrique $AFHC$ (fig. 14): la quantité X sera ici une quantité constante que je nomme A ; & on aura

$$dt = \frac{1}{2} A \sqrt{a} \cdot \frac{dx}{\sqrt{(h-x)}}, \text{ dont l'intégrale est } t =$$

$$\frac{1}{2} A \sqrt{a} \cdot X (\sqrt{h} - \sqrt{(h-x)}).$$

Il est facile de construire, au moyen de cette formule, une cressyde cylindrique. Voulez-vous, par exemple, partager la hauteur KD ou CH en douze parties, qui soient parcourues en tems égaux par la surface du fluide? Représentez CH par 144, carré de 12; de ces 144 parties égales

qui composent CH , retranchez 121, carré de 11, le reste 23 sera connoître la première partie cherchée CG ; de 121, retranchez 100, carré de 10, le reste 21 donnera la seconde partie cherchée; de 100, retranchez 81, carré de 9, le reste donnera la troisième partie cherchée; ainsi de suite. D'où l'on voit que les parties successives de la hauteur CH , comptées depuis le point C , sont entr'elles comme les termes de la progression arithmétique décroissante $\frac{1}{2} \cdot 23 \cdot 21 \cdot 19 \cdot 17 \cdot 6c.$, la hauteur totale CH étant exprimée par le nombre 144.

Quant à la mesure précise du tems employé à parcourir chaque partie de la hauteur CH , on le déterminera par la même formule. Supposons, par exemple, que la hauteur totale CH doive être parcourue en 12 heures, & que par conséquent chacune de ces parties doive être parcourue en 1 heure: on trouvera 12 heures =

$$\frac{1}{2} A \sqrt{a} \cdot X \sqrt{h}.$$

Il faudra donc tellement combiner les trois quantités A , K , h (les seules dont on peut ici disposer), que l'équation précédente ait lieu en effet. On voit que deux de ces trois quantités étant données, on en conclut la troisième. (L. B.).

CLIMATS, parties ou zones de la terre, dans lesquelles le plus long jour d'été est de 12; heures, 13 heures, &c. on distingue 24 climats d'heures. C'est un terme de l'ancienne Géographie.

CLOISON (Hyd.); on nomme ainsi des séparations de cuivre, de plomb, ou de fer-blanc, qu'on place dans les cuvettes des fontaines & des jauges. On en distingue de deux sortes: celle de calme, appelée *languette*, est placée près de l'endroit où tombe l'eau, sans interrompre la communication dans toute la cuvette, elle ne fait qu'en rompre le flot, qui dérangeroit le niveau de l'eau en même tems qu'il en augmenteroit la dépense: l'autre *cloison* est celle du bord où s'attachent les bassins pour la distribution de l'eau. Voyez BASSINETS. (K)

COCHER, ou le charrier (Astron.); constellation boréale, composée de 66 étoiles dans le catalogue britannique; elle est appelée, dans les auteurs, *auriga*, *aurigator*, *agitator curus*, *arator*, *heniochus*, *habenifer* (qui tient les rennes) *Eridanionius*; dans Homère, *Eriothus*; chez les Egyptiens, *Orus*; d'autres l'ont appelé *Phaeton*, *Ashyrthe*, *Bellerophon*, *Cusps caprarum*, *Trochilus*, *Onomastus*, *Hippolitus*. L'étoile brillante de cette constellation est appelée la *chèvre*. La même constellation renferme aussi les *chevreaux*, qui, suivant les poètes, avoient été nourris du même lait que Jupiter.

Cet Eriothon étoit, non le fils de Dardanus, mais un roi d'Athènes, qui fut déifié comme l'in-

venteur

veneur de plusieurs arts utiles, & sur-tout de celui des chars.

*Primus Eriäkonius currus & quatuor aufus
Jungere equos, rapidisque rotis infistere vidor.*

Georg. III. 113.

Dans le commentaire de Theon sur Aratus, Bellerophon est cité comme l'auteur de l'invention du char, & comme étant le cocher céleste; d'autres y substituent Myrtille, Cyllanrus, ou le Cocher de Pelops, & Orus, qui enseigna le premier l'Agriculture aux Egyptiens.

On peut très-bien imaginer que les anciens placèrent un labourneur dans la partie du ciel, qui pouvoit désigner l'entrée du soleil dans le zodiaque, & ces deux constellations reçurent un culte spécial.

Suivant M. Dupuis, c'est cette constellation qui a fourni au Jupiter *Ægichus* des grecs, & à Pan, leurs attributs. On la considérait comme une des formes de l'âme du monde. Le bouc adoré à Mendès, & le bouc *afima* des samaritains, ne font que l'image de la belle étoile de cette constellation, appelée *hircus* par un ancien commentateur de Ptolémée. Cette constellation se levait au terme de l'équinoxe, & se couchait le matin en automne. C'est par-là que M. Dupuis explique la fable de Phæon, qui tombe dans l'Eridan, parce qu'il se couche peu après ce fleuve. (*Astron. t. iv, p. 521.*)

Suivant M. Hyde, c'est à la chèvre, ou à ses petits, que se rapporte le nom d'*Ajéti*, donné par Job à une de nos constellations; c'est le *z. des grecs.* (*D. L.*)

COCHLEA, en *Méchanique*; terme latin qui signifie l'une des cinq machines simples: on la nomme en français vis. Voyez Vis.

On l'appelle de la sorte, à cause de sa ressemblance avec la coquille du limaçon ou *cochlea*. (*O*)

COCHONNET (*Jeu*), espèce de dé taillé à douze faces pentagonales, chargées chacune d'un chiffre depuis 1 jusqu'à douze. On joue au *cochonnet* comme aux dés.

On donne le même nom à une balle ou pierre que celui qui a gagné le coup précédent jette à discrétion, & à laquelle tous les joueurs dirigent leurs boules. La boule plus voisine du *cochonnet* gagne le coup.

CODILLE, terme de *Jeux*. On dit lre codille à l'ombre, au méliatur, au quadrille, &c. quand on ne fait pas le nombre de mains prescrites par le gain ou la remise de la partie. Voyez ces mots.

COEFFICIENT, f. m. (*Algèbre*) en langage algébrique, est le nombre ou la quantité quelconque placée devant un terme; & qui, en se multipliant avec les quantités du même terme qui suivent, sert à former ce terme. Voyez TERME.

Mathématiques. Tome I, lre Partie.

Ainsi, dans $3a, bx, Cxx$, 3 est le coefficient du terme $3a$, b celui de bx , C celui de Cxx .

Lorsqu'une lettre n'est précédée d'aucun nombre, elle est toujours censée avoir 1 pour coefficient, parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse regarder comme multiplié par l'unité. Ainsi a, bc sont absolument la même chose que $1a, 1bc$. Il ne faut pas confondre les coefficients avec les exposants. Dans la quantité $3a$, le coefficient 3 indique que a est pris trois fois, ou que a est ajouté deux fois à lui-même. Au contraire, dans la quantité a^3 , l'exposant 3 indique que a est multiplié deux fois de suite par lui-même.

Par exemple, supposons que a soit 4, $3a$ sera 3 fois 4, c'est-à-dire 12, & a^3 sera $4 \times 4 \times 4$, c'est-à-dire 64.

Dans une équation ordonnée, le coefficient du second terme est la somme de toutes les racines prises avec des signes contraires (voyez RACINE); en sorte que si la somme des racines positives est égale à celles des racines négatives, & que par conséquent la somme totale des racines soit zéro, il n'y aura point de second terme dans l'équation.

Le coefficient du troisième terme dans la même équation ordonnée, est la somme de tous les produits des racines prises deux à deux de toutes les manières possibles.

Le coefficient du quatrième terme est la somme de tous les produits des racines prises trois à trois de toutes les manières possibles, avec des signes contraires; & ainsi des autres termes à l'infini.

La méthode des coefficients indéterminés est l'une des plus importantes découvertes que l'on doive à Descartes. Cette méthode très en usage dans la théorie des équations, dans le calcul intégral, & en général dans un très-grand nombre de problèmes mathématiques, consiste à supposer l'inconnue égale à une quantité dans laquelle il entre des coefficients qu'on suppose connus, & qu'on désigne par des lettres; on substitue ensuite cette valeur de l'inconnue dans l'équation; & mettant les uns sous les autres les termes homogènes, on fait chaque coefficient = 0, & on détermine par ce moyen les coefficients indéterminés. Par exemple, soit proposée cette équation différentielle,

$$\begin{aligned} dy + by dx + ax^2 dx + cxdx + fdx &= 0, \text{ on supposera } y = A + Bx + Cx^2, \text{ ou aura,} \\ dy &= B dx + 2 C dx \\ + by dx &= b A dx + b B dx + b C x dx \\ + ax^2 dx &= a A x dx + a B x^2 dx + a C x^3 dx \\ + cxdx &= c A x dx + c B x^2 dx \\ + f dx &= f A dx + f B x dx + f C x^2 dx \end{aligned}$$

Ensuite on fera $B + bA + f = 0, 2C + bB + cA = 0, bC + aA = 0$; & résolvant ces équations; à l'ordinaire (voyez EQUATION), on aura les inconnues A, B, C . (*O*)

COEUR (*Géométrie*). Quelques géomètres, entre autres M. Varignon, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, ont donné ce nom au solide que formerait une demi-ellipse en tournant, non

Y y

amont de son axe, mais autour d'un de ses diamètres ; & en effet un tel solide auroit assez la figure d'un cœur pointu par le bas, & enfoncé par le haut. M. Varignon a cherché la dimension de ce solide ; mais il s'est trompé, comme il seroit aisé de le faire voir. On peut trouver facilement la dimension du cœur par la méthode suivante.

Soit imaginée une demi-ellipse dont les deux axes soient égaux aux deux diamètres de l'ellipse donnée ; chaque ordonnée sera aussi égale de part & d'autre, excepté que dans l'ellipse formatrice du cœur les ordonnées seront obliques à l'axe, & que dans l'autre elles lui seront perpendiculaires ; celles-ci dans la rotation formeront des cercles, & les autres formeront des surfaces coniques qui seront aux cercles dans le rapport du sinus de l'angle des deux diamètres à l'angle droit : rien n'est plus facile à démontrer. De plus, dans le cœur les surfaces coniques seront obliquement posées par rapport à l'axe ; au lieu que dans le solide formé par l'autre ellipse, les cercles seront perpendiculaires à l'axe : donc l'élément du cœur est encore à l'élément de l'autre solide, enfilé sous ce point de vue, comme le sinus de l'angle des deux diamètres est au sinus total. Donc, puisque ce rapport entre deux fois dans le rapport total des deux éléments, il s'ensuit que l'élément du cœur est à l'élément de l'autre solide, comme le quart du sinus de l'angle des diamètres est au quart du sinus total : donc les deux solides sont aussi entr'eux dans ce rapport. En voilà assez pour mettre sur la voie ceux qui voudront aller plus loin, faire de cette proposition une démonstration en forme, & reconnaître en quoi pèche celle de M. Varignon. (O)

CŒUR du lion ou *Regulus*, *Basiliscus* (*Astr.*) étoile de la première grandeur dans la constellation du lion.

CŒUR de *Charles* (*Astron.*) c'est le nom d'une petite constellation boréale ; elle est marquée sous ce nom dans le planisphère en deux feuilles, gravé en Angleterre, & appelé communément *planisphère de Senex*, quoiqu'on voie le nom de Harris comme rédacteur, & celui de Bowles comme marchand. Elle n'est remarquable que par une étoile de seconde grandeur, située sous la queue de la grande ourse, du côté de la chevelure de Bérénice & de la queue du lion. Cette étoile est appelée dans le catalogue de Tycho-Brahé, *informis inter caudam hujus & leonis*. Dans le *Catalogue britannique*, publié en 1712, par Halley, sur les Observations de Flamsteed, elle est appelée *clara sub cauda informis* ; il paroit qu'alors on ne lui avoit pas encore donné le nom qu'elle porte actuellement. Dans l'édition de 1725, donnée par Flamsteed lui-même, elle est comprise dans la constellation des chiens de chasse, introduite par Hévélius ; in *annullo armilla clara informis sub cauda usq.* Dans les grandes cartes célestes de Flamsteed, elle est en effet située sur le

collier d'un des chiens, sans aucune figure de cœur. Cette dénomination de cœur de *Charles*, a probablement été introduite par Halley, ainsi que le chien de *Charles II*, roi d'Angleterre, par respect pour la mémoire d'un prince, fondateur de l'Académie & de l'Observatoire d'Angleterre. Flamsteed n'a point adopté cette dénomination de Halley, qu'il n'aimoit pas ; mais on la trouve sur les planisphères de Senex, sur ceux de M. Robert de Vaugondy, sur mon globe céleste, gravé en 1773, sur le petit Atlas de Fortin, qui est une réduction des cartes de Flamsteed, & sur le planisphère qui est dans les figures de ce Dictionnaire. La principale étoile avoit en 1690, $5^{\circ} 20'$ $15''$ 22' de longitude, & $40^{\circ} 7' 18''$ de latitude boréale. (D. L.)

CŒUR de *Phydra* (*Astronomie*), étoile de la seconde grandeur dans le cœur de la constellation de l'hydre, la douzième dans le catalogue de Ptolémée, la onzième dans celui de Tycho, & la vingt-cinquième dans celui d'Angleterre. Voyez HYDRE. (O)

COIN, f. m. (*Mécan.*) : prisme triangulaire *ABCDEF* (*Pl. méc. fig. 58*) de fer, qu'on introduit dans une fente pour écarter ou séparer les deux parties d'un corps. Quelquefois aussi on s'en sert pour soulever des poids, ou pour comprimer des corps.

Les couteaux, les râpoirs, les ciseaux, & en général tous les instrumens tranchans, ou pénétrants, se rapportent au coin.

On appelle tête du coin la face parallélogrammique *ABCD* qui reçoit le coup, ou l'impression de la force motrice ; l'arrête *EF*, par laquelle le coin commence à s'enfoncer, est le tranchant ; & les faces parallélogrammiques *ABFE*, *DCFE*, par lesquelles il presse les corps contigus, en sont les côtés.

Nous représenterons cet instrument par son simple profil *DAE* (*fig. 59*), c'est-à-dire par le triangle qui, en le mouvant parallèlement à lui-même, engendre le coin.

1. Supposons un corps appuyé par sa base *ZF* (*fig. 60*) sur un plan immobile. Que pour écarter les deux parties *M* & *N* de ce corps, on introduise entr'elles un coin *DEA* frappé ou poussé perpendiculairement à sa tête par une force *Q*. Il est clair que cette force étant détruite uniquement par les résistances que les parties du corps à fendre opposent à l'action du coin, doit nécessairement se décomposer en deux forces dirigées vers les appuis *I* & *K*, perpendiculairement aux côtés *AE*, *DE* du coin, qu'on peut regarder comme des plans tangens aux appuis *I* & *K*. Ainsi la force *Q* & les deux pressions qu'elle produit aux points *I* & *K*, sont dans un même plan, & concourent au même point *O*. Nommons *Q*, *I*, *K*, ces trois forces ; & considérons que leurs directions *QO*, *OI*, *OK*, étant perpendiculaires chacune à chacun des trois côtés

AD, AE, DE , du triangle AED , on a $Q : I :: K : AD :: AE : DE$; & par conséquent aussi, $Q : I + K :: AD : AE + DE$.

II. A cause de l'équilibre, les deux pressions I & K font détruites par deux résistances contraires & égales chacune à chacune, que les parties du corps à sentir leur opposent. Ainsi, la force imprimée perpendiculairement à la tête du coin, est à la somme des résistances que les parties du corps à fendre opposent immédiatement à son action, comme la tête du coin, est à la somme de ses côtés.

On voit que plus le coin s'avancera tranchant, plus la même puissance acquerra d'avantage sur la somme des résistances à vaincre; & plus, par conséquent, le coin trouvera de facilité à s'enfoncer.

III. Lorsque le coin est isocèle, c'est-à-dire, lorsque les côtés AE, DE , sont égaux, les deux forces I & K sont égales, & on a $Q : I + K :: AD : 2AE :: \frac{AD}{2} : AE$. Donc alors la force imprimée perpendiculairement à la tête du coin, est à la somme des résistances que les parties du corps à fendre lui opposent, comme la demi-tête du coin est à l'un des côtés.

IV. Prenons en général sur les directions des deux forces I, K , les parties IV, KH , égales respectivement aux côtés AE, DE du coin, pour représenter ces forces; & décomposons chacune des mêmes forces en deux autres, l'une perpendiculaire, l'autre parallèle à la base ZF , en construisant les deux parallélogrammes rectangles $IRVT, KSHG$, qui satisfassent à cette condition. Il est évident que les deux forces IR, KS , étant perpendiculaires au plan sur lequel le corps s'appuie, ne peuvent imprimer aucune sorte de mouvement à ce corps. Mais la force IT tend à mouvoir la partie M parallèlement à ZF ; & la force KG tend à mouvoir la partie N parallèlement à FZ . Nommons T & G les deux forces IT, KG . Cela posé,

1.^o On aura $I : T :: IV : AE :: IT$; & comme on a $I, Q : I :: AD : AE$; si l'on multiplie ces deux proportions par ordre, on aura $Q : T :: AD : IT$.

2.^o On trouvera semblablement, $K : G :: AD : KG$.

Ces deux proportions donnent la suite de proportionnelles, $Q : T : G :: AD : IT : KG$; & par conséquent aussi, $Q : T + G :: AD : IT + KG$.

V. Supposons que la tête DA du coin soit parallèle à la base ZF , & menons du tranchant E , la perpendiculaire EB sur la tête. Les deux triangles rectangles IVT, EAB , qui ont des hypoténuses égales par construction, & qui ayant tous les côtés perpendiculaires chacun à chacun, sont équiangles, sont parfaitement égaux. On aura

donc $IT = EB$. On démontrera de même que $KG = EB$. Ainsi, les deux forces T & G sont égales; & la suite précédente donne, $Q : T + G :: AD : 2EB :: \frac{AD}{2} : EB$.

Il suit de-là que lorsque la tête du coin est parallèle au plan sur lequel le corps s'appuie, la force imprimée perpendiculairement à la tête du coin, est à la somme des résistances que les deux parties du corps à fendre lui opposent parallèlement à la tête du coin, comme la demi-tête du coin est à sa hauteur.

Cette propriété peut être appliquée au cas où l'on se sert du coin pour comprimer; car alors la résistance s'exerce parallèlement à la tête du coin.

VI. Telle est à-peu-près toute la théorie mathématique du coin. Nous ne devons pas dissimuler que l'application de cette théorie à la pratique n'est pas susceptible d'une grande précision, parce que les différens corps sont composés de parties plus ou moins adhérentes entr'elles, ou de fibres plus ou moins flexibles; d'où il résulte que la même force appliquée au même coin, ne produira pas les mêmes enfoncemens dans deux matières différentes; & que chaque enfoncement particulier ne peut guère être déterminé exactement que par la voie d'une expérience immédiate. (*L. B.*)

COIN (au jeu de triârac) : qui dit simplement le coin, entend le coin de repos, ainsi nommé parce que le joueur est moins exposé quand il s'est emparé de ce coin; c'est toujours la onzième case, non compris celle du tas de dames.

Une des règles les plus sûres, c'est de le prendre le plutôt qu'on peut, & d'avoir pour cela des dames sur les cases de quine & de sonnez.

Le coin de repos se prend par puissance ou par effet; dans le premier cas, lorsque celui contre qui l'on joue n'a pas le sien, & que du dé que vous amenez vous pouvez mettre deux dames dans son coin, ce qui ne se fait point: on n'empêche point son adversaire de le faire son grand jeu; quoiqu'on en ait la puissance; il est plus avantageux de prendre son coin. On le prend par effet lorsque son dé a deux dames qui bariènt son propre coin. Comme on ne peut le saisir de son coin qu'avec deux dames, les règles du jeu ne permettent pas aussi qu'on le quitte sans les lever toutes deux ensemble. Qui s'empare de son coin par effet, n'est plus en droit de reprendre par puissance: si celui contre qui l'on joue s'est saisi du sien, cette puissance est ôtée.

COIN bourgeois, au triârac, se dit de la case de quine & de sonnez. Voyez QUINE & SONNEZ.

COINCIDENCE, s. f. en Géométrie, se dit des figures, lignes, &c. dont toutes les parties se répondent exactement lorsqu'elles sont posées l'une sur l'autre, ayant les mêmes termes ou les mêmes limites.

La *coïncidence* désigne donc une égalité parfaite, c'est-à-dire, que les figures ou lignes entre lesquelles il y a *coïncidence*, sont égales & semblables. Voyez ÉGALITÉ & SEMBLABLE.

Euclide, & presque tous les autres géomètres à son exemple, démontrent un grand nombre de propositions élémentaires, par le seul principe de la *coïncidence* ou superposition. Voyez SUPERPOSITION. (O)

COINCIDER, terme de Géométrie : on dit que deux lignes ou surfaces *coïncident*, lorsqu'étant appliquées l'une sur l'autre, elles s'ajustent & se confondent parfaitement. Voyez COINCIDENCE. (O)

COL

COLIN-MAILLARD, f. m. *jeu d'enfants* ; on bouche les yeux à un d'entr'eux, il pourfuit ainsi les autres à tâton jusqu'à ce qu'il en ait attrapé un autre qu'il est obligé de nommer, & qui prend sa place, & qu'on appelle aussi *colin-maillard*.

COLLER au jeu de billard, c'est faire toucher la bille à la bande, de façon qu'on ne puisse pas la joner aisément.

COLLIMATION, ligne de collimation (*Astr.*) est celle par laquelle on vise à un objet, par les deux pinules d'un graphomètre. Dans une lunette c'est la ligne qui passe par le centre des verres, ou l'axe optique de la lunette. La ligne de *collimation* doit être parallèle à la ligne de foi, c'est-à-dire, à la ligne qui passe par le centre de l'instrument & par le point de l'index qui marque la division. On dit aussi la *ligne de foi* pour dire la *ligne de collimation*, parce que ces deux lignes étant parallèles entr'elles & peu distantes l'une de l'autre, elles se dirigent au même point du ciel. (D. L.)

COLLISION, f. f. (*Méch.*) veut dire la même chose que choc. Voyez CHOC.

COLOMBE (*Astron.*), constellation méridionale, située au-dessus du lièvre & du grand chien, introduite vers le commencement du XVII^e siècle, lorsque les navigateurs commencèrent à observer les étoiles australes & à leur donner des noms ; on prétendit placer la colombe de Noé à côté du vaisseau que l'on considéra comme l'arche de Noé. Elle est représentée dans les cartes de Bayer avec neuf étoiles, sans autre explication que celle-ci : *recentioribus columba*. Dans le catalogue de Flamsteed, elle contient dix étoiles ; dans celui de la Caille, elle en renferme un bien plus grand nombre. La principale, appelée α , avoit en 1760, 82° 39' 13" d'ascension, & 34° 13' 21" de déclinaison ; d'où il suit qu'on peut très-bien la voir en Europe, puisqu'elle passe au méridien près de 7 degrés au-dessus de l'horizon de Paris. Elle est de seconde grandeur. (D. L.)

COLONNE, force des colonnes (*Mécanique de l'Architecture*). Comme on ne bâtit pas seule-

ment avec le bois, mais aussi avec la pierre & le marbre, il seroit à souhaiter pour le bien de l'architecture que nous eussions des expériences bien faites sur la force des colonnes de pierre.

M. Van Musschenbroek a déjà là-dessus fait quelques expériences, qu'il rapporte dans ses *Ess. de Phys.* Il a pris une colonne carrée faite de terre glaise, & aussi dure que la brique rouge durcie au feu : cette colonne, qui avoit onze pouces & demi de long, & dont chaque côté étoit de $\frac{7}{8}$ d'un pouce, fut rompue par 195 livres. Une pierre de brème, longue de douze pouces $\frac{1}{2}$, & dont chaque côté étoit $\frac{7}{8}$ d'un pouce, fut rompue par 190 livres. Un marbre blanc un peu veiné, long de treize pouces $\frac{1}{2}$, épais d'un côté de $\frac{7}{8}$ d'un pouce, & qui avoit de l'autre côté l'épaisseur de $\frac{7}{8}$ d'un pouce, fut rompu par 250 livres.

Si l'on prend un pilier de pierre fait de demi-pierres posées les unes sur les autres, ayant l'épaisseur de trois pouces, la largeur de sept pouces, & la hauteur de dix piés, on demande quelle charge pourra supporter ce pilier de pierre, en supposant qu'il soit bâti de briques rouges durcies par le feu.

Si ce pilier étoit de la même épaisseur que celle qu'avoit la colonne dans l'expérience précédente, & qu'il fût de la hauteur de dix piés, il ne pourroit supporter deux livres, parce que les forces sont en raison inverse des quarrés des hauteurs ; mais si l'on compte qu'une pierre est de la longueur de 7 pouces, c'est-à-dire, dix-sept fois plus large que n'est la colonne dans l'expérience ; alors ce même pilier de mur qui a l'épaisseur de $\frac{7}{8}$ de pouce, & la largeur de sept pouces, pourra supporter trente livres. Mais la pierre est de l'épaisseur de trois pouces, qui est le côté courbé par le poids dont il est chargé ; ce côté est donc à celui de la colonne rompue comme 36 à 5, dont les quarrés sont comme 1296 à 25 : c'est pourquoi le pilier de mur qui est de la hauteur de dix piés, ne pourra être chargé que de 1555 livres ; mais s'il étoit de l'épaisseur d'une pierre carrée, il pourroit supporter un fardeau quatre fois plus pesant.

Par conséquent un mur qui sera de l'épaisseur d'une demi-pierre, & qui aura dix piés de haut, pourra être chargé de 1555 livres, autant de fois qu'il sera de la longueur des pierres entières ou de sept pouces. Il est certain que s'il étoit fait de pierres plus dures, il pourroit supporter une charge encore plus pesante avant que d'être renversé. Si l'on compare la force d'un pilier de pierre avec celle d'un pilier de bois de chêne, qui soit aussi de la hauteur de dix piés, & dont les côtés aient trois pouces & sept pouces, on trouvera que le bois de chêne pourra supporter beaucoup davantage, & même presque 2800 livres.

Comme on élève dans les églises plusieurs colonnes qui soutiennent tout le bâtiment ; si l'on prenoit une colonne de marbre blanc de la hauteur de quarante piés, & dont le diamètre seroit

de quatre piés, elle pourroit supporter à-peu-près le poids de 105,011,285 livres. Ainsi, l'on est en état de calculer quel poids étoient capables de soutenir les 127 colonnes du temple de la Diane d'Éphèse, qui étoient toutes d'une pièce de 60 piés de hauteur.

Comme on bâtit souvent des maisons à deux portes qui donnent sur le coin des rues, de sorte que tout le poids de la façade repose sur le poteau de ce coin : il n'est pas indifférent de savoir l'épaisseur qu'il convient de donner à ce poteau ; mais il seroit encore bon de calculer les avantages & les désavantages qu'il y auroit à le former en colonnes de pierre par préférence, parce que ce poteau doit supporter sans aucun danger le poids de la façade qui repose sur lui. (*M. DE CHEVALIER DE JACOUE.*)

* (*M. Euler & M. de la Grange* ont donné, le premier dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1757, l'autre dans le v.^e volume des Mémoires de l'Académie de Turin, d'excellentes recherches sur la force des colonnes.

COLONNE d'eau (*Hyd.*) : eau contenue dans un tuyau, qui la fait monter d'une rivière ou d'un réservoir quelconque par le moyen d'une machine hydraulique. On appelle aussi colonne d'eau l'eau qui forme un jet au sortir d'un ajutage. On dit également, dans des sens analogues, une colonne d'air, une colonne de mercure, &c.

COLURES (*Astron.*) sont deux grands cercles passant par les ples du monde, l'un par les équinoxes, l'autre par les solstices ; leur nom, suivant quelques auteurs, vient du mot grec *κόλπος*, *mutulus*, *truncus*, parce que dans les sphères artistielles on fait des entailles sur ces cercles, pour fixer, assembler & retenir les autres cercles ; cependant Macrobie dit que ce nom vient de ce qu'ils ne font pas tout le tour de la sphère. *Nomen dedis imperfecta conversio ; ambientes enim septentrionalem vericem poli, atque inde, in diversa diffusa, & se in summo intersecant & quinque parallelos in quatuor partes æqualiter dividunt ; zodiacum ita intersecantes, ut unus eorum per ærictem & libram, alior per cancerum atque capricornum meandrum decurrat ; sed ad australem vericem non pervenire creduntur.* Sonn. *Scip. I. 15.* Il est vrai que nous ne voyons jamais la partie des colures qui avoisine le pôle austral ; mais l'existence de cette partie ne doit pas moins le supposer. Le colure, ou cercle passant par les ples du monde ou de l'équateur, & par les points solsticiaux, s'appelle colure des solstices ; on a donné à ce méridien un nom distinctif, parce qu'il sert à mesurer l'obliquité de l'écliptique. Tous les autres placés par ce colure, ont 90° ou 270° d'ascension droite, & autant de longitude.

Le colure des équinoxes est un autre méridien qui est perpendiculaire au précédent, ou au colure des solstices, & qui passe par les ples du monde & par les points équinoxiaux. Tous les autres placés

sur ce colure ont 180° ou 180° degrés d'ascension droite, mais leurs longitudes varient. (*D. L.*)

COMBINAISON, f. f. (*Analyse*) ne devoit se dire proprement que de l'assemblage de plusieurs choses écues à deux ; mais on l'applique dans les Mathématiques à toutes les manières possibles de prendre un nombre de quantités données.

Le P. Merenne a donné les combinaisons de toutes les notes & sons de la Musique au nombre de 64 ; la somme qui en vient ne peut s'exprimer, selon lui, qu'avec 60 chiffres ou figures.

Le P. Sébastien a montré, dans les *Mémoires de l'Académie*, 1704, que deux carreaux partagés chacun par leurs diagonales en deux triangles de différentes couleurs, fournissent 64 arrangements différents d'échiquier : ce qui doit étonner, lorsqu'on considère que deux figures ne sauroient se combiner que de deux manières. Voy. CARREAU.

On peut faire usage de cette remarque du P. Sébastien, pour carteler des appartemens.

Doctrin des combinaisons. Un nombre de quantités étant donné avec celui des quantités qui doit entrer dans chaque combinaison, trouver le nombre des combinaisons.

Une seule quantité, comme il est évident, n'admet point de combinaison ; deux quantités *a* & *b* donnent une combinaison ; trois quantités *a*, *b*, *c*, combinées deux à deux, donnent trois combinaisons *ab*, *ac*, *bc* ; quatre en donneront six *ab*, *ac*, *bc*, *ad*, *bd*, *cd* ; cinq en donneront dix *ab*, *ac*, *bc*, *ad*, *bd*, *cd*, *ae*, *be*, *ce*, *de*.

En général, la suite des nombres des combinaisons est 1, 3, 6, 10, &c. c'est-à-dire la suite des nombres triangulaires ; ainsi, *q* représentant le nombre des quantités à combiner, $\frac{q-1}{1} \times \frac{q-2}{2}$ sera le nombre de leurs combinaisons deux à deux. Voyez NOMBRES TRIANGULAIRES.

Si on a trois quantités *a*, *b*, *c*, à combiner trois à trois, elles ne fourniront qu'une seule combinaison *abc* ; qu'on prenne une quatrième quantité *d*, les combinaisons que ces quatre quantités peuvent avoir trois à trois, seront les quatre *abc*, *abd*, *bcd*, *acd* ; qu'on en prenne une cinquième, on aura les dix combinaisons *abc*, *abd*, *bcd*, *acd*, *abe*, *bde*, *bce*, *ace*, *ade* ; qu'on en mette une sixième, on aura vingt combinaisons, &c. En sorte que la suite des combinaisons trois à trois est celle des nombres pyramidaux ; & que *q* exprimant toujours le nombre des quantités données, $\frac{q-1}{1} \times \frac{q-2}{2} \times \frac{q-3}{3}$, est celui de leurs combinaisons trois à trois.

Le nombre des combinaisons quatre à quatre des mêmes quantités se trouveroit de la même manière $\frac{q-1}{1} \times \frac{q-2}{2} \times \frac{q-3}{3} \times \frac{q-4}{4}$; & en général *n* exprimant le nombre de lettres qu'on veut faire entrer dans chaque terme de la combinaison, la

quantité $\frac{g-n+1}{1} \times \frac{g-n+2}{2} \times \frac{g-n+3}{3} \times \frac{g-n+4}{4} \times \dots \times \frac{g}{n}$ exprimera le nombre demandé des combinaisons.

Que l'on demande, par exemple, en combien de manières six quantités peuvent le prendre quatre à quatre, on fera $g=6$ & $n=4$, & l'on substituera ces nombres dans la formule précédente, ce qui donnera $\frac{6-4+1}{1} \times \frac{6-4+2}{2} \times \frac{6-4+3}{3} \times \frac{6-4+4}{4} = 15$.

Corollaire. Si on veut avoir toutes les combinaisons possibles d'un nombre de lettres quelconque, prises tant deux à deux que trois à trois, que quatre à quatre, &c. il faudra ajouter toutes les formules précédentes $\frac{g-1}{1} \times \frac{g-2}{2} \times \frac{g-3}{3} \times \frac{g-4}{4} \times \dots \times \frac{g-n+1}{n-1} \times \frac{g-n+2}{n} \times \frac{g-n+3}{n+1} \times \frac{g-n+4}{n+2} \times \dots$ &c. c'est-à-dire que le nombre de toutes ces combinaisons sera exprimé par

$$\frac{g \times g-1}{1 \times 2} + \frac{g \times g-1 \times g-2}{2 \times 3} + \frac{g \times g-1 \times g-2 \times g-3}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \text{&c.}$$

Si on compare précisément cette suite avec celle qui représente l'élevation d'un binôme quelconque à la puissance g , on verra qu'en faisant égal à l'unité chacun des termes de ce binôme, les deux suites sont les mêmes aux deux premiers termes près 1, & g , qui manquent à la suite précédente. De-là il suit qu'au lieu de cette suite, on peut écrire $2g-1-g$. Ce qui donne une manière bien simple d'avoir toutes les combinaisons possibles d'un nombre g de lettres. Que ce nombre soit par exemple 5, on aura donc pour le nombre de toutes les combinaisons $2^5 - 5 - 1 = 32 - 6 = 26$. Voyez BINÔME.

Un nombre quelconque de quantités étant donné, trouver le nombre des combinaisons & d'alternations qu'elles peuvent recevoir, en les prenant de toutes les manières possibles.

Supposons d'abord qu'il n'y ait que deux quantités a, b ; on aura d'abord ab & ba , c'est-à-dire, le nombre 2; & comme chacune de ces quantités peut aussi se combiner avec elle-même, on aura encore aa & bb , c'est-à-dire, que le nombre des combinaisons & alternations est en ce cas $2+2=4$. Si l'y a trois quantités a, b, c , & que l'exposant de leur variation soit deux, on aura trois termes pour leurs combinaisons, lesquels seront ab, bc, ac ; à ces trois termes, on en ajoutera encore trois autres ba, cb, ca , pour les alternations; & enfin trois autres pour les combinaisons aa, bb, cc , des lettres a, b, c , prise chacune avec elle-même: ce qui donnera $3+3+3=9$. En général, il sera aisé de voir que si le nombre des quantités est n , & que l'exposant de

la variation soit 2, n^2 sera celui de toutes leurs combinaisons & de leurs alternations.

Si l'exposant de la variation est 3, & qu'on ne suppose d'abord que trois lettres a, b, c , on aura pour toutes les combinaisons & alternations $aaa, aab, aba, baa, abb, aac, aca, caa, abc, bac, bca, acb, cba, cab, acc, cac, cca, bba, bab, bbb, bbe, cbb, bcb, bec, ccb, ccb, ccc$, c'est-à-dire, le nombre 27 ou 3^3 .

De la même manière, si le nombre des lettres étoit 4, l'exposant de la variation 3, 4^3 , ou 64, seroit le nombre des combinaisons & alternations. Et en général si le nombre des lettres étoit n , n^3 seroit celui des combinaisons & alternations pour l'exposant 3. Enfin si l'exposant est un nombre quelconque, m , n^m exprimera toutes les combinaisons & alternations pour cet exposant.

Si on veut donc avoir toutes les combinaisons & alternations d'un nombre n de lettres dans toutes les variétés possibles, il faudra prendre la somme de la série $n + n-1 + n-2 + n-3 + n-4 + n-5 + \dots$ &c. jusqu'à ce que le dernier terme soit n .

Or, comme tous les termes de cette suite sont en progression géométrique, & qu'on a le premier terme n , le second $n-1$, & le dernier n , il s'ensuit qu'on aura aussi la somme de cette progression,

$$\frac{n+1}{n-1} - 1.$$

Que n , par exemple, soit égal à 4, le nombre de toutes les combinaisons & alternations possibles sera

$$\frac{4^4-1}{4-1} = \frac{1020}{3} = 340. \text{ Que } n \text{ soit } 24, \text{ on aura alors pour toutes les combinaisons \& alternations possibles } \frac{24^{24}-1}{24-1} = \frac{3200961864440681898677951343271600}{23} =$$

13917242888872529994251284934021200; & c'est cet énorme nombre qui exprime les combinaisons de toutes les lettres de l'alphabet entr'elles.

Voyez l'ars conjecandi de Jacques Bernoulli & l'analyse des jeux de hasard de Montmort. Ces deux auteurs, sur-tout le premier, ont traité avec beaucoup de soin la matière des combinaisons. Cette théorie est en effet très-utile dans le calcul des jeux de hasard; & c'est sur elle que repose toute la science des probabilités. Voyez JEU, PARTI, PROBABILITÉ, &c.

Il est visible que la science des anagrammes dépend de celles des combinaisons. Par exemple, dans *Roma* qui est composé de quatre lettres, il y a vingt-quatre combinaisons (voy. ALTERNATION); & de ces vingt-quatre combinaisons on en trouvera plusieurs qui forment des noms latins, *armo, ramo, mora, amor, maro*; on y trouve aussi *omar*; de même dans *Rome*, on trouve *mare, orer*, &c. (*O*)

* Nous ajouterons ici l'écrit suivant de M. de Mairan , sur le nombre considérable de manières différentes dont certains mots françois peuvent être écrits.

Manières différentes d'écrire le mot HAINAUT en françois , dans la supposition que l'h ne s'aspire pas.

- 1.^o Par h , ou sans h 2 man.
- 2.^o e , ee , ei , ai , ey , ou ay 6
Dont le produit est 2×6 , & donne... 12 man.
- 3.^o Ensuite avec n , ou nn 2
Produit... 12×2 , & donne... 24 man.
- 4.^o Dans le cas d'un seul n , il peut être précédé de f , ou de x , ce qui se combine avec la moitié du dernier produit , & donne 24 à ajouter audit produit , somme 48 man.
- 5.^o Dans les deux cas de n , ou nn , il peut y avoir après , on n'y avoir pas un h 2
Produit... 48×2 , & donne... 96 man.
- 6.^o Dans tous les cas , précédens , on peut finir le mot par o , au ou eau , sans consonne , ce qui fait 3 ce qui se combine , &c. ci 3
Produit... 96×3 , & donne... 288 man.
- 7.^o Enfin on peut terminer ce mot par ces consonnes s , t , l , s , l , x , lt , th , êth ; cela fait 8 nouveaux cas , qui par leur combinaison , avec les précédens donnent le produit. 288×8 , ou 2304 man.
Le mot *Hainaut* peut donc être écrit de 2304 différentes manières sans qu'un françois le prononce différemment.

COMBUSTION, terme de l'ancienne Astronomie: quand une planète est en conjonction avec le soleil , on dit que la planète est en combustion. Ce mot vient du latin *comburere* , brûler parce qu'une planète qui est en cet état doit paroître passer sur le disque du soleil ou derrière le corps de cet astre , & par conséquent se plonger , pour ainsi dire , dans ses rayons , & en être comme brûlée.

Suivant Argoli , une planète est en combustion , quand elle n'est pas éloignée du soleil de plus de huit degrés trente minutes , à l'orient ou à l'occident. On ne se sert plus de ce mot , qui n'a été employé que par les astrologues. *Harris & Chambers. (O)*

COMÈTES, f. f. (*Astron.*) , corps célestes qui paroissent quelquefois dans le ciel avec un mouvement propre , très-différent dans les différens comètes , & qui pour l'ordinaire sont accompagnés d'une lumière éparse: c'est le mouvement des comètes qui les distingue des étoiles nouvelles que l'on a vues de tems à autres; car dans celles-ci

l'on n'a jamais remarqué de mouvement propre: d'ailleurs la lumière des comètes est toujours foible & douce; c'est une lumière du soleil qu'elles réfléchissent vers nous , aussi-bien que les planètes; cela est prouvé spécialement par la phase observée dans la comète de 1744 , dont la partie éclairée n'étoit visible qu'à moitié. On distingue principalement les comètes par les traînées de lumière , dont elles sont souvent entourées & suivies , qu'on appelle tantôt la chevelure ou la barbe , tantôt la queue de la comète ; cependant il y a eu des comètes sans queue , sans barbe , sans chevelure. La comète de 1585 , observée pendant un mois par Tycho , étoit ronde ; elle n'avoit aucun vestige de queue : seulement sa circonférence étoit moins lumineuse que le noyau , comme si elle n'eût eu vers sa circonférence que quelques fibres lumineuses. Tycho , *Prognym. p. 752*. La comète de 1665 étoit fort claire , suivant Hévélius ; il n'y avoit presque pas de chevelure : la comète de 1682 , au rapport de M. Cassini , étoit aussi ronde & aussi claire que Jupiter. *Mémoire Acad. 1699*. Enfin la comète que nous avons vue depuis le 23 septembre 1763 jusqu'au 25 novembre , n'avoit aucune queue , quoiqu'elle fût assez près de la terre. Ainsi , l'on ne doit pas regarder les queues des comètes comme leur caractère distinctif. Leur véritable caractère consiste à avoir un mouvement particulier , & à n'être visible qu'un certain tems : les apparitions les plus longues ont été de six mois.

Les Caldéens , les plus anciens astronomes dont les observations nous soient parvenues , regardèrent les comètes comme de véritables planètes ; il y a même des auteurs qui ont écrit qu'ils en connoissoient les retours , (*Senèque Quæst. nat. L. 7*) cela est très-douteux. Quoiqu'il en soit du sentiment des Caldéens , il est sûr que beaucoup d'anciens philosophes ont considéré les comètes comme des astres & des planètes perpétuelles & périodiques. Ainsi , nous ne dirons qu'un mot des systèmes de ceux qui prirent les comètes pour des illusions , pour des météores , ou pour des corps d'une existence passagère. On peut voir à ce sujet Riccioli , *Astrag. II. 35* , & beaucoup d'autres auteurs qui ont expliqué les rêves des anciens philosophes.

Panaetius crut qu'elles étoient de pures apparences de lumière , semblables aux iris , aux halo & aux parhélies. Héraclides de Pont , les regarda comme des nuées très-légères & très-élevées. *Plut. de plac. phil. 3. 2*. Aristote les regarda comme un météore igné , formé au haut de l'atmosphère par les exhalaisons de la terre & de la mer. *Meteor. lib. 1 , cap. 7 & 10*. Tous les péripatéticiens & plusieurs autres philosophes en eurent à-peu-près la même idée. Les stoïciens , ou les philosophes latins du tems de Sénèque , étoient à-peu-près d'un avis semblable , & supposèrent que les com-

mètes étoient formées par un air condensé. Senéc. *Quaest. nat. l. vij, c. 21.*

Il paroît que Ptolémée crut que le cours des planètes ou de leurs tourbillons étoit la cause de la formation des comètes (*de Astronom. Jud. lib. ij, textu 33*). Ce fut le sentiment d'Hévélius.

Gaillée même crut que les comètes étoient formées par des exhalations assez légères pour s'élever au-dessus de la lune. *Dial. 1, de Syst. mundi, Trutinctor.*

Tycho & Longomontanus crurent que les comètes étoient véritablement des corps célestes formés de la substance de la voix lactée, mais sujets à se décomposer, & d'une existence passagère.

Képler même laissa les comètes au nombre des phénomènes momentanés, & Hévélius n'en jugea pas mieux, quoiqu'il ait eu le premier sur les comètes une très-belle idée, dont nous parlerons bientôt.

Enfin le P. Riccioli. *Alm. 2. 43.* après avoir examiné tout au long la question si les comètes sont périodiques & reviennent après de longues périodes, finit par dire que cela n'est guère probable, & qu'il lui paroît qu'elles se forment de nouveau. (*Alm. 2. 58.*) Après avoir raconté différentes opinions sur la cause physique de leur formation, & n'étant point satisfait de ces différents systèmes, il propoie religieusement son avis, qui étoit de reconnoître à des aëres particuliers & volontaires de la toute puissance divine.

On voit avec peine l'illustre chancelier d'Angleterre, François Bacon, au nombre de ceux qui ont regardé les comètes comme des météores; il parle à la vérité des prédilections qu'on peut faire : *Prædilectiones fieri possunt de cometis, ut ut nostra fert conjectura præmonstrari possunt. (de augmentis scient. lib. 3, cap. 4, pag. 103, édition, 1740.)* Mais il met cette prédilection dans le catalogue de mille prédilections astrologiques, dont on étoit encore persuadé de son tems; il mourut en 1626.

Mais si l'on voit quelques philosophes avoir eu des idées si fausses & si absurdes sur les comètes on en trouve un grand nombre d'autres, même parmi les plus célèbres de l'antiquité, qui ont eu des notions plus justes sur cette matière.

Suivant Aristote même, *Meteor. lib. 1, c. 6.* quelques philosophes d'Italie, appelés pythagoriciens, soutinrent que les comètes étoient des astres errans qui ne paroissent qu'après un long espace de tems, de même que mercure se voyoit rarement & pendant peu de tems sur l'horizon; il ajoute qu'Hippocrate de Chio étoit du même sentiment avec tous ses disciples, & lui-même Asclépias.

Plutarque dit aussi que quelques pythagoriciens avoient regardé les comètes comme de véritables astres qui ne paroissent pas continuellement,

mais qui, après avoir achevé leur tour, revenoient dans des tems réglés; il ajoute que Diogène le pensoit ainsi, *de plac. phil. lib. 3, c. 2.* Quelques pythagoriciens croyoient que les comètes partoient du soleil, & y retournoient ensuite, parce qu'on avoit vu souvent autrefois les comètes disparaître dans les rayons du soleil. Aristote réfute à cet égard les pythagoriciens; mais Plin. a mal entendu le passage d'Aristote, quand il lui fait dire que les comètes ne sont jamais dans la partie occidentale du ciel. *Repler de cometis, pag. 96.*

Démocrite, qui, au jugement de Cicéron & de Sénèque, fut le subtil de tous les anciens: philosophes, avoit étudié chez les Caldéens. Il soupçonna, dit Sénèque (*Quaest. nat. lib. vij, cap. 1*) qu'il y avoit beaucoup de planètes dont chacune avoit son mouvement; mais il n'entreprit pas de les nommer & d'en assigner le nombre dans un tems où le cours des cinq planètes, étoit à peine bien connu.

A l'égard de la formation & de l'origine des comètes, je crois, comme Riccioli, qu'Aristote a mal interprété le sentiment de Démocrite & d'Anaxagore; ils ne pensèrent jamais, comme on l'a dit, que les comètes fussent formées par la réunion des planètes que nous connoissons, mais peut-être que les grandes comètes pouvoient se produire par la réunion de plusieurs autres inconnus; ce qui n'a rien que de très-physique & de très-digne de ces philosophes: ce fut aussi le sentiment de Zenon, Sénèque, *lib. vij, c. 19.*

Sénèque nous apprend qu'Appollonius le Myndien pensoit qu'il y avoit beaucoup de comètes, & que c'étoient autant d'astres particuliers aussi-bien que le soleil & la lune; mais que leur route s'étendoit dans le plus haut du ciel, & ne nous permettoit de les voir que dans la partie inférieure de leur cours. Sénèque parle dans le premier livre de ses *Questions naturelles*, de ces météores, que Plin. met au rang des comètes, *poëgonia, lampades, cyperisæ*; mais il n'en dit qu'un mot à l'occasion de ceux qui regardoient les comètes comme des météores: c'est dans son septième livre qu'il traite de la nature des comètes & de leur mouvement. On lui doit ce témoignage, qu'aucun auteur ancien n'en a parlé d'une manière aussi sublime que lui. On y voit briller la pénétration d'un homme de génie, & les grandes idées d'un esprit véritablement philosophique; il réfute les systèmes & les opinions absurdes de son tems, & il annonce à la postérité une connoissance exacte de ce qui lui étoit alors inconnu.

« On a cru, dit-il, que les comètes n'étoient point des astres, parce qu'elles n'ont pas la figure ronde des autres corps célestes. Mais ce n'est que la lumière qu'elles répandant qui est allongée; le corps d'une comète est arrondi: son éclat ou sa lumière la fait paroître allongée; & quoiqu'elle ait une autre figure, il ne s'ensuit

pas

pas qu'elle soit d'une espèce différente. La nature n'a pas tout fait sur un modèle unique, & c'est ignorer son étendue & sa puissance que de vouloir rapporter tout à la forme ordinaire : la diversité de ses ouvrages annonce sa grandeur. On ne peut point encore connaître le cours des comètes, & savoir si elles ont des retours réglés, parce que leurs apparitions sont trop rares; mais leur marche, non plus que celle des planètes, n'est point vague & déordonnée comme celle des météores, qui seroient agités par le vent. On observe des comètes de formes très-différentes; mais leur nature est semblable & ce sont en général des astres qu'on n'a pas coutume de voir, & qui sont accompagnés d'une lumière inégale; elles paroissent en tout temps & dans toutes les parties du ciel, mais surtout vers le nord; elles sont comme tous les corps célestes, des ouvrages éternels de la nature: la foudre & les étoiles volantes, & tous les feux de l'atmosphère, sont passagers, & ne paroissent que dans leur chute: les comètes ont leurs routes qu'elles parcourent; elles s'éloignent, mais ne cessent point d'exister. Vous prétendez que si c'étoient des planètes, elles se trouveroient dans le zodiaque; & qui donc a fixé dans le zodiaque les limites des corps célestes? Qui peut assigner des bornes aux ouvrages divins? Le ciel n'est-il pas libre de tous côtés? N'est-il pas plus convenable à la grandeur de l'univers d'admettre plusieurs routes différentes, que de réduire tout à une seule région du ciel? Dans cet ouvrage magnifique de la nature, nous voyons briller une multitude d'étoiles qui embellissent la nuit; elles nous apprennent que le ciel de tous parts est rempli de corps célestes. Pourquoi faut-il qu'il n'y en ait que cinq avec des mouvements qui soient réguliers? Pourquoi tous les astres doivent-ils être immobiles? On me demandera peut-être pourquoi donc il n'y en a que cinq dont on ait observé le cours. Je répondrai qu'il y a beaucoup de choses que nous savons être, sans savoir de quelle manière elles font. Nous avons un esprit qui agit & nous dirige; nous ne savons ni ce que c'est, ni comment il agit. Ne nous étonnons pas que l'on ignore encore la loi du mouvement des comètes dont le spectacle est si rare; qu'on ne connoisse ni le commencement ni la fin de ces astres, qui reviennent d'une énorme distance. Il n'y a pas encore quinze ans que la Grèce a compté les étoiles, & leur a donné des noms: (*Stellæ numero & nomina scit.*) Il y a encore bien des nations qui n'ont que la simple vue du ciel; qui ne savent pas même pourquoi ils voient la lune s'éclipser: il n'y a pas bien long-temps que nous le savons d'une manière certaine; il viendra un temps où, par l'étude de plusieurs siècles, les choses qui sont cachées actuellement paroîtront au grand jour. Un siècle

Mathématiques. Tome I, 1^{re} Partie.

ne suffit pas pour découvrir tant de choses, quand même on y donneroit tout son temps; cependant nous ne partageons que trop celui qui nous est donné: les vices en ont la plus grande part. On étudie quand on manque de spectacles, ou quand la pluie empêche les promenades. On conserve les noms des comédiens, mais on oublie ceux des philosophes. Un jour viendra où la postérité s'étonnera que des choses si claires nous soient échappées. On démontrera dans quelles régions vont errer les comètes, pourquoi elles s'éloignent tant des autres astres, quel est leur nombre & leur grandeur; ceux qui nous suivront trouveront des vérités nouvelles; conientons-nous de celles qu'on a découvertes: *Nec miremur tam tarde erui quæ tam alte jacent.* Que de choses dont l'existence nous est inconnue, & que l'auteur de la nature semble se réserver! Nous ne savons pas ce qu'est celui sans lequel rien ne peut être; quand on ignore ainsi la partie la plus essentielle de l'univers, on ne doit pas être surpris que les petites parties nous échappent.

Tel est l'abrégé des réflexions philosophiques de Sénèque, répandues dans son septième livre, que j'ai traduites & rapprochées pour en faire mieux sentir toute la force, & montrer tout le génie des anciens philosophes, même dans cette partie où l'observation ne leur avoit rien appris.

Descartes renouvella dans l'Europe le goût de la philosophie, non-seulement par des étincelles de génie, comme l'avoit fait Bacon en Angleterre, mais par une géométrie profonde & une physique toute nouvelle; il eut des comètes une idée plus juste que les astronomes même les plus célèbres & les plus occupés de l'étude des astres, quoiqu'il ne les eût étudiées lui-même que comme une branche de l'univers & de la nature, dont sa philosophie embrassoit la vaste étendue.

Descartes suppose qu'un astre placé d'abord dans un tourbillon quelconque, soit plus solide que les parties du second élément qui forment ce tourbillon: cet astre s'éloigne alors du centre, & passe dans les limites d'un autre tourbillon; il acquiert assez d'agitation pour passer au-delà, & entrer dans un troisième tourbillon, & continuer ainsi de l'un à l'autre. Ces astres, qui passent d'un tourbillon dans un autre, sont ceux, dit-il, qu'on nomme comètes. Nous verrons ci-après les découvertes de Newton mettre fin à toutes les disputes qu'il y avoit eu jusqu'alors sur les comètes.

Nombre des comètes. Riccioli, dans son énumération des comètes, n'en compte que cent cinquante-quatre, cités par les historiens jusqu'à l'année 1651, où il composoit son *Almageste*, & la dernière étoit celle de 1618. Mais dans le grand ouvrage de Lubienetz, où les moindres passages des astres sont scrupuleusement rapportés toutes les fois qu'ils ont le moindre rapport aux comètes

ais, on voit quatre cens quinze apparitions jusqu'à la comète de l'année 1665, qui parut depuis le 6 jusqu'au 20 avril, entre pégalé & les cornes du bélier. Depuis ce tems-là, on en a observé 46 en comptant celles qui ont paru dans l'année 1781: on trouvera un catalogue de toutes ces anciennes apparitions dans le recueil des *Tables astronomiques*, publié par l'Académie de Berlin, en 3 vol. in-8., en 1776, & dans le grand *Traité des comètes*, par M. Pingré, qui est actuellement sous presse. (1783.)

On en trouve aussi beaucoup de citées dans un ouvrage anglois, intitulé : *A general chronology*, &c.

Mais de toutes ces apparitions de comètes, nous n'en trouvons aucune dont la route soit décrite d'une façon circonscrite avant l'année 837, & le nombre de celles dont on a pu voir assez de circonstances pour calculer leurs orbites, se réduit jusqu'à 68, en ne comptant que pour une seule comète celles de 1456, 1531, 1607 & 1682, & de 1759, qui sont bien reconnues pour n'être qu'une seule & même planète. J'ai réuni de même celles de 1532 & 1661, & celles de 1264 & 1556, qu'on croit être les mêmes.

Au reste, nous devons être persuadés qu'il a paru de tout tems beaucoup de comètes, dont nos historiens ne parlent point, & qu'il y en a eu beaucoup plus encore qui n'ont point été aperçues. Les anciens même le faisoient; car Ptolémée avoit écrit, suivant Senèque (*Quæst. nat. lib. vij, c. 20*) qu'à la faveur de l'obscurité produite par une éclipse de soleil, on avoit vu une comète très-proche du soleil: c'étoit vers l'an 60 avant J. C. Ce qui donne lieu de croire que dans de pareilles circonstances, on en verroit souvent. Depuis l'année 1757, qu'on a attendu & cherché la comète de 1682, & que l'attention des observateurs s'est tournée de ce côté-là, on a observé vingt autres comètes dans l'espace de 24 ans. M. Messier, de l'Académie des Sciences, en a sur-tout découvert beaucoup: il y en a 8 qu'il a aperçues avant que personne en eût connu l'existence. M. Mechain, aussi de l'Académie des Sciences, en a découvert deux en 1781; & quand on prendra la peine de les chercher dans le ciel, on en trouvera sans doute un grand nombre.

Afflédus observe que, dans les années qui précèdent & suivent l'an 1101, date de la 225^e comète, on en vit presque toutes les années. *Lutienius theod. cometum.* Il est même arrivé plus d'une fois que l'on a vu en même tems plusieurs comètes. Riccioli en rapporte des exemples des années 729, 761, 1165, 1214, 1337, 1529, 1618. Au mois de mai 1748, on croit avoir vu trois comètes différentes dans un même mois. M. Struick, *Phil. Trans. t. 45.* Le 11 février 1760, on en voyoit deux. *Mém. Acad. 1760, pag. 168.* Il y a apparence qu'il existe plus de 300 comètes autour du soleil, & M. Lambert

conjecture qu'il peut y en avoir des millions. *Système du monde*, Bouillon, 1772.

Les comètes dont l'apparition a été la plus longue, sont celles qui ont paru pendant six mois; la première du tems de Néron, l'an 64 de J. C. (Senèque, *l. vij, c. 21*); la seconde vers l'an 503, au tems de Mahomet; la troisième en 1240, lors de l'irruption du grand Tamerlan. De nos jours, la comète de 1729 a été observée pendant six mois, depuis le 31 juillet 1729 jusqu'au 21 janvier 1730; celle de 1769 pendant près de 4 mois. Riccioli, dans son *Almageste*, t. 2, p. 24, nous donne une table de la durée de beaucoup d'autres comètes, suivant différens historiens: on y voit quatre comètes de quatre mois, savoir celles des années 676, 1264, 1363, 1433.

Mouvement des comètes. Toutes les comètes paroissent tourner comme les autres astres par l'effet du mouvement diurne; mais elles ont aussi un mouvement propre, de même que les planètes, par lequel elles répondent successivement à différentes étoiles fixes: ce mouvement propre se fait tantôt vers l'orient, comme celui des autres planètes, tantôt vers l'occident; quelquefois le long de l'écliptique ou du zodiaque; quelquefois dans un sens tout différent, & presque perpendiculaire à l'écliptique.

La comète de 1472 fit en un jour 120 degrés, ayant rétrogradé depuis l'extrémité du signe de la vierge jusqu'au commencement du signe des gémeaux, suivant l'observation de Regiomontanus (Riccioli, *Alm. 2. 8.*) La comète de 1760 entre le 7 & le 8 janvier, changea de 41 degrés en longitude; celle de 1770 fut à-peu-près dans le même cas: on pourroit citer d'autres exemples d'une très-grande vitesse observée dans le mouvement apparent des comètes, & elles pourroient aller bien plus vite, en apparence, si elles passaient plus près de la terre.

Quelquefois les comètes paroissent si peu de tems, que dans la durée de leur apparition, leur situation ne change que très-peu, mais il y a des comètes dont le mouvement est fort étendu. Celle de 1664 parcourut 160 degrés par mouvement rétrograde en apparence; & du 20 décembre jusqu'au 6 janvier 1665, en 17 jours, elle parcourut 143°: celle de 1769 parcourut 8 lignes, ou 240 degrés, tant avant qu'après la conjonction. Celle de 1556, un demi-cercle ou environ 180 degrés: celle de 1472 fit environ 170 degrés: celle du 1618 ne parcourut que 207 degrés; mais ce fut dans l'espace de 28 jours. Riccioli, *Alm. 2. 28.*

Kepler fut le premier qui entreprit de calculer l'orbite d'une comète, ou la trajectoire & la trace réelle de son véritable mouvement; il crut reconnaître que ce mouvement approchoit de la régularité d'une ligne droite: il dit même positivement à la page 35 de son livre de *Cometis*, que le cercle ne suffit pas pour représenter le mouvement de la comète de 1618, & que son mouvement a été exactement rectiligne: ainsi, jusqu'au

tems de Képler, on ne favoit presque rien du mouvement des comètes. Hévélius me paroît être celui qui, dans cette théorie, fit d'abord le plus grand pas, puisqu'il devina le premier, non-seulement que la route des comètes étoit courbée vers le soleil, mais encore que cette courbe étoit parabolique. Je crois à cette occasion devoir ici relever une injustice, que plusieurs auteurs modernes ont faite à ce grand homme. Une brochure allemande d'un nommé Doerfeld, imprimée en 1681, passe pour être le premier livre où l'on ait démontré que la parabole pouvoit représenter le mouvement des comètes. Doerfeld applique en effet cette méthode à la comète de 1681; mais il en conclut une distance périhélie dix fois plus grande qu'on ne l'a trouvée depuis: c'est cependant à lui qu'on a donné l'honneur de cette théorie, & c'est lui qu'on fait à cet égard le précurseur de Newton. On en juge bien autrement, lorsqu'on ouvre la cosmétopographie d'Hévélius, imprimée dès l'an 1668, c'est-à-dire, 13 ans avant la date de Doerfeld. Hévélius observe d'abord que tous les projectiles décrivent des paraboles, & qu'il n'y a de différence qu'à raison de la résistance de l'air; il décompose ensuite cette parabole pour faire voir qu'elle est le résultat d'une double impression: la ressemblance entre les projectiles que nous voyons fur la terre & les comètes, lui paroît évidente; il voit de part & d'autre une gravité, une tendance vers un centre commun, qui est le centre du soleil pour les planètes, & celui de la terre pour les corps terrestres; de part & d'autre un mouvement d'expulsion, de projection en ligne droite qui se combine avec la gravité pour former une parabole, en sorte que la comète abandonneroit la parabole pour suivre une tangente, si la gravité cessoit d'agir sur elle, comme elle tomberoit vers le soleil, si la force de projection ne l'en éloignoit pas. Ces idées d'Hévélius étoient bien singulières pour ce tems-là; s'il y eût appliqué la loi de Képler, c'est-à-dire, la règle des aires proportionnelles aux tems, il ne lui auroit rien manqué pour être en état de calculer les mouvemens d'une comète.

C'est à Newton qu'il étoit réservé de joindre cette découverte à tant d'autres: dans le tems qu'il étoit occupé de la théorie des forces centrales, & de la loi de l'attraction; on vit paroître la comète de 1680, qui réveilla l'attention des philosophes, produisit les réflexions ingénieuses de Bayle & les sublimes recherches de Newton sur cette matière. La première idée qui dut lui venir en voyant cette comète s'approcher du soleil le matin & s'en éloigner ensuite le soir, fut qu'elle tournoit autour du soleil, en vertu de l'attraction de cet astre & d'une force quelconque de projection, tout ainsi que les autres planètes. Sur ce simple soupçon, il étoit bien naturel d'en faire l'épreuve, & de tenter le calcul en employant les lois ordinaires des mouvemens des planètes: il le

fit; le succès fut complet, & toutes les observations que Flamsteed avoit faites sur cette comète, depuis le 12 décembre 1680 jusqu'au 5 février 1681, se trouvoient très-bien représentées par l'hypothèse de Newton, quoique le mouvement de la comète eût été plus de 130 degrés; il fut donc alors démontré que les comètes étoient de véritables planètes qui tournoient autour du soleil. Enfin le retour de la comète de 1682, observée en 1759, a donné le dernier degré de certitude & d'évidence à la théorie des comètes. Il étoit aisé de juger, par la rareté de leurs apparitions, que leurs orbites étoient très-vastes, très-allongées & très-excentriques, & qu'il n'y avoit qu'une petite partie de leurs orbites qui fût visible pour nous; dès lors il étoit naturel de calculer leurs mouvemens dans une portion de parabole, parce qu'il y a peu de différence entre une ellipse fort excentrique & une parabole, & parce que le calcul de la parabole est beaucoup plus facile que celui d'une ellipse. C'est la méthode que nous suivons encore pour déterminer les orbites des comètes, & dont nous allons expliquer les règles & les méthodes. Halley fut le premier qui calcula ainsi des orbites de comètes, qu'il publia en 1705.

Bradley resta seul après la mort de Halley, dépositaire de la méthode de calculer les comètes; il calcula celles de 1723, 1737 & 1742; & dans le mois de septembre 1742, il envoya en France les élémens de celle-ci, avec une idée de sa méthode, comme on le voit dans la *Théorie des comètes* de M. le Monnier. M. Maraldi, à l'occasion d'une petite comète qui avoit paru au commencement de l'année 1743, donna le premier calcul de comète qui ait été fait en France. (M. de la Caille, *Ephém.* 1765, pag. xliij.)

Supposons une comète qui tourne dans une parabole, dont le foyer ou le centre d'attraction soit au centre *S* du soleil (*plan. Astron. fig. 164*) & que cette parabole *PD* ait une distance périhélie *SP*, égale à la distance moyenne du soleil à la terre, ou au rayon du cercle que la terre est supposée décrire quand on néglige l'excentricité de son orbite. La vitesse de la comète en *P* est à celle de la terre dans son cercle, à pareille distance, comme la racine de deux est à l'unité, ou environ comme sept est à cinq; tel est le rapport des aires ou des surfaces décrites qui ont lieu perpétuellement dans la parabole & dans le cercle.

De-là on conclut que la comète arriveroit au point *O*, qui est à 90° du périhélie *P* dans l'espace de 109 jours 14^h 45' 20".

Connoissant le tems qui répond à 90° d'anomalie vraie, ou à l'angle droit *PSO*, on trouve le tems qui répond à une autre anomalie quelconque, ou à un autre angle *PSD*; car nommant *t* la tangente de la moitié de l'anomalie vraie, il suffit de multiplier le quart de 11 + 3 *t* par les 109 jours qui répondent à 90°, pour avoir le

tems qui répond à l'angle proposé. Par ce moyen qui est fort simple, on a construit une table parabolique, où pour chaque jour on trouve l'anomalie vraie correspondante: cette table se trouve fort au long dans mon *Astronomie*, dans le recueil des tables de Berlin, & dans le traité de M. Pingré. Cette table générale du mouvement parabolique de la comète de 1699 jours, sert pour toutes les autres paraboles, pourvu que l'on augmente les tems en raison de la racine carrée du cube de la distance périhélie; en effet, pour un même degré d'anomalie vraie, les carrés des tems de différentes paraboles, qui ont toujours le même rapport avec le cercle du rayon égal, doivent augmenter comme les cubes des distances périhélie, suivant la loi de Kepler, ou les tems, comme les racines carrées des cubes des distances périhélie: donc une seule table peut servir pour toutes les paraboles.

Par ce moyen, l'on divise en jours de grandes figures, où l'on marque la situation d'une comète sur son orbite de jour en jour, comme on le voit sur les paraboles de la figure 165 pour 10 jours, 20, 30, &c. de distance au périhélie; sur la plus petite parabole, on voit les jours 1, 2, 3, 4, &c.: j'ai donné les dimensions de ces paraboles calculées en détail dans les Mémoires de l'Académie pour 1773.

Avec la table parabolique, on trouve le passage d'une comète à son périhélie, lorsqu'on connaît le jour où elle étoit en un point D de sa parabole, fig. 164, & l'angle PSD d'anomalie vraie; ainsi, dès qu'on connaît l'anomalie d'une comète pour un jour donné, il est aisé d'en conclure quel jour elle a passé par son périhélie, & nous en indiquerons bientôt l'usage dans la détermination de ces orbites.

Par une autre propriété de la parabole, le rayon vecteur SD de la comète, ou sa distance au soleil, est égale à la distance périhélie SP , divisée par le carré du cosinus de la moitié de l'anomalie vraie c'est-à-dire de l'angle PSD . Ainsi, quand pour un tems donné l'on a trouvé l'anomalie vraie d'une comète dans son orbite, on a le rayon vecteur SD , en divisant la distance périhélie SP par le carré du cosinus de la moitié de cette anomalie; & si l'on a un rayon vecteur SD avec l'anomalie correspondante PSD , on peut également trouver la distance périhélie SP de cette même comète.

Enfin il y a une dernière propriété de la parabole, qui est d'un grand usage dans la détermination des orbites des comètes. Quand on connaît deux rayons vecteurs d'une parabole, comme SO & SD avec l'angle compris, on peut trouver la distance périhélie, & les deux anomalies qui répondent aux deux rayons vecteurs, en faisant cette proportion: la somme des racines des rayons vecteurs est à leur différence, comme la cotangente de la demi-somme des demi-anomalies

vraies est à la tangente de leur demi-différence. Quand on a la somme & la différence, il est aisé d'avoir chacune des anomalies vraies, & de trouver, par le tems qui leur répond, le moment du passage par le périhélie, en même tems que le lieu du périhélie de la comète.

Au moyen des théorèmes précédens, qui sont démontrés fort au long dans mon *Astronomie*, on peut trouver une parabole qui satisfasse à trois longitudes d'une comète observée de la terre, & c'est en quoi consiste le problème important de la détermination des orbites des comètes. Supposons que la terre soit en A (fig. 166) à une distance AS du soleil, & qu'elle voie le lieu de la comète réduit à l'écliptique sur un rayon AG , en sorte que l'angle SAG soit l'angle d'élongation, ou la différence entre la longitude du soleil & celle de la comète. On ne connaît dans le triangle ASG qu'un côté & un angle; on est obligé de faire une supposition ou une hypothèse sur la valeur du côté SG , distance accourcie de la comète au soleil; d'après cette supposition, arbitraire si l'on veut, mais qui sera vérifiée ou reformée par la suite du calcul, on cherche l'angle au soleil, ou la commutation ASG , en résolvant le triangle ASG , & l'on a la longitude héliocentrique de la comète; on en conclut sa latitude héliocentrique, sa distance vraie au soleil, ou le rayon vecteur. On fait la même chose pour une seconde observation faite, quand la terre étoit en B & la comète en H , & l'on a deux longitudes héliocentriques comptées sur l'orbite de la comète, & par conséquent l'angle des deux rayons vecteurs, qui est nécessairement la somme ou la différence de deux anomalies vraies; on en conclut chacune des deux anomalies par la règle précédente, & par conséquent le lieu du périhélie P , la distance périhélie SP , & le tems qui répond à ces deux anomalies dans l'hypothèse qu'on a faite sur la distance SG de la comète au soleil. Si l'intervalle de tems trouvé par le moyen de ces deux anomalies n'est pas d'accord avec l'intervalle donné des deux observations, c'est une preuve qu'une des deux distances au soleil, qui ont été supposées, doit être changée: on en conservera une, & l'on fera varier l'autre par diverses suppositions, jusqu'à ce qu'à la fin du calcul on trouve un intervalle de tems égal à celui des deux observations; alors on aura une parabole qui satisfait à toutes deux dans la première hypothèse faite sur la distance SG de la comète au soleil.

Mais il ne suffit pas d'avoir une parabole qui satisfasse à l'intervalle de deux observations, car il y en a une infinité; & à chaque hypothèse qu'on aura faite sur la première distance SG de la comète au soleil, on trouvera par les diverses suppositions de la seconde distance SH , ou de la distance du soleil, dans la seconde observation, une parabole qui satisfaisa aux deux mêmes observations. La difficulté qui reste, est de se déter-

miner par une troisième observation, c'est-à-dire, de faire un choix entre toutes ces paraboles qui représentent les deux premières observations, mais dont une seule doit s'accorder avec la troisième.

On calculera donc dans chaque hypothèse, ou dans chaque parabole, la troisième observation. Pour cet effet, on supposera que P soit le pôle de l'écliptique (fig. 167) $Q R N$ l'orbite de la comète, dont on connoît le mouvement $R Q$ entre les deux observations & les latitudes héliocentriques $R M$, $Q O$, on déterminera le lieu du nœud N , & l'angle d'inclinaison $R N M$. Connoissant le tems du passage au périhélie & le tems de la troisième observation, on trouvera par la table parabolique le mouvement d'anomalie; on en conclura la longitude héliocentrique de la comète sur l'orbite dans la troisième observation, sa latitude, sa distance au soleil; enfin sa longitude géocentrique, ainsi que pour les planètes. Si cette longitude calculée étoit d'accord avec la longitude observée, la parabole qu'on a employée seroit la véritable orbite; l'on n'auroit pas besoin d'examiner les autres hypothèses: mais cela n'arrive jamais. On est donc obligé de calculer ainsi la troisième observation dans différentes hypothèses, jusqu'à ce qu'on en ait trouvé une qui satisfasse à la troisième observation.

Celle des différentes hypothèses, qui s'accorde le mieux avec la longitude de la troisième observation, est la meilleure, & une simple proportion suffit quelquefois pour trouver une autre hypothèse qui satisfasse exactement à toutes les trois observations. Cette méthode indirecte & de fausse position, me paroît plus simple & plus commode que les méthodes plus directes & plus élégantes, données par les plus savans géomètres, depuis Newton jusqu'à nos jours. J'ai donné les détails, les préceptes, & les exemples de ma méthode dans le *XIX* livre de mon *Astronomie*; je ne pouvois donner ici que l'esprit de cette méthode.

C'est par des essais à-peu-près semblables, mais bien plus longs sans doute, que Halley détermina par les anciennes observations vingt-quatre paraboles ou orbites cométaires, y compris celle de 1698, Bradley, Maraldi, la Caille, Struyck, M. Pingré, M. Mechain, & moi, en avons calculé plusieurs autres, en sorte que le nombre s'est accru jusqu'à 68, y compris celle de 1783; mais je ne compte que pour une seule toutes les apparitions de celles dont les périodes sont connues. On trouvera ci-après le principal résultat de toutes les observations faites jusqu'à présent sur les comètes, page 368.

Les éléments d'une comète sont les six articles qui déterminent la situation & la grandeur de l'orbite qu'elle décrit, & qui établissent sa théorie, c'est-à-dire, le lieu du nœud vu du soleil, l'in-

clinaison, le lieu du périhélie, la distance périhélie, & le tems moyen du passage par le périhélie, qui tient lieu d'époque; enfin la direction de son mouvement qui peut être direct ou retrograde.

Le calcul fait dans une parabole, satisfait ordinairement à toutes les observations à 2 ou 3 minutes près; mais la comète de 1770 a exercé singulièrement les calculateurs: M. Prosperin reconnoît d'abord qu'il falloit employer trois portions de paraboles différentes pour représenter son apparition toute entière. Voyez *Brevi commentatio de motu cometae anni 1770*: cette dissertation a été insérée dans les Mémoires de l'Académie d'Upsal. M. Lambert pensoit qu'elle avoit été dérangée par l'attraction de la terre (*Mém. de Berlin*, 1770). M. du Séjour, dans son *Essai sur les comètes*, crut que ces différences tenoient à la parallaxe; enfin M. Lexell, après des calculs immenses, a trouvé qu'on ne pouvoit représenter ces observations que par une révolution de cinq ans & demi, ou 5, 585, & la distance moyenne 3, 14786. C'est une chose très-extraordinaire, & qui vient peut-être des grands dérangemens que cette comète a éprouvés par des attractions étrangères. Quoi qu'il en soit, j'ai mis dans la table les éléments qu'il a donnés. (*Mém. de l'Acad.* 1776, pag. 639, & 1777, pag. 352. *Mém. de Pétersbourg*, 1777, pag. 370.)

Le calcul fait sur ces élémens ne s'écarte presque jamais de 2 minutes de l'observation; & en supposant seulement une période de 7 ans, on trouve pour quelques observations des erreurs qui ne sont pas vraisemblables.

Comme cette comète dans son aphélie est presque dans la région de Jupiter, il peut se faire qu'elle ait été dérangée par cette planète, & qu'elle ait eu une orbite très-différente de celle de 1770 (*ib. p. 648*); sans cela elle auroit été vue plusieurs fois.

On avoit d'abord mis au nombre des comètes l'astre découvert par M. Herschel, le 13 mars 1781; mais on vit bientôt qu'il avoit beaucoup de ressemblance avec les cinq planètes. Voyez *HERSCHEL*.

Retour des comètes. Lorsque Halley eut calculé 24 orbites paraboliques pour les comètes, dont il put rassembler les observations, il vit que celles de 1607 & de 1682 se ressembloient beaucoup; la distance périhélie, la vitesse, l'inclinaison, le nœud, étoient presque les mêmes; il remonta encore 76 ans plus haut, & il trouva une comète observée en 1531, qui pouvoit s'accorder avec la même orbite; il soupçonna dès-lors que ce pouvoit être une même comète. Ce Cependant, dit-il, je me contentai de proposer mon idée comme probable, lorsqu'en 1705 je publiai pour la première fois cet abrégé; la différence des périodes & des inclinaisons me paroissoit un peu trop grande, pour oser prononcer sur l'identité

22 & les observations d'Apian & de Kepler, que
 23 j'avois employées dans le calcul des deux pre-
 24 mières, étoient trop imparfaites, ou plutôt trop
 25 grossières pour des recherches si délicates ;
 26 j'avertis cependant dès-lors les astronomes de
 27 la rechercher avec soin vers l'année 1758, où
 28 elle me sembloit devoir encore revenir ; mais
 29 lorsqu'après les recherches que je fis des an-
 30 ciennes comètes j'en eus trouvée encore trois
 31 autres qui avoient paru auparavant dans le même
 32 ordre, & à des intervalles de tems égaux ;
 33 savoir, en 1305, aux environs de Pâques, & en
 34 1380 (on ne sait pas dans quel mois) & en
 35 1456, au mois de juin : je repris un peu plus
 36 d'assurance dans mon premier sentiment. En
 effet, il finit cet article en disant : « Tel est
 l'accord des élémens de ces trois comètes, accord
 qui seroit bien étonnant, si c'étoient trois co-
 mètes différentes, ou que ce ne fût pas le retour
 d'une comète dans un orbite elliptique qui passe
 assez près de la terre & du soleil ; si donc elle
 revient encore, suivant notre prédiction vers
 l'an 1758, la postérité se souviendra que c'est à
 un anglais que l'on en doit la découverte. »
Voyez la Théorie des Comètes de Halley, que j'ai
publiée avec les tables en 1759 ; j'y ai donné l'his-
toire de l'apparition de cette comète en 1758 &
1759, par laquelle cette prédiction de Halley fut
parfaitement confirmée.

Il y a encore deux comètes dont la période
 paroit connue, & dont on espère le retour ; 1.^e celle
 de 1532 & 1661 qu'on attend pour 1789 ou 1790.
 Cette comète de 1532 & 1661 se retrouve dans
 les historiens & sur-tout en 1402, 1145, 891,
 845, & même 11 ans avant J. C., de manière
 que ce qu'on en rapporte s'accorde avec les élémens
 calculés par M. Pingré. La pièce de M. Méchain
 qui a remporté le prix de l'Académie en 1782,
 & qui est dans le Tome X des *Mémoires présentés*
par des savans étrangers, contient des calculs très-
 détaillés sur les apparitions de 1532 & de 1661, &
 il en résulte quelque doute sur l'identité de ces
 deux comètes, il faut donc attendre l'événement ;
 mais si cette comète arrivoit à son périhélie dans
 le mois de juillet, on la verroit difficilement &
 elle pourroit bien nous échapper. 2.^e La comète de
 1264 & celle de 1556, doit reparoitre proba-
 blement en 1848 ; mais les observations de 1264
 ont bien peu de précision pour établir l'identité.
 Au sujet de cette comète, on peut voir les *Mém.*
de l'Acad. 1760, pag. 192. Enfin la grande comète
 de 1680, suivant Halley, devroit reparoitre en
 2254. Il croit que c'est celle qui parut du tems
 de César ; dans ce cas-là ce seroit aussi celle dont
 parle Homère (*Iliad. IV. 75.*) & elle auroit paru
 619 ans avant J. C. Si cette comète de 1680 achève
 sept révolutions en 4028 ans, elle a dû passer près
 de la terre 2349 ans avant J. C., & peut servir
 à ceux qui veulent expliquer physiquement le
 déluge, comme Whiston, (*New theory of the*

earth, page 186.) Mais il y a des doutes sur cette
 période, parce que la comète de 1680 n'auroit
 pu être au mois de mars 1266 dans le cancer, &
 aller contre l'ordre des signes ; elle auroit dû être
 directe & dans le tauran. Quoi qu'il en soit de
 cette dernière, il est évident par le retour de la
 comète de 1682, que les comètes sont périodiques,
 & que leurs orbites sont elliptiques, de même
 que celles des planètes. La distance aphélie de la
 comète de 1759 est de 1200 millions de lieues,
 & c'est celle qui s'éloigne le moins du soleil ;
 on peut juger par-là de l'énorme distance de toutes
 les autres, & de la longueur de leurs révolutions.

Lorsqu'on a observé deux apparitions d'une même
 comète, la différence des deux passages au péri-
 hélie donne la durée de sa révolution. Ainsi, la
 comète de 1682 passa par son périhélie le 24 sep-
 tembre, & celle de 1759, qui suivit la même
 orbite, passa par son périhélie le 12 mars ; la
 différence est de 76 ans & demi, c'est la durée
 de sa révolution ; mais cette dernière révolution
 avoit été un peu allongée par des attractions étrangères.

Connoissant la durée de la révolution, 18-70
 jours, on trouve la distance moyenne au soleil
 par la loi de Képler, que les carrés des tems font
 comme les cubes des distances ; cette distance est
 18,075759 ; on connoit donc le grand axe de
 l'ellipse que la comète a réellement parcourue, de
 même que la distance périhélie, & par conséquent
 l'excentricité : on en conclut facilement son anoma-
 lie moyenne & ensuite son anomalie vraie &
 son rayon vecteur, par les méthodes que nous
 avons expliquées au mot ANOMALIE ; ainsi, l'on
 calcule le lieu d'une comète de la même manière
 que celui d'une planète.

Une seule apparition d'une comète observée
 pendant quelques mois, pourroit suffire à la ri-
 gueur pour déterminer cette ellipse toute entière,
 & par conséquent pour connoître la distance
 moyenne & la révolution, & prédire le retour
 de la comète ; mais la partie que nous pouvons
 appercevoir de la terre, est si petite en compa-
 raison de la partie de l'orbite qui échappe à notre
 vue, que les erreurs inévitables de nos obser-
 vations produiroient des erreurs énormes dans
 de semblables prédictions. Il est inutile de les entre-
 prendre, ni de chercher le retour d'une comète,
 si ce n'est quand on l'a déjà vu deux fois. Ce-
 pendant M. Euler a donné des formules pour le
 même objet dans un ouvrage intitulé : *Recherches*
& calculs sur la vraie orbite elliptique de la comète
de 1769 & son tems périodique, exécutés sous la
direction de M. Léonard Euler, par les soins de
M. LEXELL, adjoint de l'Académie impériale des
Sciences de Pétersbourg ; à Pétersbourg, de l'im-
primerie de l'Acad. impér. des Sciences, 1799 pages
11-4. avec figures. Il détermine dans cet ouvrage
 la révolution par trois observations ; mais supposant
 que les erreurs des trois observations employées
 par M. Euler soient d'une minute, la révolution

peut aller de 449 ans à 519 ans dans les cas extrêmes : cela suffit pour faire voir qu'on ne peut espérer de donner quelque chose de probable sur le retour de la comète de 1769. Mais il y aura des comètes où les erreurs des observations ne produiront pas de si grandes différences sur la période ; ainsi, il ne faut point regarder comme indifférentes les recherches qu'on peut faire sur la révolution des comètes, par une seule apparition. Indépendamment de l'élégance géométrique & analytique de ces formules de M. Euler, elles pourront devenir utiles aux astronomes lorsqu'ils auront des comètes observées assez long tems & assez exactement pour espérer d'en pouvoir prédire le retour par une seule apparition, & il y en aura probablement quelques-unes dans ce cas-là.

Les calculs que M. Lenzel a faits sur trois observations sont si considérables, qu'on ne se plaindra pas qu'il en soit demeuré-là ; mais il eût été à souhaiter qu'il parût déterminer la même période par d'autres observations prises trois à trois, & calculer les erreurs de l'hypothèse elliptique & de l'hypothèse parabolique dans chaque observation, pour voir un peu plus exactement quelle est enfin la précision avec laquelle nous pouvons croire que la période de cette comète de 1769 est connue. M. de la Grange dans les Ephémérides de Berlin pour 1783, & dans les Mémoires de Berlin pour 1778, a donné une méthode analytique pour trouver aussi la période d'une comète par une seule apparition ; enfin il y en a une de M. le Marquis de Condorcet dans la pièce qui a remporté le prix de Berlin, & qui a été imprimée à Utrecht en 1780 avec celles de M. Tempelhoff & de M. Henner.

La comète de 1779, calculée par M. Prosperin, lui parait avoir une période de 1150 ans ; il a aussi cherché à découvrir la période de la comète de 1773. *Ephém. de Berlin 1777, page 127.*

Mais ces calculs exigeroient une bien grande précision dans les observations, & ces périodes doivent être bien altérées par les attractions, comme on en peut juger par ce que nous avons dit de la comète de 1770, & ce que nous dirons de celle de 1759.

Perturbations des comètes. L'attraction universelle des corps célestes, prouvée par tous les phénomènes célestes, doit se manifester dans le dérangement des comètes. Halley s'aperçut que la comète de 1682 avoit en une de ses périodes plus courte que l'autre, & il en attribuoit la cause à l'action de Jupiter ; mais il n'avoit fait à cet égard aucune espèce de calcul.

La même comète ayant reparu en 1759, sa période s'est trouvée plus longue que la précédente d'environ 600 jours ; & il est prouvé actuellement que les attractions seules de Jupiter & de Saturne pouvoient produire une aussi grande différence. Dans le tems que nous étions occupés à chercher la comète, je proposai en 1757 à M. Clairaut, de lui calculer une table des distances de cette

comète à Jupiter & à Saturne, depuis 1731 jusqu'à 1759, avec les angles de commutation & les forces attractives de ces deux planètes sur la comète, afin qu'il y appliquât la théorie du problème des trois corps, & que nous puissions voir si cette attraction devoit accélérer ou retarder le retour qu'on attendoit pour 1757 ou 1759. Ce travail étoit immense ; mais il eut tout le succès que nous en espérons, comme je l'ai expliqué fort au long dans l'*Histoire* & dans les *Mémoires de l'Académie pour 1759*. M. Clairaut trouva que la révolution de la comète devoit être plus grande environ de 611 jours que celle de 1607 à 1682 ; savoir, de 100 jours par l'action de Saturne, & de 511 jours par l'effet de Jupiter. Suivant ces premiers calculs, elle devoit passer dans son périhélie au milieu d'avril (*Voyez ma Théorie des comètes, à la suite des Tables de Halley, 1759, pag. 110.*). Elle y passa le 13 mars ; & malgré l'immensité des calculs que nous fîmes M. Clairaut & moi, les quantités négligées produisirent un mois d'erreur dans la prédiction ; mais M. Clairaut l'avoit prévu, & il a fait voir ensuite que l'erreur se réduisoit à 22 jours, & qu'il y auroit des moyens de pousser l'approximation assez loin, pour rendre l'erreur encore moindre, à moins que d'autres attractions ne se joignissent à celles de Jupiter & de Saturne. Les recherches de M. Clairaut sur cette matière, se trouvent en abrégé dans une pièce qui a remporté le prix de l'Académie à Pétersbourg en 1762, & plus en détail dans sa *Théorie du mouvement des comètes* (1760, 241 pages in-8°). On trouvera aussi de savantes recherches de M. d'Alembert, sur le même sujet, dans le second volume de ses *Opuscules Mathématiques*, pag. 97 & suivantes, & dans la pièce de M. Albert Euler, qui a remporté, en 1762, le prix proposé par l'Académie de Pétersbourg, concurremment avec M. Clairaut. Enfin, l'Académie ayant proposé le même sujet pour le prix de 1780, M. de la Grange a composé une très-belle pièce sur ce sujet.

Table des Comètes.

Nous terminerons l'Astronomie cométaire par la table de toutes les comètes connues ; nous en avons expliqué le calcul ci-devant page 365. En consultant cette table, on voit aussi-tôt si une comète nouvellement observée ressemble à quelqu'une de celles qui avoient été vues précédemment ; dès-lors sa révolution se trouve connue.

Au moment où l'on imprimoit cette table, j'aurois voulu l'augmenter par une nouvelle comète que M. Méchain a découverte le 26 Novembre 1783 dans la constellation du bélier ; il l'a observée aussi-tôt, mais les calculs ne sont pas achevés. Cette comète est extrêmement petite, & ne ressemble qu'à une nébuleuse fort obscure ; le voisinage d'une étoile de 8^e grandeur faussait pour la faire disparaître dans la nuit.

É L É M E N S DES LXVII COMETES

Qui ont été observées assez exactement pour pouvoir être calculées.

Ordre des Comètes.	Année de l'appar.	Longitude du Nœud ascendant.			Inclinaison de l'Orbite.			Lieu du Périgée.			Distance périhélie celle du Soleil étant 1.	Passage au périgée Temps moyen à Paris.		Mouvement.	Noms des Auteurs qui ont calculé ces Orbites.
		S. D. M. S.	D. M. S.	S. D. M. S.	S. D. M. S.	S. D. M. S.	Jours.	H. M. S.							
I.	1797	5 18 13	10 00 12	2 12 1	13 11	1	13 11	1 Mars	7 11	0	Rétrograde.	M. Pingré.			
II.	1791	0 12 10	6 5	2 15 35	0 44 5	0	0 44 5	12 Janv.	7 11	0	Directe.	M. Pingré.			
III.	1766	1 18 0	15 10	2 11 0	0 41 11	0	0 41 11	6 Juillet	1 0	0	Directe.	Danthon.			
IV.	1799	1 18 45	10 21	2 1 45	0 31 79	0	0 31 79	17 Juillet	6 10	0	Directe.	M. Pingré.			
V.	1801	1 17 1	13 17	0 3 10	0 31 79	0	0 31 79	11 Mars	7 11	0	Rétrograde.	M. Pingré.			
VI.	1797	1 18 env.	78 env.	2 00 10.8	0 41	0	0 41	21 Octob. environ.	1 0	0	Rétrograde.	M. Pingré.			
VII.	1797	1 18 10	12 11	3 7 12	0 40 65	0	0 40 65	1 Juin	6 14	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
VIII.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	M. Pingré.			
IX.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	M. Pingré, à-peu-près.			
X.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XI.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XII.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XIII.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XIV.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XV.	1791	0 12 10	12 11	0 10	0 44 5	0	0 44 5	1 Juin	0 4	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XVI.	1809	1 10 11	17 2	AR 3 16	0 38 00	0	0 38 00	16 Oct.	1 17	0	Rétrograde.	Halley.			
XVII.	1648	2 16 1	21 18	10 18 10	0 31 53	0	0 31 53	17 Août	1 12	0	Rétrograde.	Halley.			
XVIII.	1618	3 16 1	17 34	0 3 16	0 37 57	0	0 37 57	1 Août	1 12	0	Directe.	Halley.			
XIX.	1618	0 12 10	6 5	2 15 35	0 44 5	0	0 44 5	12 Novemb.	1 12	0	Directe.	Halley.			
XX.	1661	1 18 30	10 21	2 1 45	0 31 79	0	0 31 79	17 Janv.	1 16	0	Directe.	Halley.			
XXI.	1664	1 18 10	12 11	3 7 12	0 40 65	0	0 40 65	1 Decembr.	1 16	0	Rétrograde.	Halley.			
XXII.	1665	2 17 3	26 5	0	3 18 16	0 36 58	26 Avril	1 16	0	Rétrograde.	Halley.				
XXIII.	1693	2 17 30	10 21	2 1 45	0 31 79	0	0 31 79	1 Mars	1 16	0	Directe.	Halley.			
XXIV.	1697	1 18 40	72 11	4 16 17 1	2 20 19	0	2 20 19	6 Mai	0 15	0	Rétrograde.	N. Sully.			
XXV.	1671	1 15 10	0 3 10	0 3 10	37 40	0	37 40	18 Août	1 16	0	Rétrograde.	Halley, à-peu-près.			
XXVI.	1676	1 18 30	17 45	0 18 12	12 19	0	12 19	1 Decembr.	1 16	0	Directe.	Halley.			
XXVII.	1619	1 18 30	0 18 12	0 18 12	12 19	0	12 19	1 Septembr.	1 16	0	Rétrograde.	Halley.			
XXVIII.	1676	1 18 30	0 18 12	0 18 12	12 19	0	12 19	1 Juillet	1 16	0	Rétrograde.	Halley.			
XXIX.	1676	1 18 30	0 18 12	0 18 12	12 19	0	12 19	1 Juin	1 16	0	Directe.	Halley.			
XXX.	1636	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	16 Septembr.	1 16	0	Directe.	Halley.			
XXXI.	1693	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Decembr.	1 16	0	Rétrograde.	M. Pingré, à-peu-près.			
XXXII.	1698	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Oct.	1 16	0	Rétrograde.	Halley.			
XXXIII.	1698	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Rétrograde.	Halley.			
XXXIV.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XXXV.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XXXVI.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XXXVII.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XXXVIII.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XXXIX.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XL.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XLI.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XLII.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XLIII.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XLIV.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			
XLV.	1701	1 18 40	11 21 45	2 27 10	13 10	0	13 10	1 Janv.	1 16	0	Directe.	La Caille, à-peu-près.			

SUITE

646397



Digitized by Google



